



15 ad 3.



66  
VII  
18

12  
13  
H  
4







*A. V. B.*

EDOARDI VVOTTO-  
NI OXONIENSIS DE  
DIFFERENTIIS ANI-  
MALIVM LIBRI  
DECEM.

AD SERENISS. ANGLIAE REGEM  
EDOARDVM VI.

Cum amplissimis indicibus, in quibus primùm authorum nomina,  
unde quæquæ desumpta sunt, singulis capitibus sunt notata & defi-  
gnata: deinde omnium animalium nomenclatura, Itẽmque singu-  
larum eorum partes recensentur, tam græcè, quàm latinè.

*Domus: Cantabrigiæ Scholam Brien*



LVTETIAE PARISIORVM  
APVD VASCOSANVM.

M. D. LII.

*A. V. B.*

Cum priuilegio Regis.

*Ex Sched. Franc. dom. Ruben*

THE HISTORY OF THE

REIGN OF KING

CHARLES THE FIRST

BY JOHN BURNET

1679

AT THE UNIVERSITY OF OXFORD

PRINTED BY J. STANLEY

IN THE YEAR 1679  
BY J. STANLEY  
PRINTED BY J. STANLEY  
IN THE YEAR 1679

Printed by J. Stanley

THE HISTORY OF THE

REIGN OF KING

CHARLES THE FIRST

1679

1679

1679

IN LIBRVM DE ANIMALIVM DIFFEREN-  
tiis, Edoardi Vvottoni Oxoniensis præfatio, Ad serenissimum  
Angliæ Regem Edoardum, eius nominis sextum.



**Q**VONIAM uel temeritate quadã inductus,  
uel ingenij confidentia ad hoc inflammatus  
uideri possum, Edoarde Rex illustrissime, ut  
de animalium differētiis scriberem: hac præ-  
fatione apud tuam Maiestatem, qua studio-  
rum meorum conatus aduersus illius culpæ  
iniuriam defenderem, ac tuerer, utendum  
esse iudicaui. Quod equidem eò libentius fa-  
ciendum putauī, quòd alius nemo occurre-  
ret, cui iustius otij mei rationem redderem: quem & natura mihi prin-  
cipem, uitæque rectorem, & uoluntas mearum actionum moderato-  
rem constituerunt. Simulque etiam expetebat animus hoc modo lite-  
rarum studiosis hominibus cognitum & perspectum esse, primùm quis  
fuerit huius laboris initio conatus meus: deinde, quæ causæ me huius  
ingenij tenuitatis non inscium ad hoc opus suscipiendum impulerint:  
denique quidnam id sit, quod in hac re præstare, & perficere uoluerim.  
Id uniuersum quicquid sit, si minus, quàm pro dignitate tantæ rei esse-  
ctum esse uidebitur: spero bonos uiros, non uoluntatem mihi, sed uires  
defuisse cognituros. Quo nomine maiorem in illis iudiciorum æquita-  
tem mihi promitto, si quid forte in istis uel erratum, uel non satis accu-  
rate tractatum inuenerint, rei in qua operam studiũque posuimus dif-  
ficultate perspecta, & uoluntate communia studia iuuandi considerata.

Equidem cum ante multos annos, quoscunque nancisci licuit autho-  
res, quatum legendi & studendi mira auiditate tenebat, antiquissimos  
optimosque euoluissim: quicunque eam doctrinæ partem scriptis illu-  
strassent, quæ ad rem medicam pertinerent, præclare quidem omnia à  
plerisque descripta & exulta animaduerti: eius tamen generis esse uide-  
bantur, quæ lectorem requirerent attentum, literarum meditationi ue-  
hementer deditum, in omni scriptorum uarietate uersatum, præstanti  
quadam memoriæ ui, naturæque bonitate singulari præditum: si cun-  
cta illa parata ac præsentia habere uellet, quæ usui forent: præsertim quū  
illa non uno loco, aut intra unius scriptoris operum septa, sed passim &  
uelut in medio posita, maxime uero in latissimis illis philosophorum &  
historicorum campis inuenirentur. Hæc res usque adeo animum meum  
commouit, ut commentarios quosdam subseciuis operis mihi cōficien-  
dos proponerem, quorum ueluti indicio ad authores ipsos, si usus postu-  
laret, in re dubia consilij capiendi gratia facile deduci possem. Qua in  
re quum diu multumque laborassem, & nonnihil assecutus mihi uide-

# P R A E F A T I O.

rer, posteaquam doctissimorum uirorum commentaria Ioānis primūm Ruellij, deinde Georgij Agricolaē amici quōdam & familiaris mei scripta & in lucem edita uidissem : maxima tandem me laboris parte leuatū sanē intelligebam . Nam hic de iis omnibus, quæ intra terræ uiscera nasci, animaque carere natura uoluit, cuiusmodi sunt metallici terrarum lapides, atque id genus alia . Ille de iis quæ super terram aluntur, quales sunt stirpes omnes, deque earum rerū natura uniuersa, (quæ omnem ferè medicam materiam in se complectuntur) ueterum in hoc genere scriptis adiuti, tanta eruditione, iudicio, copia, & orationis luce scripserunt, ut frustra in iis postea operam studiūque ponendum existimauerim . Illam itaque Venerem tam feliciter exorsam, & egregiè perfectam probandam & suspiciendam, non aliqua noua audacia attingendam esse censui . Vnum tamen hoc restare uidebatur, quod nimirum intellexerim, quæ de natura eorū, quæ in aëre, aut sub aquis uitam agāt, hoc est de animalium generibus uariè & fusè à ueteribus scripta fuere, qui collegerit adhuc extitisse neminem . Quamobrem in huius operis meditationem, si quando per negotia licebat, & quidpiam subsceui temporis incidebat, omni cura & conatu incumbendum esse duxi . Res uerò tandem eò perducta est, ut cū ipse mihi satisfecissem, & hanc studiorum meorum partem cum quem animo finem constitueram assecutam uidissem : uehementer à me contenderint ex amicis doctissimi quidam uiri, quibus labores meos communicaueram, ut quod mihi in hac re studiorum ueluti compendium parassem, id studiosis omnibus publicarem . Hic hæsisse me fateor, mihiq; ipse iam omni consilio destitutus uidebar . Nam neque amicorum flagitationi, ne ingratus: neque publico commodo, ne ingratisissimus existimarer, deesse potui . Cum uero mecum cogitarem, quàm ab eo alienum esset uitæ meæ institutum, & omnis studiorum ratio, ut editis aliquando libris iudicium orbis subire uellem, quàm nihil temporis scriptioni, nihil humanioribus literis, quibus styli uirtus dignitasque aliqua parari posset, dedissem : contrà quàm omne tempus in eorum scriptis, qui philosophiam, aut medicinam ingeniorum monumentis græcis aut latinis iuuerunt consumpsissem, nec alium laboris mei finem mihi proposuissem, quàm ut eā solū intelligerem : inclinatam ferè uoluntatem reuocaui, nec illi animi mei inductioni locum dare uolui, senex in eam arenam ut descenderem . Verum enim uero magnæ istæ causæ non erant, erant tamen, sed ad amicorum studia non erant magnæ satis . Itaque quid istuc inquam? Si isthunc animum induxistis uestrum esse utile: nolo reip. ullum cōmodum in me claudier. Ergo ne amicorum uoluntates contemnere tam ardentes, nè ue publicum commodum morari uideremur, publicāda hæc nostra recepimus, non tamen quoquo modo, sed quæ inter nos conuenerunt, ea si seruarentur. Sunt autem illa huiusmodi, Ioannes est Maſonus, amicus meus singularis & patronus, uir præter fortunæ splendorem, quo

uirtus illum extulit, omnibus cum naturæ, tum industriæ adiumentis eximie ornatus. Is tuo iussu ac uoluntate in Galliam proficiscēs, ut apud Henricum regem legatione fungeretur, accepto à me libro, uel extorto potius, pactus est curatum se, si facta legendi copia excellenti illic doctrina ac iudicio præditis hominibus probaretur, & cum allaturus fructum uideretur, qui hic à plerisque sperabatur, cum ut typographo daret, sin aliter eueniret, mihi meum redderet, ipse ne hoc amplius exposceret. Quibus rebus ad exitum huius cōsiliij non omnino temerarij, aut arrogantis adductus sum, habes illustrissime Rex. Quid uerò in hoc genere effecerim, atque utinam aliquid effecissem: sed quid efficere uole- rim, nunc accipies. Cùm in animo mihi esset animalium rationem quo potissimum modo dignosci possent, excutere atque explicare: cùm alios nonnullos, tum uel maxime Aristotelem proponēdum putauī, quem in ea re imitarer, scriptorem certè in omni doctrinarum genere excellen- tem, & propè singularem, quo uel Cicerone teste, nihil acutius, nihil po- litius. Hoc igitur ceu itineris duce usus, (explicata tamen prius & decla- rata ratione qua animalium differentiæ inueniri possint) initium paulò altius ab ipso Animali repetere institui, & ita repetere, ut si quæ non il- lius propria, sed superiorum generum communia occurrerint, ea ipsa suo, hoc est primo loco, plana fecerim. Multa enim in pluribus etiam ge- nere diuersis eadem reperiuntur. In sequentibus deinde, si quæ species sub se non multum inter se differētes, sed in eodem genere positas com- plectebantur: ea ita tractaui, ut communis ipforum natura postulabat. Post hæc species ipsas ad sua quasque genera reduxi, quæque propria ip- sarum essent, easque ab aliis rebus omnibus separarent, ea statim adiun- xi. Sic etenim probaturum me omnibus hanc docendi uiam arbitrabar, si ea quæ generis natura ad species pertinebāt, in speciebus nō reperiren- tur, sed ita orationem formarem, ut neque rebus obscura fieret, neque uerbis superuacaneis redundaret. Iam ~~æliæ~~ ad marginem & in fine ca- pitum apposui, earum rerum, quas, quòd scitu dignæ erāt, impeditas re- linquere consultum non fuit: neque tamen contextui ea inserere uolui; quòd uerebar ne tædium lectori, non uoluptatem essent allatura. Quid, quòd multa ex iis ne inferi quidem possent? nisi forte quibus de rebus uariæ sunt authorum sententiæ, uariæ codicū lectiones, eas res à propo- siti serie non putes seiungendas. Quid, quòd sæpe sola certorū animalium nomina inueniuntur, sæpe, licet præter nomina uim eorum propriam descriptam uideris, ignorabis tamen, quo pertineant, aut ferantur. Omit- to græcæ linguæ phrasēs, quæ subinde tales sunt, ut latina eas lingua non assequatur. Omitto uersiones hominum doctissimorum, in quibus uel primas tenebat Theodorus Gaza, quæ si quando à græcorum au- thorum mente aberrabant, in uiam ut redirent curati. Neque uerò un- quam cuiusquam errores dissimulandos, sed semper & sine conuitij su- spicione prodendos, & sine ostentatione ingenij corrigendos esse iudi-

# P R A E F A T I O.

eau i. Cum igitur latina græcæ lectionis ope facta testæ præstarentur, si græca ipsa uitio afficiebantur, nec occurreret ulla ratio corrigendi, coniectura apta & idonea utendum censui. quod à nobis factum est, cum in aliis quibusdam, tum etiam in Athenæo & Oribasio, quod horum authorum exemplaria minus multa suppetebant. Atque ut nostræ coniecturæ intra sententiarum contextum locum habere non debebant: sic si quæ breuiter à nobis ideoque obscure tractata fuere, (quoniam ut breuitatis studiosi fuimus, ita & obscuritatem quantum licuit, uitauimus) eadem fusius & maiore luce ab aliis explicata cognouimus, id iudicauimus in uoluminum marginibus magna diligentia adnotandum. Postremo si quid forte occurreret, quod uel propter rei obscuritatem intelligi non poterat, uel propter meam incitiam à me intellectum non erat, id à me non est dissimulatum: sed in marginum quoque spatii ascriptum, quod alij cum in ea loca inciderint, facilius per otium quid sit, uniuersum poterunt inuestigare. Atque hæc quidem hæctenus. Illud ab omnibus uehementer peto, cum plerisque non minor, bonis certe maior etiã existimationis, quàm uitæ cura sit: si quæ sint in hoc opere, cuiusmodi multa esse scio, non ea circumscriptione cõclusa, qua debet: si sermo minus elegans, & politus, si dicendi genus scabrum & inæquabile cuiquam uideatur: ut hanc à me institutam fuisse commentandi rationem perpendat: ut quæ in singulis authoribus repererim, ea uerbis non meis, sed ipsorum reddiderim, si quidem latine fuissent scripta. Nam è græcis, quæ fuerunt translata, in iis interpretum uerba assumere uolui, ea quæ à græcis non discrepare animaduerti. Neque hic ferè quicquã inuenies, quod è meo capite natum statuatur. Veterum scriptorum sententias in unum quasi cumulum coaceruau i, de meo nihil addidi. Atque illis ipsis ueteribus, ne in furti crimen fortè uocarer; singulis sua reddidi, descriptis nõ solum ad finem huius præfationis authorum nominibus, unde quæque desumpta sunt, ueruntiam cuique capiti præfixis. Iam ne uniuersa tibi euoluere necesse sit, in aliis studiis occupatissimo, cum pauca fortassis de siderentur, indices quosdam rerum omniũ, qui non modo quid in quoque libro, sed etiam quid in singulis cuiusque libri capitibus tractetur, admoneant, conficiendos, & uniuerso operi præponendos putau i. Quo fiet ut & temporis rationi in his legendis consulatur, & ad id quod quæsierit aliquis, ueluti manu quadam ductus in eo solo legendi labore ponat. Qua in re si unius labor, multorum otio consuluit, non est hoc committendum, ut multorum otium unius laboris conuitium faciat.

Tuæ itaque Maiestati, princeps optime, hoc quicquid est laboris dicere idcirco æquissimum putau i: quandoquidem si qui fructus ex his percipi posse uideantur, eorum primitias tibi offerèdas iure existimauerim, cui uni me meaque dedo, prout omnia debeo. Christus seruet tuam serenitatem diutissime incolumem.

Londini. X XII. Octobris M. D. LI.



PRIVILEGII SENTENTIA.

CAVTVM est autoritate regia, ne quis alius præter Vascofanum, hos decem libros Edoardi Vvottoni philosophi & medici clarissimi, De differentiis animalium, ante sexennium in hoc Francorum regno imprimat, nèue uendat. Qui secus fecerit, libris & pœna in sanctione æstimata, mulctabitur. Datum Lutetiæ Parisiorum IIII Nonas Ianuarij M. D. LII.

Guyot.



SVMMATIM HÆC INSUNT LIBRIS  
SINGVLIS, ATQVE EX IIS AV-  
THORIBVS EXCERPTA.

In primo libro generatim explicatur, quibus modis constituuntur animalium Differentiæ: & præterea animalium partes recensentur.

**A**NIMAL quid sit, & quò differat ab iis quæ non sunt animalia. Ex authoribus. Platone in Timæo. Aristotele in historia animalium.

De partibus animalium. De generatione animalium. De Anima. De sensu & sens. De Iuuent. & senect. De somno & uigil. De Respiratione. Et Plinio. Cap. i. Fol. i.

Quibus modis constitui debeant animalium Differentiæ. Ex Aristotele in histor. animalium. De partib. animalium. De sensu & sens. ca. ii. fo. i. b.

Animalium genera amplissima. Ex Aristotele in historia animalium. cap. iii. fol. i. b.

De partibus animalium. Authores. Aristoteles in historia animalium. De partib. animalium. Galenus in li. De placitis Hippocratis & Platonis. In Methodo medendi. De inæquali intemperie. De facultatibus naturalibus. De usu partium. cap. iiii. fol. 3.

De partibus exterioribus dissimilaribus. Author Aristoteles in historia animalium. De partibus animalium. cap. v. ibid.

De capite & eius partibus. Ex authoribus Aristotele in historia animalium. De partibus animalium. Cicerone De natura Deorum. Cornel. Celsus. Plinio. Galeno De ossibus. De Alimentorum facultatibus. De compositione medicamentorum per loca. In Commentariis in Aphorismis. Ex libro qui Introductorius inscribitur. Ex Iulio Polluce. cap. vi. fol. 3. b.

De Collo & eius partibus. Ex Aristotele in animalium historia. De partibus animalium. Ex Galeno De Sanitate tuenda. In Anatomicis. De usu partium. De locis affectis. De uerarum sectione. Ex Cornel. Celsus. Plinio. & Iulio Polluce. cap. vii. fol. 5.

De Thorace & eius partibus. Authores. Aristoteles in animalium historia. De partibus animalium. De Generatione animalium. Galenus in lib. Anatomicis. De usu partium. In Methodo medendi. De Motu musculorum.

De ossibus. In Commentariis de fracturis. Et iis qui inscribuntur *αὐτῷ ἰατρῶν*. Hippocrates in Aphorismis. Et Galenus in eundem librum. cap. viii. fol. 5. b.

De Brachiis & eorum partibus. Ex authoribus. Aristotele in historia animalium. De partibus animalium. Galeno de motu musculorum. De ossibus. De usu partium. In Commentario *αὐτῷ ἰατρῶν*. Ex lib. qui Introductorius inscribitur. Cornel. Celsus. Plinio. Festo Pompeio. Iulio Polluce. cap. ix. fol. 6. b.

De Cruribus & eorum partibus. Authores. Aristoteles in historia animalium. De partibus animalium. Galenus De usu partium. De ossibus. In Commentariis *αὐτῷ ἰατρῶν*. Lib. qui Introductorius inscribitur. Cornel. Celsus. Iulius Pollux. Fest. Pompeius. cap. x. fol. 7.

De Situ partium uario. Authores. Aristoteles in historia animalium. De partibus animalium. De Animalium incessu. De Cælo & mûdo. Plato in Timæo. Corn. Celsus. cap. xi. fo. 7. b.

De Capitis partibus interioribus. f. De Cerebro & eius partibus. Authores. Aristoteles in animalium historia. De partibus animalium. De Somno & Vigil. Galenus in Anatomicis. De nervorum dissectione. De olfactus instrumento. Lib. Introductorius. Iul. Pollux. ca. xii. fo. 8.

De Oculi partibus interioribus. Authores. Galenus De nervorum dissectione. De usu partium. De Placitis Hippocratis & Platonis. In Methodo medendi. Author libelli qui De Anatomia oculorum inscribitur. Galeno adscripti. Iul. Pollux. cap. xiii. fol. 8. b.

De Colli & Pectoris partibus interioribus. Ex Authoribus. Aristotele in historia animalium. De partibus animalium. Galeno De usu partium. Iulio Polluce. cap. xiiii. fol. 9. b.

De uisceribus & Septo transuerso. Ex authoribus Aristotele in historia animalium. De partibus animalium. Galeno in Anatomicis. De usu partium. De Temperamentis. De pla-

# CAPITA X LIBRORVM

citis Hippocratis & Platonis. De uenarū sectione. Iul. Polluce. Plinio. cap. xv. fol. 10  
De uentris partibus interioribus. Authores. Aristoteles in animalium historia. De partibus animalium. Cornel. Celsus. Galenus in Anatomicis. De uenarum sectione. De usu partium. De ossibus. In Commentariis in libros Aphorism. Iul. Pollux. Plinius. cap. xvi. fol. 11  
De partibus similaribus. Ex Aristotele in historia animalium. De partibus animalium. cap. xvii. fol. 11. b  
De Sanguine. Venis, & Arteriis: & quæ his proportionem respondent. Ex Authoribus. Aristotele in historia animalium. De partibus animalium. Galeno in libris quibus est inscriptio, Quod animi mores temperaturam corporis sequuntur. An sanguis natura contineatur in uenis. De placitis Hippocratis & Platonis. De uenarum sectione. De fetus formatione. De usu partium. De Atra bile. c. xviii. f. 12  
De Neruis. Ligamentis. & Tendinibus. Authores. Aristoteles in historia animalium. Galenus. In Methodo medendi. De usu partium. De placitis Hippocratis & Platonis. De Nervorum dissectione. De Motu musculorum. In Anatomicis. De ossibus. Plinius. c. xix. f. 12. b  
De Fibris. Ex authoribus. Aristotele in historia animalium. Galeno De temperamentis. cap. xx. fol. 13  
De Ossibus. Authores. Aristoteles in animalium historia. De Generatione animalium. De Partibus animalium. Galenus De Temperamentis. De ossibus. De usu partium. In Anatomicis. De uenarum sectione. De motu musculorum. Lib. Introductorum. Cornel. Celsus. Plinius. Iul. Pollux. cap. xxi. ibid.  
De Chartilagine. Ex authoribus Aristotele in historia animalium. De partibus animalium. Galeno De Temperamentis. Iulio Polluce. cap. xxii. fol. 16  
De Unguibus. Ungulis. Chelis. Cornibus. & Rostris. Authores. Aristoteles in historia animalium. De partibus animalium. Plinius. cap. xxiii. fol. 16. b  
De Pilis & cute, & quæ iis proportionem respondent. S. Corrice. Squama. Testa. Crusta. Ex authoribus, Aristotele in historia animalium. De partibus animalium. Galeno in Anatomicis. De usu partium. De Temperamentis. In Methodo medendi. In Commentariis in Aphorism. Hippocratis. cap. xxiii. ibidem  
De Membris. Ex authoribus. Aristotele in historia animalium. De partibus animalium. Galeno in Anatomicis. De usu partium. De

Motu musculorum. De dissectione uulnæ. De Semine. In Commentariis in Aphorism. Hippocratis. Ex lib. Introductor. Corn. Celsus. Plinio. Actio. Iul. Polluce. cap. xxv. fol. 17  
De Carne. Authores. Aristoteles in historia animalium. Galenus De Temperamentis. De Alimentorum facultatibus. In Anatomicis. Iul. Pollux. c. xxvi. fol. 18.  
De Glandulis. Authores. Galenus in Anatomicis. De usu partium. De semine. De Alimentorum facultatibus. In Commentariis in Aphorism. Hippocratis. De Definitionibus. Plinius. cap. xxvii. fol. 18. b  
De Adipe & Sebo. Authores. Aristoteles in historia animalium. De partibus animalium. Galenus De Alimentorum uiribus. De Temperamentis. De usu partium. De simplicium medicamentorum facultatibus. cap. xxviii. ibid.  
De Medulla. Ex authoribus Aristotele in historia animalium. De partibus animalium. Galeno De Motu musculorum. De Alimentis. Plinio. cap. xxix. fol. 19.  
De Lacte & Coagulo. Authores. Aristoteles in animalium historia. De partibus animalium. De generatione animalium. Galenus De Alimentis. De simplicium medicamentorum facultatibus. De locis affectis. Oribasius. Plinius. cap. xxx. fol. 19. b  
De Semine. Ex Aristotele in animalium historia. cap. xxxi. fol. 20  
De Excrementis. Authores. Aristoteles De partibus animalium. De Generatione animalium. Galenus De Sanitate tuenda. De Naturalibus facultatibus. De locis affectis. De Atra bile. De simplicibus medicamentis. Iul. Pollux. cap. xxxii. ibid.

Liber secundus ea speciatim docet  
à quibus colligi debent animalium differentiar.

PER quæ inueniri constituique possint animalium differentiar, Authores. Aristoteles in historia animalium. De partibus animalium. De sensu & sensibus. Galenus De usu partium. cap. xxxiii. fol. 20. b  
De Differentiis animalium quæ à partium discrimine oriuntur. Authores. Aristoteles in historia animalium. De partibus animalium. De animalium incessu. Plinius. cap. xxxiii. fol. 21  
De Differentiis quæ ab animalium actionibus oriuntur. ut Loci mutatione. latitatione atque id

- id genus aliis. Author Aristoteles in animalium historia. cap. xxxv. fo. 21. b
- Ab animalium incessu quæ constituuntur differentiz. Ex Aristotele in animalium historia. & lib. De animalium incessu. ca. xxxvi. fo. 22
- A Generatione quæ oriuntur differentiz. Ex authoribus Aristotele in historia animalium. De Generatione animalium. Plinio. cap. xxxvii. fo. 22. b
- A locis in quibus gignuntur animalia, & in quibus degunt, colliguntur differentiz. Ex authoribus. Aristotele in historia animalium. De longitudine & breuitate uitæ. Porphyrio. Corn. Celfo. Plinio. cap. xxxviii. fo. 24. b
- De Differentiis sexuum, masculini scilicet & feminini. Ex Aristotele in histor. animalium. De Generatione animalium. & Oppiano De uenatione. cap. xxxix. fol. 25.
- A Viçus ratione diuersa, oriuntur animalium discrimina. Ex Aristotele in animalium historia. cap. xl. fol. 25. b
- De Differentiis quæ à sensibus in animalibus colliguntur. Authores. Aristoteles in histor. animalium. De partibus animalium. Alexander Aphrodisæus in problemat. Plinius. Cicero de Natura Deorum. & in Quæstionibus Academicis. cap. xli. fol. 26. b
- A Respiratione & uoce animalium differentiz. Ex Aristotele in histor. animalium. De Generatione animalium. cap. xlii. fol. 27.
- Quæ à Somno & uigilia oriuntur animalium discrimina. aut ab ætate, iuuentute scilicet & Senectute aut à uitæ prolixitate & breuitate. Ex Aristotele in animalium historia. De sensu & sensu. De longitudine & breuitate uitæ. cap. xliii. ibidem.
- Differentiis quæ à moribus constituuntur. Authores. Aristoteles in historia animalium. Plinius. cap. xliiii. fol. 27. b
- Ab Affectuum quorundam immutatione quæ oriuntur animalium discrimina. Ex Aristotele in historia animalium. cap. xlv. fol. 28. b
- A Valetudine prospera aut aduersa differentiz. Author Aristoteles in historia animalium. cap. xlvi. fol. 29.
- Animalium discrimina eò quòd commoda magis minusue aut incommoda nobis sint. Ex authoribus. L. Columella. M. Varrone. Plinio. Galeno De Alimentis. De simplic. medicament. facult. cap. xlvii. ibidem
- Ab alimentis quæ ex animalibus nobis suppeditantur, differentiz quibus modis constituuntur. Authores. Galenus De Alimentis. De cibo. bo. malique succi. De tenui uictus ratione. In Methodo medendi. Orisbasius. Corn. Celsus. cap. xlviii. fol. 29. b
- Alia quædam ab alimentis quæ nobis præstant animalium discrimina. Ex iisdem authoribus. Et præterea Ex Aristotele in Lib. Meteorolog. Actio. Athenæo. & Plinio. cap. xlix. fol. 30.
- A medicamentis quæ nobis præstant animalia, quibus modis constituuntur animalium differentiz. Authores. Galenus De simplic. medic. facultatibus. Dioscorides. Plinius. Orisbasius. Aetius. & Aristoteles in historia animalium. cap. l. fol. 31. b

Liber tertius continet animalium sanguine præditorum differentias.

- P Artium exteriorum differentiz in animalibus sanguine præditis. Authores. Aristoteles in historia animalium. De partibus animalium. De Generatione animalium. Plinius. Ouidius in Metamorph. Salustius. Et ex Theocriti Scholiaste nonnulla. cap. li. fol. 32.
- Interiorum partium discrimina in animalibus quæ sanguine prædita sunt. Authores. Aristoteles in historia animalium. De Partibus animalium. De Generatione animalium. De Iuuentute & Senectute. De Respiratione. Galenus in Anatomic. De formatione fetus. De uuln. dissectione. Solinus. cap. lii. fol. 34. b.
- Similarium partium differentiz in animalibus sanguineis. Ex authoribus. Aristoteles in animalium historia. De Generatione animalium. Galeno De Temperamentis. Plinio. cap. liii. fol. 36. b
- Eorum quæ ad generationem pertinent discrimina in his quæ sanguine prædita sunt animalibus. Ex Authoribus. Aristoteles in historia animalium. De Generatione animalium. Galeno de uenarum & articularum dissectione. De uuln. dissectione. cap. liiii. fol. 38.
- Morum actionumque & affectionum quarundam aliarum differentiz. Authores. Aristoteles in historia animalium. De Generatione animalium. Theophrastus De causis stirpium. Lucretius. cap. lv. fol. 39
- Eorum quæ in huiusce generis animalibus alimentis aut medicamentis rationem obtinent discrimina. Ex authoribus. Galeno De Ali-

mentis. De cib. bo. malique succi. In Metho-  
do medendi. De simplic. medicament. facultate. Oribasio. cap. lvi. ibid.

Ex animalium sanguineorum partibus, alimē-  
torum medicaminūque uires diuerse. Au-  
thores. Galenus De Alimentis. De cib. bo. malique succi. De tenui uictus ratione. De simplic. medic. facultatib. Dioscorides. Plinius. Oribasius. Aetius. Paulus Aegineta. cap. lvii. fol. 39. b

De Excremētorum quæ in animalibus sangui-  
neis reperiuntur differentiis. Authores. Ga-  
lenus De simplic. medic. facultatib. De locis affectis. Dioscorides. Plinius. Oribasius. Aetius. cap. lviii. fol. 40. b

De Lacte & iis quæ ex lacte fiunt. ut Caseo. Bu-  
tiro. & aliis. Ex autoribus. Galeno De Ali-  
mētorum facultat. De cib. bo. malique succi. De Sanitate tuenda. In Methodo medendi. De simplic. medic. Dioscoride. Plinio. Ori-  
basio. Actio. Paulo Aegineta. Athenæo. Con-  
stantino Cæsare. Columella. Hippocrates. cap. lux. fol. 41

### Liber quartus continet Homi- nis differentias.

**D**E Homine. Authores. Aristoteles in hi-  
storia animalium. De partibus animalium.

De Generatione animalium. De Iuven-  
tute & Senectute. De Memoria & Reminiscen-  
tia. De Respiratione. De animalium incessu.  
De Anima. De Sensu & Sens. Plato. Solinus.  
Iul. Pollux. Cicero De natura Deorum. De  
Academicis Quæstionibus. cap. lx. fol. 36. b

De partibus Hominis exterioribus. Authores.  
Aristoteles in historia animalium. De parti-  
bus animalium. De Generatione animalium.  
De animalium incessu. De Somno & Vigilia.  
Galenus De Sanitate tuenda. In arte parua.  
In Commētariis in sextum librum De mor-  
bis uulgaribus. lib. qui Introductorius inscri-  
bitur. Et De Definitionibus. Plinius. Solinus.  
Aetius. Iul. Pollux. cap. lxi. ibidem

De partibus Hominis interioribus, & similari-  
bus. Ex autoribus Aristotele in historia ani-  
malium. De partibus animalium. De Gene-  
ratione animalium. Galeno De Tempera-  
mentis. In Anatomicis. De usu partium. De  
offibus. De Alimento. facultatib. De sanitate  
tuenda. Plinio. Theophilo. cap. lxii. fol. 46

De uoce Hominis & Somno. Authores. Aristo-  
teles in historia animalium. Plin. ca. lxxii. fo. 47.

De Hominis Generatione & Partu: atque de iis  
quæ ad hæc pertineant. Authores. Aristote-  
les in historia animalium. In problematis. Ga-  
leno De Homine. Plin. Solino. c. lxxiii. f. 47. b  
De Hominis Vita, Aetatibus, & Statura. Autho-  
res. Aristoteles De Generatione animalium.  
In problematibus. Mar. Varro. Plinius. Soli-  
nus. cap. lxx. fol. 49. b

Multiformes Hominum effigies. & mira quæ-  
dam de Hominibus alia. Ex autoribus. He-  
rodotus. Plinio. Solino. Pausania. Aeliano.  
cap. lxxi. ibid.

Homini quæ ex Homine aut eius partibus o-  
riuntur commoda. Authores. Dioscorides.  
Plinius. Galenus De simplic. medic. facultat.  
Aetius. Solinus. cap. lxxii. fol. 50. b

### Liber quintus continet anima- lium quadrupedum uiuiperarum differentias.

**D**E Quadrupedum uiuiperarum partibus  
exterioribus. Authores. Aristoteles in hi-  
storia animalium. De partibus animalium.

De Generatione animalium. Galenus in A-  
natomicis. Plinius. cap. lxxiii. fol. 52

Interiorum quarundam partium discrimina in  
quadrupedibus uiuiperis. Ex Aristotele in hi-  
storia animalium. De partibus animalium. &  
Galeno in Anatomicis. cap. lxxiv. fol. 53. b

Pilorum colorumque discrimina & uocum in  
Quadrupedibus uiuiperis. Ex autoribus.  
Aristotele in historia animalium. De parti-  
bus animalium. Plinio. cap. lxx. fo. 54. b

De Coitu Partuque & aliis quæ ad generatio-  
ne pertinet in quadrupedibus uiuiperis. Au-  
thores. Aristoteles in historia animalium. De  
Generatione animalium. Plin. ca. lxxi. ibid.

De Quadrupedum uictu & etate. Authores. A-  
ristoteles in historia animalium. Plinius. L.  
Columella. cap. lxxii. fo. 55

De Quadrupedum ruminatione. Latitatione &  
aliis quibusdam actionibus affectibusque. Ex  
Animalium historia Aristotelis. & Plinio.  
cap. lxxiii. fo. 55

Alimenta ex quadrupedibus & earum partibus  
uaria. Authores. Aristoteles in historia ani-  
malium. Galenus De Alimentis. De cib. bo-  
ni malique succi. Oribasius. Plin. ca. lxxiii. ibid.

### MULTIFIDA.

De Quadrupedibus Multifidis. Et primo De Ele-  
phanto. Ex autoribus. Aristotele in histo-  
ria

- ria animalium. De partibus animalium. De Generatione animalium. Galeno De usu partium. In Anatomic. Plinio. Solino. Dioscoride. Strabone. Pausania. Philostrato. Oppiano De Venatione. Aeliano. c. lxxxv. fo. 56. b
- De Simiarum generibus. Ex Aristotele in historia animalium. Plinio. Solino. Galeno in Anatomicis. Oppiano De Venatione. Ouidio in Metamorph. Strabone. Aeliano. Arthiano in rubri maris nauigatione. Diodoro Siculo. cap. lxxvi. fo. 57. b
- De Canibus. Authores. Aristoteles in historia animalium. De Partibus animalium. De Generatione animalium. Galenus in Anatomicis. De simplic. medic. facultatibus. Dioscorides. Alexander Aphrodisæus in problemat. Plinius. Oppianus de pisc. & De uenatione. Iul. Pollux. M. Varro. L. Columella. Gratius poeta. M. Aurelius Olympius. Vergilius in Georgic. cap. lxxvii. fo. 58. b
- De Lupis. Authores. Aristoteles in historia animalium. De partibus animalium. Plinius. Solinus. Oppianus De uenatione. Galenus De compositione medic. per loca. Aetius. Gratius. Vergilius in Georg. Iul. Pollux. Aelianus. cap. lxxviii. fo. 62
- De Hyæna & Crocuta. Ex authoribus. Aristotele in historia animalium. Oppiano De Venatione. Plinio. Solino. Galeno De simplic. medic. facultat. Actio. cap. lxxix. fo. 63
- De Leonibus. Ex authoribus. Aristotele in historia animalium. De partibus animalium. De Generatione animalium. Oppiano De Venatione. Ouidio in Metamorph. Strabone. Herodoto. Solino. Galeno De usu partium. De simplicibus medic. cap. lxxx. fo. 63. b
- De Tigride. Authores. Plinius. Solinus. Oppianus De Venatione. Strabo. Arthianus. cap. lxxxi. fo. 65
- De Panthera. Pardo. & Cepo. Authores. Aristoteles in historia animalium. De partibus animalium. Plinius. Pausanias. Solinus. Oppianus De Venatione. cap. lxxxii. ibid.
- De Urso. Ex authoribus. Aristotele in historia animalium. De partibus animalium. Oppiano De Venatione. Ouidio in Metamorph. Plinio. Solino. Galeno De simplic. medic. facultat. Dioscoride. cap. lxxxiii. fo. 65. b
- De Hystrice. Erinaceo, & Scyuro. Authores. Aristoteles in historia animalium. De Generatione animalium. Plinius. Solinus. Plutarchus in libello cui titulus est, Solertiorane sint animalia aquatilia an terrestria. Oppianus De Venatione. Galenus De simpl. medic. facultat. Dioscorides. cap. lxxxiiii. fo. 66
- De Vulpe & Leporibus. Authores. Aristoteles in historia animalium. De partibus animalium. De Generatione animalium. Plinius. Oppianus De Venatione. Galenus De simplicibus medicamentis. De Alimentorum facultatibus. De tenui uisus ratione. Aetius. Paulus Aegineta. Dioscorides. Athenæus. M. Varro. Herodotus. Xenophon De Venari. Strabo. Moses in Leuitic. cap. lxxxv. fo. 66. b
- De Viueris. Mustelarum generibus. & De Felc. Authores. Aristoteles in historia animalium. De partibus animalium. De Generatione animalium. Plinius. M. Varro. Strabo. Galenus De simplicibus medicamentorum facultat. Dioscorides. Aetius. Oppianus De Venatione. Aelianus. Ouidius in Metamorph. M. Aurelius. Martialis. cap. lxxxvi. fol. 67. b
- De Mure & Murium generibus. Ex authoribus Aristotele in historia animalium. De partibus animalium. Plinio. Dioscoride. Galeno De Aliment. De simplic. medic. Ouidio in Metamorph. Herodoto. Oppiano De Venatione. M. Varrone. L. Columella. Actio. Nicandro. Aeliano. D. Hieron. ca. lxxxvii. f. 68. b
- De Quadrupedibus aquaticis. Vt De Fibro. Lutra. & quibusdam aliis. Authores. Aristoteles in historia animalium. Plinius. Solinus. Strabo. Dioscorides. Galenus De simplic. medic. Nicander in Theriac. Aelianus. M. Aurelius. cap. lxxxvii. fo. 70
- De Vitulo marino. Authores. Aristoteles in historia animalium. De partibus animalium. Plinius. Dioscorides. Oppianus De pisc. Galenus de simplic. medic. cap. lxxxix. fo. 70. b
- De Talpa & Vespertione. Ex authoribus. Aristotele in historia animalium. De partibus animalium. De animalium incessu. Plinio. Strabone. Iul. Polluce. Herodoto. Ouidio in Metamorph. cap. xc. fo. 71
- De Monstrosis quibusdam aliis animalibus in India aut Aethiopia prognatis. Authores. Aristoteles in historia animalium. Plinius. Solinus. Strabo. Aelianus. cap. xci. fo. 71. b

BISVLCA.

- De Quadrupedibus Bisulcis. & primo De Boue, & Boum generibus. Authores. Aristoteles in historia animalium. De partibus animalium. M. Varro. L. Columella. Palladius. Strabo. Plinius. Solinus. Oppianus De Venatione. Caesar in Commentariis. Pausanias. Herodotus. Athenæus. Galenus De Aliment. De fanitate ueda. De cib. bo. malique succi.

- De simplic. medic. facultat. Dioscorides. Paulus Aeginetes. cap. xcii. fol. 72.
- De Ouibus. Authores. Aristoteles in histor. animalium. De partib. animalium. Plinius. M. Varro. Columella. Palladius. Galenus de Alimentor. facultat. De constitutione artis. De cib. bo. malique succi. De sanitate tuenda. De simplic. medic. Dioscorides. Oribasius. Aetius. Paulus Aeginetes. Michael Sethus. Oppianus De uenat. Herodotus. Athenus. Aelianus. cap. xciii. fol. 75.
- De Capris. Ex authoribus. Aristotele in historia animalium. M. Varrone. Plinio. Columella. Dioscoride. Palladio. Galeno De alimēt. De tenui uictus ratione. De cib. bo. maliq; succi. De Sanitate tuenda. De simplic. medic. Oribasio. Actio. Oppiano De uenatione. Herodoto. Aeliano. Ex Lib. Regū. ca. xciiii. f. 77. b
- De Cernis. Authores. Aristoteles in historia animalium. De partib. animalium. Plinius. Solinus. Ouidius in Metamorph. Iul. Pollux. Galenus De alimēt. De tenui uictus ratione. De Sanitate tuenda. De simplic. medic. Dioscorides. Herodotus. Nicander. Pausanias. Strabone. Gratius. Aelianus. cap. xciv. fol. 79. b
- De Tragelapho. Tarando. Ophio. Leucocruta. & Colo. Ex authoribus. Solino. Plinio. Strabone. cap. xcvi. fol. 81.
- De Hippelapho. Hippardio. Hippagro. Hippopotamo. & Eale. Authores. Aristoteles in historia animalium. Plinius. Solinus. Oppianus De uenatione. Herodotus. Pausanias. Dioscorides. cap. xcvi. fol. 81. b
- De Camelo & Camelopardali. Ex authoribus. Aristotele in histor. animalium. De partib. animalium. De Generatione animalium. Plinio. Herodoto. Heliodoro. Strabone. Mose in Leuitico. cap. xcvi. ibidem
- De Suibus. Authores. Aristoteles in historia animalium. Plinius. Ouidius in Metamorph. Galenus in Anatomic. De uteri dissect. De cib. bo. malique succi. De tenui uictus ratione. De Sanitate tuenda. M. Varro. Columella. Palladius. Oribasius. Dioscorides. Aelianus. cap. xcix. fol. 82. b
- Strabo. Aelianus. Cæsar in Commentariis. cap. ci. fol. 84.
- De Asino. Authores. Aristoteles in histor. animalium. De partib. animalium. De Generat. animalium. M. Varro. Columella. Palladius. Plinius. Galenus De alimēt. facultat. De cib. bo. malique succi. In Methodo medēdi. De simplic. medic. Dioscorides. Absyrus. Aelianus. Oppianus De uenat. cap. cii. fol. 87.
- De Mulis. Authores. Aristoteles in histor. animalium. De Generatione animalium. M. Varro. Columella. Palladius. Plinius. cap. ciii. fol. 88. b

Liber sextus continet ea quæ cortice integuntur *quadrupeda* à Græcis dicta, *Quadrupedes* scilicet ouiparas, & serpētes.

- D**E Quadrupedibus ouiparis. Author Aristoteles in histor. animalium. De partibus animalium. De animalium incessu. De Generatione animalium. De Respiratioe. c. ciii. f. 89. b
- De Crocodilis & Scinco. Authores. Aristoteles in histor. animalium. De partibus animalium. De animalium incessu. Herodotus. Dioscorides. Plinius. Pausanias. Aelianus. cap. cv. fol. 90.
- De Testudinū generibus. Ex authoribus. Aristotele in histo. animalium. De partibus animalium. De animalium incessu. De Iuuet. & Senect. Plinio. Solino. Strabone. Oppiano De pisc. Paulo Aegineta. Arrhiano. Martiale. c. cvi. fol. 91.
- De Ranarū generibus. Ex authoribus. Aristotele in histor. animalium. De partibus animalium. Plinio. Dioscoride. Nicandro. Galeno De simplic. medicam. Paulo Aegineta. Actio. Aeliano. cap. cvii. fol. 92. b
- De Lacertis. Authores. Aristoteles in histor. animalium. De partibus animalium. Plinio. Dioscoride. Strabone. Galeno De simplic. medic. facultat. cap. cviii. fol. 93. b
- De Salamandra & Sepe quadrupede. Ex authoribus. Aristotele in histor. animalium. Dioscoride. Plinio. Galeno De Tēperamēt. De simplic. medic. Actio. Nicandro. Lucano. c. cix. f. 94
- De Stellione. Authores. Aristoteles in histor. animalium. Plinius. Nicander. Actius. Paulus Aegineta. Ouidius in Metamorph. Galenus De simplic. medic. facultat. cap. cx. fol. 94. b
- De Chameleone. Authores. Aristoteles in histor. animalium. De partibus animalium. Plinius. Solinus. Dioscorides. cap. cxi. fol. 95.

## SERPENTES.

## SOLIPEDES.

- De Solipedibus. Plinio authore. cap. c. fol. 84. b
- De Equo. Authores. Aristoteles in historia animalium. De Generatione animalium. Plinius. Solinus. M. Varro. L. Columella. Palladius. Galenus De usu partium. Absyrus. Vergilius in Georgic. Oppianus De uenatione. Iul. Pollux. Vegetius De re ueterinaria. Herodotus.



## DE DIFFERENT. ANIMALIVM.

malium incessu . De Generatione animalium .  
 Delongitudine & uitæ breuitate . Cornel . Cel  
 sus . Plinius . Galenus De Theriaca ad Pisonē .  
 De Aliment . D . Basilus magnus . Oppianus  
 De pisc . Dioscorides . Pausanias . ca . xxi . f . 95 . b  
 De Hydro . & aliis quibusdam serpentibus aqua  
 tilibus . Authores . Aristoteles in histor . anima  
 lium . Plinius . Nicander . Actius . Solinus . Ver  
 gilius in Georgie . Dioscorides . Pausanias . Ar  
 rianus . Galenus de Theriaca ad Pisonē . Pau  
 lus Aeginetes . Aelianus . cap . cxiii . fol . 97 . b  
 De Serpētibz terrestribz . Et primo de Aspi  
 dū generibz . Authores Aristoteles in histo  
 r . animalium . Solinus . Actius . Nicander . Lu  
 canus . Plinius . Strabo . Dioscorides . Galenus  
 De Theriaca ad Pisonem . Paulus Aegineta .  
 cap . cxiii . fol . 98 . b  
 De Vipera . Dipfide . Ceraſte . & Hammodyte .  
 Authores . Aristoteles in historia animalium .  
 De partib . animalium . De Generatione ani  
 malium . Nicander . Actius . Strabo . Plinius .  
 Solinus . Lucanus . Aelianus . Dioscorides . Ga  
 lenus de Alimentis . De simplic . medicamēt .  
 De Theriaca ad Pisonem . In Antidotis . Pau  
 lus Aeginetes . Suidas . cap . cxv . fol . 99  
 De Hæmorrh . Sapedone . Sepe . Cēchri . & Cē  
 chrite . Authores . Nicander . Actius . Galenus  
 De Theriaca . ad Pisonem . Dioscorides . Pau  
 lus Aeginetes . Aelianus . Pausanias . Luca  
 nus . cap . cxvi . fol . 100 . b  
 De Basilisco . & aliis quibusdā serpentibus , quo  
 rum uenenum remedio caret . Authores . Ari  
 stoteles in histor . animalium . Plinius . Soli  
 nus . Galenus De Theriaca . ad Pisonē . Nican  
 der . Dioscorides . Diodorus Siculus . Aelia  
 nus . cap . cxvii . fol . 101 .  
 De Dracone . Amphibena . & aliis quibusdā ser  
 pentibus , quorum morsus minus aſſert peri  
 culi . Authores . Aristoteles in histor . anima  
 lium . Plinius . Solinus . Nicander . Pausanias .  
 Strabo . Actius . Lucanus . Herodotus . Philo  
 stratus in uita Apollonii Tyranei . Aelia  
 nus . cap . cxviii . fol . 101 . b

### Liber septimus continet auium differentias.

**D**E Partibus Auium exterioribus . Autho  
 res . Aristoteles in histor . animalium . De  
 partib . animalium . De incessu animalium .  
 Plinius . cap . cxix . fol . 103 .  
 De Partibus Auium interioribus . Authores . Ari  
 stoteles in histor . animalium . De partibus  
 animalium . De Generatione animalium . De

Respiratione . Galenus De usu partium .  
 cap . cxx . fol . 104  
 De Coitu Auium , & aliis quæ ad earum genera  
 tionem pertinent . Authores . Aristoteles in  
 histor . animalium . De partibus animalium .  
 De Generat . animalium . Plinius . ca . cxxi . f . 105 .  
 De uictu Auium & loci mutatione . Authores .  
 Aristoteles in histor . animalium . & Plinius .  
 cap . cxxii . fol . 106 . b  
 De uocis discriminibus & coloris in Auibus .  
 Ex Aristotele in histor . animalium . Et de par  
 tib . animalium . cap . cxxiii . fol . 107 . b  
 Ex ingressu auium & uolatu differentiæ . Atque  
 ex ualitudine moribusque . Authores . Aristo  
 teles in histor . animalium . De partib . anima  
 lium . Plinius . cap . cxxiiii . ibidem .  
 Eorum quæ in auibus alimenti medicamentue  
 rationem obtinent , discrimina . Ex authori  
 bus Galeno De aliment . De tenui uictus ra  
 tione . De cib . bo . malique succi . De Sanitare  
 tuenda . De simplic . medic . De ratione uictus  
 in morb . acutis . In methodo medendi . Dio  
 sconde . Plinio . Paulo Aegineta . c . cxxv . f . 108

### FIDIPEDES.

De auium generibus quæ fiffos habent pedes . Et  
 primo de Gallinaceo genere . Authores . Ari  
 stoteles in histor . animalium . De partib . ani  
 malium . De generatione animalium . Plinius .  
 Columella . M . Varro . Palladius . Dioscори  
 des . Galenus De aliment . De cib . bo . malique  
 succi . De simplic . medic . facultat . Oribasius .  
 Actius . cap . cxvi . fol . 109 . b  
 De Gallinis Rusticis . Africanis . Meleagridē , &  
 Pauone . Authores . Aristoteles in histor . ani  
 malium . De animalium incessu . M . Varro .  
 Columella . Plinius . Athenæus . Palladius .  
 Oppianus de Venatione . Galenus De alime  
 to . facultat . Aelianus . cap . cxxvii . fol . 112 .  
 De Columbaceo genere . Authores . Aristoteles  
 in histor . animalium . De partibus animalium .  
 De generat . animalium . L . Columella . M . Var  
 ro . Palladius . Plinius . Athenæus . Dioscори  
 des . Galenus De tenui uictus ratione . De cib .  
 bo . malique succi . De simplic . medic . De atra  
 bile . cap . cxxviii . fol . 113 .  
 De Palumbe . Oenade . Peliade . & Turture . Ex  
 authoribus Aristotele in histor . animalium .  
 De generatione animalium . Alexandro Myn  
 dio . Athenæo . Dioscoride . Plinio . Galeno .  
 De aliment . De tenui uictus ratione . Oriba  
 sio . Aeliano . Martiale . cap . cxxix . fol . 114 .  
 De Phasiana . Tetrace . Erythraone . Otide . &  
 Oto . Authores . Aristoteles in histor . anima

- lium . Plinius . Athenęus . Strabo . Galenus  
De alimentis . & De tenui uictus ratione .  
cap.cxxx. fol.115.  
De Coturnice . Perdice . Galerita . & aliis id ge-  
nus quibufdam terrenis grauioribufque . Ex  
Authoribus . Aristotele in hiftor. animaliu.  
Plinio . Athenęo . M. Varrone . Ouidio in Me-  
tamorph. Solino . Strabone . Diofeoride . Ga-  
leno De aliment. De cib. bo. maliq. fucci . De  
tenui uictus ratione . De fimplic. medic. Ori-  
basio . Aetio . Iul. Polluce . Aeliano . Vergilio  
in Georgic. Suida . cap.cxxxi. fol.116.  
De Turdorum Merularumq. generibus . &  
aliis quibufdam que cum iis fimilitudine qua-  
dam iunguntur . Authores . Aristoteles in hi-  
ftor. animaliu . M. Varro . Columella . Plinius .  
Athenęus . Diofeorides . Galenus De alimēt.  
De tenui uictus rati . De fimplic. medic. Pausa-  
nias . Aelianus . cap.cxxxii. fol.117.b

## AVES CARNIVORAE.

- De Aquilarum generibus . Authores . Aristote-  
les in hiftor. animalium . De Generatione a-  
nimalium . Plinius . Aelianus . Galenus De u-  
fu partium . De fimplic. medic. facultat. Pau-  
fanias . cap.c.xxxiii. fol.118.b  
De Accipitrum generibus . Ex Authoribus . Ari-  
stotele in hiftor. animalium . De Partibus ani-  
malium . De Generatione animaliu . Ouidio  
in Metamorph. Plinio . Strabone . Galeno De  
ufu partium . De fimplic. medic. Oppiano De  
uentione . Columella . cap.cxxxiii. fol.120.  
De Cuculo . Authores . Aristoteles in hiftor. ani-  
malium . De Generatione animalium . Pli-  
nius . cap.cxxxv. fol.121.  
De Nocturnis Auibus . que uniufque funt . Au-  
thores . Aristoteles in hiftor. animalium . Pli-  
nius . Aristophanes . Ouidius in Metamorph.  
Athenęus . Aelianus . cxxxvi. fol.122.  
De Hirundinum generibus . Ex Authoribus . A-  
ristotele in hiftor. animaliu . De Generatione  
animalium . Plinio . Ouidio in Metamorph.  
Columella . Vergil. in Georgic. Aeliano . Ga-  
leno De fimplic. medic. De cōpōitione me-  
dicamentorū per loca . Paulo Aegineta . Ae-  
tio . cap.cxxxvii. fol.123.  
De Coruino genere . f. Coruo . Cornice . & Mo-  
nedula . Authores . Aristoteles in hiftoria ani-  
malium . De partib. animalium . De Genera-  
tione animalium . De admirando auditu . Pli-  
nius . Apuleius . Athenęus . Lucretius . Ouidi-  
us in Fastis . & in Metamorph. Oppianus de  
Venatione Vergilius in Georgic. Cicero de  
Diuinatio . c. Hefichius . Suidas . ca.cxxxviii.

fol.124.

De Pico Martio . Pīttaco . Pīca . & quibufdam id  
genus aliis . Authores . Anftoteles in hiftor.  
animalium . De partib. animalium . Plinius .  
Solinus . Aelianus . Ouidius in Metamorph.  
cap.cxxxix. fol.125.

De aliis quibufdam auibus . que uictus caufa ar-  
bores & ligna feriunt contunduntque . Ex A-  
ristotele in hiftor. animalium . Aeliano & Pli-  
nio . cap.cxl. fol.126.

De *Spiz* . id est que spinis uictitat . Ex Aristo-  
tele in hiftor. animalium . Plinio . & Aeliano .  
cap.cxli. fol.126.b

De iis auiculis que maxima ex parte uermiculis  
aliisque id genus animalculis uiuunt *exolus*  
*quise* dicuntur . Ex Authoribus . Aristotele  
in hiftor. animalium . De longitudine & bre-  
uitate uite . Plinio . Aetio . Athenęo . c. cxlii. ib.

## AQVATICAE VOLACES.

De Auibus que circa aquam uictitat . Primo De  
uolacibus . Authores . Aristoteles in hiftoria  
animalium . Plinius . Athenęus . Herodotus .  
Aetius . Galenus De fimplic. medic. Aristo-  
phanes . Aelianus . cap.cxliii. fol.128.

De Laro . Charadrio . Fulica . Aethya & Catara-  
cta . Ex Authoribus . Aristotele in hiftor. ani-  
malium . De partibus animalium . Plinio . A-  
thenęo . Aristophane . Heliodoro . Cicerone  
De Diuinatione . Arato . Vergilio . Nicadro .  
Lucretio . Ouidio in Metamorph. Suida .  
cap.cxliv. fol.129.b

De Elorio . Crece . Ortigometra & Glottide . Au-  
thores . Aristoteles in hiftor. animalium . Pli-  
nius . Athenęus . Aristophanes . Herodotus .  
Suidas . cap.cxlv. fol.130.b

De Ardeolarū generibus . De Porphyrione . &  
Hematomode . Ex Authoribus . Aristotele in  
hiftor. animalium . De animaliu in cēffa . Pli-  
nio . Ouidio in Metamorph. Arato . Athe-  
nęo . Aeliano . cap.cxlv. ibid.

De Grue . Plataea . Ciconia . & Ibide . Authores .  
Aristoteles in hiftor. animalium . Plinius . Ci-  
cero De natura Deorum . Aristophanes . Ga-  
lenus De Alimēt. facult. Solinus . Strabo . He-  
rodotus . Aelian . cap.cxdvii. fol.131

## Aquaticæ aues grauiores.

De Aquaticis grauioribus . que omnes palme  
des funt . De Anferum generibus . De Olore  
& Onocrotalo . Ex authoribus . Aristotele in  
hiftor. animaliu . Plinio . Columella . M. Var-  
rone . Galeno De Aliment. De cib. bo. maliq.  
fucci . De fimplic. medic. Diofcoride . Michael-  
le Setho .



le Setho . Aeliano . Ouidio in Metamorpho.  
 D . Hieronymo in Sophoniam . Solino .  
 cap. cxlviii. fo. 132.  
 De Anarino genere . & aliis quæ Anatibus simi-  
 les sunt . Ex authoribus . Aristotele in histor.  
 animalium . Plinio . Athenæo . Galeno De ali-  
 mēt . M . Varrone & Columel . ca. cxlix . f. 133 . b  
 De Coruis aquatilibus . Ex Aristotele in histor.  
 animalium . & Plinio . c. cl . fol. 134 .  
 De Brintho & Vpupa . Ex authoribus . Aristotele  
 in histor . animalium . Plinio . Ouidio in Me-  
 tamorph . Pausania . Aeliano . cap. cli . ibid .  
 De Auibus partim peregrinis , partim mōstros-  
 fis . Authores . Aristoteles in histor . animaliu .  
 Plinius . Solinus . Galenus De locis affectis .  
 Plutarchus . D Ambrosius in Hexahemer .  
 Ouidius in Fastis . & in Metamorph . Clau-  
 dianus . Aelianus . Pausanias . Lactantius .  
 cap. clii . ibidem .  
 De Struthiocamelo . Ex authoribus . Aristotele  
 in histor . animalium . De partib . animalium .  
 De Generatione animalium . Diodoro Siculo .  
 Plinio . Strabone . Galeno De aliment . De  
 cib . bo . malique succi . Aetio . c. cliii . fo. 136 .

Liber octauus continet quæ in sangui-  
 ne præditis sunt aquatilia : quæ scilicet  
 in aqua uictum quarunt & in a-  
 qua quoque pariunt : uidelicet pisciū  
 & Cetorum genera .

**D**E Piscibus & eorum partibus exteriori-  
 bus . Ex authoribus . Aristotele in historia  
 animalium . De partibus animalium . De  
 Generatione animalium . De animaliu in-  
 cessu . De Respiratione . Plinio . Galeno De  
 usu partium . cap. cliui . fo. 136 . b  
 De Piscium interioribus partibus . Ex Aristotele  
 in histor . animalium . De partibus anima-  
 lium . De Generatione animalium . De Respi-  
 ratione . Oppiano De pisc . cap. clv . fo. 137 . b  
 De Sexus discrimine in piscibus . Deq . eorum  
 coitu & alijs quæ ad generationē pertinent .  
 Ex Aristotele in histor . animalium . De par-  
 tibus animaliu . De Generatione animaliu .  
 Plinio . Oppiano De piscib . cap. clvi . fo. 138 . b  
 De Ratione uictus piscium . Author Aristotele  
 in historia animalium . De partibus ani-  
 malium . cap. clvii . fo. 140 .  
 Quod loca mutant pisces uarie atque latent .  
 Ex Aristotele in historia animalium . & Plinio .  
 cap. clviii . fo. 140 . b  
 De Coloris mutatione in piscibus uocēque &  
 somno . Ex Aristotele in histor . animalium

cap. clix . ibidem .  
 De Valetudinis piscium Differentiis , tum ex lo-  
 cis , tum ex temporibus . Ex authoribus Ari-  
 stotele in histor . animalium . Columella . &  
 Plinio . cap. clx . fo. 141 .  
 In Alimentis medicamentique ratione piscium  
 discrimina . Authores . Galenus Lib . De ali-  
 ment . De cib . bo . malique succi . In Methodo  
 medēdi . Oribasius . Paulus Aegineta . Aetius .  
 Athenæus . cap. clxi . fo. 141 . b

### Chartilaginei Pisces . & Plani .

De Chartilagineis piscib . Authores . Aristotele  
 in histor . animalium . De partib . anima-  
 lium . De Generatione animalium . Plinius .  
 Galenus De aliment . facultatib . De tenui ui-  
 ctus ratione . De Sanitate tuenda . Athenæus .  
 cap. clxii . fo. 143 .  
 De Planis piscibus Chartilagineis . Authores .  
 Aristoteles in histor . animalium . De partib .  
 animalium . De Generatione animaliu . Plinio .  
 Athenæus . Galenus De aliment . De tenui  
 uictus ratione . De simplic . medicament .  
 Oppianus De piscib . Dioscorides . Nicander  
 in Theriac . Paulus Aeginetes . Aelianus . O-  
 uidius in Halieuticis . cap. clxiii . fo. 144 .  
 De Chartilagineis oblongis . ut de Galeis ex iis  
 quæ *γαλιεῖδαι* dicuntur . Authores . Aristotele  
 in histor . animalium . Plinius . Oppianus  
 de piscib . Athenæus . Strabo . Galenus . De ali-  
 mentor . facultat . Oribasius . Theophrastus  
 in plantarum historia . Pausanias . Aelianus .  
 Herodorus . Columel . Apuleius . Ausonius .  
 cap. clxiiii . fo. 146 .  
 De Piscib . Longis . Ex Aristotele in histor . ani-  
 malium . cap. clxv . fo. 147 .  
 De Murena . Anguilla . & alijs quibusdam lon-  
 gis . Authores . Aristoteles in histor . anima-  
 lium . De partib . animalium . De animalium  
 incessu . Plinius . Athenæus . Ouidius in Ha-  
 lieutic . Oppianus De piscib . Galenus De Ali-  
 ment . De cib . bo . malique succi . De tenui ui-  
 ctus ratione . Columella . Nicander in The-  
 riac . Macrobius . Oribasius . Aelianus .  
 cap. clxvi . fo. 147 . b  
 De planis piscib . qui *πλατῖδαι* dicuntur , id est  
 qui passerina sunt specie . Authores . Aristotele  
 in histor . animalium . De animalium in-  
 cessu . Plinius . Columella . Athenæus . Gale-  
 nus De alimēt . De tenui uictus ratione . De  
 cib . bo . malique succi . Oribasius . Oppianus  
 De piscib . Aelianus . Ouidius in Halieutic .  
 cap. clxvii . fo. 150 .

### SAXATILES .

De piscibus quibusdā litoralibus saxatilibusque.  
 De Scarō. Ex authorib. Aristotele in histo.  
 animalū. De partib. animalū. Plinio. Gale-  
 no De aliment. Oribasio. Athenæo. Oppia-  
 no De piscib. Columella. cap. clxviii. fo. 151.  
 De Mullo. Coccyge. & aliis quibusdā similibus.  
 Authores. Aristoteles in histor. animalū. De  
 Generatione animalū. Oppianus De piscib.  
 Athenæus. Plinius. Dioscorides. Ouidius in  
 Halieutic. Columella. Galenus De aliment.  
 Oribasius. Strabo. Aelianus. ca. clxix. fo. 151. b  
 De Synodōte. Synagri. Charace. Chromi. & Cā-  
 tharo. Ex authorib. Aristotele in histor. ani-  
 malū. Plinio. Athenæo. Galeno De potētis  
 Naturalib. De alimēt. Oribasio. Oppiano De  
 pisc. Aeliano. Ouidio ī Halieuti. c. clxx. f. 153. b  
 De Anthiarū generibus. Authores. Aristoteles  
 in histor. animalū. Oppianus De piscib. Athe-  
 næus. Plinius. Ouidius in Halieutic. Gale-  
 nus De usu partū. Oribasius. Paulus Aegine-  
 ta. Columel. Helychi\*. Aelian\*. c. clxxi. f. 154.  
 De Lupo & Afellis. Ex authorib. Aristotele in  
 histor. animalium. Plinio. Columella. Athe-  
 næo. Oppiano De pisc. Ouidio in Halieutic.  
 Plutarcho. Galeno De alimēt. De cib. bo. ma-  
 lique succi. De tenui uis\*. ratione. Oribasio.  
 Aeliano. Apuleio ī Apolog. Varrone De lin-  
 gua Latina. cap. clxxii. fo. 155.  
 De Vmbra. & Glauco. Authores. Aristoteles in  
 histor. animalū. Plinius. Athenæus. Galenus  
 De aliment. Oribasius. Oppianus De piscib.  
 Aufonius. Ouidius ī Halieutic. c. clxxiii. f. 156  
 De Sparo. & Aurata. Authores. Aristoteles in hi-  
 stor. animalū. Plinius. Oribasius. Athenæus.  
 Oppian. De pisc. Columella. c. clxxiii. f. 156. b  
 De Turdo. Merula. & aliis quibusdā saxatilib\*.  
 Authores. Aristoteles in histor. animalū. Ga-  
 lenus De aliment. De potētis Naturalib. Pli-  
 nius. Athenæus. Ouidius in Halieutic. Op-  
 pianus De piscib. Oribasius. Columella. Au-  
 fonius. cap. clxxv. ibid.  
 De Melanuro. Coracino. & aliis quibusdā. Au-  
 thores. Aristoteles in histor. animalū. Colum-  
 ella. Plinius. Oppianus De pisc. Athenæus.  
 Galenus De alimēt. Oribas\*. c. clxxvi. f. 157. b  
 De Exocæto & Cordulo. Authores. Aristote-  
 les in histo. animalū. De partib. animalium.  
 De Respiratione. Plinius. Athenæus. Oppia-  
 nus De piscib. cap. clxxvii. fo. 158.  
 De Dracone marino. & Scorpione. Authores.  
 Aristoteles in histor. animalū. Plinius. Op-  
 pianus De piscib. Aelianus. Dioscorides. A-  
 thenæus. Galenus De aliment. De tenui ui-  
 ſus ratione. Oribasius. Paulus Aegineta.

cap. clxxviii. fo. 158. b  
 De Mugilum generibus. Authores. Aristoteles  
 in histor. animalium. De partib. animalium.  
 De Generatione animalium. De animalium  
 incessu. Oppianus De piscib. Athenæus. Pli-  
 nius. Strabo. Oribasius. Galenus De aliment.  
 De cib. bo. malique succi. Pausanias. Auso-  
 nius. cap. clxxx. fo. 159.  
 De Dasquillo. Salpa. & quibusdā aliis. Autho-  
 res. Aristoteles in histor. animalū. Plinius.  
 Oppianus De piscib. Athenæus. Oribasius.  
 Columella. cap. clxxx. fo. 160. b  
 De Gobione. Authores. Aristoteles in histor. a-  
 nimalium. Oppianus De piscib. Athenæus.  
 Ouidius in Halieutic. Galenus De aliment.  
 De cib. bo. malique succi. Aelianus. Diofco-  
 rides. Plinius. cap. clxxxi. ibid.  
 De Apuarū generibus. & similibus quibusdā a-  
 liis. Authores. Aristoteles in histo. animalū.  
 Plinius. Athenæus. Oppianus De pisc. Oriba-  
 sius. Iul. Pollux. Aelianus. cap. clxxxii. fo. 161.  
 De Trichide. Thrissa. & similibus quibusdā a-  
 liis. Authores. Aristoteles in histo. animalū.  
 De Generatione animalium. Plinius. Athe-  
 næus. Oppianus De pisc. Strabo. Apuleius in  
 Apolog. Columella. Galenus De aliment.  
 Suidas. cap. clxxxiii. fo. 162.  
 De Halecula. Mēna. Smaride. & Boce. Autho-  
 res. Aristoteles in histo. animalium. Plinius.  
 Athenæus. Columella. Oppianus De piscib.  
 Dioscorides. Galenus De simplic. medic. O-  
 ribasius. cap. clxxxiii. fo. 162. b  
 De aliis quibusdā piscibus qui uocales dicun-  
 tur. Authores. Aristoteles in histor. anima-  
 lium. Plinius. Pausanias. Athenæus. Strabo.  
 cap. clxxxv. fo. 163.  
 De Thynno. Thymnide. Pelamide. & huiusce  
 generis aliis. Ex authorib. Aristotele ī histor.  
 animalium. Plinio. Athenæo. Oribasio. Op-  
 pianus De pisc. Strabone. Ouidio ī Halieutic.  
 Galeno De Sanitate tuenda. De aliment. De  
 cibo. bo. malique succi. De simplic. medica.  
 Dioscoride. cap. clxxxvi. fo. 163. b  
 De Salfamētis. Ex authoribus. Plinio. Columel-  
 la. Dioscoride. Galeno De aliment. De sim-  
 plic. medic. Athenæus. Oribasius. Aetius.  
 cap. clxxxvii. fo. 165. b  
 De Scombro. Colia. Amia. & aliis quibusdā qui  
 sale seruantur. Ex authoribus. Aristotele in  
 histor. animalū. Plinio. Galeno De alimēt.  
 Oribasio. Aetio. Athenæo. Oppiano De pi-  
 scib. Aeliano. Columella. Cornel. Celfo.  
 cap. clxxxviii. fo. 166. b  
 De prægrandibus aliis quibusdā piscib. quo-  
 rum

## DE DIFFERENT. ANIMALIVM

rū nōnullos etiā *ἠρῶν* *ἰδῆ*, id est cetaceos uocār quidā. Ex authorib. Aristotele in histo. animaliu. Strabone. Plinio. Plutarcho. Oppiano De pisc. Athenço. Orisabio. Aufonio. Dioscoride. Galeno De simplic. medic. Paulo Aegineta. Herodoto. Aeliano. ca. clxxxix. f. 167.  
De aliis quibuscūq; fluuiatilibus & lacustribus piscib. Ex authoribus. Aristotele in histo. animaliu. De partib. animalium. Plinio. Plutarcho De fluminibus. Aufonio. Aeliano. Athenço. Oppiano De piscib. cap. cxc. fol. 169.  
De Niloticis piscib. & aliis quibuscūq; ignotis. Ex authoribus. Aristotele in histo. animaliu. Plinio. Strabone. Athenço. Oppiano De piscib. Ouidio in Halieutic. Paulo Aegineta. Iul. Polluce. Aeliano. cap. xcxi. fo. 170.  
De Piscibus mira. Ex authoribus. Aristotele De Respiratione. Theophrasto De piscibus. Plinio. Athenço. Columella. Philostrato in uita Apollonij. Aeliano. cap. xcxi. fo. 170. b

### C E T E.

De Cetis. Ex authoribus. Aristotele in histo. animalium. De partib. animalium. De Respiratione. Plinio. Oppiano De piscib. Galeno De Alimēt. De Sanitate tuēda. c. xciii. f. 171.  
De Delphinis & Phocæ. Authores. Aristoteles in histo. animalium. De partibus animalium. De Generatione animalium. Plinius. Solinus. Oppianus De piscib. Ouidius in Metamorph. Aelianus. cap. xciii. fo. 171. b  
De Balena. Orca. & Physeter. Ex authoribus. Plinio. Oppiano De Pisc. Strabone. Festo Pompeio. Solino. cap. xcvi. fo. 172. b  
De Aliis quibuscūq; marinis beluis. Ex authoribus. Aristoteles in histo. animaliu. Plinio. Oppiano De pisc. Ouidio in Metamorpho. Pausania. Aeliano. Vergilio in Aenide. c. xcvi. f. 173.  
Liber nonus continet animalium Exanguium Differentias: & priuatim, insectorum.

**D**E Animalibus Exanguibus. Ex Aristotele in histo. animalium. De partib. animalium. De animalium ingressu. & Columella. cap. xcvi. fo. 173. b  
De insectis & eorum partibus exterioribus. Ex Aristotele in histo. animalium. De partib. animalium. De animalium ingressu. De sensu & sensu. Plinio. cap. xcvi. fol. 175.  
De Partibus Insectorū interioribus. Ex Aristotele in histo. animaliu. De Partibus animalium. De Generatione animalium. & Plinio. cap. xcix. fol. 175. b  
De Insectorum generatione & interitu. Ex Ari

stotele in histo. animalium. & De Generatione animalium. cap. cc. fo. 176.  
De Visu Insectorum. Voce. Valentinus. & aliis quibuscūq; affectibus. Ex Aristotele in histo. animalium. & De partib. animalium. cap. cci. fo. 177.  
De Insectorum generibus quæ fauos sibi extruunt. ut De Apibus, atque id genus aliis. Authores. Aristoteles in histo. animalium. De Generatione animalium. Plinius. M. Varro. Columella. Vergilius in Georg. c. cci. f. 177. b  
Ratio operis & uita Apū. Authores. Aristoteles in histo. animaliu. Plinius. M. Varro. Dioscorides. Columella. cap. cci. fo. 179.  
De Generatione Apum. Ex Aristotele in histo. animalium. De Generatione animalium & Plinio. cap. cciii. fo. 180. b  
De Morbis Apum & iis quæ aliis inimica sunt apibus. Ex authoribus Aristotele in histo. animalium. Plinio. Columella. Vergilio in Georgic. cap. ccv. fo. 181.  
De Melle. Ex authoribus. Aristotele in historia animalium. Plinio. Seneca. in Lib. Epistol. Dioscoride. Galeno De Naturalib. potētis. De aliment. De sanitat. tuēda. In Methodo Medendi. De Antidot. M. Varrone. L. Columella. Palladio. cap. ccvi. fo. 181.  
De Cera & Propoli. Ex authoribus. Plinio. Dioscoride. & Galeno. De simplic. medic. facultat. cap. ccvii. fo. 183.  
De Vespiis. Crabronibus. & Teuthredone. Authores. Aristoteles in histo. animalium. De Generatione animalium. Plinius. M. Varro. cap. ccviii. fo. 183.  
De Sirene. Bombylio. & Bombycio. Authores Aristoteles in histo. animalium. Nicāder in Theriac. Plinius. c. ccix. fo. 184.  
De Formicis & Scorpionibus. Authores. Aristoteles in historia animalium. De partib. animalium. De Generatione animalium. De sensu & sensu. Plinius. Solinus. Galenus De simplic. medic. Nicander. Ouidius in Metamorph. Pausanias. Strabo. Dioscorides. Suidas. Aelianus. cap. ccx. fo. 185.  
De Araneis & Phalangis. Authores. Aristoteles in histo. animalium. De Generatione animalium. Plinius. Ouidius in Metamorph. Aetius. Paulus Aeginetes. Nicander in Theriac. Dioscorides. cap. ccxi. fo. 186.  
De Scolopēdra, & aliis quæ multipede dicātur. Ex authoribus. Aristotele in historia animaliu. De partibus animaliu. De Respiratione. Nicādro in Theriac. Plinio. Dioscoride. Oppiano. De pisc. Paulo Aegineta. Galeno De  
ē ij

# CAPITA X LIBRORVM

simplic. medic. Aelianus. cap. ccxii. fo. 188  
De iis quę promuscidem & ueluti aculeum in ore gerūt. Vt de Muscis & Culicibus. Authores. Aristoteles in histor. animalium. De partib. animalium. De Generatione animalium. Plinius. Columella. Vergilius in Georg. Strabo. Theophrastus in plantarum histor. Suidas. Aristophanes. Aelianus. cap. ccxiii. f. 189  
De Cicadis. Authores. Aristoteles in histor. animalium. De Respiratione. Plinius. Dioscorides. Galenus De simplic. medic. Athenęus. Aelianus. cap. ccxiiii. fo. 190  
De Locustis. Ex authoribus. Aristotele In historia animalium. De partib. animalium. De Generatione animalium. Plinio. Aeliano. Dioscoride. Mose in Leuitic. cap. ccxv. fo. 190  
De Vaginipennibus, quę gręci κελευπιδες uocant. Ex Aristotele in histor. animalium. De partib. animalium. De Generatione animalium. de animalium ingressu. De Respiratione. Theophrasto De causis plantarum. Plinio. Dioscoride. Galeno De simplic. medicam. Nicandro. cap. ccxvi. fo. 191  
De Erucis, & iis quę ex eis gignuntur, ut papilionum generibus. Ex de pennatis quibusdā aliis quę ex uermibus gignuntur. Ex authoribus Aristotele in histor. animalium. De partib. animalium. De Generatione animalium. Plinio. Ouidio in Metamorphosi. Dioscoride. Nicandro in Theriac. cap. ccxvii. fo. 193  
De Bestiolis quibusdā quę in lignis aut arboribus nascuntur. Authores. Aristoteles in histor. animalium. Theophrastus in plantarum histor. De causis plantarum. Plinius. Plautus in Cistellaria. Columella. Strabo. Suetonius in Sergio Galba. cap. ccxviii. fo. 193  
De nōnullis quę in aliis stirpibus aut fructibus creātur bestiolis. Authores. Theophrastus in histor. plantarum. De Causis plantarum. Plinius. M. Varro. Palladius. Pausanias. Phociō Grammaticus. cap. ccxix. fo. 194  
De Bestiolis quibusdā quę in igne, niue, aut terra ipsa gignuntur. Ex authoribus. Aristotele in histor. animalium. De animalium inaccessu. De Generatione animalium. Plinio. Dioscoride. Galeno De simplic. medic. Athenęo. Aeliano. cap. ccxx. fo. 195  
De Bestiolis quibusdā quę intra aut eorum partes generantur. Ex authoribus. Aristotele in histor. animalium. Plinio. Galeno in Commentariis in Aphorism. In Methodo medendi. Ex lib. qui Introductorius inscribitur. Aetio. Paulo Aegineta. Columella. cap. ccxxi. fo. 195

Deus quę carnis uiuę humore aluntur. Vt Pulice. Pediculo. Ricino, & similibus. Ex authoribus. Aristotele in histor. animalium. De partibus animalium. De Generatione animalium. Plinio. Q. Sereno. Galeno De compositione medic. per loca. De simplic. medica. Dioscoride. Paulo Aegineta. c. ccxxii. fo. 196  
De Blattis. Authores. Aristoteles in histor. animalium. Plinius. Dioscorides. Galenus De simplic. medic. cap. ccxxiii. fo. 197

Liber decimus continet Exanguium Aquatilium Differentias, scilicet Mollium, Crustaceorū, & Testatorū quę Zoophyta appellantur: quę & à nōnullis pisces uocantur.

## MOLLIA.

De iis quę Mollia dicuntur. Authores. Aristoteles in histor. animalium. De partib. animalium. De Generatione animalium. De Respiratione. Galenus De Aliment. De cib. bo. malique succi. Oribasius. Athenęus. cap. ccxxiii. fo. 198  
De Polypo. Ex authorib. Aristotele in historia animalium. De partib. animalium. De Generatione animalium. Plinio. Oppiano De piscib. & de Venatione. Athenęo. Iul. Polluce. & Oribasio. cap. ccxxv. fo. 199  
De Sepia. Ex Aristotele in histor. animalium. De partibus animalium. De Generatione animalium. Plinio. Athenęo. Dioscoride. Galeno De simplic. medic. facultat. Paul. Aegineta. cap. ccxxvi. fo. 201  
De Lolligine & Lollio. Authores. Aristoteles in histor. animalium. De partib. animalium. Plinius. Oppianus De pisc. Aethnæus. cap. ccxxvii. fo. 202  
De Lepore marino. Ex authoribus. Dioscoride. Galeno De simplic. medic. facultat. Aetio. Plinio. Nicandro in Alexipharmac. Apuleio in Apolog. Athenęo. Aeliano. cap. ccxxviii. fo. 202.

## CRVSTATATA.

De Crustatis. Ex authoribus. Aristotele in historia animalium. De partib. animalium. De Generatione animalium. De Respiratione. Galeno De Aliment. Plinio. Athenęo. Oribasio. Aetio. cap. ccxxix. fo. 203  
De Locustis. Authores. Aristoteles in histor. animalium. De partib. animalium. De animalium inaccessu. De Generatione animalium. Athenęus

## DE DIFFERENT. ANIMALIV M.

- Athenæus . Plinius . Oppianus De pisci.  
cap. cccxx. fol. 204  
De Astaco siue Cammaro . Ex Aristotele in histo-  
ria animalium . De partib . animalium .  
cap. cccxxi. fol. 205  
De Cancrorum generibus . Authores. Aristote-  
les in historia animalium. De partib. anima-  
lium. De animalium ingressu. Plinius. Op-  
pianus de piscib. Athenæus. Dioscorides. Ga-  
lenus De cib. bo. malique succi . De simplic.  
medic . Paulus Aegineta. Aetius. Aelianus.  
cap. cccxxii. fol. 205. b  
De Squillarum generibus . Et Camaro. Leone.  
& Arcto. Ex authoribus. Aristotele in histor.  
animalium. De partibus animalium. Plinio.  
Athenæo. Aeliano. cap. cccxxiii. fol. 206. b

### TESTATA.

- De Testaceis. Authores. Aristoteles in histor. a-  
nimaliū . De partib. animalium. De anima-  
lium ingressu . De Generatione animalium.  
Galenus De Alimentis. De cib. bo. malique  
succj . De tenui uictus ratione. De sanita-  
tuenda. Oribasius. Plinius. Athenæus.  
cap. cccxxiii. fol. 207. b  
De Turbinatis. Author Aristoteles in histor. a-  
nimaliū . De partib. animalium. c. cccxxv. f. 210  
De Cochleis. Ex authoribus. Aristotele in histo-  
ria animalium. De partibus animalium . De  
Generatione animalium. Plinio. Dioscori-  
de. Oribasio. Athenæo. M. Varrone . Galeno  
De cib. bo. malique succi . De Alimēt. De sim-  
plic. medic. De compositione medic. per lo-  
ca. Actio . Paulo Aegineta. Cornelio. Celso.  
Cicerone De Diuinatione. Strabone.  
cā. cccxxvi. fol. 210.  
De Muricem generibus. ut Purpura . Buccino.  
& reliquis. Authores . Aristoteles in historia  
animalium. De Generatione animalium. Pli-  
nius. Athenæus. Dioscorides. Strabo . Gale-  
nus De Aliment. De cib. bo. malique succi .  
De simplic. medic. Oribasius. Paulus Aegine-  
tes. Ouidius i Metamorph. ca. cccxxvii. f. 212  
De Strabelo. & Nerige. Ex authoribus. Aristote-  
le i histor. animalium. De partib. animalium. Pli-  
nio. Aeliano & Athenæo. ca. cccxxviii. f. 213  
De Echinus. Ex authoribus Aristotele in histor.  
animalium. De partib. animalium. De Gene-  
ratione animalium. Plinio. Dioscoride. Gale-  
no De Aliment . De simplic. medicamen.  
cap. cccxxix. fol. 213  
De Balano. Authores. Aristoteles in histor. ani-  
malium. Plinius. Athenæus. Galenus. De Ali-  
ment. Oribasius. cap. ccd. fo. 214.

- De Vniualibus. ut De Lepade . & Aure mari-  
na. Ex authorib. Aristotele in histor. anima-  
lium. De partib. animalium. Athenæo. Ori-  
basio. cap. cccxli. fol. 214  
De Biuasuiibus. Et primo De Ostreis. Authores.  
Aristoteles in histor. animalium. De Genera-  
tione animalium. Plinius. Athenæus. Oriba-  
sius. Corn. Celsus. Galenus De Aliment. De  
cib. bo. malique succi. De simplic. medic. Pau-  
lus Aegineta. cap. cccxlii. fo. 214. b  
De Chamis seu Conchis. Ex authoribus. Aristote-  
le in historia animalium. Dioscoride . Pli-  
nio. Oribasio. Athenæo. Pomponio. Mela.  
cap. cccxlii. fol. 215  
De Mitulis siue Musculis & Tellinis. Ex autho-  
ribus. Aristotele in histor. animalium. De Ge-  
neratione animalium. Corn. Celso. Plauto.  
Plinio. Dioscoride. Athenæo. Oribasio. Gale-  
no De simplic. Medic. cap. cccxliii. fol. 215. b  
De Pinna. Ex authoribus. Aristoteles in historia  
animalium. Plinio. Cicerone De natura Deo-  
rum. Athenæo . Oribasio . Theophrasto De  
Lapidibus. Solino. cap. cccxlv. fol. 216  
De Pectūculo. Authores. Aristoteles in histor.  
animalium. De Generatione animalium . Pli-  
nius. Athenæus. Oribasius. ca. cccxvi. fo. 216. b  
De Dactylis siue unguibus & pernis. Ex autho-  
ribus. Aristotele in histor. animalium. Plinio.  
Athenæo. Oribasio. cap. cccxvii. fol. 217.

### ZOO PHYTA.

- De Zoophytis. Et primo De Tethyis Vertibulis  
ue. Authores. Aristoteles i histor. animalium.  
De partib. animalium. De Generatione ani-  
malium . Athenæus . Oribasius . Plinius .  
cap. cccxviii. fol. 217. b  
De Holothurio. Stella . & Pulmone marino. Au-  
thores. Aristoteles in histor. animalium . De  
partib. animalium. Plinius. Dioscorides. Op-  
pianus De pisc. cap. cccxlix. fol. 218  
De Vrtica. Ex authoribus . Aristotele in histor.  
animalium. De partib. animalium . Plinio.  
Athenæo. Galeno De simplic. medic. Oriba-  
sio. cap. ccl. fol. 218.  
De Spongia. Authores. Aristoteles in histor. a-  
nimalium. Dioscorides. Plinius . Oppianus  
De piscib. Galenus De simplic. medic. facult.  
Paulus Aegineta. cap. ccli. fol. 218. b  
Epilogus, seu caput ultimum . Ex authoribus.  
Aristotele in Histor. animalium. Plinio . A-  
lexandro Aphrodisico in problemat. Iul.  
Polluce. Galeno De Naturalib. facultat.  
cap. cclii. fol. 219. b

F I N I S.

# LOCORVM, QVAE IN HOC OPERE AB

Edoardo Vuottono uel citantur uel exponuntur, catalogus.



<b>A</b> Eliani. 57. h. 55. g. 72. g. 75. b. 77. h. 81. b. g. 88. g. 99. c. 102. f. 115. c. 120. d. c. 129. d. 131. b. 134. d. 150. c. 153. a. 155. b. 157. b. 161. a. 167. d. 169. a. b.	170. d. 172. e. h. 195. f. 202. f. 210. b.	<b>A</b> etii. 78. h. 93. c. f. 99. g. 100. a. c. e. g. 101. c. f. 109. f. 117. g. 127. b. 187. e. g. 188. a. c. d.	<b>A</b> gatharfidu. 83. e.	<b>A</b> charnis. 160. e.	<b>A</b> eschyl. 11. g. e. 132. c.	<b>A</b> ldi Manuti. 118. g.	<b>A</b> lex. Aphrodisi. 59. b.	<b>A</b> lex. Myndu. 77. f. 115. d. 116. a. 125. a. 127. e. 131. a. 133. e.	<b>D</b> Ambrosij. 120. c. 169. a. b.	<b>A</b> mynta. 68. h. 69. b.	<b>A</b> ndrea. 147. g. 148. a. 205. c.	<b>A</b> ndromachi. 124. b.	<b>A</b> ndroffens. 216. f.	<b>A</b> nigoni. 128. f. 114. d.	<b>A</b> nthoni Mufe. 99. h. 197. e.	<b>A</b> ppellu. 91. c.	<b>A</b> pici. 129. b.	<b>A</b> pollodori. 102. f. 151. a. 185. f. 186. a.	<b>A</b> pollonidis. 95. d.	<b>A</b> ppionis. 154. h. 163. e.	<b>A</b> pyrri. 81. e. 88. g.	<b>A</b> pulei. 87. c. 125. a. 129. f. 147. d. 151. g. 156. c. 162. f. 202. g.	<b>A</b> rati. 124. a. 129. g. h. 130. g. 133. h.	<b>A</b> rati scholiaste. 124. a.	<b>A</b> rcheffrati. 144. e. 146. e. h. 150. e. 151. a. 155. h. 156. c. d. 157. h. 160. f. g. 162. a. 167. d. 168. h. 205. a.	<b>A</b> rchelau. 50. h. 78. d.	<b>A</b> ristotelis fol. 4. g. 5. d. 6. a. c. e. g. h. 8. c. 11. a. 13. a. 18. c. 19. c. g. 22. g. 26. f. 27. e. 31. f. 34. e. g. 35. d. 36. h. 38. f. 45. g. 46. a. d. f. 49. d. e. f. 50. b. 52. e. 54. a. 57. c. h. 58. g. 59. c. 63. g. 64. a. c. 67. a. b. 73. b. d. 79. g. d. 80. b. 81. a. b. 82. b. 84. g. 85. d. g. 86. g. 87. b. c. e. 91. d. g. 2. e. 94. a. 95. c. 97. e. 99. d. f. 100. d. e. 101. d. 103. b. 106. g. h. 112. a. g. 114. d. g. 115. h. 116. f. g. 117. g. 118. g. h. 120. d. e. h. 121. e. 123. a. 124. a. b. 126. d. e. 127. e. h. 128. f. 129. d. 130. d. 132. b. c. 133. e. 135. d. 136. a. g. 138. c. 139. g. 140. c. 142. d. 143. a. c. 144. c. g. 145. b. h. 146. a. 147. d. f. g. 148. f. h. 150. a. f. 151. a. b. d. e. g. 152. h. 153. a. c. 154. b. e. 155. d. e. 157. e. h. 158. f. 159. a. f. g. 159. a. b. e. 160. d. 161. a. f. 162. b. f. 163. e. g. h. 164. a. 165. c. 167. a. c. h. 168. d. 169. b. 170. f. 171. e. h. 173. a. c. 175. h. 176. c. 177. d. h. 178. b. c. e. g. 179. d. f. h. 180. d. e. h. 181. d. 184. f. g. h. 185. a. c. 187. b. 188. a. 189. a. g. 190. a. g. 191. b. c. e. h. 193. c. 199. d. g. 200. f. 201. b.	102. e. 103. b. f. 204. b. h. 205. e. 206. h. 208. h. 211. h. 212. c. 213. c. 214. d. 215. e. 216. g. 217. h. 218. b. d. 220. a.	<b>A</b> ristotelis interpretis Arabici. 127. e.	<b>A</b> ristotel. ueteris interpret. 98. d. 112. a. 117. g. 126. e. 151. c.	<b>A</b> ristobulu. 162. d.	<b>A</b> ristophanis. 111. h. 126. e. 130. d. 133. h. 134. d. 158. c. 190. a. 200. e.	<b>A</b> ristophanis interpretis. 125. c. 131. c. 133. e. 191. f.	<b>A</b> ristophanis Byzanti. 163. b.	<b>A</b> rriani. 65. c. 92. d. e. 98. d. f. 130. d. 134. a.	<b>A</b> rsiani. 153. a.	<b>A</b> rtemidori. 102. a. 159. f. 162. b.	<b>A</b> sclepiadu. 9. g. 124. b.	<b>A</b> thenei. 113. b. 114. d. h. 115. g. 117. f. g. 123. a. 124. h. 126. h. 128. a. 130. d. 131. c. 145. h. 150. a. h. 151. b. c. g. 152. a. e. 153. e. 154. b. c. g. 156. a. c. 157. e. f. 158. b. c. f. 159. a. d. 160. g. 162. f. 163. f. g. 164. a. e. 165. c. d. e. 167. f. g. h. 169. a. b. 170. b. d. 190. g. 199. d. 201. b. 205. e. 207. b. d. 211. f. h. 212. a. 203. a. c. 214. b. d. c. f. 215. h. 216. b. g.	<b>A</b> triali. 164. f.	<b>A</b> ufonij. 147. a. 156. d. 157. d. 160. a. h. 162. d. 168. d. 169. b. d. e. g.	<b>B</b>	<b>D</b> Basili Magni. 97. f.	<b>B</b> loni. 115. c. 117. f. 157. b.	<b>B</b> ortij. 219. e.	<b>C</b>	<b>C</b> alliphanis. 50. b.	<b>C</b> allumachi. 124. d.	<b>C</b> atonis. 166. f.	<b>C</b> haru Mitylemai. 216. f.	<b>C</b> hrisippi. 161. h. 219. g.	<b>C</b> landiani. 136. a.	<b>C</b> learchi. 124. h. 162. a.	<b>C</b> lytarchi. 131. c. 135. b. 191. e.	<b>C</b> lyri. 112. d. e.	<b>C</b> olumellae. 41. c. 44. b. c. 55. d. 59. c. 60. d. 61. h. 6. g. 76. b. d. 79. d. 181. c. 189. b. 194. b. g. 196. c. 197. e. d. 205. e. 207. d. 214. b. 215. f.	<b>C</b> orneli Celsi. 4. f. g. 5. a. b. d. 6. d. f. h. 7. a. d. e. 11. g. 12. f. 16. a. b. c. e. 29. f. 30. b. c. e. 99. e. f. 112. a. 129. d. 158. h. 167. f. d.	<b>C</b> orneli Nepotis. 131. f. 155. c.	<b>C</b> iceronis. 5. d. 11. g. 18. c. 26. h. 24. b. 28. a. 124. g. 129. g. 185. d. 194. b. 212. a. 215. f.	<b>C</b> onstantini Caesaris. 44. b. 125. e.	<b>C</b> ratu Pergamenfis. 72. a.	<b>C</b> renatij. 134. e.	<b>C</b> tesiae Gnidi. 50. b. 70. h. 83. e. 88. f. 98. f. 149. g. 171. a.	<b>D</b>	<b>D</b> emocriti. 48. e. 187. a. 195. e.	<b>D</b> inoniz. 135. h.	<b>D</b> iodoru. 36. f. 62. g. 153. b. 161. b. 166. f. 199. d.	<b>D</b> iodori Siculi. 58. g. 101. f. 196. e. 197. f.	<b>D</b> ionysij. 89. a.	<b>D</b> ioscoridi. 20. a. 40. e. g. 41. c. g. 42. c. 43. f. h. 44. a. b. c. d. 56. d. 57. g. 61. g. 69. b. 70. f. 75. c. 77. a. c. 80. f. 84. f. 91. a. b. 93. f. g. h. 94. c. e. 99. g. h. 100. e. 109. f. 111. e. 112. b. 117. d. 124. h. 130. a. 145. a. 152. c. h. 164. h. 166. f. 199. c. 179. e. 182. h. 183. c. d. 187. b. 188. d. b. 189. a. f. 190. f. 192. c. f. h. 195. e. 196. a. 197. e. 201. h. 202. b. f. h. 211. f. 112. g. 215. e. h. 216. c. 219. a. c. f. 220. a.	<b>D</b> iphili. 142. d. 144. c. 145. d. 148. e. 149. a. 150. b. e. 152. b. 154. f. 156. b. e. f. 157. c. 160. d. g. 161. b. 164. b. f. 165. a. b. d. h. 166. a. b. g. 167. a. 200. h. 201. a. h. 202. d. h. 203. b. 205. a. 215. c. d. 216. f. 218. f.	<b>D</b> orienu. 147. f. 151. a. 154. e. g. 155. h. 156. c. 160. d. 161. f. 162. b. e. 165. a. d. 167. e. 169. g. 170. b.	<b>E</b>	<b>E</b> nnij. 147. d. 151. g. 155. e. 162. f.	<b>E</b> peneri. 115. d.	<b>E</b> picharmi. 127. e. 152. f. 153. c. f. 156. b. 158. c. h. 161. c. 220. a.	<b>E</b> phippi. 159. a.	<b>E</b> rasistrati. 10. b. 18. d. 101. b. e.	<b>E</b> usei proph. interp. lat. 82. f.	<b>E</b> ndemi. 306. f.	<b>E</b> udoxi. 50. a. 148. f.	<b>E</b> uphemi. 50. c.	<b>E</b> uphronis. 219. h.	<b>E</b> uphranij. 129. f.	<b>E</b> uthydemu. 155. h. 156. c. 159. c. 160. d. 167. e.	<b>E</b> gii. 7. f. 172. b.	<b>G</b>	<b>G</b> alenis. 5. d. 6. c. g. h. 7. a. e. 8. c. f. 9. g. 11. a. 12. f. 13. e. 16. a. b. c. 17. b. 18. c. f. 19. b. f. 30. c. 31. f. 44. g. 35. d. 39. g. 38. b. f. 40. c. d. g. 42. c. e. 43. f. 44. a. b. 45. g. 46. c. f. 51. e. 54. a. 55. h. 56. a. 7. b. 62. f. 67. g. 69. g. h. 70. c. 77. a. c. e. g. 80. e. 97. e. 98. e. 99. f. h. 100. e. 101. g. 106. g. 109. f. 111. c. e. 112. b. 114. c. d. 115. g. h. 117. d. g. 124. b. 127. h. 128. h. 129. a. 130. a. 131. f. 132. h. 143. c. 145. c. 145. c. h. 148. b. 150. a. d. e. f. g. 151. b. 152. c. 153. b. c. 155. d. f. 156. a. h. 157. a. f. 159. h. 160. b. 162. a. 162. g. 164. f. h. 165. b. h. 166. d. f. 167. d. f. 169. c. 182. b. d. g. 183. b. 184. e. 188. b. h. 189. a. 182. e. h. 194. f. 197. a. d. e. 202. a. h. 203. b. 206. f. 209. f. 211. c. h. 213. h. 214. b. 215. b. 220. a.
---	--	---	-----------------------------	---------------------------	------------------------------------	------------------------------	---------------------------------	---	---------------------------------------	-------------------------------	---	-----------------------------	-----------------------------	----------------------------------	--------------------------------------	-------------------------	------------------------	---	-----------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	--	---	-----------------------------------	---	---------------------------------	--	--	--	--	-----------------------------	---	---	---------------------------------------	---	--------------------------	---	-----------------------------------	--	--------------------------	--	----------	-------------------------------	--	-------------------------	----------	-----------------------------	-----------------------------	--------------------------	----------------------------------	------------------------------------	----------------------------	-----------------------------------	--	---------------------------	---	--	--	---	--	-----------------------------------	---------------------------	---	----------	---	--------------------------	--	--	--------------------------	---	---	---	----------	--	--------------------------	--	--------------------------	---	--	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	----------------------------	----------------------------	--	-----------------------------	----------	--



# CATALOGVS.

A. Gellij. 11.g.120.d.  
Cicij. 63. a. 65.g. 70.h.75. c.d. 81.b. g.  
207.d.  
Gratij. 60.f.h.71.h.87.c.

H

Hegeſandri. 153.b.  
Heliodori. 82.f.129.d.  
Hermola Barbari. 63.a.69.h.70.g.81.  
a.89.e.91.g.93.g.100.c.d.103.a.112.  
a.113.b.117.g.h.120.e.124.b.136.b.  
151.b.153.b.155.b.156. c.f.162.b. 163.  
c.d. 165. e.166.f.167.f.184. g.187.f.  
188.c.191.e.f.197.g.g.111.h.112. a.113.  
a.h.116.c.120.a.

Herodoti Halicarnaeſei. 50.a.64.a.e.91.  
d.122.b.136.a.168.h.169.b.g.  
Herodoti Heracleota. 63.g.81.h.90.h.  
213.d.

Herophili. 8.f.11.c.46.e.  
Heſychij. 130.a.134.a.191.f.  
Heſiodi. 47.g.49.e.81.a.111.h.

D. Hieronymi. 69.g.  
Hippocrati. 6.h.12.b.14.b.15.b.43.f.  
117.a.182.e.f.192.f.h.193.b.

Homeri. 5.d.6.e.11.g.16.a.14.f.49.g.  
119.e.121.a.122.h.

Horatij Flacci. 108.g.109.f.153.c.163.c.

I

1a. Claymondi. 75.d.95.f.112.b.130.d.  
180.c.181.d.

1ceſij. 145.c.146.d.148.b.e.156.b.f.158.  
h.159.c.161.b.165.d.166.a.167.a.  
d.215.c.

1auij. 15.b.  
Iphicrati. 75.b.  
Iſchij. 69.h.

Iſogeni. 49.g.50.c.  
Iſob.e. 71.h.100.h.133.c.171.e.151.g.

Iſulj Caſarij. 75.a.77.a.  
Iſulj Pollucij. 4.g.5.a.b.6.c.d.e.h.8.h.9.  
e.g.11.g.16.a.b.e.18.h.44. h.63.a.67.  
c.115. h.126.h.128.a.131.f.161.f.151.c.

100.e.

Iuuenalij. 129.d.107.d.

L

Labeonij. 135.  
Laberij. 155.c.

Laclanij. 9.h.134.h.151.a.  
Leonici. 100.e.

Leonidij Byſanti. 170.h.171.a.196.b.  
Licinij Mutiani. 153.c.

Lippij. 158.c.  
L. Linij. 82.f.

Lucani. 97.e.98.e.99.c.100.e.103.a.  
118.c.192.h.

Lueretij. 9.c.113.b.114.c.124. c.130.b.  
Lyncij Samij. 162.b.

M

L. Macri. 147.f.102.h.  
Magoni. 89.a.

Manilij. 134.f.g.  
Marcelli Virgilij. 191.f.g.

Marziali. 68.e.75.d.84.g.92.g.114.h.  
115.h.117.a.c.128.b.128.a.129.b.150.  
a.f.155.b.156.g.153.c.d.205.e.207.d.

Maſſarij. 145.h.146.a.147.a.d.150.b.151.  
b.153.d.

Maſſarij. 40.e.110.c.  
Martionij Smyrni. 51.d.

Meſſaltheu. 50.a.b.e.58.d.65.c.96.e.  
186.b.

Menecraſi. 177.h.  
Meſſiſthei Pratenſis. 163.e.

Meſſiſthei Athenienſis. 142.a.168.a.  
209.h.

Meſſei. 119.a.  
Matiani. 214.f.

N

Neocli. 93.e.  
Nicandri. 69.f.h.93. c.f.g.h.98.a.99.f.  
101.b.c.102.g.h.103.a.130.d.146.c.

184.g.h.185.g.186.a.187.d.g.188.c.  
189.a.191.e.191.f.193.c.120.a.

Nicandri Theterei. 151.f.  
Nicanor interpres. 94.f.100.c.

P. Nigidij. 69.a.122.c.135. e.190.a.g.  
192.b.

Nonij Marcelli. 136.b.163.e.  
Nomencl. 152.f.158.f.58.f.166.f.170.b.

195.f.

O

Oniſicriti. 49.g.  
Oppianij. 57.h.58.g.65.g.66.e.69.h.70.  
h.75.b.c.79.d.81.b.97.f.100.d.115.

c.136.d.138.e.144.g.145.b.f.146.a.  
147.c.d.148.f.149.a. b.149.a. b.d.

130.b.131.e.f.133.c.d.154.a.b.d.154.  
c.155.b.h.156.c.d.h.157.a.b.e.f.158.f.

159. e.160.g.161.h.162.c.163.d.g.  
164.e.165.c.e.166. f.167.e.f.h.169.

a.b.g.173.a.c.f.188.f.199.g.200.d.h.  
201. a.202. b.205. a.206.f.218.c.h.

219.f.  
Orbiſij. 109.f.117.g.150.c.153.e.156.b.  
161.h.211.f.h.212.g.215.e.

Ophili. 51.d.  
Onidij. 7.a.68.h.97.g.109.f.117.g.110.

g.122.e.123.a.b.125.b.h.126.a.128.g.  
130. b.f.133. d.134. f.135. g.h.136.a.

147.e.f.h.151.a.b.c.f.153. b.g.154. a.b.  
d.g.155. b.e.156.a. b.h.157. f.158. f.

160.c.163. g.164.e. 165.c.171.f.172.  
e.173.f.185.h.193.h.200.c.

P

Palladij. 75.c.83. b.85.a.c.d.86.d.87.h.  
112.b.116.a.166.g.183.a.194.h.

Pamphilij. 165.a.d.  
Parnemonij Rhodij. 157.h.

Pauli Aegineta. 45.g.69.h.93. h.99.g.  
100.e.127.h.169.c.183.b.191.e.

Paulſanij. 50.e.57.h.72.f.75. d.81.a.90.  
h.98.f.100.h.101.h.103.a.126.a.135.

g.160.b.163.c.f.169.a. b.173.d.191.  
f.211.h.

Pelopij. 92.f.  
Pernandri. 98.f.213.c.

Phaenonij. 162.f.  
Philophaui Cyrenenſis. 163.e.

Philophrati. 57.h.88.e.103.a.  
Philotimi. 36.f.114.c.145.h.148.h.166.f.

Phocionis. 130.d.195.b.  
Phomoneis. 119.e.

Pictonij. 197.e.  
Piſandri Camirei. 135.f.

Pithia. 154.d.  
Platonij. 1.b.12.f.44.f.145.c.

Plantij. 123.a.151.b.194.b.219.g.  
Plinij. 4.e.f.5.a.d.6.a.c.e.h.11.g.12. f.13.

a.16.a.c.d.17.d.16. c.19.c.h.20.a.26.  
h.34.e.f.37.d.38.b.40.c.g.41.c.d.43.

c.d.43.f.44.c.45.e.46.a. c.e.48. b.  
49.d.f.g. h.50. d. c.96. d. f.57. a. b.

c.f.g.h.58.g.59.f.61.g.62.e.g.64.  
a.b.65.c.f.67.a.c.68.a.d. 69.g.h.

70.h.72.a. b.73.b.d.74. c.75. c.f.g.  
77.g.78.a.d.79.d.h.80.a. b.d.81.g.

h.81.b.83.a.84.b.g.85.e.86.g.87.b.  
c.88.g.89.c.91.a.d.92.c. c.f.93. d.f.

94.d.96. f.h.97.d.e.f.g.98.b.f.g.99.  
b.f.100.e. 101.b.f.102. h.103. a.b.

105.e.105.b.h.108.f.109.d.f.110.d.  
g.111. c.d. e. h.112. a. b.d. g.113.b.d.e.

114.f.115.c.a.117.d.e.h.118.c.119.e.  
h.120.d.e.g.h.121.e.122.d.h.123.b.c.

h.124.b.125.d.126.a.c. h.127.e.f.  
128.a.d.f.h.129.a.c.d.f.g.130.a.d.131.

a.132.d.133.e.135.d.e.h.136.a.138.e.  
140.h.142.e.145.a.f.146.e.147.c.d.

f.148.h.149. b.e.150.a.b. c.150.f.g.  
151.b.d.e.g.151.c.h.153.b.c.d.e.h.154.

h.155.a. b.e.g.156.b.c.f.g.h.157.a.g.  
158.a.b.c.159.a.160.c.e.161.c.162.a.

b.163.a.c.g.h.164.a. g.165.c.d.e.  
166.e.f.g.167.a.e.h.168.c.d.f.g.169.

b.c.171.a.172. a.e.g.h.173.e.f.175.f.  
176.a.178.a.b.c.d.f.179.d. g.h.180.

d.g.h.181.a.c.g.182.a.h.183.a.b.c.d.e.  
184.b.d.e.f.h.185.a.c.h.186.a.187.c.

g.188.a.b.c.g.189.d.190.a.f.g.191.b.  
h.192.a.c.e.f.h.193.a.c.e.g.h.194.c.f.

h.195.e.g.197.a.b. c.d.199.b.d.200.  
a. e.f. g.h.201.a. b.202. b.f.203. b.

204. b.212.e.215.a.c.206.e. h.207.c.d.  
209.b.c.210.a.g.211.f.g.h.212.c.213.

a.c.e.f.h.214.b.f.215.a.e.h.216.b.c.g.  
217. b.c.d.h.218.a.c.d.g.219. a.d.f.

220.a.

Plutarchi. 97.g.115.e.131.e.  
Polemonij. 131.b.

Polybij. 163.f.  
Praxagora. 36.f.

Praxoni. 44.c.  
Pſcuppi. 152.f.g.163.a.167.g.190.f.

Pythagora. 72.a.

R

Rafij. 114.d.  
Racelij. 191.e.

Raffij. 31.f.40.c.78.f.  
8

Santra. 135.c.  
Seneca. 153.c.181.f.

Sereni. 196.d.  
Sergij. 214.g.

Seruij. 23.g.  
Seſij. 70.b.86.f.91.c.94.d.

# CATALOGVS.

Seibi.	109 f.
Solimi. 36. f. 49. d. f. 50. e. 56. h. 57. b. c. f. 58. g. 64. a. 65. g. 72. b. 74. c. 75. e. 91. f. 97. e. 99. c. 101. f. 103. a. 125. g. 126. a. 132. d. 136. a. b. 150. c. 171. e. 172. e. 186. c. 216. g.	
Sophocles.	4. h.
Sophonis.	145. h. 152. b.
Sorani.	196. g.
Sprmatij.	149. g.
Softrati.	163. h.
Stratij Setofsi.	149. g.
Strabonius. 10. f. 57. h. 58. e. g. 70. h. 87. e. 99. d. 115. e. 122. h. 132. a. 136. d. 146. a. 149. d. 156. b. 164. a. 167. e. f. 168. h. 169. a. b. 172. h. 194. b. 210. f.	
Suetonij.	129. d.
Suida. 121. e. 125. c. 126. h. 130. a. 134. a. 186. h.	
T	
Tauronius.	52. e.
Telephi Cretenfis.	185. d.
Terpsiclus.	127. a.
Tenaci.	212. a.
Theocriti.	79. d. 87. b. 124. a.
Theocriti interpretis.	75. b. 94. b. 97. f. 114. a. 125. a.

Theodori Gazæ. 5. a. 6. e. d. h. 38. b. 46. f. 47. a. 54. b. 57. d. 68. e. 75. e. 81. b. h. 84. g. 98. g. 100. e. 103. b. 104. d. 112. a. 114. d. 117. f. g. h. 118. a. g. 120. e. 121. e. 123. a. b. g. 124. b. 126. a. d. e. h. 127. h. 128. a. c. 129. e. d. 130. d. 136. a. b. 137. f. 140. e. f. 147. c. d. 150. a. b. d. 151. b. c. g. 153. c. d. 154. b. 155. b. 156. b. 158. b. c. 156. c. d. 162. a. b. f. 162. g. 163. c. d. h. 165. e. 167. f. 169. a. b. 170. b. 172. e. 173. c. 174. h. 175. g. 179. b. 180. d. 184. g. 185. a. 186. c. 188. a. b. 189. h. 190. a. f. g. 191. a. h. 192. h. 194. c. f. 197. c. g. 199. d. 205. e. 206. h. 207. e. d. 211. f. g. h. 214. d. 216. g. 217. h. 218. c.	
Theonius interpretis Arati.	130. d. 189. a.
Theophrastus.	195. d.
Theophrasti.	46. e.
Theophrasti. 44. b. 62. g. 89. a. 94. g. 103. b. 120. c. 145. b. 146. c. 170. c. 171. d. 191. h. 194. c. f. 216. e.	
Theopompi.	114. d.
Timæi.	93. e.
Trochij Nigri. 125. a. 149. b. d. 152. h. 167. h. 200. e.	
Trogi.	48. d. 67. c.

V		
Valerij Maximi.	120. d.	
Vegetij.	87. e.	
Varronius. 49. c. 59. d. e. 60. d. 67. d. 68. e. 70. h. 73. b. g. 75. e. f. 76. e. g. 77. g. 78. e. 79. d. 83. a. b. 84. f. 85. g. 86. a. 89. a. 99. b. 110. h. 111. h. 112. b. c. d. 113. b. c. 117. f. 115. b. 118. a. 132. d. 133. h. 151. b. 156. b. 160. c. 177. h. 178. f. 179. e. 179. e. g. 180. d. 181. a. 184. f. g. 210. f.		
Virgilij.	76. b. 77. h. 86. d. 93. g. 97. h. 93. b. c. 124. g. 126. h. 129. h. 130. b. 173. a. d. 178. h. 179. a. 180. h. 189. e. 195. e.	
Vitruvij.	12. f.	
Vipiani.	72. g.	
Vmbrij.	120. e.	
X		
Xenocrati. 50. h. 142. c. f. 143. a. c. 146. d. 148. h. 149. a. 150. e. f. g. 151. g. 152. b. h. 153. b. g. 154. f. h. 155. e. f. 156. a. d. e. f. 157. e. g. 158. b. 160. e. f. 164. e. g. 165. a. d. 166. a. f. g. 167. a. 194. b. 201. a. 210. a. 214. b. 216. h. 218. f.		
Z		
Zenotimi.	62. h.	
Zoroastri.	43.	

FINIS



# Edoardi Vuottoni Oxoniensis

## DE DIFFERENTIIS ANIMALIUM LIBER I.

Ad serenissimum regem Angliæ Edoardum eius nominis sextum.

Animal quid sit, & quo differat ab iis quæ non sunt animalia.

Caput I.



Nimal undique absolutum atq; *οὐραν*, id est mente præditum esse mundum, cuius circuitu flexu teguntur cuncta, Plato nobis author est: idemque quatuor in eo animalium genera contineri prodidit. Vnum scilicet deorum cælestium, & igneum hoc quidem atque rotundum: alterum *πτερόν τε καὶ ἀνέροπτερον*, id est uolucres & æriuagum: *ἑρπύλλον*, tertium, hoc est aquatile: quartum *πρὸς γῆν χερσαῖον*, id est terrestre, aut in terra uisitans. Verum cū substantiæ, quæ natura constant, partim ingentia immortalesque seculis omnibus à sapiētiæ professoribus putentur, partim ortus participes atque interitus intelligantur: nos partem illam nobilem ac diuinam minus cōtemplari propterea possumus, quòd admodum pauca sensui patent, quorū ope de iis, quæ in illis rebus nosse cupimus, facultas nobis cogitādi, indagandique suppeditetur. Reliqua autem illa animantium genera, quæ nos quoque animalia appellamus, quòd eas nobis socias familiarēque habemus, nosse uberius possumus. De harum itaque differentiis disseramus, nullum genus pro uiribus omittentes, uel uilius uel nobilius: cum nulla res sit naturæ, quanuis uel uilissima appareat, in qua non mirandum aliquid habeatur. In animantium genere uniuerso, primum genus plantarum est: earumque alia ab alia differt, eò quòd perfectioris uitæ particeps esse uidetur. Vniuersum autem earum genus, si ad cætera respicias, quæ anima uacant, ipsum quasi animal est: at respectu animalis, inanime esse uidetur.

Sed enim digressus hinc ad animalia cōtinuus procedit. Natura enim cōtinue ab inanimatis ad animalia transit, per ea quæ uiuant quidem, sed non sunt animalia: ita ut parum admodum alterum ab altero differre uideatur, propter suam propinquitatem. Viuunt enim principio, & quæ in ouis, & quæ in animalibus gignuntur uita plantæ. adharendo enim capiunt primum & incrementum & alimentum. Sunt item in mari nonnulla quæ ambigas animāl ne sint an planta. Spongiæ enim natura simillima plantis est. Cæterum paruo quodam discrimine subinde alia præ aliis iam adipisci uitam sensumque uidentur. Quin & sentiendi uim ita habent nonnulla, ut

*Animal.*

leuiter & perobscure sentire uideantur. Quandoquidem itaque anima-  
lia ab iis quæ uiuunt tantum, parte animæ sensuali, sentiendiue facultate om-  
nino separari constet, eò præcipue quòd sensum habeat, definitur ani-  
mal. Erit itaque animal corpus animatum, quod sensu præditum est. Non  
tamen in omnibus animalibus par inest sentiendi uis: sed aliis sensus om-  
nes, aliis pauciores dedit natura. Sunt enim quinque numero: uisus scilicet,  
auditus, olfactus, gustus, & tactus. Quorum tactus omnibus animantibus  
adeo necessarius censetur, ut nisi hunc habeat sensum, non poterit animal  
quæ iuuant, nocentue, hæc quidem uitare, illa uero amplecti. Est uero & gu-  
stus tactus quidam, qui & alimenti causa non minus necessarius habetur.  
his igitur si priuetur, ut animal seruetur, uiuatque, minime erit possibile.

*περὶ τοῦ πνεύματος.*

Omnibus itaque quæ animalis nomine censentur, tactus inest & gustus, &  
& maxima etiam ex parte olfactus: nisi quod forte imperfectū animal fue-  
rit. Horum enim quibusdam solum tactus inest: reliqui autem sensus non  
ex necessitate, sed salutis potius gratia dati sunt. Neque enim omnibus ne-  
cessario insunt, sed iis tantum quæ locum mutare nata sunt, *περὶ τοῦ πνεύματος* uocāt:  
hoc nanque genus non tangendo solum, sed eminus etiam sentire oportet,  
si permanere animal debeat. Quando igitur sentiendi facultate conue-  
niunt omnia, quo pacto unumquodque ab alio discrepet, explicandum iam  
nobis est.

Quibus modis constitui debeant animalium differentiæ. Cap. II.

*A partibus.*

Non sensus solum, sed & alia nōnulla sunt, quæ partim multis, partim  
omnibus animalibus insunt cōmunia: uiuendi nimirum ratio, mo-  
res animalium, aliique affectus actionesque, & præterea partes. Actiones  
autem & affectus intelligi uolo, incessum, generationem, incrementum,  
coitum uenerem, uitamque ac mortem, uigiliam & somnum, respiratio-  
nem, iuuentam & senectam, ualitudinem prosperam aduersamue, sexum  
masculinum aut femineum, atque uocem, & quæcunque id genus alia pos-  
sunt generi animalium tribui. Per hæc potissimum & quæcunque huius-  
modi alia, differentias animalium constitui dignum est. Quibus de rebus  
primum ueluti formula quadam agendum: deinde generatim discussione  
diligentiore differendum censemus. Profecto differentiæ quæ in partiū,  
morum, aliorumque affectuum, & uictuum actionumque ratione uersan-  
tur, colligi debent: partium quidem, eò quòd animalium alia sanguinē ha-  
bent, ut homo, equus: alia exanguia sunt, ut apes, uespæ. Item aliis pedes na-  
tura dedit, aliis negauit. Et quæ obtinent pedes, aut binos habent, ut homi-  
nes atque aues, duo hæc tantummodo genera: aut quaternos, ut lacerti, ut  
canes: aut plures, ut centipedes & apes. Per uictus rationem differunt ani-  
malia, eò quòd alia carne uescuntur, alia frugibus: alia omnia attingunt, ut  
cornices, alia cibo sui generis proprio utuntur, ut apes, melle, & paucis qui-  
busdam aliis aluntur. aranei uenatu muscarum uiuunt. Differunt præter-  
ea & moribus animantes: aliisq; affectionibus: ut alia feræ, alia cicures in-  
ueniantur. Atque harum utriusque, alię perpetuo cicures, ut homo, mulus:  
alia

*A uictus rat.*  
*ἰσχυρὰ φάγα.*  
*καρπεφάγα.*  
*πυμφάγα.*  
*διόρεφα.*  
*Ab affectionibus*  
*A moribus.*

A alia perpetuo fera, ut panthera, lupus: alia cū sint fera, facile mansuescunt, ut elephantus. Item alia mites sunt, animoque remissa minimeque peruicaces repugnantē, ut boues: alia animosa, peruicaces, & omnino indociles, ut sus sylvestris: alia ingeniosa ac timida, ut cerui, lepores, cuniculi: alia illiberales, perfida, insidiosaque, ut serpentes: alia liberales, fortes, nobiles, ut leones: alia feroces & insidiosa, ut lupi: alia astuta, malitiosa, calida, ut uulpes: alia animosa, amatrices & assentatrices, ut canes: alia mites, & mansuetudini addicta, ut elephantes: alia uerecūda & cauta, ut anseres: alia inuida, & ornatus, polituraque studiosa, ut pauones. Colore etiam differunt animalia: alia nāque unicolora sunt (appello unicolora, quo

*A colore.*

*μοιχρα.*

B idēque in auibus & piscibus & reliquis animalibus intelligi uolo: alia uersicolora sunt: sed toticolora (ea autem dico toticolora, quorum corpus totum quidem eundem habet colorem, sed non omnium eiusdem generis corpora eundem, ut bos totus albus est, aut totus est niger:) alia uaria sunt, idque dupliciter: aut enim genere toto, ut panthera, ut pauo, & pisciū nonnulli, ut quæ thrassa uocantur: aut non genere toto, sed parte, ut boues, ut capræ: interdum uaria generantur: in auium etiam genere, columbæ, & alia pleraque. Sunt uero & per actiones animalium differentia, ut alia locum per tempora mutant, alia iuuamen in cōsuetis sibi locis coniperiunt.

*πελύχοι.*

*όλνχοι.*

*πειλά.*

*Αβ αχθόβου.*

*Αμοι.*

Item animalium alia uolatilia sunt, ut aues, apes: alia gressilia, ut quadrupedes: alia natant, ut pisces: alia reptilia sunt, ut angues: alia tractilia, ut hircines. His uero modis uaria colliguntur & alia animalium differentia: ut animalium alia aquatilia sunt, alia terrestria. Et aquatiliū ordo triplex: alia enim in aqua degunt, uictumque petunt ex humore, quæ etiam per uices recipiunt & reddunt, nec uiuere possunt nisi uersentur in humore, ut pisces. Alia degunt quidem in fluido, uictumque inde emoluntur: sed aerē non humore recipiunt, id est spirant, & foris parere solent. Complura huius generis sunt, partim gressilia, ut lutris, latax, crocodilus: partim uolucres, ut mergi & urinatrices: partim etiam quæ nullis pedibus innitantur, ut natrix: nonnulla cum uictu in humore exerceāt, nec foris uiuere queāt, nihil uel aeris uel humoris recipiunt, ut urtica, ostrea. Aquatiliū item aliis nandi uis tributa est, ut piscibus: quædam ambulare possunt, ut cancrorum genus. Sunt & quæ sede stabili degunt: ut quæ faxis affixa omnem uitam traducunt, ut concharum genera nonnulla. Aquatilis item generis, alia marina, alia fluuialia, alia lacustria, alia palustria, ut ranæ. Terrestriū uero animantium, alia spirant, ut homo, & quæcunque terrestria habent pulmonem: alia quauis non spirant, tamen sedem in terra perpetuo tenent, & uictum inde capiunt, ut uespæ, apes. Terrestrium etiam alia uolucres sunt, ut aues, ut apes: alia pedestria, quorum alia gressilia, alia tractilia sunt. Animal autem quod uolucres tantum sit, ut piscis, natatīle solummodo est, nullum nouimus. Necnon differentias illas uitæ, actionesque animantium continent. Sunt enim alia gregales, alia solitaria, alia uitam ancipitem degunt: ut eadem modo societate, modo solitudine gaudeant: tū

*Ερπονταί.*

*Είληπταί.*

*Ciuiles animan-  
tes, πολιτικὰ  
ζῷα.*

uolucres, tum nantes, tum etiam pedestres. Item alia ciuiles, alia inciuiles. E  
Ciuiles appello animantes, quæ labori communicant: id est, quarum opus  
communi efficitur opera, munusque idem omni est, quod non omnibus gre-  
galibus competit. Ciuilis generis est homo, apes, uespa, formica, grus: qua-  
rum alia sub duce degunt, ut apes: alia nulli subditæ imperio sunt, ut for-  
mica. Sunt item tam ex gregalibus quàm ex solitariis alia quæ sedem nun-  
quam mutant, nec peregrinentur: alia quæ mutare statuto tempore solent.  
Et alia uim habent uenandi, aut ingenio recondendi sibi dotata sunt: alia  
nec ad uenandum aptæ, nec ad recondendum. Item alia domicilia sibi pa-  
rant, ut talpa, mus, formica, apes: alia nullis se includere casis patiuntur, ut  
plures tam insecti generis, quàm quadrupedis. Quinetiam locis discrimen  
aliud existit: quippe cum alia cauernas subeant, ut lacerti, serpentes: alia  
per summa telluris degant, ut canis, ut equus, ac alia foramina sibi exca-  
uant: alia nunquam eo munere funguntur. Et alia noctu sibi uictum qua-  
runt, ut noctua, uespertilio: alia interdum tantum. Item alia mutæ omnino  
sunt: alia strepitum tantum elidunt: alia uocem etiam formant. Quarum  
alia loqui possunt: alia uocem solam nullis exprimendam literis reddunt.  
atque alia loquaces, alia taciturnæ: alia oscines, alia non canunt. Alia  
præterea camporum incolæ sunt, ut palumbes: alia montis, ut upuæ: alia  
cum hominibus degere solent, ut columbi. Item alia copia libidinis gau-  
dent, ut perdicum genus, & gallinaceorum: alia minus uenere ualent, ut  
quæ coruinam speciem gerunt: quippe quæ raro solent coire. Adhæc aliis  
data est uis dimicandi: aliis ingenium cauendi & euitandi. Præterea quæ  
natant, alia pedibus carent: & hæc aut pinnis natant, ut pisces, aut etiam abs-  
que pinnis, sed ita mari utuntur, ut terra serpentes, modoque simili repunt  
in humore: aut sua ipsa latitudine natant, ut cartilaginei generis, quæ pla-  
na sunt, & caudam habent, ut raia, pastinaca: alia uero quæ pedes habere  
uidentur, ut mollia, tum pedibus ipsis, tum pinnis natant. Quæ crusta inte-  
cta sunt, suis caudis natant, celerrimæque retrorsum, pinnarum caudæ ad-  
iunctarum beneficio. Cordulus etiam pedibus natat & cauda. Volucrum  
autem aliæ penna uolant, ut aquila, accipiter: alia membrana sicca, ut apes, sca-  
rabei: alia cute, ut uespertilio. Sunt porro quæ uel pennis uel cute uolant, om-  
nia bipeda aut apeda. Angues enim circa Aethiopiā tales uolare narratur.

Animalium genera amplissima.

Cap. III.

H

**A**mplissima uero animalium genera, in quæ alia digetantur redigantur  
que animalia, quæ saltē nominibus distincta reperiuntur, hæc sunt,  
auis, piscis, cetus: quæ quidem omnia habent sanguinem. Et terrestre quod  
sanguinem habet & pedibus caret, genus serpentum est. Adhæc genus tes-  
ta intertū est, ὀστράκιδόρμιο Græci uocant, & ὀστρεὺς: nos ostreum siue cōcham.  
Et crusta inclusum aliud, μαλακίστρακι uocant: nec aliud nomen habet com-  
mune, ut locustarum & cancrorū genera. Aliud item μαλάκιον, id est molle,  
ut lolligines, sepiæ. Adde iis insectorum genus, quæ omnia genera sangui-  
ne carent. Reliquorum animantium genera nulla præterea ampla nume-  
rantur:

A rantur: unum enim quod plura genera contineat nullum est: sed aut simplex est, nullis ipsum specificis euarians discriminibus, ut homo: aut diuidi quidem in alia genera potest, sed nullis nominibus distincta. Quæ enim in genere quadrupede non pennato continentur; sanguinem quidem omnia habent: sed alia animal pariunt, alia ouu: dixerim hæc *δεσνικα*, id est ouipara, illa *ζωονικα*, id est uiuipara. Hæc ita impresentiarum formula exposuisse quadam prægustandi gratia placuit. Reliquum ita est ut ad alia trāscamus.

De partibus animalium.

Cap. IIII.

**B** Ante omnia partes animalium ex quibus constant, explicandæ sunt. Iis enim potissimum, atque in primis, tota quoque ipsa inter se differunt. Sunt porro animalium partes, aut similes, aut organicæ siue instrumentales. Similes Græci *ὁμοιομερεις* uocant, quod undique in similes diuidantur particulas, id est quod omnes earum partes tum sibi mutuo, tum toti similes habeantur: quæ & simplices etiam, & primæ, & incompositæ nonnunquam appellantur: quandoquidem ex illis constitutæ sunt particula, quæ organicæ siue instrumentales, atque etiam officiales uocantur. Similes autē numerantur hæc, os, cartilago, uena, arteria, neruus, ligamentum, tēdo, membrana, caro, adeps, unguis, cutis: his adduntur humores, ut sanguis, & qui in oculo sunt, crystallinus & vitreus humor. Instrumentales uero partes sunt, quæ aptæ secari in partes, ipsi toti dissimiles sunt: ut manus, non in manus secatur, aut facies in facies, aut pes in pedes: quapropter & dissimiles etiam uocantur. Ex hoc partium genere sunt, quæ non modo partes particulae ue, græce *μερὴ ἢ μόρια*, (pars enim cuiuspiam dicitur quicquid totum complet atque integrat) uerum etiam *μέλη*, id est membra appellantur: uidelicet quæ cum ipse totius integritate describantur, habeant tamen in se partes diuersas, ut caput, ut pes, ut manus, ut totum brachium, aut pectus: quippe quæ & ipsæ partes sint totæ, & ex partibus consistunt diuersis dissimilaribusque. Has uero partes totas uoco, & integras: quemadmodum animal aut totū aliud quoduis, unum esse dicitur, & totum quoddam integrūmque, eò quod suis conspiciatur finibus circumscriptum, nec ulla sui parte aliq̃ coniunctum: ita & ipsius pars, cuiusmodi est oculus, lingua, nalis, una esse dicitur: totaque & integra, eò quod appareat suis quibusdam finibus contineri: quod si non esset ulla ex parte reliquo corpori annexa, sed omnino separata persisteret, tūc sane neque pars, neque membrum diceretur omnino, sed absolute unum & totum integrūmque.

De partibus exterioribus dissimilaribus.

Cap. V.

**V**T uero nummos ad id quod sibi quisque certum exploratūmque habeat probare solet, ita & in animalium partibus agendum nobis est. Homo itaq; cum sit omnium maxime animalium nobis familiaris, & exteriorum partium eius forma per usum quotidianum sit notissima, reliquorum proinde animalium exteriores partes, tam similes, quàm instru-

mentales ita dignoscendæ sunt, eò quòd humanis partim easdem habent, E  
partim similes, dissimilesue sint, sed proportionè conueniant. At uero in-  
teriores contra sunt enim hominum in primis incertæ atque incognitæ.  
Quamobrem ad cæterorum animalium parteis, quarum similes sunt hu-  
manæ, referentes eas, contemplari debemus. Hominis autem partes, & si  
sensu facile percipi possint, describendæ tamen sunt: ut & sensum ratio co-  
mitetur, atque etiam ut series commentandi seruetur perpetua, dum ordi-  
nem persequimur omnium: quò minus lateant ea quæ non eodem modo  
quo homines, cætera animalia possident. Partes itaque primum enumera-  
bimus officiales, quæ externæ sunt, utpote quæ sunt per usum quotidianū  
præcipue nobis notæ: deinde interiorum ordinem prosequemur: postremo F  
quæ similes sunt, explicare conabimur.

De capite & eius partibus.

Cap. VI.

**M**Aximæ igitur partes, in quas primas diuiditur corpus, hæ sunt, ca-  
put, collū, thorax, brachium duplex, crus duplex. Caput in animalibus  
omnibus superiorè obtinet situm, corporis sui ratione. Capitis autem  
pars quæ capillis intecta est, calua appellatur: cuius pars prior sinciput, po-  
sterior occiput est. Quod uero inter sinciput & occiput est, *σφαίριον* dicunt,  
id est coronam. Extremus etiam capillorum ambitus *σφαίριον* uocatur. Caluæ  
medium illud discrimen & æquamentum capillorum, uerticem uocamus,  
Græci *κεντήριον* dicunt, unde & *σινδρυφαί*, id est biuertices dicti, quibus discrimē G  
illud geminum est: uerum non osse, sed æquamento. Faciem partem eam  
nominamus duntaxat in homine, quæ in priore parte caluæ subiaceret. Pars  
faciei frons, quæ sub sincipite posita, inter idipsum & oculos est: huic quæ  
prætenditur cutis, *περιτωπίδιον* dicitur: in qua rugæ, *ρυτίδες* dictæ. Ab utra-  
que frontis parte, tempora sita sunt. Supercilia sub fronte bipartito distin-  
cta. inter ea quod medium est, *μισοστροφον*: at eorum partes quæ naribus pro-  
ximæ sunt, *ὀφθαλμοκλαί*, id est superciliorum capita dicuntur: & *αὐραι*, id est  
caudæ, quæ ad tempora accedunt. pilos uero ipsos medici nonnulli *τύλαι* uo-  
carunt. Superciliis oculi subiacent duo: quorum partes superius inferiusq;  
oculos tegentes, palpebræ appellantur. Pilos, qui extremo palpebrarum am-  
bitui adherent, cilia nominamus. extremus uero palpebrarum ambitus, H  
unde excrescunt cilia, *ταρσοί* uocatur. Humor oculi quo uidemus, pars uideli-  
cet illa quæ in medio est, pupilla, quod eam ambit, nigrū oculi dicitur: quod  
postremo nigrū circūdat, cadidū oculi uocatur. Pars etiā cōmunis superio-  
ris inferiorisq; palpebræ angulus est, quæ duplicē uterq; oculus habet: alterū  
iuxta nares, alterum iuxta tempora. Auris pars capitis qua audimus est.  
huius pars exterior, quæ plana patulæque manet, Latinis auricula, Græcis  
*πτερυγία* est, (quasi alam dixeris aut pinnā) quæ solum chartilagine & cute  
constat. Qua uero parte sui extrema ab anteriore in posteriore uertitur, &  
quasi reflectitur, *κρυπτή* dicitur. sub hoc, quod ueluti dimidiū circuli est,  
ad rotunditatē uergens, & in mucronē exurgens, *συστήρ* appellatur. quod uero  
huius acumini subest concauū, *καρχήλον*. rotundū quod in medio est foramen,  
meatus

A meatus auditorius uocatur. Suprema autem pars pinna dicitur: inferior fibra. Pars illa interior anfractu cochleæ similis, definit in os quod auriculâ plane imitatur. Partem inter utrunlibet oculum, & aurem, & uerticem positam, tempora appellamus. Item pars faciei inter oculos sita, nasus est: cuius partes concavæ utrinque posita, nares dicuntur, græce *μῆρες*, quæ meatum præbent spiritui. his nanque ærem reddimus, & accipimus. Olfactus quoque, id est sensus odoris, hac eadem parte sumministratur. Mobiles esse nares natura uoluit, nec sicut aures sua compage immobiles. Pars nasi chartilaginea quæ nares discriminat, interseptum uocatur: externas uero narium partes, *πτερυγία*. In utraq; nasi parte, loca illa quæ sub oculis caua cernuntur, priuatim etiâ *κύναι*, id est caua dicuntur: quæ ex morbo aut aliâ interdum ex cruditate laborantibus facile attolluntur. Quæ uero sub iis inter nasum & aures ueluti margines leuiter eminent, oculorūque ab inferiore parte tutantur, malæ & genæ dicuntur. Sub iis laxiores partes, quæ iratis, aut spiritu à pulmone reuocato compressis ad hoc labiis inflantur, buccæ sunt, hilaritatē risūque indicantes, ut inquit Plinius. Est deinde maxilla duplex: cuius pars prior (quæ scilicet labro subiaceret inferiori, atque in rotundum quoddam acumen tendit) mentum, posterior mādibula est. Labra mox à naso habentur, caro per mobilis. Quod supra labra est, & infra nares, *μύτης* dicitur, & *ὐπὸ τῆς*, id est mustax. Quod autem sub mento est carneum, *αὐτὸ πρὸς* uocatur. Quod autem intra labra & maxillas describitur, os est, quo scilicet cibis recipitur: cuius partes, palatum, & fauces siue guttur. Fauces autem & guttur appello partē illam oris uniuersam, quæ gulæ prætenditur. Inest & pars sentiens saporem, lingua: cuius pars prior quæ acuta est, *πτερυγία* dicitur: caro uero qua inferiorem attingit maxillam, *αὐτὸ πρὸς*. Ea linguæ pars quæ ad fauces est, & quæ (ut nonnullis uidetur) gustus sensum habet acutiorem, *κύναι* nominatur, & *καυαλῶν*. utroque uero linguæ cauos sinus, *καρδίμους* uocant. carne rara & fungosa lingua constat: eius pars quædam ligula est, quæ pluribus infra explicabitur. Quod in ore bifidum cernitur, tonsillæ: multifidum uero, gingiue appellantur. Carne hæc constant, intusque dentes ossei coherent, utraq; maxilla sexdecim, in homine saltem. primores quaterni lati & acuti, eod quod secant, *πτερυγία* appellantur: ij omnes singulis radicibus innituntur. Hos utrinque sequuntur qui *κανόδοτοι*, id est canini uocantur: quibus singulæ quoque radices insunt, ij partim acuti sunt, partim lati: quippe qui infra latiusculi, supra arctiusculi sunt. ultra hos sunt maxillares, qui & molares dicuntur, quini ab utroque latere: nonnullis uero non quini, sed quaterni sensus oriuntur. Ex his, qui in intimo ore sunt, *συνσπονδυλῆες* appellantur: quibus utrinque iunguntur qui *ἀκύναι*, id est serotini uocantur, post uicesimum demum annum excrescentes: nonnullis etiam senescētibz prodierunt: multis & octogesimo. Molares, qui maxillæ superiori insunt, ternis fere, qui inferiori binis radicibus adhærescunt, nonnullis tamen exceptis, qui supra sæpe cum quaternis, infra cum ternis radicibus depræhēduntur: præsertim duo primi interiores, qui & intimi. Totus uero dentiū ordo *σπονδυλῆες* dicitur, id est dentiū acies. Parte autem oris penitiore, parti-



cula pendet carnea, columella nomine: quæ si immodice humecta intus  
mefcat inflammeturque, uua nomine uocatur.

F. Caput, græce καφαλή dicitur, πῆλος, κρεττός, κέγχος, σκαλίον. ποτήρ καὶ λήκας uocant,  
à papaueris capite hoc nomen deriuantes. Calua, quæ & caluaria, κρανίον. Sinciput,  
ἐρείσμα, ἐρείτωος. Occiput & occipitum, ἰνόν. εἰσάτη pro extremo capillorum ambitu,  
etiam πρὸς ἄρσους dicitur. Vertex capitis, κερνή. Orpheus μεσούρατος uocauit. G. Fa-  
ciem, & πρὸς αὐτὴν eam partem nominamus, inquit Aristoteles, duntaxat in homine.  
Nam piscis aut bouis πρὸς αὐτὴν faciē uocare non solemus, sed πρὸς τοὺς ἑταίρους  
dicunt: ut in auidibus ῥάμφορ, & ῥύγχος, πρὸς αὐτὴν in homine, à reipsa nomen accepisse uide-  
tur: quod enim unus animalium homo erectus est, solus prospicit ante uersus, uocē-  
que ante uersus mittit. Frons, μέτωπος ἢ μετώπιος. μετέφρονος etiam dixerē quidam. Tem-  
pora, προτωπαί. Supercilia, ὀφρύς, ἀμαρυγαί, σκυλῆς. Oculi, ὀφθαλμοί, ὀμματα. Pal-  
pebra, βλεφαρῆ. Plinius genas dixit. Cilia βλεφαρίδες. Celsus ferē pilos palpebra-  
rum uocauit: eosdem Plinius palpebras dixit. H. Extremo ambitum genæ supe-  
rioris, inquit Plinius, antiqui cilium uocauere, unde & supercilia. πρὸς αὐτὴν  
dicuntur & ἰλνῆς, ἰνῆς, ῥαίμα, τα, ὀρεγί. Pupilla, κέρα. Nigrum oculi, πῆλιν καὶ ῥῆς.  
Candidum oculi totum (quidam albuginem uocant) πῆλιν καὶ. σφαιρίδιον etiam dicitur & λοχός.  
Angulus oculi καὶ ἄλξ. Oculorum pars illa, quæ in medio est, quam pupillam uocant, κέρα  
est, uti modo diximus. Ambiens autem hanc circulus, ῥῆς uocatur. Huius uero par-  
tes, quæ pupillæ proximæ sunt nigrae, πῆλαι. C. Circulus qui candido proximus est,  
ἄλξ. Quæ ultima pars candidior est, πρῶτος uocatur. Totus oculorum ambi-  
tus, ἴον. Angulorum oculi radices, ἰγναί, δίδες, ἢ ἰκναί, δίδες. Quarum quæ naso pro-  
ximæ sunt, ῥῆς, πρὸς αὐτὴν dicuntur & πῆλαι: quæ uero tempora spectant, προτωπαί. Concaue  
altitudines quibus oculi continentur, quæ palpebras circundant, κέγχος appellantur,  
& γλῶσσαι à nonnullis. Auris, ὄψ, ὀκνῆ, ἔκασμα. Auriculam, Celsus etiam aurem uocat,  
πρὸς ῥύγχος, πρὸς ῥῆς. Mearus auditorius, ἀκνευκὸς πῆρος. Pinna, ἀντιλόβος. Fibra λόβος.  
Aristoteles erat, inquit Pollux, omnes auriculæ partes præter quā λόβος, id est fibra, G  
nomine carbant: uerum medici postea hæc imposuere uocabula. Auricularum ipsa-  
rum exterior ambitus, κεχλῆς, interior uero σκαλῶς est. Pars quæ ad tempora uergit,  
πρὸς ῥῆς, inferior autē λόβος. i. fibra uocatur: & interior κεχλῆς, unde & auris sordibus  
idem nomen quod concauū est, ἀκνῆς, quod ueluti fundamentū est aur pauimentum  
κρότων. Ipsius autē cōcaui sinus, quod in ea parte est quæ ad tempora uergit, & ad aures  
interiōra reflectitur, ῥῆς: opposita uero pars ἀντιῥῆς dicitur: sicuti & eius partis,  
quæ fibra dicta est, quod prominēt, πρὸς ῥῆς: quod κεχλῆς proximiū est, πῆλιν: quod su-  
per hanc est acutū in superiote fibræ ambitu, ἀντιλόβος. Eius autē partis quæ ῥῆς dice-  
batur, quod tēpora spectat ἀκνῆ dicitur. Cōcauū uero quod iuxta κεχλῆς est, ἰγναί, καὶ  
quod ad foramen est, καμῶς: quod autē intus est, κνῆς uocatur. quod deinde ad auriculæ  
radicē est fibræ subiectū, μέκων dicitur. Illius autē auriculæ partis, quæ sub eo quod πρὸς  
ῥῆς dictū est, habetur, ἰλῆς: & huic opposita pars ἀντιῥῆς: quod quæ sub hac est, κέγχος  
nūc  
parat. A. Tēpora, κρότωποι. nonnulli & κέρῆς uocant, & κέρῆς. Nasus, ῥῆς. Nares, μεκ-  
τῆς, μεκτῆς. Totū etiā mēbrū à medicis quādoque μεκτῆς uocatur, & μεκτῆς, & ῥῆς.  
Et nares Sophocles etiā μῆς appellauit. Et foramina ipsa quidā θαλάμους dixerē, & ὀ-  
κνῆς. Inter septum, κῆς. Quidā uero ita dinidūt. Nasi ea pars quæ superciliis pro-  
xime subiacer, ἴμος, per quem scilicet spiritus transmittitur. media uero χεῖρ, id est  
cartilago, uocatur. Partes uero quæ urrinque genas spectant ὄψ, ῥῆς ῥῆς, id est  
nasi spina. At ea quæ nares diuidit, κῆς διὰ φρεγμα, σῆς, uel ut aliis placet, quod in-  
tus mearus ipsos diuidit, διὰ φρεγμα ῥῆς uocant, id est septum narium. Quæ uero su-  
per eam partem est caro ad labra uergens κῆς, & totam nasi summitatem, σφαιρίον.  
Quæ autem extrinsecus ex utraq; sphaerij parte sunt, ὑπὸ καὶ ἢ πρὸς γῆ: intrinsecus au-  
tem μῆς ἢ θαλάμους: & quod illis tanquam fundamentum subest, ἰλνῆς ἢ ἰλνῆς. Max-  
& genæ, μῆς dicuntur, & πρῶται, & γῆ, uerum πρῶται & γῆ, buccæ potius dicen-  
tur. Maxilla σκαλῶς, γῆς, γαμφύλη. Mētum, γῆς, ὀφθαλῆς. Mandibula, γῆς. Labra, κῆς,  
neteres



A ueteres comici *καλλυπες* uocarunt. *Αιθεριον* etiā *λευκηρια* dicitur. C. Os, *στομαχι*, à nonnullis etiā *λόγος* dicitur, & *μύτης*. Palatū dicitur & cælum oris, *ὤπερδον*, *ὄρεστος*, *ὄρεσις*. Fauces Celsus lib. 4. Fauces, & spiritum & cibum capiunt, græce *φάρυγξ*, *φαρυγος* etiā à quibusdam & *ιδμός*, ob loci angustiam. Significat & *φάρυγξ* gulæ summam partem atque initium, sicuti *λάρυγξ* asperæ arteriæ uerum Plinius partem hanc quam Celsus & Theodorus fauces uocant, guttur appellat fauces uero summam gulæ partem, sicuti postremam stomachum dixit. Lingua *γλῶττις*, ἢ *γλῶσσα*, à nonnullis *χῆνος* uocatur, aut *πλῆκτρον* *χῆνος*: & totum membrum significat & membri partem, ut dictum est. Sed quod hic diximus (Pollucis autoritate) gustus sensum acutiorē illi linguæ parti inesse quod ad fauces est: contra Aristoteles eam, sentiendi istam uim præcipuè obtinere scribit, parte sui primore. Nam si interiore tangatur, minus eam sentire existimat. Ligula, à Plinio minor lingua uocatur: Græci *ὤπυρρα* *ὤπυρρα* uocant. Tonfillæ *περὶδωμικ* & *ἀπιδωμικ* dicuntur. Galenus *περὶδωμικ* inflammationem earum, quæ prope tonsillas sunt, partium, & *ἀπιδωμικ* priuatim tonsillarum ipsarum inflammationem esse ait. At Celsus *ἀπιδωμικ*, tonsillas, quæ post inflammationes induerent, à Græcis uocari scribit. Tonfillæ in intimo ore quatuor cōspiciuntur: binæ ad linguæ radicem, singulæ utrinque conspicuæ: & binæ penitiores, quas Pollux *μῦλα* uocari tradit. Gingiua *ὄλα*: ut nero Polluci placet, carnes quæ dentes continent, quæ quidem externæ sunt, *ὄλα*: quæ uero internæ, *ὤνυλα*: & quæ inter dentes ipsos continentur, *ἀρμυλ* dicuntur. Dentes, *ὀδόντες*, *τομῆς*. Dentes primores acuti, etiā *δρυχεῖρες* dicuntur, & *κτιν*, & *κλάστοι*. D. Maxillares, *γμφιοι*. Molares, *μύλαι*, *ὀφέργοι* etiā, *κρεατῆρες*, & latine genuini. Columella, *κίον*, ἢ *κιοῖς*, ἢ *γαργαρόν*. Vua *ταφῶλη*.

Decollo & eius partibus.

Cap. VII.

Collum deinde id appellamus quod inter caput & artus humerōs uenteriacet. Quantum uero colli ipsius cartilagineum, priorem obtinens situm, uocem transmittit & halicum, id arteria, & aspera arteria nominatum est. Hæc autem accipiendi reddendique tantummodo spiritus officio fungitur. Nihil enim aliud nec siccum uel humidum pati ipsa uidetur: sed ubi in eam tale quid deerrauerit, tandiu torquetur, dum excutiat quod dilapsum est. At uero quātum interius carneum spinæ præiacet, gula dicitur: qua cibus atque potus deuoratur. Ipsius autem asperæ arteriæ pars summa, quæ uocis instrumētum est primum ac præcipuum, larynx dicitur: apparētque in collo tangenti durum: & inter translutendum sus deq; moueri cernitur. Ultima autē colli anterioris pars, cui proxime subest iugulum, *ὤπυρρα* dicitur. Pars uero posterior colli, extrema ceruix appellata est. Partes thorace tenus dispositæ hæc sunt.

D B. Collum, idem & ceruix, græce *αὐχλῶν*, *τράχηλος*, (utrunque simul posuit Aristoteles 4. de partibus animalium, καὶ τοῖς πᾶσι καλεῖται αὐχλῶν καὶ τράχηλος) dicitur & *αιγὴ*: hinc ultima colli anterioris pars, *ὤπυρρα* dicta est. Plinius ceruicem à collo distinguit. C. Ceruix, inquit, nulli nisi quibus utraque hæc arteria & gula, cæteris colli, quibus tantum gula. Ceruix flexilis est ad circumspectum. Arteria, & aspera arteria, *ἀρτηρία*, καὶ *τρεχῶν ἀρτηρία*, & *βρόγχος* quoque dicitur. Gula, *στόμαχος*, *ὀισόφωγος*, *λαιμός*, & *λινυαρία* Homero. Stomachum etiā uocant Latini, ut Cicero: De natura deorum, & Celsus lib. 4. Plinius tamen stomacho abutitur pro ore uentriculi. Galenus utrunque significare tradit, gulam scilicet & os uentriculi, quod *καρδια*, id est cor ueteres nominare solebant. Larynx, *λάρυγξ*, quandoque etiā *φάρυγξ* & *βρόγχος* καλεῖται. Extrema ceruix, *ὤπυρρα*: dicitur & hæc colli pars *πινος*. *ὤπυρρα* Galeno est musculus superiorem humeri partem occupans, & præterea ea dorsi pars quæ humeri articulo proxima est.

**T**horacem eam partem appellamus, quæ à collo ad pudenda usque trunca pertendit. Finem enim thoracis faciunt partes quæ ostium excrementi tum humidi tum sicci continent. Thorax ipse parte priore posterioreque constat. In priore huius parte, mox à collo communis colli & pectoris pars, iugulū est, quod ossibus continetur, quæ & iuguli dicuntur, & *κλῆξ*. Deinde pectus, priorem thoracis obtinet situm: cuius media pars *σθῆθος* uocatur, quasi pectusculum dixeris, & *σῆτος*. Pectus ipsum bipartitum est, in mammam parte sui utraque extuberans. Mammis laxior cōtextus corporis est. Iuncta illis papilla, per quam lac transmissum elicitur. Qui papillas ambit circulus subniger, *μαῖς* dicitur. Quod sub mammillis est, *παραστός*, ac si præcordia dicas. Communis pars costæ, brachij, & humeri, ala est, quæ **F** & axilla, & subalis latera. Venter infra pectus est parte corporis priore: totum scilicet quod ab ea parte est, quæ *σῆτος* uocatur, ad pudenda usque, una etiam connumeratis iliis. Huius pars tota exterior musculosa, quæ interna obtegit, abdomen est: cuius ueluti radix umbilicus est. Huic radici pars subiecta in latus utrunque ilia dicitur: quæ autem recte subiungitur, aquiliculus: cuius postremum, pubes est: qua scilicet pili nascuntur. Sed super umbilicum, sub ore uentriculi, hypochondrium est. Cavum autem commune hypochondrij, & ilium cholago est. Pudenda his proxima sunt. Pars femine propria, uterus aut uulva est: maris penis colūscus, foras postremo thorace propedens, parte sui prima carne propemodū constans, æquabili facie turbinata: nomen à glande pars hæc mutuata est, glans dicta. Hæc **G** glandem quæ tegit cutis, *πρόσθιον* dicitur: & totum quod ex ea cute glandēque constat, præputium est. Reliqua pars cartilaginea est, & augeri ampliter potest. Huius membri quod minime dependet, *πρόσθιον*: foramen uero quæ humor excernitur, *ὀφθαλμός* dicitur: & id quo cuticula cum glande adnectitur, *ἀνδροσθιον*. Quod in inferiore penis parte, suturæ simile est, per scrotum ad podicem usque pertedens, *σπέρμα* est. Subiacet membro genitali testes gemini, cute obducti, quod scortum & scrotum nominamus. Mulieris autem genitale contra quàm uiri formatum est. Cavum enim subditum pubi est, non sicut maris propensum ac prominens: cuius pars interior, loci, & uterus appellatur. Ostium uero & ceruix, matrix est: quæ ab utero effertur, accessum prolifico maris semini præbens, & exitum humido excremento. Femoris & imi uentris pars communis est inguen. Pars **H** item interior femoris & natis communis, coles: exterior, subnatale: pars uero excretoria, podex est. Huic quod subditum quasi stragulum est, nates appellant: in quo autem scemur uersatur, coxa & acetabulum. Thoracis iam partes omnes primores diximus. Dorsum item sub ceruice, sed pone pectus est: cuius pars, quæ collo proxime subiacet, gibba, *χλωρίον*: quæ autem utrinque sitæ prominent, scapulae humerique: summi uertices *ἀκρόμια* dicuntur. Ab iis in anteriora protendunt *κλῆξ*, iuguli scilicet ossa, inter quæ iugulum situm est. Quæ uero ab scapulis ad spinam tendunt, *ὀμωπλάτης* Græci, nostri scoptula uocant: inter quæ *μῆστρον* situm

A situm est ad medium usque dorsum, ubi septi transuersi locus est. Infráque è regione uentris, lumbi habentur, usque ad os sacrum: cui utrinque adiacent clunes, partes quidem carnosæ: & in his, quæ prominent, nates appellantur. Totius uero dorsi media pars superne ad os usque sacrum, spina, & dorsi spina uocatur. Et thoracis quidem partes ita se habent.

E. Thoracem, *Θώραξ* (qui & *ἐλκός* dicitur) totam eam partem corporis quæ à collo ad crura usque pertendit, uocat Aristoteles, & alij quoque. Quanquam medicam solū partem thoracis dicunt, quæ collo proxima est, & utrinque costis clauditur: priore scilicet parte & posteriore ad spinā usque: inferiore uero ad præcordia terminatur: iugulū, & iugulus (Pli. lib. II. iuguli, nulli præter hominem) *σφαγὴ*: à *πὸνυλὶς* *θυμὸς*, *κλῆϊς* & *κατακλῆϊς*. harum pars quæ utrinque scapulis proxima est, *ἰπυμὸς*, quæ uero pectori & collo, *παρασφαγὴς* dicitur: atque hoc loco, quod cauum est, *σφαγὴ*, id est iugulus, appellatur. Pectus, *πῆρ*, pectoris media pars est, à summo ad cartilaginem usque illam, cui nomen est *φυσαλὶς*: significat & *πῆρ* os ipsum pectoris medium, cui adnectuntur costæ. Mamma *μαστήρ* dicitur & *παστήρ* & *παστήρ*. Papilla, *θήλη*, *πυλὸς* dicitur & cauum illud quod sub pectore est, carneum molléque ad os uentris: quæ quidem pars & *σφαγὴ* quoque & *κατακλῆϊς* uocatur. F. Ala & axilla, *μειράλη*. Latera, *πλευρῆ*, *πλευρῶν* uero costæ, id est lateris ossa dicuntur. uenter *γάστρ*, unde *περγάστρ*, id est uentricosus dicitur & *καίλη*. Abdomen, *ἰσχυρίων*, quandoque & *ἰσχυρίων* hoc totum significat: & contra, *ἰσχυρίων* nonnunquam pro *ἰσχυρίων* quandoque etiam uiscera ipsa hypochondria dicuntur. Umbilicus, *ομφαλός*, ἢ *μυσομφαλός*, concauum illud est, quod in uentris medio est. Qui circa hunc cernitur quasi perituum quidam contextus, *γάστρ*: medium autem umbilici, *μυρομφαλός*: quod uero super ipsum est, *ἰμυμφαλός*. At cutis ipsa quæ circa umbilicum est, *χαλὴ* uocatur, (quasi uetulam dixeris) eò quod cum rugas contraxerit, senectam iam aduentare significat. Ilia *λαγόν*, *κατὰ* *κατὰ* uocant, inquit Galenus, locum qui inter coxarum ossa, & costas uentricosus dicitur, eò quod sit inuolū, id est inanis & osium expertus. Aqualiculus, *ἴσρ*. Theodorus hanc partem *σῆμα* uocat, atque abdomen & imum uentris uerum *σῆμα* quid significet, infra explicabitur ex Plinio. *ἴσρ* quod & *ἰσχυρίων* dicitur, ut Pollux author est, eam duntaxat partem significat, quæ ab umbilico ad pubem pertingit. Pubes, *ἔβη*, quæ & *φίβη* dicitur & *ἰσχυρίων*, uel *ἰσχυρίων*. Chologagelās. Pudenda, *πίδοι*. Vetus aut uulua, *ὑπέρ*. Penis, *πίδοι*, *κατὰ*, *σῆμα*. *Αἰδοί* Aristoteli penem tantum significat: ut uero Polluci placet, penem continet unā cum scroto & testiculis, *πίδοι* etiam à quibusdam uocatur: *αυλός* Aristoteli fere ceruicem significat, uel sic scilicet, & penis. G. Glans, *βήλαι*, *πρυμνί*, *αἰροπιδί*: uerū Polluci *αἰροπιδί* & *αἰροπιδί* significat præputij cuticulæ partem prominentem. *ἰσχυρίων* dicitur & *ἰσχυρίων* *ἰσχυρίων*, uel sic ceruix: *πιδί* etiam dicitur & *ἰσχυρίων* quoque à nonnullis. testes, *ἔβη*, *σῆμα*. Scortū & scortū, *ἔβη*, *ἔβη*, ἢ *ἔβη*, ἢ *ἔβη*. Loci & uteris, totius nomine pars uocatur, *ὑπέρ* *κατὰ* *κατὰ*: unde fratres uterini *ἔβη* uocatur. Matrix, *μῆτρα*. D. Pndendi muliebri torus ipse sinus *κατὰ* uocatur: & latine (opinor) cunnus. Extremæ eius margines carnosæ *πρυμνί* & *μυρομφαλός*, *κατὰ* in harū medio suborta ueluti carūcula, *πρυμνί*, *κατὰ*, *κατὰ*: uterus etiā matrix dicitur, & *μῆτρα* *κατὰ*. H. Inguen *βουβών*. Coles, *πιδί*, subnatale *ἰσχυρίων*, pars scilicet carnea illa, quæ sub natis dorsum uersus ad fœmur pertendit. Podex *κατὰ*, *πιδί*, *πιδί*, *πιδί*. Nates, *κατὰ*, *πιδί*. Partes carnosæ quæ proxime lumbis, utrinque prominent, *ἔβη* dicuntur, id est clunes. ab his uero partes prominentes, *κατὰ*, & *κατὰ*, id est nates. *ἔβη* uero dicitur etiam partes carnosæ ex utroque sacri ossis latere, uocatur & *σφαγὴ*, clunes (uti arbitror) latine. *ἔβη* itē ligamētū ipsum significat, quo fœmur coxædici acetabulo colligatur. articulus etiā ipse *ἔβη* nōnūq̃ appellatur. Coxa & acetabulū, *κατὰ*: uerū Pollux *κατὰ* uocari prodiit cauas illas ossis fossulas, in quibus fœmoris capita uersantur, quas & coxas Celsus uocat, & ipsa fœmoris capita, *κατὰ*. Dorsum, *πιδί*. Scapulæ humerū, *δμῆς*: scapulas enim uocat Celsus humeri articulos: Theodorus

uero scapulas uocat, quas Græci ὀμωπλάτας dicūt, & Celsus scoptula, (scoptula operta E legunt nonnulli apud Celsum.) A. Humerus etiā in hoc significato pro articulo ipso apud Pliniū cū aliās, tum apertissime lib. 11. sed apud Celsum pro ea brachij parte accipitur, quam lacertum uocamus. ὤμως item apud Aristotelem fere pro humeri articulo accipitur. Lumbi ὀσπρὸς ἢ ἱστὺς ἢ πύθμιον. ἰσάαι dicuntur lumborum muscoli interni: qui & νεφρομήτραι & ἡλδοπικαι etiam à quibusdam uocantur. Quæquam sunt & qui externos spinæ musculos, ἰσάαι uocent. Clunes ἰσχίαι: quæ & τετραπόδα uocantur, ut ante dictum est. Harum partes sunt, nates, quas Græci χλόντες uocat & ἰσθμὸν: & ὀπλήν. πλάς, quæ carnes sunt infra nates, ad fœmora uergentes. Spina ῥάχις, κλόνος γυνὴ. Spinæ partem mediam illam quæ inter metaphrœnum & lumbos est, Homerus ἀκμήν uo cavit: uerum κεντρὴς, ut tradit Pollux, proprie in folis quadrupedibus est.

De Brachiis &amp; eorum partibus.

Cap. IX.

**M**embri uero superioris bipartitam compactionem à thorace dependentem, brachium siue ulnam uocamus: cuius partes sunt, scapula, humerúsue, lacertus (qui & humerus Celsi) gibber, cubitus (Celsus brachiū uocat) & manus. Lacertus totius brachij pars maxima est, terminos habens, inferne quidem gibberum, superne autem humeri articulum: gibberum uocamus cui innititur. est autem ea pars qua totum brachium flectitur. Altera brachij pars non minima, imo secundum lacertum maxima, quam cubitum uocamus, inter gibberū sita est, & articulum, quo cū cubito manus iungitur, χείρ Græci uocāt, nos brachiale. Cubiti pars superior, ὤμωπλήν, inferior, ἀγκυρὴ dicitur. Manus partes, palma, & digiti quinque. In manu prima palmæ pars, quæ ex multis minutisque ossibus constat, χείρ Græce dicitur: altera quam μετὰκαρπιον uocant, pars manus lata G est, quæ ex rectis quinque ossibus constat ad digitos tendentibus, à quibus digiti oriuntur. Digiti quinque numero: quorum qui maximus est, pollex uocatur, à latere metacarpij adiunctus, breuis crassúsque: huic proximus est index: medius deinde, qui longissimus omnium est: illum sequitur qui medicinæ dicatus est, τετταμόνιος dictus: postremus omnium minimus est. Hæret summis digitis unguis. Digiti pars qua inflectitur, nodus siue articulus est: quæ rigida constat, internodium dicitur. Pars interior manus, quæ carnosa est, & scissuris uitæ indicibus distinguitur, uola est. Exterior uero manus pars nervosa est, ὀπιδίταιρ à Græcis dicta.

Aliter sentit  
Galenus utrim  
fra uidebitur  
in ossibus.

F. Membri superioris. κῶλον Aristoteli & Galeno membra significat exteriora (ni fallor) à thorace separata, & quasi dependentia, ut brachia & crura: uerum, ut sentit H Pollux, κῶλον, quod & κῶλονμα dicitur, ex fœmore tantum & crure constat. Brachium βραχίον ἢ χείρ: totum hoc mēbrum Aristoteles βραχίονα, Galenus χείρ uocat, nonnunquam & βραχίονα, Celsus brachium, Theodorus brachium siue ulnam: ita forsitan & Plinius, lib. 11. uni homini ulnæ. Scapula, humerúsue, ὤμως, de quibus supra. Lacertus, hanc partem Aristoteles ἀγκυρὴν uocat, Galenus βραχίονα, Celsus humerum: alij lacertum, Theodorus, nisi codices sint mendosi, lacertum agilem. Gibberum, ὀμωπλήν: articulum hunc totum ubi cubitus lacerto iungitur, ἀγκυρὴν uocant alij: huius quod ab exteriori parte prominet, ὀμωπλήν. Galenus in ossē, inquit, brachij, quod cubitus appellatur, in extremo eius sine, illo qui cum lacerto iungitur, duo extant tubercula, alterum maius quod & posterius, & inferius est: alterum minus, quod superius est & in parte anteriore. hos processus siue tubercula uulgo κεράτια uocat: sed proprie illum, qui maior & posterior est, Attici ὀμωπλήν, Hippocrates ἀγκυρὴν uocat. hæc Galenus.

Cubitus

- A** Cubitus, πῦξ ἢ ὠλίτη. Celsus hanc partem brachium uocat, eodem scilicet cum toto nomine. Manus χεῖρ ἢ ὕπερ χεῖρ, ita enim fere uocat Galenus: nam χεῖρ apud illum totum brachium significat. Nomina ista brachij non inconcinne expressit Ouidius lib. 1 Metamorph. Laudat digitosque, manúsque, Brachiaque & nudos media plus parte lacertos. Palma δάκτυλος partes habet palma (ex Aristotele & Celfo) καί ποτ' & μετὰ καί ποτ'. Celsus has partes nominibus propriis non appellat, sed tantum primā palmæ partem, & alteram palmæ partem. Tertiā palmæ partē addit Pollux περὶ καί ποτ', quod ante carpū est. G. Digitus, δάκτυλος. Pollex ἀντὶ χεῖρ ἢ μέγας, index, λίγανος, medius, μέσος, minimus, μικρός. Nodus siue articulus κόλπος. Internodij, φάλαγγς ἢ φατταλὴς. Vola, δάκτυλος, ut utrumque significet δάκτυλος Aristoteli, totum scilicet & partem: uola etiam pedis pars concava dicitur ex Plinio & Fest. Pōp. Manus partes uarie ab aliis explicantur: nam quibusdam δάκτυλος ea pars dicitur carnosa, quæ in parte manus supina iuxta pollicem assurgit, & ad indicem usque: quæ uero illi opposita est in eadem manus parte, ἄνω δάκτυλος: pars uero exterior, ὀπίσθινος: quæ uero pars digitis proxime subest, σῆδες χεῖρὸς dicitur, à nonnullis hæc pars ὑπὸ δάκτυλος uocatur, & σῆδες χεῖρὸς (quod & ἀσθῆρον quoque dicitur) ea pars nominatur, quæ post cauam manus partē ante metacarpiū iacet: concavam uero manus partem κοίλος χεῖρὸς uocant: alij κοτύλλω, quæ scilicet inter δάκτυλος & σῆδες χεῖρὸς sita est. Alij uero manum ita diuidunt. Toram uolam, id est partem manus internam, δάκτυλος uocant, autoritate freti Hippocratis atque Homerij: externam uero, ὀπίσθινος, ἢ κίρκος, ἢ περὶ σῆδες, ἢ δῶρος: partem uero quæ iuxta carpū sita σῆδες χεῖρὸς dicunt: quæ uero sub digitis, τερσόν, κρεπίς.

De cruribus & earum partibus.

Cap. X.

- I** Inferioris autem membri quod κάλος uocant, bipartita compactio, utrinque à coxa dependens, crus est. Huius quod inter coxam & genu interiacet, fœmur & fœmen. Commune deinde fœmori & tibiæ, quod articulum constituit genu est: cuius pars posterior, poples uocatur. Quod foris orbiculatum adiectum est, contegens eam quæ ad genu est commissuram, patella uocatur & mola: tibia, quod gemino osse subiacet, cuius pars prior quæ carnis expers est, crea, posterior sura appellatur: quæ caro est nervosa. Postremum tibiæ, quod utrinque extat, malleolus geminus in utroque crure est. Quod deinde multiplici osse constat, pes est: cuius pars posterior, calx: prior discretæ in digitos quinque est: mediæ, plantæ nomine explicatur. Reliquæ partes ad earum quæ in manu sunt similitudinem instructæ sunt: plantæ scilicet palmæ, digiti digitis, unguis unguibus respondent. Partes exteriores hæc sunt.

- C.** Crus, κάλος: ita uocatur hoc totum, quod ex fœmore, genu, tibia, malleolis & pede constat. Fœmur fœmen uocat Celsus, μῦς: unde fœmoris internæ partes περὶ μῦς dicuntur: & quæ inter fœmora sunt μισομῦς. Genu γόνυ. Poples, καμῶν, ἢ ἰόνω, ἢ ἄγκυλα. Patella μύλη: alij ἱπποπόδη, ἢ ἱπποκρέτιδε dicunt, uocatur & μολαχεῖς, ἢ ἐπιμύλης, ἢ κίρχη ἢ κίρχος. Ἐπιγόνος etiam musculum significat qui in genu reperitur. Tibia (crus uocatur à Celfo) κνήμη, eodem scilicet cum toto membro nomine. Crea, ἡ τερπήμων, tibiā uocat hanc partē Celsus. Sura, γαστροκνήμη, γαστροκνήμων: quidā priorē partē κνήμω, posteriore ἀπὸ τερπήμων uocāt. Malleolus, σφύρος. ἄστρογίλος quidā uocant, & latine talos. Sunt autē ἄστρογίλοι ἢ πόδες inter illos extantes, sed qui intus à malleolis occultantur, ut inter ossa dicimus. Pes, πῦς, βῆσις. Quod post malleolos & talū est, id totū pes uocatur. Calx τῆρνα. Pedis partes uarie distinguuntur: etenim ut quibusdā placet, prior pedis pars à malleolis ad digitos usque τέρσις uocatur: interiora malleolis ad magnum usque digitum pedibus sese quasi aspicientibus πῆδον: quod sub hoc statim in imi pedis medio habetur, κίλον πῆδος, id est pedis cōcauum dicitur, latine uola. Infimum autem, quo terram

contingimus & calcamus, *πάμα* est. Pars uero ea quæ post cauum pedis iuxta digitos F  
attollitur, *ἡ πρὸς πρὸς*, ἢ *πρὸς πρὸς* dicitur. Sequuntur deinde *ἡ πρὸς πρὸς*, id est digiti pedis  
quinque numero. Alij uero superiorem pedis partem totā, quæ ante digitos est, quæ  
scilicet ex neruis & ossibus constat, *πρὸς πρὸς* uocant: ἢ *πρὸς πρὸς*, cuius priorem par-  
tem, quæ digitis proxima est, *πρὸς πρὸς* uocant: posteriorem pedis partem *πρὸς πρὸς*, id est cal-  
cem: inferior pars rota, *πρὸς πρὸς*, id est uestigium, quod scilicet carnosum est & inferius  
solum attingit. Galenus uero *πρὸς πρὸς* eam pedis partem uocat, quæ malleolis proxi-  
ma est: quæ ex septem ossibus constat, uti infra apertius explicabitur: inter ossa & illi  
manus parti respondet, quæ *πρὸς πρὸς* dicitur: *πρὸς πρὸς* uero, quæ illi proxima est, quæ ex  
quinque ossibus constructa est: quibus adiunguntur pedis digiti, & metacarpio in ma-  
nu responder. Itaque constat à Celfo plantam uocari, quæ ex utraque hac parte con-  
stat: sicut in manu palmam, quæ & *πρὸς πρὸς* continet, & *πρὸς πρὸς*, ut modo dictū est.

## De situ partium uario.

## Cap. XI.

F

HAbet sane homo (sicuti & cætera fere animalia) suas parteis ita dispo-  
sitas, ut & in eo superius sit & inferius: & prius & posterius: & dextrū  
& sinistrum. Et dextrum quidem & sinistrum ex similibus fere constat par-  
tibus, nisi quod sinistra omnia imbecilliora. At posteriora prioribus, & su-  
periora inferioribus discrepant; præterquam quod inferiora similitudinē  
superiorum præferre ea dixerim ratione, qua uenter imus respondere asso-  
let faciei in corpulentia uel gracilitate: & crura cum brachiis communem  
ineunt rationem. Ita quibus lacerti breues, iis etiā scæmora magna ex parte  
breuia sunt. Et quibus pedes exigui, iis manus quoque paruæ habentur.

De sex istis dif-  
ferentiis situs  
plura uideas li-  
bro de anima-  
liū gressu A-  
ristotelis.

Partium itaque situs, quemadmodum ad superius & inferius, prius po-  
sterius, sinistrum dextrum se habeat, paucis explicandus est: sex nanque G  
hisce differentiis moueri hominem liquido apparet. Superius autem intel-  
ligi uolo in animalibus, non ut idem sit quod in orbis uniuersi situ, sed quē-  
admodum supremam partem in omnibus eam esse dicimus, non animalibus  
tantum, sed quęcunque uita prædita sunt, per quam cibus recipitur: in-  
fimum autem ad quam postremo accedit. Partē quoque priorem eam uo-  
co, in qua sensus præcipue comprehenduntur, & unde sensus emanant ex-  
ordia: opposita uero illi pars posterior est. Dextrum autem, (quemadmodū  
& in uniuerso est) unde primus motus orditur. Ergo superiora inferiora-  
que hominem omnium maxime animalium habere ad rationem diffe-  
rentiamque locorum naturalium intelligimus: eius etenim partes tam su-  
periores quàm inferiores, ad situm orbis uniuersi superiorem inferiorem H  
que dispositæ sunt. Itidemque priores posterioresque, atque etiam dextræ  
sinistræque habentur: cum cæterorum animalium genus, uel respectu hu-  
iusmodi careat, uel confusius habeat. Caput itaque cum in cæteris etiam  
omnibus animalibus superiorem obtinet situm, corporis sui ratione: at ho-  
mo potissimum, quoniam solus (ut modo diximus) ad uniuersi orbis habi-  
tum institutus est: (solus enim animalium erectus uiuit) idcirco partē etiā  
istam habet respondentem parti sublimi uniuersi. Caput collum excipit,  
tum pectus & dorsum: alterum prius, alterum posterius est. Subiacent iis,  
uenter & lumbi, genitale & nates: mox scæmur & tibia: postremo pedes.  
Crura uero ante flectunt, eodem scilicet quo & incedunt. Calx è tergo po-  
situs



A situs est. Malleoli situm imitantur aurium: quippe qui latera teneant imi cruris, quomodo aures iunctæ lateribus capitis habentur. Brachia è latere corporis dextro sinistroque dependent, atque se intro flectunt: ita ut homini potissimum crurum & brachiorum deuexa, (*κυρτω* Græci uocant) aduersa inter se sint. Et brachiorum prior ea pars sit, quæ à pectore est: posterior uero, quæ ab scapulis: sicuti interior quæ ad latus tendit: exterior quæ ab eo recedit: quod ad omnes articulos pertinere etiam patet. Sensuum autem partes sensorias, oculos dico, nares & linguam, eodem scilicet in priorem partem spectantes habemus. Auditus uero sensoriam partem, id est aures, à latere, eodem in orbe quo oculos. Ita partes exteriores collocatæ atque dispositæ sunt, nominanturque præcipuæ: & cognitæ per usum situmque B euidentiorem habentur.

De partibus interioribus, & primo de capitis partibus. Cap. XII.

N Vnc interiorum ordinem persequemur. Primum igitur cerebrū *Cerebrum ἑν- κα' φηλος.* capitis priorem obtinet partem: non modo in homine, uerum in cæteris etiam animalibus, quibus ea pars data est: omnibus autem in iis est, quæ sanguinem obtinet, & ob eam rem *σῆμα*, id est sanguinea appellantur: ex cæteris fere nullum habet, nisi per proportionem, ut ea quæ *μαλακία*, id est mollia nomine speciali nuncupantur: ipsum ambiunt membranae duæ quas *μυώσας* Græci dicunt: altera crassior & solidior, ossi caluæ adhærens, quam *σκληρὴ*, id est duram uocant: altera *ῥεοδὴς* dicta, quæ interior est: & cerebrū *σκληρὴ, περι- χειρ' ἐπὶ δὲ αἰ- νητὶς ἐστὶν κρα- νία, ὅτι περιμα- τωδὴς.* ipsum attingens, infirmior & rubicundior. Bipartitum omnium animalium cerebrum est, postremumque iungitur, quod cerebellū uocatur, quod spinali medullæ continuum est: duriusculū, hoc est & colore sufflauo. Cerebrum omnibus priuatum sanguine est, nec uenam intra se ullam continet: omniumque corporis partium frigidissimum sentitur, uel ad tactum, ait Aristoteles, Galenus pernegat: cute tamen frigidius ipsum asserit, quæ omnium animalis partium, quod ad caloris frigorisque sensum attinet, ueluti norma est. Ex cerebro ipso paria neruorum oriuntur septem, quas *πεντακισ- τὴς* uocant, qui in secūdi arte periti sunt. (iis quæ ad nares feruntur minime cōnumeratis: neque enim hæc neruorum more producentur, nec extra caluā exeunt.) Et primū quidem parius nerui prodeunt, unus dextra, & alter sinistra, crassitudine notatu digna, & fere omnium neruorū mollissimi. Hi ueluti radices quædam oculorum uidentur: uterque enim ex priore cerebri parte prodians, atque in aduersum sibi oculū subiens, in latum sese explicat: ipsumque qui in oculo est, uitreū humorē in orbem sphære modo ambit: membranamque (siue tunicam dicere malis) efficit, quæ *ἀμειβλητοδὴς* dicitur, id est retiformis. Solis hinc neruis antequam in oculos inferantur, sensibilibus quidam meatus inest: unde ipsos quidā, non neruos, sed *πῆρας*, id est meatus appellarunt, alij neruos opticos, quasi dixeris uisus. Alterum post hoc neruorum par est, in musculos qui oculos mouēt distributum: puriores multo sunt hi, tenuioresque iis quos modo memorauimus. His adiacet tertium par. hos autem neruos molles uocant: molliores enim sunt, tum



secūdi paris neruis, de quibus modo diximus, tum uero eius quod mox se- E  
quetur, quarti, & itē aliorum. oritur autem hoc neruorum par, ubi pars  
cerebri anterior cum posteriore connectitur. Quarti uero paris nerui, his  
posterius paulo siti sunt, à cerebri basi emergentes. Quinti quoq; paris ner-  
ui proximi iis oriuntur, sed ad capitis latera magis, ad ossa quæ λισσῶς, id est  
lapidea dicuntur, uergentes. Hi uero cum statim bifidi fiant, in ipso scilicet  
per ossa transitu, utrinque deinde prodeunt, altera quidem pars (αὐτοκίνητος, id  
est auditorium neruum uocat) in priorem magis partem ad auditus me-  
atū: altera in partem magis auerſam, in ossis eius quod λισσῶς dicitur, fo-  
ramen illi indidēre, cum utiq; penitus anfractum illum perforare non po-  
tuisse, per quem neruus post aures foras emergit. Sextum neruorum par F  
à cerebri basi producit per foramē quoddam, quod ad inferiorem illius  
commisſuræ partem, quam λυμῶδες uocat, à λ litteræ similitudine, conspi-  
citur. Nec dum etiam nerui isti duri apparent: prædictis tamē omnibus eò  
duriore sunt, quo iā spinali medullæ sunt propinquiore. hæc nanq; corū  
qui duri sunt, neruorum, principium est. Vbi autem cerebrum desinit, illic  
oritur septimum neruorum par: quod unā cum sexto pari è caluaria se ex-  
erit. Habet in se cerebrum, plerisque omnibus, cauum quoddam exiguum  
ueluti lacunam λωὴν ab Herophilo dictum, id est torcular. habet & uetri-  
culos (κελίαις uocant) in priore quidem parte, hoc est in cerebro ipso, binos:  
in posteriore uero, quod cerebellum uocatur, unum. Et præterea à priori-  
bus in posteriorem meatus quidam transire cernitur, quem sane quartum G  
totius cerebri uentriculum nonnulli anatomici uocant. A prioribus illis  
utrinque exoritur processus quidam oblongus & concauus, in narium usq;  
principium protensus, à uentriculorum illorum natura nihil prope muta-  
tus: olfactus instrumentū primum hoc esse medici tradunt. Et cerebri qui-  
dem partes, & quæ ex his oriuntur, hoc se habere modo cernuntur: quæ  
uero in oculis sunt partes, iam explicandæ à nobis sunt.

De oculi partibus interioribus.

Cap. XIII.

Molles illi, quos primi paris neruos, & à priore itē cerebri parte oriri  
diximus, cum primum è caluaria egressi ad oculos peruenerint, in  
latum sese (ut modo expositum est) explicantes in orbem sphaeræ modo, ui- H  
treum humorem, quem ὑαλιδὴν uocant, amplectuntur: efficiuntq; membra-  
nam illam, siue tunicā, quæ ἀμειβανερῶδες dicitur, eò quod ἀμειβανερῶς, id est  
reti similis sit. Quæ tamen tunicam membranamue neq; colore, neq; sub-  
stantia refert penitus: sed si exemptā ab oculo eam seponas, atque in unum  
colligas, apparebit plane ceu cerebri portio quædam. Inferitur autē hæc in  
humorē oculi, qui κρυσταλλιδὴς dicitur, id est crystallinus aut glacialis, quod  
primum uisus est instrumentum, estq; affectuum crystallini certus ad ce-  
rebrum nuntius. Sunt autem in oculo intus sub tunicis humores orbicula-  
res duo: mollis alter perinde ac uitrum, quod modice solutum ac fuscum sit:  
alter ita durus, ut glaciem mediocriter concretam imitetur: nec corporis  
habitu

Quot quibuscq;  
modis à capite  
ſpērentur ner-  
ui in alias cor-  
poris partes, ſu-  
ſius oſtēdit Ga-  
lenus lib. De  
diſſect. neruo-  
rum. & lib. 9  
De uſu part.  
λῶος & λυ-  
μῶδες dicitur

Ἀφ' οὗτος δὲ  
quoq; ἡanc νο-  
cat ἰσλίαν Πολ-  
lux libro 2.

- A habitu solum, sed colore etiam tum vitrum tum glaciem referunt: vocanturq; à medicis, hic eadem qui mollior est, *υαλοειδης*, id est vitreus: ille uero durior, *κρυσταλλοειδης*. Est autē crystallinus, candidus, splendescens, perspicuus, & ut dictum est, duriusculus, figura globuli leuiter cōpressi: at vitreus (qui in hoc à natura institutus est, ut sit crystallino familiare alimentum) liquidus est instar uitri ab igne liquefacti: albi uero coloris tantum habet, quantum si intellexeris exiguum nigrum multo albo permistum, ut sit albedinis perfectio adulterata. Tunicam *αμυδαλινος* continet alia *αεροειδης* dicta, (quæ re uera tunica est, & corporibus subiectis operculum) orta à tenuiore cerebri membrana illi cognomine. Vasa hæc plurima, arterias scilicet & uenas in se habere conspicitur, quæ & alimentum *αμυδαλινος* præstent: & uincula illi seu sustentacula fiant. Cærulea hæc multis in partibus est, tum fusca, tum etiam nigra. Circundat hanc, & tuetur tertia quædam membrana durior, & quæ subiectam sibi tunicam ab ossium duritie tueri possit. A crassiore cerebri membrana hæc producta est, & apud iridis circum alteri membranæ inferiori coniuncta. Porro iridis circulus ita se habet. Crystallinus ille humor (quem primum uidendi instrumentum esse diximus) in uitreum humorem inferitur: & medius in ipso, quasi in aqua uehitur, eodem prope modo quo sphaera globusue, cuius dimidiū extra quā promineat. Hæc humorum connexio in crystallini medio hemisphærio, in utroque humore circulum unum efficit. Locus hic terminus est, finisq; *αμυδαλινος* tunica atque *αεροειδης* efficitq; eodem loco suum utraque circulum. Ad eundem hunc circulorum locum prope accedunt aliunde membranæ præterea duæ, altera *αφροειδης*, finisue est musculorū oculos mouentium, in duriores illam tunicam inserta: altera à membrana calvariæ ambiente (*πρωτοειδης* Græci uocāt) producta est. Hæc colore alba est, & totum oculum cum ossibus contegit: desinit autem ad circulum eundem, ubi & reliquæ oculi membranæ: & ubi nigro oculi iungitur album. Locus hic si probe omnia dissecueris, diligentēque omnia perspexeris, circulos ostendet plures (nempe septem) sibi mutuo coherentes, & crassitudine, & colore uarios: ut appositissime à ueteribus harum rerum peritis, iridis nomen datum illi sit. nonnulli autem & *σκληρον*, id est coramam uocarunt. At tunica illa tertia duriore, quam à crassa cerebri membrana oriri diximus, & quæ *αεροειδης* tunicam proxime circundat, ex iridis circulo producit membrana alia, quæ & dura est, ut sit crystallino humori operimentum, & ueluti propugnaculum aduersus ea quæ extrinsecus occurrere sint: & prætenuis simul atque alba, ne ullo pacto uisum impediatur: densa adeo ac tenuis, (præsertim in media sui parte) ut non aliter quàm cornu prætenue, & quam accuratissime derasum, splendore transmittere possit: unde & nomen illi impositum est *καρνεοειδης*, id est cornea. Est uero hæc membrana quauis aranea tenuior candidiorq;, & quouis speculo leuior magisq; pellucida pariter ac dura. Quæ proxima illi subest mollis est, uenosa, nigricans, & in medio pertusa. Oritur hæc una cū cornea ex iridis circulis, à tenuiore illa tunica, quæ *αεροειδης* dicta est: corneamq; sibi uicinam alit, ac eadem ne in crystallinum

humorem concidat, prohibet. Membrana hæc intus qua uitreo humori E proxima est, asperitatem quādam habet: extra uero qua corneum attingit, densior est: in medio autem sui qua pupilla est, perforatur. Atque hoc in loco, ubi scilicet foramen est, nulla tunica inter corneam & crystallinum humorem media est: sed ueluti pertenuē admodum & album cornu, splendor internus cum externo cōmunicat, & commiscetur. Caruleam hanc tunicam in medio perforatam, ab acini uix similitudine quādā (quod scilicet intus aspera non aliter sit, foris leuis) *ἐκροσθὴ* uocarunt. Cuius substantia, ea parte qua humori crystallino coniungitur, spongiæ madidæ similis est. Et cornea tunica qua quidem parte unā cum ea quæ *ἐκροσθὴ* dicitur, ab iride exoritur, humori crystallino propinqua est. membranæ enim oculi omnes pariter atque humores, eo in loco cohærent. Exterius uero magis magisque à crystallino abscedit: adeo ut qua pupillæ locus est, plurimū ab eo distet. Porro hoc ipso intervallo quod est inter humorē crystallinū & *ἐκροσθὴ*, humor quidam prætenuis reperitur & limpidus, ouorum albumini haudquaquam dissimilis, quo unā cum spiritu quodam aereo splendido prohibetur cornea, ne eo in loco crystallinum humorem comprimat aut contingat. Si enim pertundatur pungaturue cornea, confestim & humor ille per uulnus effluere cernitur: oculūque rugosus efficitur, contractus atque latus. Inter hunc humorem & crystallinum, membranula quædam, in modū cepæ corticis aut araneæ prætenuis est, quo crystallinus humor ab rhagoide membrana separatur. Quod autem reliquum in oculo est, pupillam ambiens, (exceptis qui oculum mouent musculis) non in homine solum, sed omnibus animalibus quibus oculi duri non sunt, sebi naturam imitatur. Et oculi quidem partes, tot numerantur: quanquam in crystallinus humor primum uisus instrumentum est, ut sæpius iam dictū est: reliquæ uero eius causæ factæ sunt.

E. Nulla tunica, nullam forsitan tunicam conspieuam intellexit Galenus. Nam *ἀρχροσθὴ* membranula quonammodo prætenditur crystallino humori, statim explicabitur ex eodem Galeno. F. Humor prætenuis, humorem aqueum uocauit hūc Asclepiades: hic in suffusionibus eoagulatur. Membranula, hanc membranulam tenuem adeo ut ægre conspici possit, ex *ἐμμελεχροσθὴ* natā, non distinxit Pollux (ut arbitror) ab illa, sed quasi eandem membranam duplici nomine insigniuit, ut antea notauimus, scilicet *ἐμμελεχροσθὴ*, & *ἀρχροσθὴ*.

H

De colli &amp; pectoris partibus interioribus,

Cap. XIII.

*Asperam arteriā Lactantius gurgulionem uocat, & spiritalē fistulam.*  
*Larinx, λάρυγξ.*

Collum capiti subiaceat proximū, ut ante dictū est. Intra collū gula est, cui comes aspera arteria iungitur, priorē obtinēs situm in omnibus iis quæ eam habent: habent autē omnia quibus pulmo est. Huius summa pars larinx dicitur, ut ante diximus: in cuius meatu particula quædam linguæ quæ in fistulis est, non absimilis cernitur, cui in uoce formanda primæ partes tribuuntur, nomine *λάρυγξ* (quasi lingulam dicas) & *λάρυγξ* *λαρυγίς*, id est lingua laringis. Iungitur postremæ linguæ parti minor lingua, quæ *ἐπιλάρυγξ*, & ligula nominata est, posita inter principia gulæ & laringis, cartilaginea

A laginea, prætenuis, forma hederæ folio perfimili: cuius pars latior ad ipsam linguâ: mucro uero ad interiores oris partes uergit, uidelicet apta quæ per uices arteriæ foramentum quod ad os spectat, operiat. respirantibus enim erecta est, at deglutientibus prona. Arteria ipsa multis cartilaginibus con-  
 B stat: & altero sui extremo cum lingua ima coniungitur: altero ad pulmonē descendit: tum in utrâque finditur pulmonis partem. esse nanque bipartitus pulmo omnium cōsuevit. Hinc arteriæ partes illæ binæ in multos ueluti ramos sparguntur, *σύνφυς* uocant. Gula ab ore & ipsa dependet, continua tum spinæ tum asperæ arteriæ, nexu fibrarum, & per septum transuersum descendens, in os uentriculi finit, neruo carnēq; cōstans: & pariter distendi in longum latumq; habilis. Quæ intra pectus continētur omnia, *σπλάγξ* dicuntur. Spatium uero ipsum pectoris totum, *κοιλία* dicitur.

De uisceribus & septo transuerso.

Cap. XV.

S Equitur ut de uisceribus doceamus. Naturâ habent omnia uiscera, carneam quidem, sed sibi consimilem, cæteris dissimilē. Sunt enim carnosissimi generis species plures: primo quidem quæ proprie caro appellatur, deinde cuiusque uiscerum propria substantia est. Eam Erasistratus parēchyma uocauit: quandoquidem posita sit ad meatus uenarum, & intercapedines: proinde quasi sex aquæ profluentis, ita sanguinis per uenas fluentis, uiscera illa, ueluti *πρωτόμακτα*, id est profusiones consistunt. Sunt autem uiscerum, quædam supra septum transuersum, quædam infra. Cor situm in pectore  
 C est opertum in uolucro pingui & corpulento, quâ uenæ maiori annectitur, & arteriæ quæ aorta nominatur. & cæteris quidem animalibus in medio pectore situm est, homini tantum paulo uergit ad leuam. Extremum eius (*πυθμὴ* Græci uocāt) turbinatur in mucronem curuosum & firmissimum, & omnino parti corporis priori commissum est: at parti sui ampliore superiora corporis spectat, præterquam in piscibus. solis enim iis cordis mucro ad caput spectat. Cordis pars illa amplior qua membranæ connectitur, *καρδιὰ πνευμάτις* uocatur. Neruulos quosdam suis in cauis continet: sed cor sine osse est omnium quæ nos nouerimus, præterquam maximorū quorundam animalium: ossi tamen quiddā simile omnibus inest: cuius substantia nō in omnibus æque dura est. in minutis enim animalibus, ad cartilaginis  
 D duritiem prope accedit. quod enim in iis nascitur, non omnino cartilaginis, sed corporis ex neruo & cartilagine conflati naturam habet. In maiusculis perfecta cartilago est: in iis uero quæ grandiora sunt, cartilago ossea est: at in maximis animalibus, os cartilagineum potius dicendum est. Quo nāque uastiore corpore fuerit animalis genus, eo propius ad ossis duritiem accedit cartilago illa. In corde, uentriculi siue sinus fere bini inueniuntur, unus in latere cordis dextro, in sinistro alter. Non tamen idem in omnibus est uentriculorum numerus. quibus enim pulmo deest, hæc neq; dextrum cordis uentriculum habent. Inter utrunque cordis uentriculum, medium quoddam est quasi septum. Auriculas item habet cor binas, uentriculus adhaerentes, quæ concauæ sunt, & substantia constant cutanea, au-

riculas eas dixere ueteres, ob similitudinem quandam earum quæ in capite E sunt: utrinque enim cordi, sicuti aures capiti adhærent. Sed de corde hæc nus: reliqua etiam uiscerum iam considerata sunt. Pulmo spirandi officina est, attrahens ac reddens animam: idcirco spongiosus ac fistulis inanibus cauus. Bifidus consuevit esse omnium pulmo, quamquam partium distinctio in omnibus non æque cernitur. Est enim hominis pulmo simplicior, atque à singulari arteria partes in utrumque latus duæ dependet: uenæ quoque maiori, atque arteriæ, quæ aorta ab Aristotele uocatur, pulmo connectitur. Sub pulmone septum pectoris est, quæ præcordia & septum transversum appellant: determinat enim hoc à reliquis pulmonem & cor. Costis hoc & hypochondriis & spinæ, parte sui carnosiore, ualidioræque annexum est: parte uero media tenue est, membranæque exilitate contextum. F

Iecur sub septo positum, à dextro latere est: Lien à sinistro in omnibus, quæ membra ista disposita habent per naturam non prodigiose. Iam enim legitimum illum locum in nonnullis quadrupedum, lienem cum iecinore permixtum uisum est. Iecinoris pars, quæ ad septum transversum & peritonæum est, conuexa uel gibba: quæ autem inferne uentriculum tangit, caua uocatur. In iis animalibus quæ lienem habere necesse est, lien ipse quasi iecur adulteratum esse uidetur: adeo ut Plato lienem iecinoris *ἐκμαγών*, id est effigiem dixerit. Quæ autem lienem non habere necesse est, sed exiguus admodum lien ueluti notæ gratia habetur, iis iecur bipartitum aperte est: & pars altera ad dextram, altera (quæ minor est) ad sinistram situm habere solet. Et in nonnullis adeo diuisum patet, ut locis quibusdam lepores bina G iecinora habere uideantur: quemadmodum in genere piscium, tum alij, tum cartilaginei iecur duplicatum habere uidentur. Fibras habet iecur, *λέβοι*, *ἰκταρίαι* græce uocantur. est enim iecur, aliis multifidum, aliis simplicius.

Iecur magna ex parte maximoque animalium numero, felle caret: uerum in nonnullis id habere in uesica sibi adnexum cernitur. Quæ enim sanguinem habent animalium, maior pars fel habet, aut iecori aut intestinis annexum: ut piscium plurimi, necnon serpentum maxima pars. Renes post hæc iuxta spinam ipsam ipsam adhærent in illis: ex uisceribus ij maxime pinguescunt: & quamuis uehementer fuerint pingues, mediis tamen fere aliquid deest. Dexter in omnibus quibus sunt renes animalibus, superiorem obtinet locum, (nonnunquam iecoris fibræ aliquā attingens) minusque pingui obducitur, & squalidior est, quod uel in omnibus æque liquidò manifestatur. Porro à spinæ uasis, arteria scilicet & uena magna, inferuntur in eos haud exiguæ magnitudinis uasæ: aliis utrinque singula, aliis quibusdā bina. Figura iis sima fere est, qua parte arteria & uena ipsis inferuntur, & qua se mutuo respiciunt: opposita uero parte, gibba. In omnium fere renibus sinus inest concauus, (quibusdā amplior, ut in maioribus animalibus, quibusdā uero arctior, ut minoribus) corpore quodam membranæo circumdatus. Ex hoc utrinque sinu haud procul à locis quibus inferuntur, quæ diximus uasæ, meatus duo insignes concaui atque prælongi, ad uescicam feruntur singuli ex singulis renibus, *ὑπέρητες* à Græcis dicti. Et de uisceribus

In illis, *ἔξ* τῆς  
*λατῶνας*.

*ὑπέρητες*, ἢ  
*ἐπὶ τῶν*.

A fceribus quidem, hoc est de pulmone, corde, iecore, liene & renibus, dictum iam est.

B. Viscera, *σπλάγχνα*. Intercapedines, *σπλάγχνος*, uetus Aristotelis interpres uacuitates dixit. C. Cor, *καρδίη*. D. Ventriculi siue sinus, *κελίαι*, *ὡς κελύπτει*, tres in maiori animalium corde esse uentriculos sentit Aristoteles: uerum tertiam illam cauernam partem esse dextri uentriculi asserit Galenus. Auriculæ, *ὠτὰ*. E. Pulmo, *πνεύμων*, *ὡς πλάθει*. Septum pectoris, *φρένας*, *ὡς φρεγγίς*, præcordia appellantur, quia cordi prætenduntur: alias præcordia uocamus uno nomine, exta in homine. F. Iecur, *ἥπαρ*. Lien, *σπλήν*. Conuexa, *κυρτώει*. Caua, *σκάλα*. G. Fel, *χολή*: nomen hoc commune est, & humori ipsi, & uesiculæ humorem continenti. Renes, *νεφροί*.

De uentris partibus interioribus.

Cap. XVI.

**B** VEntriculum appellamus eam partem, in quam cibus deuoratur: uentriculi os sub media pectoris cartilagine, quæ *ἐνφρενίδος* dicitur: reliqua pars infra septo transuerso sita est. fundum habet uentriculus amplior, & in homine certe ad dextram potius inclinatum: pars uero superior, quæ ad gulam tendit, arctior est. In aliis fere animalibus, in anteriora ad hypochondrium tendit uentriculus. huius ostium inferius, quo cibo exitus patet, in intestinum, ad dextram prope iecur situm est: *πύλαρον* hanc partem Græci uocant, quoniam portæ modo in inferiores partes ea quæ excreturi sumus, emittit. Pyloron intestina excipiunt, flexuosis orbibus conuoluta: quorum natura, quatenus intestina sunt, eadem in omnibus animalibus est: magnitudine autem, & anfractu (quas *ἐλκυστας* dicunt) numero, discrimen habetur. In his ab egressu ipso ex pyloro, est quod *ἡφύστος δώδεκα δακτύλος* ab Herophilo (quod duodecim digitorum longitudinē habeat) dictum est. Hoc principium est intestini, prius quàm in anfractus orbésq; conuoluatur. Quod autem sequitur flexuosis orbibus conuolutum, nō ita tamen implicitum, ieiunum intestinum uocatur: cui tale uocabulum est, quia nunquā quod accipit, continet, sed protinus in inferiores partes transmittit. Inde tenuius intestinum est, in sinus uehementē implicitum: orbis uero eius in dexteriores partem conuersi, & è regione dexteroris coxæ finiti, superiores tamen partes magis complent. Deinde id intestinum cum crassiore altero transuerso cōmittitur, quod à dextra parte incipiens, in sinisteriore peruium est, in dexteriores non est: ideoq; cæcum nominatur, tumidum quoddam existēs. Ad id quod peruium est, *ὠλον* appellatum, late fusum atque sinuatum, ab utraque parte huc atque illuc uolutum, magis tamen sinisteriores inferioresq; partes tenens, contingit iecur, atque uentriculum: deinde cum quibusdam membranulis à sinistro rene uenientibus iungitur: atque hinc dextra recuruatum, ad exitum usque excrementi rectum pertēdit: ideoq; id ibi rectum intestinum nominatur: breue id, corpulentumq; huius finis est musculus, *σφιγκτηρ* Græci dicunt: quo cohibetur alui excrementa, ne inuitis nobis effluant. Contegit uero uniuersa hæc omētum, quod non nisi membrana præpinguis est, Græci *ἐμπύλαρον* dicūt. oritur id de medio uentre, statimq; à septo transuerso dependet. Quod autem late uocant, membrana & ipsum est duplex pertēdēs continua de intesti-



nis ipsius ad uenam usque maiorem, quæ in iccinoris porta est, atque illi adiunctam arteriam, plena uenarum multarum, quibus alimentum iam probe in uentriculo concoctum perfertur ad iccoris portas, Græci πύλας uocant. Venis ipsius atque arteriis quæ prope iccoris portam in ramos finduntur, substernitur caro quædam glandulosa πύμρις aut καλάριας à Græcis nominata. Vesica ultimo uentris loco, sub ossibus latis, quæ ilium ossa dicuntur, posita est, meatibus annexa illis, qui ὑντῆρες dicti sunt, porrectis à renibus ad uescicam: & ipsa quidem neruosa, tenuis atque exanguis est, collum uero habet carnosum. Genitale huic ceruici uescicæ adnectitur, foramine uno foras directo (quod ὑρῆρας nominari diximus) peruium, sed quod hoc loco bifariam diuisum sit: quorum foraminum alterum ad testes, alterum ad uescicam tendit. Testes ex genitali maribus pendent. Atque hæc eodem modo uel in sexu F  
femineo omnia natura cōformauit, atque disposuit: nulla enim parte interiore sexus inter se differunt, nisi utero: cuius forma qualisnam sit, ex cōsectionum descriptione petendum expectandumque est: situs eius super intestina, & infra uescicam est. Ostium autem uteri, quasi ceruix carnosam admodum, cartilagineamque, parti animantium plurimæ auctissimæque tributum est, diciturque μήτρα, id est matrix. Pars uero interior, siue spatium internum, loci & uterus appellatur in homine: hoc in reliquis animalibus uulua. Prominent utrinque ad superiores eius partes, exortus, alij κῆραιες dicunt, alij πλάταιες, quasi cornicula dixeris, & flagella cirrōsue. Sed de uteris generum omnium differendum postea est: neque enim similes dati omnibus sunt, nec forma simili constituti. Partes animalium dissimilares interiores exterioribus G  
refque hunc in modum haberi cognitum est.

B Ventriculus, κειλία, ἢ γαστήρ, ἢ ἄνω κειλία: aluum dixit Cic. lib. 2. de natura deorum. Intestina, ὑντῆρες, ἢ λεικῆς. de his ita prodit Plinius. Ab hoc uentriculo lactes in homine & oue per quas labitur: eibus: in cæteris illæ à quibus capaciora intestina, hominique flexuosissimis orbibus ad aluum. De intestinis lege Pollucē lib. 2. C Ieiunum inflatum, ἰσῆς. Tenuius intestinum, λεπτὸν ὑντῆρον, ἢ ἀπλοῦν. Cæcum, τυφλόν. D uulua, ἢ κέτω κειλία, τυκίρη Homero: Celsus etiam intestinum plenius uocat, & aluum: & Plinius quoque aluum: & Gellius aluum colon uocari tradit. Rectum intestinum, ἐπίθυσιον, ἢ ὀρθός. 1 φουγντήρι, σφυγντήρι, ἢ δεκντήρι, ἢ σφάρα, ἢ πτελός. Lactes, μασσαίον, ἢ μασσῆρον. hoc Cicero, ni fallor, medium intestinum uocauit. lib. 2. de nat. deorum. Lactes Plinio aliud significat, ut modo dictum est. Vesica, κύστις. Collum uescicæ, καυλός, ἢ κύστις ἢ κήληος, uescicæ ceruix. Ostium uteri, στήμας, ἢ ὑστῆρας. μήτρα, καὶ ὁ καυλός, καὶ στήμας ἢ ὑστῆρας, id est ceruix, & ostium uteri, καὶ χυλὸς ἢ ἰσῆρος. Locum & uterus, ὑστῆρα καὶ ἄλλοις, καὶ γυναικῶν κέλητος. H

De partibus similaribus.

Cap. XVII.

Similium autem alia molles & humide sunt, alia sicce & solide. Molles inquam uel omnino, uel quandiu secundum naturam manent, id est in sede & cōcoctione naturali, ut sanguis, sanies, adipis, sebum, medulla, semine genitale, fel, lac, caro, & quæ iis proportionem respondent. Non enim omnia animalia partes has obtinent: sed sunt quæ ad proportionem nonnullarum ex his consistunt. item excrementa omnia similia uidetur: pituitam dico & bilem, tum flauam, tum etiam atram, & sedimenta alui atque uescicæ. Siccas ac solidas



A ac solidas intelligi uolo:neruum, cutem, membranam, uenam, pilum, os: item & quod uice fungitur ossis: ut spinam, *ἄγκυραν* Græci dicunt, & cartilaginem, unguem, cornu: item quæ iis proportionē respondent.

De sanguine, uenis atque arteriis: & quæ iis proportionē respondent. Cap. XVIII.

**E** Similarium numero humorem quēdam genus unumquodq; animalium continet, quo si aut per uim, aut per naturam ipsam priuetur, in perniciem agatur necesse est: habet etiam diuersum quoddā, id scilicet in quo humor ille cōtineatur. Sunt hæc in aliis sanguis & uena: aliis quod iis proportionē respondeat, ut fibra & sanies. Hinc sane animalia alia *αἷμα* dicuntur, id est sanguine prædita & sanguinea, alia *ἀναιμα*, id est exanguia. Et sanguineis quidem omnibus, similarium sanguis potissimum communis est: nec minus communis ea pars est, qua sanguis continetur, quæ uena dicitur: exanguiibus autem, proportionē illis respondēt, sanies & fibra. Cū itaque natura sanguineæ uenarumq; corporis principiū esse uideatur, primum de iis differendum est. Sedenim natura uenarum ita se habet. Duæ intra thoracem uenæ continentur: uenarum enim nomine etiam uasa illa pulsantia, quas modo arterias uocamus, à uetustissimis, tum medicis, tum philosophis appellari uideo: altera earū maior, quàm uenam cauam ob insignem eius cauitatem uocant. Hippocrates *ἡ νηρὶς*, id est iecorariā dixit. Altera minor quàm aortam uocant nōnulli, arteriam medici posteriores: **C** eodem etiam nomine uasa singula, quæ pulsū habeant nuncupantes. Sūt etenim arteriæ spirituum semitæ, quarum certe pulsū in cacumine membrorum euident est. Vtraque ueluti caudex est, seu truncus omnium quæ per totum corpus sparguntur uasorum: uenarum altera, quam scilicet cauam uocari diximus: altera uero, quæ & arteria dicta est, arteriarum. Neque uenæ fere deest arteria: & quacunq; corporis parte arteriam uideris, eadē & uena conspicietur, paucis quibusdam exceptis uenis. Quanquam qui ab arteria oriuntur rami, minores multo sunt, quàm qui à uena maiori profisciscuntur. Sed qui diligētius nosse uelit, quemadmodum uenæ arteriæque inter se habeant, spectare id tum per dissectionem, tum etiam per commentationem, hoc est historiā animalium debet. In iis uasis qui continentur humor, qualiscunq; is sit, una sanguinis appellatione censetur. Sanguis si integer sit, rubet & dulcis saporis est: salsum nanque sanguinem, sicuti & salsum pituitam, morbosos humores esse perspicuum est. Verū qui in arteriis reperitur, tenuior simul & calidior, magisq; flauus est, quàm qui in uenis atque purior: ut qui spiritui animali nutrimentum præstet. Et qui in sinistro cordis uentriculo reperitur, fere tenuior est, atq; magis flauus, quàm qui in dextro: quanquam nonnūquam etiam crassior atque atrior, uerum semper calidior. Qui uero in dextro sinu est, eandē speciem habet cum eo; qui in iecore, & in omnibus totius corporis uenis reperitur. Solus omnium humorum sparsus per totum corpus animalium sanguis est: effluitq; sanguis quancunq; partem incideris carnis uiuæ atque incorruptæ. Venæq;

ipsæ in prætenues postremo fibras subter totam cutē dispersæ, adeo in angustam subtilitatem tenuantur, ut penetrare sanguis nō possit, aliūduē quā exilis humor ab illo, qui cacuminibus innumeris sudor appellatur. Sanguis in primis necessarius communisq; omnibus animalibus sanguineus est. est enim his ultimum alimentum. Atque deficit sanguis quoties cibus nō ingeritur: quoties uero ingeritur, augetur: et si alimenta bona assumuntur, sanguis integer est, si praua uitiosus. Liquidus & calidus semper est, quando in animalis corpore continetur: at ubi effluerit, cōcrefcit fere omniū sanguis, nisi fibræ, quibus refertus est, eximantur: si uero fibras detraxeris, sanguis non cogetur. Sanguis incoctus sanies est: incoctus autem, aut quia concoctus nondū est, aut quia in serum degenerauerit. Fit enim per concoctionem ex sanie sanguis. F

A Sanguis, αἷμα, uena, φλέβα: fibræ, νῆς: sanies, ἡμέρη. B Hippocrates in libro ἐπιδημιῶν 2. ait, Cum nascitur infans cui uena quæ in cubito est, pulsauerit, furiosus ille & iracundus euadet: cui sensim mora fuerit, lētus. Plato etiā in Timæo: cor uero simul & uenarum fontem, & eius sanguinis, qui per omne corpus cū impetu fertur, &c. Celsus quoque in procemio, Neque quid uenas moueat, inquit, sed quid quæque genera motus significant, &c. Plinius lib. 32. Nullo uino æque uenæ excitantur. & aliis item plerisque locis. Vitruuius lib. 2. rithmos uenarū appellauit. C. Arteria. Quemadmodū à maximis hisce caudicibus exeunt radices atque rami, id est uenæ arteriarūq; minores passi per uniuersum sparguntur corpus, accurate docuit Galenus, cum in aliis, tum uero breuissime simul ac apertissime in eo libro, quem de Dissectione uenarū & artèriarum inscripsit. D. Sanguis, αἷμα. E. Sudor, ἰσφύς. Sanies, ἡμέρη, significat etiā id quod in exanguibus uicem sanguinis præstat: sicuti & in quibusdā hīs, id est uirus. G

De neruis, ligamentis, & tendinibus.

Cap. XIX.

Alias octo & quinquaginta.

**N**eruum mox ordinē persequemur. His ceu canalibus quibusdā trās mittitur sensus, & motus à cerebro in uniuersas animalis partes. Aut enim à cerebro manifeste oriuntur, aut per mediā dorsi medullam transmittuntur: ex qua prodeunt circiter sexaginta. Nullus à cerebro aut spinali medulla producit̃ neruus, ἄννῆς, id est non coniugatus, sed semper alter ad dextram, ad sinistram alter: eadē prorsus utrinque magnitudine, situm obtinent. Nerui omnes sua substātia cerebro sunt duriores: uerum qui sensum oculis præstant, densiores omnino conspiciuntur, haud magnopere tamen duriores: atque hi omnium soli sensibiles meatus in se habere cernuntur. Sunt nerui alij molles, alij duriores: molles nerui, sensus sunt instrumenta, quemadmodum duri, motionis. Ex parte cerebri posteriore mollis neruus penitus nullus producit̃: ex anteriore autem duros quosdam neruos oriri fuit necesse: in quibus, opinor, sunt ij quibus oculi mouentur. Quicunque uero neruorum molliores sunt, ij nihil à medulla spinali differre uidebuntur, quod scilicet ad mollitiem attinet. Nerui non solidantur incisi: mirumq; uulneratis summus dolor, præfectis nullus. E neruorum genere censentur ligamenta & tendines: ligamentum propriè & non cōm muniter appellatum corpus est neruosum, album, exangue, solidum, sine sensu, similiterque neruo concūitatis expers: ex ossē quidem omnino ortum H

A tum habens: insertum autem in os aut musculum: ut scilicet os ossi, aut musculum ossi coniungat, & tanquam uinculū contineat. Musculorum *αἰσθητικὰς* tendines nominantur, in quos scilicet musculi desinunt: mista autē eorū natura est, & media inter ligamentū & neruum. Horū quidam adeo efficiuntur tenues, ut mēbrane potius uideantur. Facile autē dignoscuntur: nā si hos clara luce penitus inspicias, fibras quasdā intercurrētes ostendēt.

G Neruus, *νεῦρον*. horum sectionem in uniuersa corporis membra ostendit accuratissime Galenus lib. de usu partium, & de neruorum dissectione. Notat Aristoteles ē cerebro exoriri meatus duos neruosos ualidos, qui per ipsas oculorum sedes, pertendentes in superiores *χειρὶ δὲ νῆτας* finiunt: cum alioqui sentiat neruorū originem à corde, non à cerebro duci. H Ligamentum, *συνέσμις*: hęc uel neruorum nomine uocant Aristoteles & Plinius. Sunt & alij ligamentorum usus, ut uidere est apud Galenum libro Anatomices primo. A Tendines, *τῶν περὶ τὸ ἄκρον ὑπερβάσεις*, tendones.

De fibris.

Cap. XX.

Fibræ inter neruum & uenam suam habent naturam: & nonnullæ hu- *Fibræ, ὕψος.*  
morem, sanicem appellatum continent. tendunt à neruis ad uenas, ac inde ad neruos. In corde item fibræ sunt, quales in musculis cernimus, quibus caro circumhæret: cæterum non est idem fibrarum genus, sed quæ in musculis habentur, neruorum ac ligamentorū sunt particula. Cordis propria quædam est fibrarum species, æque scilicet ac uenarum tunica: atque arteriarum: itēque intestinorum, uentriculi, uteri, & uesicæ utriusque: licet enim in iis membris, propriam quandam uidere carnem suis ipsorum C fibris circunnascentem. Aliud item genus fibrarum est, quod consistere in sanguine solet, quancquam non cuiusque animalis: spissari autem sanguis non potest, si id genus fibrarum detrahatur, ut dictum est: spissatur uero si non detrahatur. Genus id ergo fibrarum, tametsi maiore ex parte in sanguine animalium inest, tamen cerui, procis & bubali, & aliorum quorundam sanguini deest: quocirca eorum sanguis nō similiter atque cæterorum concreuit, sed ceruorum perinde ut leporū solet spissari: uidelicet non coitu firmiore, ut cæterorū, sed fluido, quale lac est quod iniecto coagulo coiuert. Sanguis, uena, arteria, neruus, ligamentū, rēdo & fibra, ita se habēt.

De ossibus.

Cap. XXI.

D Ossa omnium animalis partium sunt durissima, maximēq; terrestria. *Ossa, ὀστᾶ.*  
Hęc tanquam fundamentum quoddam ad uniuersi corporis molem sustentandam subiiciuntur: iis nanque membra omnia firmantur: magnitudinis quoque animalium meta atque terminus iis describitur. Ossium quædam grandia & ampliter concaua sunt ac medullosa: quædam minora, solida, ac sine medulla. In iis quæ imbecilliora sunt animalibus, ossa sunt laxiora ac caua magis: fortioribus uero densiora ac conferta magis: ac proinde canis, lūpus, panthera, reliquæque omnia, quę musculis ac neruis sunt robustioribus, densiorem multo ac duriorem habēt ossium compaginem, quàm oues, capræ, & id genus alia: quin & leo qui omnium est ferocissimus, ossa in cæteris quidem membris omnia habet medullæ expertia: in fœmoribus uero & si quis alius id genus artūs, admodum exiguum ac te-

nuem . hominis uero ossa, quæ in ipso uel maxima sunt, caua & laxa inueniuntur : ut qui leone musculos habeat longe imbecilliores. Atque hæc quidem in omni animalium genere adeo seruat natura, ut nō modo gressile nullum, sed ne uolucres quidem aut aquatile aliter habeat. quandoquidem aquilis defissima ac durissima sunt ossa: deinceps & accipitrum ferocioribus, circo, palumbario & similibus: gallinaceo uero, anatibus atque anseribus, laxa simul ac caua, leuisq; ossium est substantia. Ossa uni tanquā principio sunt connexa, & omnia inter se aptata, unam continuāt seriem, modo uenarum: nec est ullum os, (quod effatu dignum sit) quod seorsum ipsum per se maneat. Initiū uero omnibus spina est: quæ compacta ex uertebreis, à capite ad coxas porrigitur. Extat huic continuum capitis os rarum & rotūdum, summis superimpositum uertebreis: quod calua dicitur & caluaria, ex interiore parte concava, extrinsecus gibba, utrinque leuis: cuius pars prior sinciput est, tenuissimum, infirmissimumq; omnium capitis ossium, nouissimæq; consistere solitum. Omnium enim ossium corporis, ultimum id concrefcit & induratur, in homine duntaxat: cum tamen in cæteris animalibus discrimen ossium nullum sit, sed omnia perfecta iam inde à natiuitate proueniant. Caluaria ipsa nō simili modo in quoquo genere animalium habetur: aliis enim osse continuo calua perficitur, *μορτα* dicunt, ut canis: aliis compacto, ut homini. sex enim numerantur caluariæ ossa, excepto etiam illo quod à cunei similitudine *σπλωον* dicitur. Sunt autē hæc ab exterioribus partibus dura, ab interioribus, quibus inter se connectuntur, mollia. Caluariæ pars ferrata, futura: nomine significatur. Inueniuntur autem futurae in plerisque quinque: prima ad sinciput, *πρῶτη* dicta: altera per uerticem, *ἐκτομή*: tertia per occipitium, *λειτουργία*: quæ magna ex parte coniunguntur. Duæ quas *κροτάλια* nomināt, in utroque temporum singulæ: hæc super aures, tempora à superiore capitis parte discernunt. quæ *λαμβδωδής* dicitur, ad inferiora per uerticem tendens, occipitium à summo capite diducit. *ἐκτομή* uero ab eodem uertice per medium caput ad frontem procedit: eaq; modo sub imo capillo desinit, modo frontem ipsam secans, inter supercilia finitur. Os deinde est, cuius posterior pars cum caluariæ osse, quod iuxta aurem habetur, anterior cum parte supercilij extrema ad paruum oculi angulum coniungitur: iugale appellari potest, Græci *ὀφθαλμὸς* dicunt. Inter caluariam, & ea quæ superiorē maxillam constituunt, os est quod à cunei similitudine *σπλωον* uocatur, & ueluti cuneus inferitur . hoc si inter superioris maxillæ ossa numerabimus, quindecim numero erunt: uel ut aliis placet, octo: inter quæ cēsentur, & genarum & narium ossa. Duodecim faciei ossa numerant alij. Maxillæ inferioris nō est os simplex: in summo nanque menti acumine, si coquitur, laxatur. Maxillis dentium genus inhæret, os partim cauum, partim solidū & adeo firmum, ut solum inter ossa ferri aciem respuat: neque eandem penitus naturam quam cætera ossa habet. Cætera nanq; in prima corporis constitutione omnia gignuntur, neque est quod post oriatur: at dentes post enascuntur. quo fit, ut cum deciderint, denuo possint oriri: soli q; dentes inter ossa,

*Septem numerantur in libro, qui à παλαιῶν ἱερωτέρῳ ἔστιν ἱεροῦ: πολλὰ μὲν γὰρ ἐν πρῶτῃ καλουμένην ἐκτομήν.*

- A tota uita crescunt. Dentes omnes in suorum ossium concavis infiguntur. Et ossa ipsa quibus continentur dentes, *φάρυγες*: quæ subeunt foramina, *ὀστέα* dicuntur. & capitis ossa ita se habent. Spina longitudinē & rectitudinem continet animalium: hæc ex uertebis quatuor & uiginti constat (excepto osse sacro) in homine scilicet: nā in reliquis, ex pluribus compacta est. Harū tota compago in cervicis uertebas, & dorsi, & lumborū, & os sacrum (quod & os latum uocatur à nonnullis) diuiditur. Dorsi eam partem intelligimus, cui cum pectore est æqualis lōgītudo: quod subest reliquum, lumbi appellantur: quorum pars ultima sacro osse finitur, in homine inquam. homo enim cauda uacat. In collo septē uertebrae sunt: duodecim ad costas, ad lūbos quinque. Earum quæ in collo sunt, supremae uertebrae in utroque eius
- B latere sinus inest, in quos ingredi conspiciuntur processus ossis caluæ sub inferiore cerebelli parte egressi, quæ *κεράται* dicuntur. Ex secunda colli uertebra sursum uersus, in primæ uertebrae sinus quosdam (quos ab oculorū sinus similitudine *χλωροδόντες* appellant) prioribus minores, processus duo inferuntur, qui à figura turbinata *πυλωδοδόντες* dicuntur: Hippocrates à figuræ similitudine *ὀδοντοδόντες* uocauit: & totam quoque uertebra *ὀδόντα*, id est dentem inde nominauit. Vltima uero colli uertebra *ἄτρας* uocatur. Sub atlante proxima, & prima dorsi uertebra *λοφία* dicitur: & quæ illi subest, *μικρολοφία*: quæ deinde sequuntur, *πυλωδοδόντα*. Duodecima uero dorsi uertebra, *ἡσθεσίς*. E lumborum uertebis, prima *ησθεσίς* dicitur: postrema *ἀσπυλῆτις*. Os sacrum ex tribus particulis tanquam ex propriis quibusdam uertebis
- C compactum est: quarum extremæ os aliud quartum quod coccx nominatur, additum est: cuius pars quæ podici proxima inflectitur, *κερυνσὴ* uocatur. Vertebrae omnes breues teretesq; sunt: processus tamen quosdā exigunt, *ἀκροφύτοις* Græci uocant. Ex mediis enim omnium (præter primā) partibus postremis, exeunt ossi quidam processus: qui tanquam uallū spinam ab ea parte defendunt, *ἐκασθῆ* Græcis nomen est. Sunt & ab utroque uertebrae latere proecessus: & à superiore etiam parte atq; inferiore omnibus, exceptis tribus summis. Omnium spinæ ossium, infimum (quod os sacrum dicitur) maximum est, quod ueluti fundamentum quoddam omnes sustinet uertebas. Secundum uero locū in magnitudine occupat, quæ illi proxima uertebra est: quæ inter eius quæ in lūbis sunt, quinta numeratur. Re-
- D liquæ uero, quod longius ab infima recedunt, eodē etiā tere magnitudine deficiunt. Primæ itaque cervicis uertebrae, minimæ sunt omnium, & ob foraminis amplitudinē tenues: uertebrae nanq; omnes foramine medio sibi iunguntur, quod *σπυλὼ* dicitur, quo spinæ medulla à cerebro descendit. Rursus à ceruice duo lata ossa utrinque ad scapulas tēdunt: nostri scoptula, *ὠμωπλάταις* Græci nominant: ea summis uerticibus, qui ad scapulas sunt, sinuata, ab iis triangula, paulatimq; lateſcentia ad spinam tendunt. Hæc parte sui posteriore cartilaginosa sunt, sed in imo maxime: ibiq; ualidis musculis netuisq; conſtricta sunt, nulliq; nisi in summo, ossi cohærescunt. Inæqualia undiq; sunt hæc ossa, atq; omni ex parte dissimilia: gibba quidē exteriore ex parte, intrinsecus sima: & summa in parte crassa, in imo uero tenuia sunt:

*Spina, ὀστέα γίνεσθαι. Vertebrae αὐτὴν ὀστέα, ἢ ἀνέτοι.*

*Lūbi, ὀσφύς.*

*Prima dorsi uertebra, λοφία, ἡλεφασίς. Os sacrum, ὀδόντα ἐστίν. Coccx, ἢ αὐτὴν ἀνέτοι, ἢ ὀφείθ πύγιος.*

*Σπυλὼ, ἢ ὀδὸν ἀστέρας, ἢ πλάγιος.*

*Humeri artic.  
ἡ ἁρτὸς ὤμων  
ἄρ. ὤμων,*

paulatimque pleniora euadunt, donec ad eam partem peruenerint, quam E  
scoptuli ceruicem nominant. Is in extremo in acetabulum definēs (ut mo-  
do diximus) eius ossis caput in se excipit, qui humerus dicitur, efficitque  
humeri articulum. In utriusque scoptulorum parte gibba, *ῥέχερ*, id est spi-  
na huic parti propria addita à natura est: quæ paulatim superiore sui parte,  
qua scoptulorū ceruicē attingit, altius sese attollens, ossi alligatur, quod iu-  
gulū dicitur: idq; efficit hic ossium nexus, quod *ἀγκύριον* à Græcis uocatur:  
quod simul esset & humeri articulo operimentū, ac propugnaculū: & pro-  
hiberet, ne humeri ossis caput sursum uersus, articulo excederet. Est & in  
scoptulo utroq; in inferiore capitis eius parte exiguus acutūsq; processus:  
qui cum anchoræ aut coruini rostri similitudinē referat, *ἀγκυροειδής* à nōnul-  
lis, ab aliis *κερχυροειδής* nuncupatur: quandoquidem extrema eius pars uti cor- F  
uinum rostrum extenditur. Hæc ossa in hominibus quidem longius distāt  
à pectoris ossibus, & huic parti quasi innatant. Quin & humerorum arti-  
culi à reliquis pectoris ossibus altius prominent: at in quadrupedibus, sco-  
ptula reliquis pectoris ossibus fere coniuncta sunt: ac proinde homini soli  
sunt humeri, cæteris armi. Lato huic scapularum ossi, quā definit pars illa,  
quam *ῥέχερ*, id est spinam uocauimus, adnectitur iugulum, non inter duris-  
sima ossa numerandum: (sistulosum enim est) altero eius capite in eo quod  
posui, altero in exiguo sinu ossis pectoralis (quod *σθῆθος* dicitur) insidet. Pars  
eius inferior qua pectoris ossi alligatur, crassior cæteris rotundiorque est:  
quæ huic succedit, longe gracilior: procedens uero, quo propius lato scapu-  
larum ossi sit, eo plenius latiūsq; & in exteriora curuatum est. Costæ ab G  
utroque latere sunt duodenæ: rarissime nanque decimatertia costa in ho-  
mine uisitur, atque hoc rarius undecim tantum. Hæ primis partibus rotun-  
dæ & leniter quasi capitulatæ, uertebrarum trāsuerlis processibus, ibi quo-  
que paulum insinuatīs inhærent. Inde pateſcunt, & in exteriorem partem  
recurrente, paulatim in cartilaginem degenerant: eaque parte rursus in in-  
teriora leniter flexæ, committuntur: septem quidem cū ossē pectoris, quod  
*σθῆθος* dicitur: octaua uero cum cartilaginis radice, quæ *τεφελὸν* uocatur. re-  
liquæ autem quatuor in pectoris latera ad septum trāsuerſum definunt,  
quæ cæteris etiam breuiiores sunt. Quinque istæ postrema: nothæ appel-  
lantur, suntque cartilagineæ omnes: atque adeo ipsarum finis, exquisita car-  
tilago est. Costis non una est, simplexque figura. nam in prioribus illis H  
quicquid cum pectoris ossē committitur: non os est, sed in cartilaginé de-  
generat: & suprema costa, ea parte conspicitur maxima, qua spinæ adnecti-  
tur: reliquæ in medio, & ubi ad pectoris latus accesserint, latiores sunt, quæ  
earum partes *πλάτια* dicuntur: angustiores autem, qua spinæ coniungūtur,  
& *κωτια* uocantur. Pectoris os, *σθῆθος* à Græcis nominatum, à iugulo statim  
incipit, & per medium pectoris protensum ad præcordia ipsa molli carti-  
lagine terminatur: (quæ quidem cartilago triangula est, & à nonnullis *τε-  
φελὸν* appellatur.) non unum os hoc est, sed ex pluribus ossibus constat: sunt  
autem numero septem, sicuti costæ utrinque septenæ, quæ cum ipsis alli-  
gantur. Brachij ossa sunt, primum humerus: hic extremis utrinque capi-  
tibus



**A** tibus tumidus: mollis, sine medulla, cartilaginofus: medius, teres, durus, medullofus, & in priorem, & anteriorem partem leniter gibbus. maximū omnium hoc os est, ſcēmore excepto. Summa eius pars grandiuſculum habet caput, & in eo tuberculum quoddam adnatum rotundum, quod ſcapularum oſſi inferitur: pars autem inferior in tubercula duo deſinit in æqualia, inter quæ ſinus eſt: circa hunc cubitus mouetur. conſtat hic ex oſſibus duobus. Radius quē *ῥαδιὸς* appellant, ſuperior minorque, rotundo & leniter cauo capite, exiguum humeri tuberculum recipit. Cubitus alterum os dicitur, eodem ſcilicet quo totum nomine, inferior maiorque. In huius ſine extremo, ubi ſcilicet cum humeri oſſe committitur, duo inueniuntur tubercula: alterum maius, & in parte cubiti poſteriore inferioreque: alterū minus, & in parte anteriore ſuperioreque: & communi quidem nomine *καρπῶν* uocant, & *καρπῶν*: proprie uero maiorem illum & poſteriorem Attici *ἐλαγχρον* dicunt, Hippocrates *ἡ κωπῆ*. Radius ſupra inſrāque ualidis ligamentiſ cubito alligatur: media inter ſe omnino dehifcunt. Radius ſuperiore parte tenuior eſt, cubitus plenior: uerum cū rurfus ad manū cocunt, modo craſſitudinis mutato, ibi radius plenior, cubitus admodū tenuis eſt. Vtrunque adnatum tuberculum iuxta carpi partes habet, ex interiore parte cauum, extra uero gibbum. In ſinum eiufmodi ſeſe inſinuat *καρπῶν*, quā primam palmæ partem diximus, ei que adneſcitur. ineſt autem cubito & proceſſus quidam, quem à columnæ ſimilitudine *συλῶδῆ* appellant: & hic quoque carpo anneſcitur. Cubitus minimo digito, radius pollicis è directo reſpondet. In manu prima palmæ pars, quæ græce *καρπῶν* dicitur, ex multis minutifque oſſibus conſtat: quorum numerus incertus eſt: quidam tamē octo numerant. dura omnia, nec medulloſa multiplicifque figuræ ſunt: nam partim gibba, partim ſima, partim recta, partim orbiculata: ſed oblonga omnia & triangula. Recta deinde quatuor oſſa ad digitos tendentia palmam explent. Ab iis digiti ipſi, præter pollicem, omnes oriūtur: qui ex oſſibus ternis conſtant, quæ *φάλαγξ* dicuntur, id eſt internodia & *συνταλάς*: omniumque eadem ratio eſt. pollicis tantum primum internodiū, ex tranſuerſo illi palmæ parti, quam metacarpiū diximus, annexum eſt. Compactus ita & pollex ex triplici oſſe eſt: primumque eius internodium cum poſteriore palmæ parte minime connumerandum cenſet Galenus. Ac ſuperiorum quidem partium oſſa ſic ordinata ſunt. Ad imā uero ſpinam ab utroque ſacri oſſis latere, coxarum os, & quod *ἰχίον* dicunt, utrinque adnexum eſt: quod tranſuerſum longeque ualentiffimum, uuluam, uelicam, reſectum inteſtinum tuetur. Atque iis quidem oſſibus quæ ex utroque oſſis ſacri latere cernuntur, integris nullum eſt nomen unum inditum: nam partes eorum latæ ſuperiores, ilium oſſa nuncupantur: inferiores exteriorēſque, coxæ & coxarum oſſa. In quorum utroque ſinus prægrandis eſt, qui recipit rotundum ſcēminis caput, acetabulū uocant: Græci *κωτιλίον*. Ab iis quæ in anteriora protenſæ partes, tenuēſque, & foratæ, atque inter ſe coniunctæ ſunt, os conſtituunt, quod pecten dicitur: quod in uiris rectius eſt, recuruatū magis in exteriora in ſcēminis, ne partum prohibeat.

*Totius manus oſſa numero ſunt uiginti ſex, ut author eſt Clearchus.*

*ἰχίον, ἢ σπινθίον.*



sibus fœmina oriuntur, quæ magnitudine cæteris præstant omnibus: quo- E  
 rum capita rotundiora etiam quàm humerorum sunt, cum illa ex cæteris  
 rotundissima sint. Ad fœmoris cervicem oriuntur processus duo, *ἡ δὲ τῆς*  
 dicti: quorum exteriorem, qui longe minor est, *ἡ δὲ τῆς* uocant: infra uero le-  
 niter patefens in duo tubercula à priorè & à posteriore parte definit, adeo  
 quidem grandia, ut uel capita possint appellari: eaque tibie adnectuntur.  
 Hæc uero commissura osse paruo, rotundo, molli, cartilaginoso tegitur: pa-  
 tellam uocant. Tibia, ut ante dictum est, ex ossibus duobus constat. Ete-  
 nim pat omnia fœmur humero: tibia cubito similis est, adeo ut habitus  
 quoque & decor alterius ex altero cognoscatur. Horum uero alterum os  
 ab exteriore parte supra positum est, quod sura nominatur: id breuius est  
 (neque enim adeo protenditur, ut genu ipsum cōtingat) supraque tenuius, F  
 ad ipsos malleolos intumescit. Alterum à priorè parte positum, cui tibie  
 nomen est, longius & in superiore parte plenius solum cum fœmore com-  
 mittitur, sicut cum humero cubitus: eaque parte duplicem habet sinum,  
 qua fœmoris capita recipiat. Inter eos tibie sinus nervosum quoddam car-  
 tilaginosumque eminet: quod inter fœmoris capita illa, ueluti in imā quā-  
 dam scissuram inseritur. Et hæc quoque ossa infra supraque coniuncta, me-  
 dia, ut in cubito dehiscunt. Imæ ab utroque latere tibie suræque partes,  
 malleoli nuncupantur: iique gibbi & carnis omnino expertes prominent:  
 intrinsecus uerò caui sunt. Excipitur autem tibia infra primo pedis osse:  
 quod nos talum, Græci *ἡ δὲ τῆς* uocant. à malleolis hic continetur ac con-  
 tegitur, ut eum ne tangere quidem possis. Huius pars illa quam *πῆξ* uo- G  
 cant, sursum uergit: posterior uero orbiculata est, & ad superiora potius spe-  
 ctat. Prior autem pars, rotundo quidem capite, cum eo osse connectitur,  
 quod ad scaphæ similitudinem *σκαφοειδὲς* nuncupatur. Huic subest os pedis  
 maximum, quod *πῆξ*, id est calcem, uocāt, durum, sine medulla: eius pars  
 qua ingredimur, leniter rotunda & latiuscula est: posterior quoque teretem  
 figuram repræsentat, in posterioremque partem proiecta, tibie rectitudi-  
 nem admodum excedit. Ex partibus eius anterioribus, quæ è regione ma-  
 gni digiti sita est, capiti ipsius tali subiacet: nec cum alio osse copulatur, quæ  
 uero minimo digito respondet, cum eo osse quod à tessera similitudine *κν-  
 εονοειδὲς* uocant, annectitur. *κνέονοειδὲς* autem à parte exteriore iuxta *σκαφοειδὲς* po-  
 situm est. Tria deinceps ossa paruula inferiori *σκαφοειδὲς* parti adiungun- H  
 tur, cum quibus etiam exteriore ex parte *κνέονοειδὲς* una porrigitur. Atque pri-  
 ma quidem pedis pars, quam *τῆξ* uocant, hæc septem continet ossa. Pars  
 inde pedis inchoatur, quam Græci *πῆξ* uocant: quæ ex quinque ossibus  
 constructa est. Post hæc deinceps pedis digiti sunt, qui ex ternis interno-  
 diis omnes, ad eorum, quæ in manuum digitis sunt similitudinem, con-  
 stant, pollice tantum excepto: qui solus omnium ex duplici osse constitu-  
 tus est. Itaque pedis ossa pleraque ad eorum quæ in manu sunt similitudi-  
 nem, instructa sunt: plantæ, palmæ, digiti digitis, sicuti & ungues unguibus  
 respondent. Hæc, ut arbitror, de ossibus ueluti rudimenta discantibus di-  
 cta satis sunt. Quod si quod ossiculum alibi, utpote in corde, in naso, in  
 gutture,

A gutture, itēque in aliquo ex digitis, (ut quæ à fefami similitudine *αἰγμοειδῆ* uocantur) aliudue eius generis deprehenditur, non necessarium arbitror hoc opere pertractare.

F Spina, *σπίς*. Calua, uel caluaria, *κεφαλή*. Totum capitis os etiā *καφαλῆς κύνος* dicitur. Sutura, *ῥαφή*, ἢ *ῥαφής*. Sunt & aliz suturæ, & in faciei ossibus, & quæ communes sunt superioris maxillæ & caluæ: ut uidere licet apud Galenū lib. De ossib. & Celsū, & Introduc. Galeni. Iugale, *ζυγώδης* ἢ *ζυγώμας*: uerum Pollux *ζυγώμας* appellat post tempora bina obliqua: quorum connexus aures complectitur, qui *αερίνοι* etiam dicuntur. sed an idem sit *ζυγώδης* Galeno quod Celfo, confideret lector. Vertebrae, Colli uertebræ etiā *σπονδῆς* dicuntur, ἢ *σπονδυλῆς*, ἢ *κύνος*: Homerus etiam *ἄσπιδες* uocauit. *ἄτλας*, Spinæ articulum, siue nodum (inquit Plinius) *ἐπὶ ἀτῆσι* uocant: est autem primus. Processus, *αερίνοι*: Pollux *ταρτήριος* uocat. Celsus, processus, & excessus, & tubercula. Quam formam situmq; habeant processus isti, luculentissime ostendit Galenus lib. De ossib. & lib. de usu part. & Celsus lib. 8. Scopula, *ὠμοπλάτης*, & *ὠμοσπονίαι*, & *πλάτης* quidam uocant: Celsus hæc etiam scopula, & lata scapularum ossa nominat. Sunt qui hoc loco apud Celsum scopula operta legi uolunt. Costæ, *πλευρῆς*. quo pacto costæ cum spinæ uertebrarū processibus connectantur, leges apud Galenum lib. Anatomicis 8. & lib. De ossib. *νέκτοι*, minores costæ dicuntur, sicut *γνώαι* maiores. Costæ utrinq; duæ primæ *ἀνίστροφα* uocantur: quæ has sequuntur: item duæ, *σφικταί*. Post has *σφικταί* duæ. Et deinde quæ ad pectoris cartilaginē desinūt, *πυρρῆνοι*. Quæ reliquæ sunt quatuor nothæ *μολδακαί* uocantur, id est molles. Humerū, *δυσχίον* uocat Galenus. Radius, *κάρκιν*, ἢ *πυρρῆνχιον*, ἢ *πυρρῆνχιον*. Cubitus, *πύγος*, ἢ *ὠλον*. Quatuor ossa, Ita Galenus: uerum Pollux hanc palmæ partem (ut supra diximus) exceptis quinq; ossibus ad digitos tendētib; constare, primumq; pollicis internodium metacarpi partem esse scribit. Ilium ossa, *λαπῶν ὀστά*. Coxæ & coxendices, *ἰσχίον*, *κατύλον*, ἢ *κατύλονδον*. Pecten, *ἰδὸς ἰσον*. Femur & fœmur, *μῆρ*. Caput fœmoris, *καφαλὴ μῆρ*, ἢ *κατύλονδον*. Patella, mola, *μύλα*, ἢ *ὠδογαστῆς*, ut supra. Tibia, *κνήμιν*. Sura, *ποδῖν*: recentiores fibulam uocant. Tibia, *κνήμιν*: quidam etiam *καρπίδα* uocant. *Νόστρον* *σφῶδον* *σῶδον*, hic est, de quo lib. 2. De temperamētis. Mallcoli, *σπινῆς*: Celsus hos etiā talos uocat: & talos item appellat os illud quod & nos, quod scilicet *ἄσπιδες* uocauit Galenus. Talus *ἄσπιδες* Aristot. lib. de hist. animal. i: & talus Plinio lib. 11. uidetur aliud significare: de quo infra plura dicemus in quadrupedibus uiuiparis. Ossiculum, Sub tonsillis ossiculum est *ὠσῆδης* dictum, eod quod simile sit τ litteræ, quod arteriæ caput amplectitur: alij *πυρρῆνχιον* uocant.

De cartilagine.

Cap. XXII.

E Iusdem fere naturæ cum osse cartilago est: & quemadmodum os præcisum nunquam recrefcit, ita & cartilago ablata nunquam reparatur. Differt autem ab osse pluri minorisq; ratione: & uidetur quidem cartilago ex osse ligamentoque constare: utrique enim aliqua ex parte similis naturæ est: uerum ligamento durior, sicuti osse mollior est. Et partes cartilaginosæ membrorum articulis inseruntur, ueluti puluinar, ne attritu mutuo lædantur ossa. Terrestrium quæ & sanguinē habet, & animal gignunt, cartilago nullo foramine hinc: nec ossium more medullam continet. At uero aquatiliū cartilaginis, quod per dorsum ossibus proportionatum tendit, cartilago est humorem in medulla speciem continens: & Plinius, cartilaginea medullam in spina habent, inquit. Gressiliū, quæ animal gignunt, auriculæ, nares, extrema ossium nonnulla cartilagine constant. Priuatim uero quæ in extrema ora est ossis, quod in medio pectore *σφῆν* uocatur, prope os uentriculi *ἐν σφῆνι* cartilago dicitur, & triquetra est.

C iij

*Ἵνγυες, ἔν-  
γυς, unguis, ὀ-  
πλάει. Apud  
Celsum pro pe-  
dibus ipsius ca-  
piuntur ungu-  
le. Chela, χε-  
λαί. Cornua,  
κέρωτα. Ro-  
strum, ῥύγχος,  
ἡ ῥάμφος.*

**S**unt item alia partium genera, quæ naturam nec eadem habent, quam ea quæ exposita sunt: nec longe ab iis remotam, ut unguis, ungula, chela, cornua: præterea rostrum, quale datum auiibus est: hæc enim & flexilia & fissilia sunt: cum nullum os hinc possit, sed fragile quodque habeatur. Colores cornuum, unguum, ungularum & chelarum, cutis pilorumque colorem sequuntur: etenim cutis nigra, cornua nigra, & unguis ungulaque nigra oriuntur. Et candida pari modo in colore respondent: melius etiam medium eadem colorem præferunt. At dentes naturam ossium æmulantur: quamobrem hominum nigrorum ut Aethiopum, atque similibus dentes, ut ossa cadent: unguis nigri, modo suæ cutis apparent. Cornua parte plurima caua sunt ab radice, quatenus ambiunt os, quod ortum à capite, cauo cornu inferitur, totumque implet: in mucronem tamen solidum & simplicem exeunt. Adherent cornua cuti potius quam ossi. Ceruino generi tota solida & sparsa in ramos, & omnibus annis decidua, nisi caestrentur: cum ex cæteris cornigeris nullum cornua amittat. Cornua quibusdam inesse dicimus, sed per similitudinem: cum nullum ex iis cornu officio fungatur: qualia cochleis data sunt ad prætentandum iter: quæ enim iure cornua intelliguntur, gerunt quadrupedes uiui paræ ad uim, aut inferendam, aut depellendam, quæ uirium sunt officia: quod nulli ex cæteris quæ cornua habere dicuntur, contingit. Ungues à neruis neruosus ue ligamenti orti, iis scilicet quæ digitorum ossa continent, indurescunt. Habent autem unguis quibus digiti sunt: digiti uero iis sunt, quibus pedes articulis formati, excepto elephanto. unguis etiam in senectute, & defuncto augetur, durior esseque redduntur: & ungula quoque maiores in senecta redduntur: quod idem rostris etiam auium euenit. Ungues præterea nonnullis animalium adeo duritate degenerant, ut præ nimia duritudine nihilo ab ossibus differre uideantur.

*De unguine ex-  
ortu plura a-  
pud Pollucem.*

De pilis & cute, & quæ his proportionem respondent, scilicet cortice, squama, testa & crusta.

Cap. XXIII.

*Cutis, Αἶμα.  
Pilus, ὀρίξ.  
Lana, χείλον.  
Cortex, Φελίς  
Squama, λε-  
πίς.*

*Pili.*

**D**e pilis & cute, atque de iis, quæ uicem pilorum cutisque suppetunt, ita se res habet: cutem omnia habent quibus inest sanguis: pilos habent quæ pedestria eademque uiui paræ sunt. nam lana etiam pilus est, sed pilus proprie crassior est & procerior: lana uero crispa magis ac tenuis. Cortice autem integuntur quæ ouis ara sunt pedestria, appellanturque φελίδια: squama uero pisces tantum, sicuti penna aues: & testa silicea includuntur, quæ testacea dicuntur, ut ostrea: crusta operiuntur, quæ crustata uocantur, ut cancri, locustæ. Gignuntur pili ex uaporibus fuliginosis à cute exeuntibus, iam lori formam adeptis: quorum quod in meatibus est, stirpis radici simile uidetur: quod uero ex cute extat, ipsi ueluti stirpi. Habent autem pili ad suam radicem lentum quendam humorem, quo protinus, ubi euulsus pilus est, si qua leuiuscula tangat, ita adhæret ut trahere possit. Quibusdam animalibus

- A** malibus nulli dati sunt pili: aliis supina in parte nulli, aut pauciores quàm in prona. Iis animalibus qui molli sunt cute, ut homo, quanto sicciore calidiorque cutis fuerit, tanto magis pilos gignere potest. at neque in iis, quæ silicea testa includuntur, ueluti ostris: nec crustatis, ut locustis, cancris: sed nec quæ corticem habent, aut squamas, ut serpentes, ut pisces, oriri pili possunt. Sunt enim horum quæ summæ cutis loco habentur, uere & in totum sicca ritu testæ uel petrae. Pili præfecti augeri inferius ab radice possunt, superne non possunt. Pennæ autem nec ab radice, neque superne ab incisura possunt, sed cadat necesse est. Cortex squamæ loco est, & illi similis: sed natura rigidior atque durior: quod in testudine & serpētibus magnis, & crocodilo fluuiatili palam fit: firmior enim osse euadit. Cutem, ut diximus, omnia habent, quibus est sanguis: pilos non omnia, sed sicut distinctum iam est. Inest in cute omnium lentor quidam mucosus: uerum aliis minus, aliis magis: ut in tergore bubulo, ex quo glutinum facere solent. ubicunque cutis per se ac sine carne est, uulnerata nō coit, ut in gena, præputio, palpebra. Sed neque in carnis etiam partibus restitui cutis potest talis omnino qualis erat quæ periit: sed simile quiddam cuti, & quod eius officium suppleat, potest, non tamen plane cutis. Cōtextu perpetuo cutis in omnibus animalibus continuatur: nec alibi interpellatur, quàm ubi sint naturales meatus: ut in ore & excrementorum exitibus, atque etiam in unguibus. Cutis hominis proportionem magnitudinis tenuissima est. Cutis quæ quidem totum corpus ambit, *ἡριμῆς*, id est excoriari potest à subiecta carne, & membrana eam circumdante, ideoque *ἡριμῆς* Græci uocant: manuum autem internam & infimam plantæ cutē, præterea frontis & totius fere faciei, aliarumque: quarundam partium animalis excoriari nō contingit. Cuti superiacet summa cuticula, quæ Græcis *ὤδη Ἀρῆς* dicitur, tenue quiddā, quale est quod serpētis se nectus nominatur: id quod in scabie, lepra, & lichenibus maxime cernitur.

Quing. cutis differentias enumerat Galenus lib. 11 De usu part. quarum aliquæ excoriari possunt, aliquæ uero minime. Quo pacto autem excoriari debeat cutis à subiecta fibi membrana, docet idē Galenus li. 3. Anatomicon.

## De membranis.

## Cap. XXV.

- S**unt & membranæ in sanguineis animalibus: quæ quidem pars similis cuti prætenui spissiorque est. Sed diuersum genus id est: quandoquidē neque fissilis, neque euulsilis cutis est: membranæ etiam omnes, cute sicciore sunt. Ambit singula, tum ossa, tum musculos, tum etiam uiscera, membrana tam in maiore, quàm in minore animalium genere: uerum in minore sensum effugit. Quæ ossa contegit membrana, *πρωτόστας ὕμνη* dicitur: quo in genere est quod *πρωτόστας* uocatur, membrana scilicet caluariam ambiens. Ligamenta per quæ muscoli ossibus colligantur, membranæ circa ipsos musculos efficiunt. Inter membranas præcipue duæ sunt, quibus cerebrū opertum munitur, *μυελίνης* dicuntur: altera superior adhæret ossi, quæ firmior & crassior est: hæc *σκληρῆς* dicitur, & *παχὴς*, & *ἀσφαλῆς*, hoc est dura, crassa & coriacea: altera inferior contigua est cerebro, quæ *χερσάνης* uocatur, quod *χερσῶ* membranæ similiter, uenas in se & arterias habeat connexas: atque hæc cerebro tanto durior est, quanto altera, crassior uidelicet illa, osse sit mollior. Adhærent item membranæ duæ septo transuerso, ex utraque eius parte

*Μυελίνη, Πλῆνις* continentes cerebrū membranas eas uocat.

περιτοναϊόν, ἢ  
περιτοναϊὸν  
ἢ μίλον, ἢ περι-  
πύλαιος χιτῶν,  
ἢ περιτοναϊὸν  
σκήπτωμα.

singule, superiore scilicet parte & inferiore. Superior *ὑπερστικόν*, id est succin- E  
gens, inferior uero *πυθιναϊόν* nominatur: quod à renibus ortum, toti abdo-  
mini interne obtenditur, atque adhæret ad pubem usque infimam. Vtra-  
que siue membranam dicere placet, siue tunicam, (*χιτῶν* nanque Græ-  
ci dicunt) substantia omnino simili est: utraque enim aranæ modo  
prætenuis est: non ut tendines quidam, qui cum in membranarum spe-  
ciem tenues sint, si tamen eas clara luce inspicias, fibras quasdam tenues  
intercurrentes ostendent. At non ita peritonæum: est enim simplex, to-  
tum sibi continuum & adamussim simile corpus, quod inde nomen ha-  
bet *ἀπὸ τοῦ περιπύλαιου*, id est quod prætendatur omnibus, quæ inter septum  
transuersum & crura continentur. Eodem etiam modo succingens costas  
membrana simplex est peritonæo similis, eundemq; usum omnibus spiri- F  
tus instrumentis, quæ intra pectus sunt præstat, quem peritonæum iis quæ  
nutriendi gratia in uentre sita sunt. Costas nanque omnes intrinsecus suc-  
cingit: & operimentum est eorum quæ intra pectus continetur omniū. Ve-  
rum non una est mēbrana quæ utriusq; lateris costas succingit: à dextra et-  
enim parte una est, à sinistra altera. Neque unum & continuum est totius  
pectoris spatium internum (ita enim uoco *ἐνερχισμὸν*) sed membranis distin-  
guitur. Ex membranis nanque illis succingentibus oriūtur partes duæ, quæ  
totum hoc pectoris spatium diuidunt, atque ob id *διχοφρενηότης* uocatæ. Hæ  
ad iugulum usque à dorso ascendentes, & per totam ossis, quod in medio  
pectore est, longitudinem ad mucronatam usque cartilaginem, quæ *ἐνφρε-  
νίδις* dicitur, porrectæ, mutuo sibi cohærent: nisi ea tantū parte qua cor situm  
est. Hic nanque separatæ, cor ipsum unā cum propria quadam membrana, G  
siue tunicacraffiulcula cor ipsum ambiente (*περικαρδιον* uocant) inter se cō-  
prehendunt. Succingentiū autem bases, supernis septi transuersi parti-  
bus superbiacent: quemadmodum alia quædam membrana similis, infer-  
nis substrata est, quæ peritonæi uertex, aut principium non inepte dicitur.  
Hæc totam inferiorem septi regionem subliniit: ac ubi septum perforatum  
est, quo uasis transitus pateat, ibi iis ipsis quæ permeant, undique adhæret,  
ferturque una per totum corpus, ut quæ iam ipsis simul & operimentum  
fiat, & quasi firmamentum. Eodem modo & membranæ illæ succingentes  
quæ supra septum sunt, uasis septum permeantibus iungūtur, & simul per  
corpus foruntur. Membranosa præterea quædam corpora multis in locis H  
præter hæc existunt: quædam ex ossibus procedentia in ipsa ligamentorum  
substantia, quædam ex nervosis musculorū finibus (*ἐκπνευστικὰ* uocant) intē-  
dinum substantia. At quæ uere maximeq; proprie membranæ dicūtur, hæ  
sunt. Omentum quoque non nisi membrana est, *ἐντερίδιον* à Græcis dictū.  
hoc omnia habent animalia quæ sanguinem, sed alia pingue, alia macilen-  
tum. Nomen hoc à ueteribus *ἐντερίδιον* sortitū est, quoniam nulli intesti-  
norum adhæret: sed neque ulli alij perpetuo præterquam iis tribus, uentri-  
culo scilicet (à quo oritur atque dependet) lienī & colo, quibus semper con-  
nexum est. Adnascitur etiam nonnunquam, sed raro iecinoris fibræ cui-  
piam, aut ex nothis costis alicui. Est autem corpus ex duplici peritonæi ceu  
plexu

A plexu compositum, in quo uenæ per multæ sparguntur. Descendit uero in quibusdam animantibus, haud multo infra quàm umbilicus est: at in quibusdam ad pubis ossa: maximum id habent inter animantia, homines & simiæ. Quod etiâ lactes uocant, membrana & ipsum est duplex pertendens continua de intestinis ipsis ad uenam usque, quæ in iecinoris porta est, uti ante dictum à nobis est. Vesica etiam utraque, tam ea quæ urinam recipit, quæ maior est, quàm quæ flauam bilem, quæ minor, membranosa est: quâuis maioris illius collum carnosum sit. Membranæ etiam quædâ sunt fœtum in utero inuoluentes: prima *αἰσθητήρ* dicitur, quæ uulux adhæret: hæc nil aliud quàm uenarum, & arteriarum multarum cōtextus quidam est, cum interuallis quibusdam membranosis: altera tenuis est & mollior, totum

B circundans fœtum, *ἡμῆς* uocant: tertia duplex membrana est, & partibus tantum prominentibus circuniecta: capiti dico, natibus, & pedibus. hæc *ἐκτακτὴ* dicunt, quod *ἐκτακτὴ*, id est intestino crumenæ uel similis sit. albæ utæque ac tenues, forma ad araneam proxime accedentes. Sunt & oculorum membrana, de quibus supra pertractauimus. è membranis si qua præcisa fuerit, non coit. Ergo de sanguine & uenis, neruis, fibris, cute, membranis: atque etiam de pilis, ungulibus, ungulis, tam solidis quàm bisulcis, rostro, cornibus, denticibus, cartilagine, ossibus, corumque proportionalibus, statuendum ad hunc modum est.

C Membranæ, *ὠμὸς*. Euulsiis, *πλῆθ*. G Peritonæi uertex, *περιτὸν πᾶσι*. H Omentum, *ἐπιπλῶν*, & *ἐπιπλῶς*, & *ἐπιπλῶσιν*. A Lactes, *μαστοί*, ἢ *μαστοί*. C *σπέρμιον*: medium intestinū uocauit Cicero lib. 2. De natura deorū. Lactes Plinio aliud significant: nēpe ieiunum intestinum, opinor, & quæ *ἡφίστη* dicitur. Vesica *ύστερ*. Quo conueniant, quodue differant istæ uesicæ, præclare docet Galenus lib. 5. de usu part. *αἰσθητήρ*, secundas uocant: de his plura legas apud Galenum in lib. de diff. uulux, & de scie. Aristoteles duas tantum enumerat, lib. de hist. animal. 7. & mébranas uocat.

## De carne.

## Cap. XXVI.

EX animalium partibus, nulla omni animantium generi, carne magis communis est: nam & exanguia quoque suam quandam habent carnem, ut ostrea & testacea reliqua. In genere animalium sanguineo, caro, & quod carni simile est, omnibus fere inter cutem & ossa, aut quæ ossi proportionem respondent, continentur: estque caro ueluti molle fulcimentum & pin

D guiusculum ossibus impositum, ornandi pariter & uelandi causa. aboletur, & in uenas fibrasque transit, quoties animal extenuatur & gracilefcit: uertitur item in pingue, quoties pabuli copia suppetit. Sed carnis plures sunt species: primam quidem, quæ sincera & absque fibris est, & proprie caro dicitur, nusquam in corpore per se inuenias: sed est perpetuo musculi pars.

Musculi autem reuera carnes sunt, potissimumque partes ipsorum me-

dia: nam extremis in finibus plurimi in magnos desinunt tendines. Est auté & carnis quoddam genus cuiusque uisceris propriū, quod parenchyma ab Erasistrato dictum est: iecinoris enim, lienis, renium & pulmonis caro, simplicis cuiusdam naturæ est, circa cuiusque uisceris arterias, uenas, & neruos crescens. Cordis simplex carnis natura non est: sed sunt in eo sui generis fi-



bra, quales in musculis cernimus, quibus caro circūhæret. Est & uentriculi, intestinorum, uteri, uesicæ utriusque propria quædā caro, quæ suis ipsorum fibris circūnascitur. Lingua præterea substantiam quandam habet sibi propriam: est enim rarior fungosiorue eius caro, & minus habens sanguinis, quàm sit musculorum. Neque enim eandem penitus formam habent hæc carnis genera. Musculorum nanque caro rubicundior est ac mollior, quàm uentriculi aut uulvæ, uesicæue aut intestinorum: cordis autem durior, & fibris magis uaria: musculi enim fibras habent positu simplici, & quæ neruorum ligamentorumque sunt particula, ut supra dictum est: cordis autem propria fibrarum est species, quæ situ sunt magis uario.

## De glandulis.

## Cap. XXVII.

F

*Glandula, ἡ δὲ αὐτῆς οὐκ ἔστιν ὅρα.*

Carni proxima est adenum siue glandularum natura: est enim ueluti caro conglomerata. quantum autem lingua differt ab ea quæ proprie caro appellatur, tantum glandulæ à linguae substantia recesserunt. Harum cum duplex sit usus, duplex quoque genus esse debet: alterum densum ac siccus, quod uasorum, uenarum dico & arteriarum, fulcimentum est in iis locis, quibus in ramos discissa, periculum subeunt, ne in uehementioribus agitationibus disrumpantur: alterum uero glandularū genus, rarioris substantiæ est, cauernosum fistulosumue, ac madidæ spongiæ in modum, humore imbutum. Hoc nanque glandularum genus humorem quandam in se gignit, aut ad aliorum membrorum usum, irrigandorum scilicet causa, ne facile exsiccentur: ut quæ linguae adiacent adenes saluam procreant: aut ad generis propagationem, ut testes semen, (nam & hi è glandularum genere sunt) aut ad conceptus nutritionem, ut quæ in mamillis sunt glandulæ, lac generant. Huius generis adenes uenas & arterias, perspicuas quidem, ac nonnunquam magnas, & item neruos in se habent: illæ uero altere neque sensum habent, neque motū, neque neruum in se ullum. Sunt præterea nonnullæ in quibusdā corporis partibus adeo exiguæ, ut uulgius ipsum lateant: ueluti in lactibus, (ὑδατῶν dicunt) in quibus utriusque generis glandulæ reperiuntur. Et in aliis quoque corporis partibus sunt exiles quædam, uasorum diuisiones fulcientes: circa fauces autem & laringa magnæ sunt atque conspicuæ. Haud longe à cordis radice & pericardij membranæ, ad septimam spinæ uertebra, (σπινθη, glandula est, haudquaquam exigua, glā- H dium Latini dicunt. hæc in recens natis animantibus est quā maxima, crescentibus autem minuitur. ὑδατῶν dicuntur glandulæ, ceruici uesicæ adiacentes, quas & ἀδένες πνεύματος quandoque uocat Galenus, in maribus maiores, sceminis minores. Sunt qui renes quoque inter glandulas numerant: ij nanque etiam glandulosum quiddam habere uidentur. Glandularū omnium natura exanguis est.

*πνεύματι τῆς ἀπὸς τοῦ πνεύματος (nisi liber sit mēdosus) sunt meatus quibus defertur semē à testibus ad ὑδατῶν.*

## De adipe &amp; sebo.

## Cap. XXVIII.

*Adeps & sebum (quod ἔστιν sebum dicitur)*

Adeps quoque & sebum ex maxime communibus sunt inter animalium partes: nam quæ rite alitur, sanguinea dico, ea omnia aut adipem habent,



- A** bent, aut sebum. Quòd si uoles, licebit omnē quæ in animalis corpore est, oleosam & pinguem substantiam, utrumuis appellare, sebum scilicet aut adipem: utrunque enim oleosum & pingue est, & utrunque sanguis est concoctus per bonitatem nutrimenti. humiditate tamen & siccitate differunt inter se, cum sebum fragile usquequaque sit, nec ad ignem admotum tam facile lique scat, & cum refrigit, concre scat, ut ovis, ut capræ: adeps liquidior sit, hoc est, ad ignem facile lique scens, minimè que aptus durari, oleo longa uetustate incrassato similis, ut equi, ut suis. Locis etiam discrepant, adeps enim inter carnem cutemque solet consistere: sebum in fine carnis semper est. Itaque si ex hominibus quempiam incidas, qui uel graciles sint, & paruas uenas habeant, sceminam præcipue (ut quæ & frigidioris
- B** est naturæ, & uitæ magis desidio sâ) adeps excidet, quam cõstat cuti ad internam eius membranam subnasci. Omentum omnibus adipe pinguescentibus adipeum est, sebo obesis sebale. Quæ parte utraque dentata sunt, adipe pinguescunt: quæ una, sebo. Generatur autè pinguedo omnis ex sanguinis parte pinguiore, per tenuis uenas effusa, circa parteis animatis membranas ac neruosas: cui concretio ideo contingit, quòd membranis adiacet: crasso nanque oleo est similis, eoque congelatur, ubi cum frigidis & exanguibus particulis coniungitur. At neque circa iecur coire potest (inquit Galenus) neque circa arterias uenasque aut cor: sed nec circa ullam aliam partem calidam. Renes autem ex uisceribus maxime pinguescunt, uerum dexter minus semper quam sinister: & quanuis uehementer fuerint pingues, tamen aliquid fere mediis deest. Quæ sebo pinguescunt, maxima pro parte magis quam quæ adipe in renibus opimandis luxuriant, ac omnium præcipue oues: quippe quæ renibus pingui obductis intereant, quod ubertate pabuli fit. Plerisque animalium est pinguedo sine sensu: quam ob causam sues spirantes à muribus tradunt rosas. Animalia quæ uis aut intra carnem, aut scorum pinguescunt, quibus autem pingue separatum non est, ea minus per uentrem omentumque pinguescunt, ut anguilla: paucum est enim eis pingue in omento. Plurima tamen pars animalium uetere pinguescit, & præcipue quæ parum se moueant: est nanque uitæ magis desidio sâ eiusmodi nota. Minus esse fecunda, quæ admodum pinguescunt, siue matres sint, siue sceminæ notum est.

πικρὴ καὶ  
πῆμα.  
Pinguedo cõ  
mune nomen  
est Latinis,  
aut pinguedo,  
Sebum, πῆμα.  
Adeps, πικρὴ  
καί.

Huius causa  
redditur ab  
Aristotele lib.  
De part. ani  
malium 2.

## D De medulla.

### Cap. XXI X.

**M**edullæ rationem iis addere debemus: nam ea quoque humidis adnumeranda generibus in nonnullis sanguineis animalibus est: humida est enim, & propemodum fluxilis. Maxime uero mollem ipsius substantiam ad similitudinem pinguedini possis: nam cum nouellis adhuc animalibus medulla cruenta admodum sit, ætate prouectis, ut adipe piguescentibus, adipi similis est & albescens: sic sebo deputatis generibus, sebum præ se fert. Quod in spinæ ossibus continetur, colorem habet medullæ similem, τοῦ αἵματος μυελός, id est spinalem medullam uocant. Est porro spinalis medulla cerebro cõtinaua, ac eiusdè cum eo substantiæ, nisi quòd compactior multo

Medulla, μυελός.

Νοτιαίος, μυελός, ἢ αἵματος.

fit & durior, potissimum in infernis spinæ sinibus: quanto enim ab cerebro abscedit, tanto magis durefcit. Eandem uero esse ei naturam, quam cerebro colligunt (inquit Plinius) quoniam prætenui eius membrana modo incisa statim expiretur. Quamquam medulla non nisi inclusa ossibus est, (ut reliqua quoque omnia, quæ suapte natura humida in corpore sunt, cōceptaculis quibusdam tanquam uasculis continentur: ut sanguis in uenis, & alia in membranis, aut cutibus, aut uentribus) tamen ossa nō omnia medullam intra se cōtinent: sed ea tantum quæ caua habentur, tametsi ne ipsa quidē omnia continent: ossa enim leonis partim nullam, partim admodū exiguam habent, ut dictum est. Hæc fere semper in animalibus natia & congenita humidi genera habentur.

De lacte & coagulo.

Cap. XXX. F

**A**dnata autem posterioraq; sunt lac & genitura: præterea excrementa tam alui quàm uesicæ, atque alia quædam, scilicet in iis quorum natura hæc obtinet: hæc enim similia uidentur, licet re uera nō sint omnia similia: lac etenim tametsi sensui quidē simile apparet, ex tribus tamē naturis diuersis est cōpositum: prima quidem crassa, ex qua caseus conficitur: altera pingui, ex qua butyrum: & tertia aquæ, quod ferū nūcupamus. Plus casei lac illud habere uidemus, quod crassius est. coit lac eorum, quæ non utrinque dentata sunt: quapropter caseus ex iis fit, quæ inter urbana dentium ordine carent superiore. Eorum autē quæ utrinque dentata sunt, lac coire tam facile non potest, (sicuti neque adeps) & tenue & dulce est: tenuissimum cameli est, mox equæ, tum alinæ: crassissimum bubulum est **G** & pinguisimum: mediocris consistentiæ est caprarum, crassius hoc est ouium lac: sed lactis differentias pluribus infra explicabimus. Nulli fere animalium lac fieri solet, antequam uterū ferat: nec dum ferunt, utile omne est: lac enim fieri incipit ad speciem puris statim cum coire inceperint: sed utile postea est cum pepererint. Prima autem à partu spongiosa densitas lactis, colostræ uocatur & colostrū. & ex primo lacte in bobus semper à partu colostræ sunt: quæ, ni admisceatur aqua, in pumicis modum coeunt duritia, uel perinde ut lapis durefcunt, ut prodit Aristoteles. Non prægnantibus aliquando, sed raro, eduliis quibusdam, aliisque artibus (ut uberum frictione) efficitur ut lactescant. Quæ lac habent omnia, māmīs id continent. Maribus magna ex parte nec bestiis nec hominibus gignitur lac: fieri tamē **H** potest, ut aliquibus interdum gignatur: uiris enim post pubem, exiguum nonnullis exprimitur. Cogitur lac succo ficulneo & coagulo. Coagulum lac etiam est: quippe quod in eorum uentriculo, quæ adhuc lactent, continetur. est ergo coagulum lac ignem habens intra sese, quod cum animalis tempore concoqueretur, caseum traxerit. Habent coagulum omnia ruminantia, & inter dētata utrinque dasypus. Coagulum, inquit Plinius, hinhnuli, leporis, horði laudatum: præcipuum tamē dasypodis. Habent quibus hoc datum est, non in magno uentre, neque in reticulo, neque in ultimo, quod abomasum nominatur, sed in eo qui inter ultimum & duos primos positus est, quod omasum uocatur. Quo uetustius coaguli est, eò præstantius:

A tius: tale profluuium alui mederi potest, atque etiam quod leporis est, sed laudatissimum hinnuli, inquit Aristoteles.

F. Lac, γάλα. Butyrū, βούτυρον. Serum, ὀρός. Caseus, caseus non fit ex utrinque datis, inquit Plinius, quoniam eorū lac non coit. Lac, Plinius, crassissimū est a sinu lac, inquit, ut coaguli uice utantur: nisi fortasse menda sit. H. Coagulum, πνύα. Est ergo, &c. Aliter libro secundo de generat. animalium, Coagulum lac est cōtinens calorem uitalem, qui parteis similes ducit eodem, & unit atque constituit. Coagulum etiam uituli marini, & balenæ quoque reperitur apud Plinium & Dioscoridem.

## De semine.

## Cap. XXXI.

B Genitura nō eodem modo in omnibus est: sed quibusdam pro genitura, γένεσις, id est genitale uirus sui generis habetur, ut piscibus. ἀνέμια, id est nū. est semen genitale habent omnia quæ sanguinem. exit profecto semen genitale à maribus album & crassum, si integrum est: sed foris tenue totū redditur & nigriusculum. Nunquam id gelu concrefcit: imo admodum extenuatur, & aquæ tum colorem, tum substantiam trahit: calore autem coit, & crassescit. Delabitur in aqua quod sæcūdum est atque subsidit: quod autem infæcundum, diffunditur atque exolefcit.

## De excrementis.

## Cap. XXXII.

E Xcrementum appello reliquias alimenti: cuius uariæ sunt species. naturalibus excrementis omnibus fere locus præscriptus est, ut sit humoris ueluti conceptaculum: uerbi gratia, alimēti sicci excrementis, aluus inferior, humidi uescica, lactis mamme, seminalis (nam & hæc excrementa dicuntur) quæ circa uterum & genitale sunt uasa: in ea nanq; loca se colligūt, atque conflunt. Quod enim stercus & siccū excrementum uocatur, à lyncero nutrimento separaturn, paulatim impellitur per omnia intestina usq; ad satis amplum spatium, quod ad illud intestinū uisitur, quod rectum uocant: postea uero quàm plurimum congestū iam graue animali fuerit, tum foras egeritur. Serosum uero excrementum, renes à sanguine secernentes, ad uescicam maiorem transmittunt: ea porro id colligit seruatq; ad eūdem ferme modum, quo de sicco excremento retulimus. Biliosum excrementum ex iccinore attrahitur à uescicula, quæ illi subiicitur: alterum uero à liene. in iis collecta excernūtur, alterum in priorem tenuis intestini partem, alterum uero in uētriculum: ab iisq; iam per omnia intestina unā cum sicciore excremento permeant. Quod uero pituitam expurget, natura nullū instrumentum cōdidit singulare: mixta enim cum cibo puro, alere potest, & in laborantibus in alimentum absumitur. pituita ergo illa, quæ ad iccur unā cum succo perlata est, non uacuari desiderat, sed in corpore manēs alterari: dum enim cum succo illo unā concoquitur, sanguis euadit: & quod in uentriculo reliquum ex cibo est, & in intestinis, à defluēte in ea loca bile exterfum, per inferiora egeritur. Quod uero à cerebro destillat (mucū uocant, & destillationem, græce βλεφάρων καὶ κεφαλῆς) per palatum & nares exitum habet manifestū. Ex hoc genere esse uidetur, & quæ quotidie expuen-

## DE DIFFERENTIIS

do excernitur salua. Aliud excrementorum genus est, quod in singulis animalibus nascitur particulis, ex ipso unde aluntur succo, humidum tenuéque, cui nullus certus à natura præscriptus meatus est: expellitur tamen per exitus quos omneis corporeæ molis meatus, πῆμα Græci uocant, quorum nō modo reliquum corpus uniuersum, sed etiā tota cutis plena est: partim uiolento motu confertim erūpens (appellant uero quod ita excernitur, sudorem,) partim in speciem halitus ab insito calore solutum, quod per flatum sensum latens uocatur. ueteres quidem authores hoc excrementorum genus totum σῶμα, id est colliquamentū (ni fallor) uocauerunt: quod enim ex corporis incremento secernitur propter motus calorem, uim habet colliquamenti. In hoc insensibili perflatu, crassioris excrementi non nihil excernitur: ex quo tum pilis origo est (natura enim commode uel excrementis suis interdum abutitur) tum uero iis quæ circa omnem cutem semper acruantur sordibus. In hoc genere excrementum est, quod Græci κνέλιον dicitur, ita uocant aurium sordes, quæ interdum etiam auditum multitudinem sua obstruunt. De partibus animalium iis, quas similes dissimilesque appellamus, denique de omnibus tam interioribus, quàm exterioribus partibus dictum iam est: reliquum est, ut ad instituta pergamus.

κνέλιον, κνέλιον.

B Excrementum, πῆμα. C Stercus, κόπρος. Urina, ὕρως. Bilis, χολή. Atra bilis, χολή μίλινα. Pituita, φλέγμα. E Salua, σπῆμα, ἢ σπῆμα, ἢ σπῆμα, ἢ σπῆμα. Sudor, ἰσφῆρ. quo pacto in corpore generetur, leges apud Galenum lib. 10. De simplic. med. faculta. F Perflatus sensum latens, uel transpiratio sensum latens, uel perspiratio, græce κνέλιον αἰσθάνει ἀσπῆμα.

G

## DE ANIMALIUM

### DIFFERENTIIS LIBER II.

Per quæ potissimum constitui, inueniri uel possint animalium differentia. Cap. XXXIII.



Vemadmodum corpus totum animi gratia conditum est, (organum nanque animi corpus censetur) ita & corporis partes officiorum gratia constant, & operum ad quæ singulæ accommodantur: indeque fit, ut quorum actiones officiaque plura sint, ea plurcis exerceant motiones, plurcisque & uarias desideret corporis partibus, quæ sint ipsarum motionum instrumenta: quæ uero aut immobilia sunt, aut parum motus adipiscuntur, ut testata eorum corpus non adeo multiplex, ut sit necesse est. Atque hæc quidem cum ita se habeant, præter corporis partibus, earumque actiones motionesque, tertium etiam

A etiam quoddā adesse est necesse, nempe affectus. Porro actiones & affectus intelligi diximus, incessum & quauis loci mutationem, in uictu parando solertiam, ortum, incrementum, coitum uenerem, sensum, spirationē, uocem, uigiliam & somnum: ætatem, ut iuuentutem & senectutem: uitā, ualitudinem prosperam & aduersam, atque mores: & quæcūque huiusmodi alia possunt generi animalium tribui. Per hæc, ut diximus, potissimū, partes dico, actiones & affectus, animalium differentias constitui dignū est: sunt enim hæc animalibus partim omnibus communia, partim uero pluribus.

De differentiis animalium, quæ à partium discrimine oriuntur.

Cap. XXXIII.

B H Abent uero animalia partes, aut eiusdem sibi omnes, aut diuerfas partes: easdem, uel specie intelligi uolo, ut hominis nasus aut oculus specie cum oculo aut naso alterius hominis conuenit, & caro cum carne, & os cum osse: (ut enim totū se habet ad totum, sic partes singulæ sese ad singulas habeant, necesse est) uel genere, quanquam excessu defectūue differunt. de iis loquor, quorum idem est genus, uerbi gratia, auis aut piscis: id enim utrunque differentiis cōsumitur generis: & species complures cū piscium, tum etiam auium habentur. Diuersæ uero inter se sunt animalium partes pene plurimæ, contraria affectuum qualitate: ut coloris & figuræ, eò quod alia magis, alia minus affectæ iis ipsis qualitatibus sunt: multitudine etiam & paucitate, & magnitudine paruitatēque, mollitie & durezza, leuitate & asperitate, & reliquis generis eiusdem, atque omnino excessu defectūque discrepant: id est quod magis minūse quicquā horū habeāt, uerbi gratia, oris magnitudine discrimen existere animalibus palā est: aliis enim os magno hiatus rescissum est, ut cani, leoni: aliis paruum, ut homini: aliis mediocre, ut generi suū. Multitudine & paucitate differunt partes: ut eorum quæ pedes habent, alia bipeda sunt, alia quadrupeda, alia multipeda. mollitia & durezza, ut inter ea quæ oculos habent: alia duris oculis sunt, ut cancri, locustæ: alia humidis mollibusque. leuitate & asperitate, ut concharum quibusdam testæ leues sunt, aliis scabræ. præterea aliquæ longæ sunt, quædam rotundæ, itaque in figura notatur differentia. item aliis crusta, aliis testa protegmine habetur: & aliis rostrū porrectius est, ut gruibus: aliis breue. Penna item aliis uberius, aliis parcius data est. Sunt item auium alia longo crure, alia breui. Linguam etiam alia latiusculam habent, alia angustam. Pectus animalia plurima humano proportionatum pectori habere uisuntur, uerum non simile: homini enim pectus latum est, cæteris uero, ut quadrupedibus, angustum. sed & in iis quoque ratio partium nonnullarum diuersa est: eò scilicet quod quas alia animalia habent, alia iisdem careant. Alia enim calcarī aut aliquo armantur aculeo, alia nihil eiusmodi habent: & aliis apex in capite est, aliis deest: & eorum, quæ loco se mouent animalia, quædam pedes habent: ut bipeda, quadrupeda, multipeda: (sed omnia pedes pari numero possident) alia nullis fulciuntur pedibus. & oculos habentium, alia carent palpebris, alia habent, ut uisus sit exquisitior. Partes ita-

D iij



que animalium (prope dixerim) plurimæ aut eadē sunt, ueluti dictum est, E aut ratione contrariorum differunt, aut per excessum defectūque. Non defunt tamen quibus partes nec specie sunt eadē, neque secundum excessum defectūque, sed proportionē conueniant: quæadmodum os cum cartilagine aut piscium spina, & ungue cum solida ungula, & manus cum chele, id est forcipato pede, & pennam cum squama conuenire animaduertimus: quod enim penna in auium genere est, idem squama in piscibus habetur. Proportionē item conueniunt, quod aliis pulmo datus est: aliis pulmo quidem negatus, sed uice pulmonis iunctum aliquid est, quod pulmōni respondeat. aliis item sanguis inest, aliis sanguinis proportionale, quod eandem in genere exanguis obtinet uim, quam sanguis in corpore illo sanguinis habet. Differentias præterea nonnullas partium situ atque ordine F contemplamur: sunt enim complura animalia quæ easdem habeant partes, sed non situ eodem: uerbi gratia, mammas alia in pectore habent, alia inter scēmora, ut uacca. Partes quas singula animalia habent, hunc in modum diuersas easdemque intelligimus. Differūt autem suis partibus animalia: cum aliæ omnium communes sint, aliæ uero plurimorum, aliæ quorūdam generum propriæ: ut piscium branchiæ, ut auium pennæ. Omnium animalium communes partes sunt, quæa cibus recipitur, & in quam deuoratur: communes enim partes tam sanguineo generi, quàm exanguis sunt os, uēter, & plurima ex parte stomachus & intestinum, aut quæ iis proportionalia habentur: plurimorum namque animalium cōmunes partes sunt, per quas transit cibus, & quibus cibi excrementū emittitur. Et cum excrementum hoc, ut antea docuimus, duplex sit, humidum & siccum, quæ partem illam humidi excrementi capacem habent, hæc siccū receptaculū continent: quæ uero hoc habent, non illud etiā habere omnia nouimus. quæ obrem quæ uesicam habent, aluum inferiorem eadem etiā obtinent: at uero quæ aluum habent, non omnia & uesicam possident. Oculos item habent animalium genera omnia, præterquam talpa, (quem tamen modo quodam habere dixerim) & quæ testa integuntur, & si quid imperfectum aliud est, ut uermes. Et per partes quidem animalium differentiæ his modis constitui debent.

De differentiis quæ ab animalium actionibus oriūtur. Cap. XXXV.

ACTIONES animalium plurimæ circa coitum, fœtus procreationem, atque uictus solertiam uersantur: necnon ad frigora & æstus, mutationes denique temporū pertinent: inest enim omnibus ex natura sensus mutationis factæ ex frigore aut colore. Itaque ut homines alij domicilia hyeme repetunt, alij qui amplioris provinciæ principes sunt, sedem pro tempore mutant, ut morā æstate locis frigidis, hyeme tepidis trahant: sic bruta quæ loca possunt permutare, faciunt. Atque alia iuuamē in ipsis consuetis sibi locis comperiūt, alia locum mutāt: iam enim post autumnale æquinoctium, aliqua ex ponto locisq; frigidis fugiunt hyemem futuram: à uerno autem, ex tepida regione ad frigidam sese conferunt, æstus metu futuri: & alia

A alia de locis uicinis discedunt, alia de ultimis (prope dixerim), ut grues faciunt, quæ ex Scythicis campis ad paludes Aegypto superiores, unde Nilus profluit, ueniunt. Quinetiam pisces modo eodem, alij ex ponto aut in pontum tranant alij per hyemem ex alto ad litora teporis gratia ueniunt: contra, æstate ex litore in altum uitantes æstum discedunt. Aues quoque imbecilliores hyberno & gelido tempore discedunt in campos, ut tepore potiatur: æstiuo autem repetunt montes, ut æstu careant. Idem hic affectus, fugiendi scilicet caloris frigorisque exuperantias, euenit iis, quæ temporibus quibusdam se abdunt & latent: ut terrestria quædam hyeme latebras subeunt, tempore iam tepidiore exeunt. Condi autem plurima hyeme, diebus scilicet frigidissimis, uel eo maxime argumento constat, quod minime cum algor est capiuntur. Sed piscium nonnulli æstate etiam latent, ut glaucus. latet aliquorum genus totum: aliquorum partim latet, partim non latet. testacea omnia latent, uerum non eodem modo: absolorum enim latibulum euidentius est: condunt enim se suis testis, ut peccines facere uisuntur: aliqua leuiore tegmine superimposito delitescunt, ut limaces: eorum autem quæ adhærent, non est tam manifesta latitatio. insecta pene omnia hyeme conduntur. Sanguinei quoque generis multa se condunt: ut ea quæ cortice intacta sunt, serpentes dico, laceratos, crocodilos fluuiatiles. Piscium etiam compluribus latere nouimus: alios hyeme, ut coracinum, thum nû: nonnulli æstate etiam latent, uti diximus, ut glauci: auium etiam complures conduntur, ut hirundines. iam enim uisæ sunt multæ hirundines in angustiis couallium nudæ atque omnino deplumes. Quadrupedum quoque quæ animal generant, nonnulla conduntur: ut hystrices, ursi: glires etiam latent in ipsis arboribus. Nonnulla ex iis quæ conduntur, exuunt id, quod senectus *Senectus, uocat, (est autem senectus ueluti cutis ultima, uel cortex, qui ueluti oper-* *uocat.* culum cuti est) ut ex sanguineis ea quæ cortice molliori intacta sunt, serpentes scilicet & lacerti. insecta etiam quædam senectutem exuunt, ut silpha & culex: & ea quarum pennæ uagina continentur, ut Scarabei: & omnia quidem, ubi iam factum est, quod gigni debuerit, exuunt. quædam etiam inter marina senectutem exuunt, ut locustæ, gammafi & cancri. Sed quænam lateant, & quo modo & tempore: atque etiam quo tempore exuant senectutem dictum iam est.

D Ab animalium motu quæ cõstituuntur differentiæ. Cap. XXXVI.

Differunt animalia inter se etiam ipsa motione: animalium nanque alia sede stabili degunt, alia mutabili & uaga. Sedes stabilis in humore tantummodo est: terrestrium nulla statu immutabili uiuunt: at aquatilium plura saxis affixa uitam omnem traducunt: ut conchæ genera complura. Sunt ite quæ & adhærere soleant, & quoties libeat absolui: ut genus quoddam quod urticam uocamus: quippe cum nonnullæ ex iis noctu absolute pascantur. Non desunt complura, quæ cum sint absoluta, mouere tamen se nequeant, ut ostræ. Omnia uero tum natantia tum stabilia, locis eisdem quibus orta sunt, aut similibus degunt: suus enim quibusque cibus in iis est:



uagantur maxime & oberrant quæ carne aluntur. Quæ loco mouentur E animalia, iis initium incedendi omnibus à dextris partibus est : & omnia aut quaternis notis mouentur, aut pluribus. quaternis tantum, quæ habent sanguinem, ut homines binis manibus binisque pedibus, quadrupedes pedibus quaternis, pisces pinnis quaternis : nam & quæ pinnis, aut non amplius binis, aut nullis, ut serpentes, utuntur, quaternis ea quoque notis nihilominus mouentur : flexus enim aut quaterni iis aguntur, aut bini cum pinnis binis. At quæ sanguine uacua, pedibus se pluribus moucant, siue uolucres sunt siue pedestres, iis certe motus per notas plures exercetur : nam & ephemerum pedibus quatuor, pennisque totidem mouetur : quæcunque uero ambulant, omnia pedes pari numero possident. Animalium quoque alia uolatilia sunt, ut aues, apes : alia gressilia, ut quadrupedes, multipedes : F alia natatilia, ut pisces : alia reptilia, ut angues : alia tractilia, ut hirudines. Animal quod uolucres tantum sit, ut piscis natatile solum est, nullum nouimus : at uero quæ gressilia eademque natatilia sunt, complura reperiuntur.

Item eorum quæ pedibus carent, alia incesu undant fluctuant, (ινωχ-  
ιστον Græci uocant) hocque bifariam accidit : quædam namque flexuosis im-  
pulsibus per terram labuntur, ut angues : quædam corpus sursum flectentia  
progrediuntur, (parte enim innitentia priore, contrahunt sese, adducentes  
posteriorem, arcuatimque incedunt) ut cruce quædam. alia in incesu ιλα-  
σασθαι utuntur (ac si per limum trahi dixeris) hoc est præcedere parte prio-  
re progrediuntur, & quod reliquum est corporis ad illam contrahunt : quo  
mouentur modo hirudines & uermes terreni. Animalium præterea quæ G  
loco se mouent, alia toto corpore id præstant, ut salientia : alia per partes, ut  
incedentia omnia. Quæ per saltum sese loco mouent, ut serpentis genus,  
qui iaculus dicitur, nullum pedum ministerium ad eiusmodi saltem mo-  
tionem desiderant : at quæ saltu utuntur, & gressus insuper indigent, cum  
illis saltus satis non sit, iis pedibus opus est.

Incedentia, π-  
ρὸς ἰσχυρὰ.

E Notæ, αμύα partes significare uidentur Aristoteli, per quas motio fiat : libro  
etenim de animalium gressu, αμύα, id est noras uocat & alas, & brachia manusque, in  
auibus atque hominibus, & pedes item in reliquis.

A generatione quæ oriuntur differentiæ.

Cap. XXXVII.

EX omnibus uitæ muneribus, animalium quibusdam nihil præter gene H  
rationem inesse percipitur : quædam uero non tantum procreandi of-  
ficio suis quodque temporibus funguntur, sed in enutrienda etiam prole  
laborant. atque horum quædam cum hoc perfecerint, nullam insuper cū  
prole seruant societatem, sed sibi tantum uiuunt : alia uero ciuilius agunt cū  
prole. Prima igitur pars uitæ animalium, in officio procreandi consistit : al-  
tera in alédo : in his enim duobus studium omnium uitæque uersatur. cha-  
rum enim cuique suaueque contingit, quod per naturam habetur : sequun-  
turque omnia eam uoluptatem quæ secundum naturam est. Sunt autem  
generationes animalium multæ ac uariæ : hoc enim commune animalia  
cum stirpibus habent, quod alia semine, alia sponte naturæ oriuntur, nullo  
cognatio-

A cognationis semine antecedente: quorum alia humo aut stirpe putrescente consistunt, ut plura insecta generantur: alia ex rore, qui frondibus insidat, ut erucæ: alia à limo, ut testaceæ: alia in animalibus ipsis excrementisq; partium gignuntur. Quæ uerò ex semine cognato procreatur, iis omnibus ortus per coitum est, dummodo sexus discrimen id habeant, quod marem & feminam describere potest: non enim in omnibus animalibus, sed in præditis sanguine omnibus, paucis quibusdam exceptis, altorum mas, aliterum femina perfectum euadit. marem appellamus, quod in alterum, feminam, quod in seipfa semen illud prolificum mittit. Et quamquam diuersa sunt animalia mas & femina, tamen specie idem sunt: homo nanque utrunque est. In piscium genere, nonnullæ nec mares nec feminae gignantur. Exanguium etiam quædam marem & feminam habent, ut sobolem eiusdem generis procreant. Alia procreant quidem, sed non sui generis prolem: scilicet quæ non ex coitu animalium prodeunt, sed quæ per se uel in animali, uel in terra putri, uel in stirpe, uel etiam in eorum ipsorum partibus uel excrementis gignuntur: quæ nanque hoc modo per se generantur, si in mares ac feminas descripta sunt, ita generant quidem ea aliquid coitu, sed imperfectum & dissimile, & ex quo nihil amplius gignatur: sed id quod sunt, in nonnullis, sordes persistunt: ut uermiculi ex muscis, ut pulicum aut pediculorum fœtus: id nanque magis declarant naturæ eorum quæ insecta dicuntur. Coitus nec similes omnibus sunt, nec similem in modum aguntur: quæ enim ex sanguineis pedestria uiuipara sunt, & retro urinam mittunt, auersa coeunt: ut leo, lupus, canis: crustacea quoque & insecta eodem modo. Cæterorū, quæ sanguinea uiuipara sunt, magna ex parte modus coeundi idem est, feminā scilicet mare superingrediente: quamquam non omnia simili modo coniunguntur. Aliis enim coitus cōplexu mutuo supinarum partium agitur, ut serpētibus, murenis, & lacertarum generi: alia, ut pisces omnes, exceptis planis cartilaginei generis, ad motis inuicem partibus supinis copulantur. Aues mare feminā superueniente coeunt: quæ mollia dicuntur oribus inuicem admotis, cōplexuq; mutuo brachiorū, libidine explent. Coitum omnium animalium ad hunc modū fieri apertū est. Tempora autem coitus descripta, & ætates certas ad uenere[m] singulis animalibus natura fixit & statuit. Ergo plurium animantium natura uult quidem rem uenerē per id tēpus cū hyemis cessante sæuitia, æstatis clementia oritur: quod sane tēpus ueris est, quo animalia, prope dixerim omnia, & uolatilia, & pedestria, & natantia ad coitum excitantur: sed sunt tamen quæ non eo tempore coeant: uerum prout quæque alere suos fœtus cōmodius possunt, ita tempus sibi conueniens habeant. sunt enim quæ per autumnum etiam & hyemem coeant & pariant: ut nonnulla tum aquatiliū tum uolucrum genera. sicuti enim temporis beneficio, ita & corporis ualetudine propensiora ad uenere[m] redduntur animalia. Homo uero atque etiam plura alia pedestria, quæ cum homine uiuunt, coitum nullo tempore aspernantur, (uidelicet propter teporem & pabuli ubertatē) ut sus, canis, & uolucres quædam. Genus autem auium parte plurima uere ac ineunte æstate coit &

Mas, ἀρρεν.  
Femina, θή-  
λυς.

Auersa, πρὸ-  
γῶν.

parit, excepta alcyone, quæ circa brumam parere solita est: quædam etiam E  
 æstate: aliæ à bruma incunte uere pariunt & incubant. lusciniæ æstate parit:  
 insecta hyberno quoque tēpore coeunt. non desunt quæ omnibus anni tem  
 poribus pariant, ut ex piscibus murena, & ex mollibus sepia. Actate etiam  
 ad coitum differunt animalia: primum enim magnæ eorum parti semen nõ  
 simul incipit, & excerni, & posse generare: sed uis illa prolifica postea acce  
 dit: nouellorum enim in omnibus animalium generibus, prima emissio se  
 minis, aut infœcunda, aut si fœcūda sit, imbecilliora tamen generat & mi  
 nora: quod potissimum in hominum, & quadrupedum animal gignētium  
 genere, atque etiam auium patet: alterum enim prolem minorem procreat,  
 alterum oua edit minora. Actas uero accommodata ad coitum cuique suo  
 in genere, plurima ex parte, fere tempus idem sortitur, nisi quid præmatu  
 ret, & aut ob aliquam rem monstruosam, aut ex detrimento naturæ & uitio F  
 anticipet: ut oues & capræ anniculæ coeunt, atque utero ferunt. mares quoque  
 in ipsis generibus eodem illo tempore incunt. Sues tum mares tum fœmi  
 næ coire incipiunt mense suæ ætatis octauo: sed tamen non omnibus locis  
 eadem ætatis ratio est: iam enim sues nonnusquam tam mares, quàm fœ  
 minæ quarto coeunt mense: sexto tamen ita, ut uel prognerare & educare  
 possint. Ex quadrupedibus itaque uiui paris, aliæ anniculæ & coeunt & pa  
 riunt, ut oues, capræ, canes: aliæ mense suæ ætatis octauo, ut sues, ut iam di  
 ximus: aliæ uero biennes coeunt, ut equus, asinus, tam mas, quàm fœmina  
 coire incipit in trimatu: fert uentrē menses duodecim. Elephātus tam mas,  
 quàm fœmina incipit coire ante annum ætatis uicesimū: incipit enim fœ  
 mina coire anno duodecimo cum celerrime, aut quintodecimo cum lētif  
 sime: mas quinque aut sex annos natus superuenit incūte uere: coitū trien  
 nio interposito repetit. Lacustres & palustres pisces, quinto suæ ætatis mense  
 uterum gestare magna ex parte incipiunt. Coeunt quandoque uel alieni  
 gena, ut in Cyrenēsi agro lupi cum canibus coeunt. Indicos etiam canes ex  
 rigride & cane gigni confirmant. Raro quidem id fit: sed tamen id fieri, &  
 in canibus, & in uulpibus, & lupis certū est: necnon in auibus falacioribus  
 idem fieri uisum est, ut perdicibus & gallinis. In Africa coeunt & generāt  
 etiam quæ genere diuersa sunt, sed quorum tempora eadem ferendi uteri  
 sunt, & magnitudines non multò inter se discrepent. Obseruatum, inquit  
 Plinius, è duobus diuersis generibus nata tertij generis fieri, & neutri parē  
 tum esse similia: eaque ipsa quæ ita nata sunt, non gignere in omni anima  
 lium genere: idcirco mulas non parere. Coitum animalium, quæ non nisi  
 coeundo prognerant, ad hunc modum se habere intelligimus. Generant  
 autem hæc, alia uerine, ut aranei & aliorum insectorum quædam: alia oua  
 G

Ouipara, & ou  
 ting.  
 Viuipara, & ou  
 ipara.

(ouipara dicuntur), ut aues, serpentum maxima pars, & quadrupedes ouipara, & pisces plurimi: alia animal pariunt (appellanturque) uiuipara, ut homo, equus, uitululus marinus, & reliqua quæ pilis integuntur: & quæ cete dicuntur, ut delphini: & ex piscibus cartilaginei, & ex serpētibus, uiuipara. At uero eorum quæ animal pariunt, aut oua intra se prius cōficiunt, ut cartilaginea, aut ilico animal intra se formant, ut homo & equus. Ouiparorū alia ouum

- A ouum edunt perfectū, ut aues, & quæ quadrupes ouum pariunt, & serpentum pars plurima: (oua enim eorum postquam prodierūt, nullum insuper capiunt incrementū) alia imperfectum edunt, ut pisces, & quæ crustata, & quæ mollia dicuntur: nanque eorum oua postquam edita sunt augentur. Quæ ex ouo generantur, fere omnia coitu oriuntur, mare in fœminam emittente semē genitale. Ouum id uocamus, quod ubi in fœtura perfectū est, eius ex parte principio animal consistit: reliquū uero, alimento ei quod gignitur est. Continetur autem ouum ipsum, aut putamine testaceo, & bicolor est, quale auium esse uidemus: aut cute molli obducitur, unicolorque est, quale est cartilagineorum & piscium omnium. Vermē id esse dicimus, ex quo toto nō ex parte aliqua animal totum per subiecti fœtus formationem incrementumq; gignitur. Quæ ex ouo generantur, constat non similiter gigni, atque ea quæ ex uermibus: in ouo nanque oculi primū in capite patent grādes: contra uero in illis euenit, ut scilicet pars inferior maior inter initia sit, oculi & caput postea augeantur. Hic admirari naturam subit, quā bene miroq; deinceps ordine generationem reddit: alia enim & quæ perfectiora sunt, animalia intra se statim generant perfectā, sed tamen quæ foris incrementum recipiunt: alia non statim animalia, sed cum prius intra se ouum pepererint, mox animal edunt in lucem: alia non perfectum animal generant, sed ouum, idq; edunt perfectum, ut aues: alia, ut quæ frigidiora iis consent, generant quidem ouum, sed nondum perfectum: uerū quod foris perficiatur, ut genus piscium squamatum, crustata & mollia.
- C quintum genus, ne ouum quidem ex sese parere potest, nisi quod hæc affectio foris euenit ei, uti infra docebimus: insecta enim primo uermiculum pariunt, qui addito tempore, speciem accipit oui: quæ enim chrysalis appellatur, oui obtinet facultatē, tum ex eo animal nascitur, tertia mutatione finem accipiens generationis. Differunt etiā animalia, tum gerendi uteri tempore, tum pariendi, tum partus etiā numero: semel anno pariunt quedam, ut magna pars syluestrium animalium: alia bis, alia ter, alia sæpius. Dasy-podes & cocunt, & pariunt quoque tempore, & singulis mēsis: & alia uere, alia æstate, alia autumno, alia bruma pariūt: ut inter aues halecyone, ex piscibus mēnides: alia omni tempore, ut homo, uitulus marinus. rursum alia breui à coitu pariunt, ut insecta maxima sui parte, quæ solēt coire: alia diuius uterum ferunt: alia denique singulos fœtus pariunt: alia, binos, ternos, aut quaternos: alia numeroso magis partu fœtificāt. In ouiparo genere sanguineo, quadrupedum ortus uerno tempore agitur: auium syluestres semel magna ex parte pariunt: aliquæ tamen bis, ut hīrudo: aliæ & cocunt, & pariunt omni tempore anni, ut gallinæ: columbæ decies anno pariunt: & columbaceum genus magna ex parte bina parit oua: turtur tamen & palūbes uere, nec plus quā bis pariunt. Piscium alij diebus amplius tricenis uterum ferunt, alij minus. alij item circa æquinoctium uetnum pariūt: aliis æstas, aliis autumnale æquinoctium attribuitur: mēnides bruma pariunt, ut dictum est. Ex iis qui in lacubus fluuiisq; degūt, Cyprini quinquies aut sexies anno pariunt: chalcis ter: reliqui semel edunt oua. In exanguū uero

Ouum, &amp; i.

Vermis, ouo  
lat.

genere, tribus mensibus oua gerunt locustæ: quatuor mensibus squillæ: intra diem decimum quintū parit sepia. Ex uiuiparis delphini singulos magna ex parte edunt, interdum tamen & binos. Sues cicures uterum ferunt mēses quatuor: numerus partus cum plurimum ad uicenos. Oues & capræ magna ex parte singulos: aliquando binos, & ternos, & quaternos. uterum ferunt quinque mensibus, tum oues, tum capræ. Parit canis duodecim cum plurimum: sed magna ex parte quinque, aut sex: unum etiam aliquam peperisse certum est. Gerūt uterum canes Laconicæ sexagenis diebus, aut uno aut altero plus minúsue. sunt & canes, quæ quinta anni parte uterū ferant, hoc est tribus & septuāginta diebus: nonnulla quarta parte anni. Vaccæ decimo mēse pariunt singulos, geminos uero raro. Ferunt uterū equæ menses undecim: pariunt duodecimo mēse, magna ex parte singulos, sed gemellos quoque aliquando. eodem modo asinæ. Camelus fert uterum menses decem. Elephantō ferendi uteri tempus incertum: alij annū & sex menses, alij biennium, alij triennium statuunt. Ceruæ uterum gerunt octo menses: pariunt magna ex parte unum. Vrsæ fert uterum dies triginta: parit tum unum tum duos: sed cum plurimum quinque. Histrix totidem diebus fert utero, & reliqua facit perinde, ut ursæ. Leona singulis annis uere parit, & magna ex parte geminos, sed cum plurimos sex catellos. Vulpes cum plurimos quatuor edit. Lupus fert, & parit ut canis, tum tempore, tum etiā sætus numero: parit ineunte æstate. Felis & ichnemaones tot pariūt numero quot canes. Thos ut canis impletur, & generat numero duos, aut tres, aut quatuor. Murium generatio mirabilis præter cetera animalia maiorem in modum est, tum numero, tum celeritate.

A locis in quibus gignuntur animalia, & in quibus degunt, colliguntur differentiæ.

Cap. XXXVIIII.

AD generationem pertinet & locus: est enim uel locus generationis ut principium, ac proinde à diuersitate etiam locorum differentiæ oritur: ut enim locis nonnullis gigni omnino aliqua nequeunt, sic aliis generantur quidem, sed minora aut pauciora & uita breuiore, nec prospera: serpentes enim & lacertæ corticatæque omnia, in locis calidis, & in mari rubro testata omnia gignuntur prægrandia. In frigidis autem, ut septentrionali plaga, ex animalibus, quæ aut parum sanguinis habent, aut eodē uacant, quedam omnino nō gignuntur: quædam gignuntur quidem, sed minora uitaq; sunt breuioris. Maxima in India gignuntur animalia: indicio sunt canes grandiores cæteris. Plurimum autem discriminis ex ipsa regione oriri certum est, non ad magnitudinem tantum habitūque uegetiorem, uerum ad coitum etiam & partum: ut eadem alibi pluries generent, alibi minus. In uniuerſa Africa non aper, non ceruus, nō capra syluestris est: & locis quoque uicinis discrimen huiusmodi existit, ut agri Milesij locis sibi propinquis cicadæ alteris gignantur, alteris non. Amnis in Cephalinia insulā di rimit, cuius citra alterum latus cicadarum copia est, ultra alterum nullæ. Terræ Bæotia in Orchomenio agro talpæ habentur multæ: at in Lebadio uicino

*Quobus &  
septuaginta.*

*Plinius ca-  
preas dixit.*

A uicino nullæ sunt: neque si aliunde portatæ eò fuerint, uolunt infodere. India quæ sanguine carent, & quæ secessu tempore conduntur, grandiora nimirum illa possidet, sicuti & reliqua quoque animalia, ut modo diximus. In Africa, magnitudo anguium mira, sicut & fertur. In Arabia, lacerti magnitudine cubitum excedunt. In Ponto, neque mollia sunt, neque testata, nisi locis quibusdam pauca. In mari rubro, testata omnia mira quadam magnitudine augentur. In Syria oues sunt cauda lata ad cubiti mensuram: capræ auriculis mensura palmari & dodrantali, ac nonnullæ demissis, ut spectent terram. In Cilicia capræ tendentur, ut alibi oues. In Ægypto aliqua maiora quàm in Græcia sunt, ut boues & oues: aliqua minora, ut canes, lupi, lepores, uulpes, cerui, accipitres: aliqua magnitudine pari, ut cornices & capræ: cuius rei causam attribuunt cibo, qui aliis large aliis parce sit: tum etiam cæli conditio temperaturæ causa est: ut in terra Illyrica & Thracia & Epiro, asini parui habentur: in Scythica & Celtica nulli aut omnino pauci, propter immodicum frigus. Item leones in Europa potius sunt: pantheræ in Asia: in Europa autem nullæ. Bestiæ denique omnes feræ efferratiores in Asia sunt, fortiores in Europa, multiformiores in Africa: quo quidem loco etiam quæ alienigenæ sunt, coeunt & generant, ut ante dictum est. Morum etiam diuersitatem loca efficiunt, ut montana & aspera suas bestias reddunt, & aspectu efferratiores, & uiribus robustiores, quàm plana & molliora. Morsus etiam ferarum & ictus ex locorum diuersitate plurimum differunt: ut in Pharo locisque aliis quibusdam scorpiones non lædunt: at aliis, & præcipue in Scythia multi & magni, & nocui sunt. Anguium quoque morsus per loca plurimum differunt. Genera enim serpentium peregrina aliquanto magis pestifera sunt: maxime quæ æstuosis locis gignuntur. Italia frigidiorisque regiones minus terribiles angues edunt. Atque hæc ita se habent.

De sexuum differentiis, masculini scilicet & feminini.

Cap. XXXIX.

Sexus item masculinus femininûsque distinctus quidem, sed non in omnibus animantibus, est: sunt enim quibus id desit, ac similitudine quadam & parere dicuntur & ferre uterum. In iis enim animalibus quæ uitam stabilem uiuunt, aut omnino iis, quæ testa integuntur, sexus discrimen nullum omnino est: in mollibus uero, crusta operitis, & pedestribus omnibus, tum bipedibus tum quadrupedibus sexus uterque est: atque etiam in aliis quæ animal per coirum generant, aut ouum aut uermem. At uero in genere insectorum & piscium, sunt quæ omnino sexus hoc discrimen alterutrum in partem non habeant. Nulla parte interiore sexus inter se differunt, nisi utero & testibus, atque iis quæ illis adiuncta sunt. Feminis enim omnibus sanguineis intus conditæ habentur hæ partes: maribus autem multiplici differentia euariant testes: aliis enim nulli omnino sunt, ut piscibus, serpentibus: aliis sunt quidem, sed intus: & iis quæ intus continent, non etiam omnibus eodem modo habentur, ut infra docebimus. Maribus in quocunque animalium genere, partes superiores priorisque sunt potiores, ualidiores

Στ. Πικρὸς ὁ  
Παλαῖος.

Sunt tamē quidā qui in rhinocerotū genere marem tantum reperiri existimēt.

& aptiores. Quæ autem dici possunt inferiores posteriorisque, eas fœminæ habent robustiores, tum in hominibus, tum cæteris animalibus omnibus, quæ pedestria sunt atque animal generant. Et fœmina fere inneruior atque infirmior est: à partu tamé fœmina in educanda sobole fere acerbior mare est. In pedestribus sanguineis uiuiparis, maxima ex parte maiores sunt mares quàm fœminæ: at in iis quæ aut ouum pariunt aut uermem, ut piscibus atque insectis, fœminæ maiores suis maribus euadunt. Fœminis sanguis nigrior & crassior quàm maribus est, dummodo cætera adsint pariter, quæ uel ab ætate uel sanitate proficiſcuntur. Et minus sanguis per summa corporis fœminarum est, plus enim parte interiore continetur. Caro quoque humidior est fœminæ quàm maris: pilum etiam habet tenuiorem fœmina quàm mas: uox item fœminis omnibus tenuior & acutior, boue F excepto. Partes autem quas uelut arma natura animalibus dedit, cuiusmodi sunt dentes exerti, cornua, calcaria, & cætera generis eiusdem: eas certe in nonnullis generibus omnino mares habent, fœminæ non habent: uelut generis ceruini, fœmina cornuum inops mutilaque est: & auium nonnullarum quibus data calcaria sunt, fœminæ omnino iis carent: pari modo ut suæ fœminæ dentibus uacant exertis. At in nonnullis generibus sunt quidem hæc sexui utrique, sed maribus potiora, ut cornua tauris robustiora quàm uaccis.

Auictus ratione diuerſa oriuntur animalium differentiæ. Cap. XL.

*Terrestria, uel  
pedestria, πῖδες  
Aquatilia, ἁν-  
δρα.*

*Ἐπιμφορέ-  
ζον.*

**D**Egunt animalia locis disiuncta, alia nanque terrestria, alia aquatilia G sunt: quam differentiam trifariam intelligimus: aut enim recipiendi aeris aut aquæ ratione, altera terrestria, altera aquatilia dicimus: aut quod apta natura sunt seruari temperamento alterutrius, quanquam ærem aquamue non recipiant: aut etiam quod cibum petant, uersanturque utrobique diutius. Complura enim cum recipiant ærem, id est spirant, partusque faciant in terra, cibum tamen à madidis locis petunt, uersanturque in humore partem maximam temporis: quæ sola ἐπιμφορέζον, id est uitam ambigam agere uidentur: quippe eadem & uelut pedestria & uelut aquatica statui possunt. Arcorum quæ humore recipiunt, præter unum cordulū, nullum uel pedestre uel uolatile est, nec cibū sibi ex terra petit: quanquā multa spirabilia pedestrisque generis humore gaudent: & adeo nonnulla ut ne H uiuere quidem disclusa ab aquæ natura ualeant, ut testudines marinæ & lutariæ, crocodili, fluuiatiles equi, uituli marini. Hæc enim omnia nisi aliquandiu spirent, intereunt: & parere educareque solent in sicco. Quæ uero in cetaceo uel in reliquo aquatili genere fistulam gerunt in capite, ut delphinus, balena, hæc natura quadam peculiari, nec aquatilia tantum, sed nec terrestria facile dixeris: siquidē terrestre quod ærem recipit, aquatile quod aquam, secundum naturam est: particeps nanque est hoc genus utriusque, cum & mare accipiat, reddatque per fistulam, & ærem per pulmonem: habent enim hoc membrum & spirant, uerum in utraque diuisionis tam contrariorum generum parte collocari hoc genus absurdum est. Quamobrè aqua-



- A aquatile genus amplius distinguendum uidetur: ut alia accipiant reddantque aquam, ea causa, qua spirantia aerē, quo scilicet refrigerentur: alia propter cibum. Cum enim in humore cibum accipiunt, fieri non potest, quin simul aliquid humoris admittatur: quod admissum, quo emittant, instrumentum habeant necesse est. Quę igitur loco aeris, qui per spirationem attrahitur, humore utuntur, quo scilicet refrigerentur, branchias habent: quibus autem cum cibo humor illabitur, iis fistula in sanguineo genere data *Fistula, uictus* est. Mollibus etiam & crustaceis hoc idem adhibitum est: nam ea quoque humorem propter cibum accipere coguntur. Altero etiam modo aquatilia sunt, (ob temperationem corporis dico & uictum) quę accipiant quidem aerem, sed in humore atatem degant: aut quę recipiant quidem humorem & branchias habeant, sed terram petant, unde cibū accipiant: quale cordulum esse diximus. Sed horum omnium natura quasi peruersa deprauataue uidetur: sicut marium nonnullorum natura feminam refert, & foeminarum marem. Cum ergo animalia trisariam in aquatile & terrestre diuidantur, ut dictum iam est: aut enim recipiendi aeris aquatilis necessitudine, aut corporis temperatione, aut tertio cibi ratione, uictus prorsus discrimen pro his diuisionum membris consequetur: alia enim temperandi corporis gratia, & propter cibum, atque etiam recipiendi aeris aut aque necessitate ita degunt: alia temperamenti uictusque causa tantum. In iis, eorum quę testa operiuntur, quę quidem sua natura immobilia sunt, plurima aluntur humore dulci & potulento, qui tenuior ex aqua salsa elicitur: quę autē mobilia eademque carne uescētia sunt, *καοφαγεύματα* Gręci dicunt & *καυφαγία*, iis uictus ex pisciculis est, ut purpuris: alia & iis quę in mari pululāt uescuntur. Quę crusta integuntur, omniuora sunt: quippe quę & lapillos, & limū, & algā deuorent: atque quędam etiā sterces, ut cancri fluuiatiles: carnes etiam nimirum appetūt. Locusta uel pisces maiores cōvincere possunt. Mollia omnia carniuora sunt: lolligines enim atque sepia pisces uel maiores euincunt: polypi conchulis maxime uescuntur. Pisces fere omnes fœturam suo tempore, alter etiam alterum edit, maiorūque minores sunt praeda: reliqua uictus ratio nō eadem omnibus est. In auium genere, quibus ungues aduncę, omnes carniuorę sunt. In genere etiam non adunco sunt, quę carne uescuntur, ut hirundo. Sunt quę uermiculos cum aliis, tū qui in lignis nascuntur, pascant: alia spinam appetunt: alia frugibus uiuūt.
- D Omnium fere auium, alia uictum à terra petunt: alia à fluuiis & lacu, ut ardeolę: alia mari, ut halcedo & fulica. Genus auium omne cum potu exiguo contentum sit, tum aduncis nullus usus bibendi est, præterquam paucissimis quibusdam, quę & ipsę raro utuntur. Auium cetera sorptu bibūt: sed quibus, collum est longum, intermittunt, caputque resupinant. porphyrio unus morsu bibit. Genus animalium cortice intectum, ut lacerti & reliquę huiusmodi quadrupedes, atque etiam serpentes, omniuorum est: nam & carnem edunt & herbam: sed desiderium iis quoque bibendi exiguum, & reliquis quibus pulmo fungosus est. Quadrupedes quę animal generant, syluestres eademque serratę dentibus, ut leo, lupo, carne omnes

uescuntur. ursus animal omnium est. Cornigera animalia, & quibus E  
dentes ferrati non sunt, omnia fruge herbâque uescuntur, nisi uehementer  
esuriant, sue excepto, qui minime herbe frugumue appetens est, sed radicū  
maxime ex omnibus animalibus. Sunt & inter quadrupedes ferâsque, quæ  
uictum ex lacu & fluuiis petunt, ut fiber, lutris, latæ: at uero à mari nullum  
præterquam uictus marinus. Bibunt, quibus dentes ferrati animalia, lam-  
bendo: atque etiam nonnulla ex non ferratis, ut mures. Quibus autem con-  
tinui, sorbendo, ut equi, boues: ursus neque sorbendo neque lambendo, sed  
morsu. Bibunt cætera quidem magis tempore æstiuo quam hyberno: quæ  
autem in Africa degunt animalia, contra: insuetum namque iis est bibere æ-  
state, propterea quod imbres per id tempus fieri non soleant. Insecta ani-  
malia quibus dentes omnium sunt: quibus autem lingua tantum, humo- F  
rem undique exugendo sua lingua uescuntur: quorum alia omnium sunt,  
quibus gustus omnium saporum est, ut muscæ: alia sanguiuora, ut tabani  
& asili: alia succis plantarum & fructuum uiuunt. Animalium quibusdā  
ruminare in more est, proficiuntque ac delectantur non minus in rumi-  
nando, quam edendo. Ruminant, quæ superiore dentium ordine carent, ut  
boues, oues, capræ. Ex feris nullum ruminare constat, præterquam ea, quæ  
aliquando cum hominibus exigunt, ut ceruus: hunc etenim ruminare pla-  
num est. Sunt etiam de dentatis utrinque nonnulla quæ ruminant, ut mu-  
res potici, lepores & piscis quidam, quem ab ea re *uiscens*, id est ruminalem  
quidam appellant. Talis animantium uictus est.

*Vide an hoc pa-  
cto legendū sit  
apud Aristote-  
lem, Et pisces  
quidā, & quæ  
ab ea re, &c.*

A sensibus quæ oriuntur animalium discrimina.

Cap. XLI.

G

Sensus quidem, ut ante dictum est, omnibus animalibus communis est:  
Saliis tamen omnes, aliis uero pauciores dedit natura. Quæ nanque san-  
guine prædita sunt omnia, omnes habent sensus, nisi quid læsum mutilum-  
ue sit, ut talpa: præterea iis quæ mollia, quæ crusta insecta, & quæ insecta di-  
cuntur, prope dixerim omnibus, sensus omnes insunt. Quæ autem filiceo  
tegmine operiuntur, quāquam tactum (quem omnibus animalibus com-  
munem esse diximus) & olfactum gustumque habere constat, de uisu tamen &  
auditu nihil certi manifestumque habemus: quædam tamen ut echini, tethya,  
glandesque: olfactum minime habere uidentur. Eorum quæ non spirant, alia  
branchiis, alia fistula, alia præcincta, ut insecta, odorē sentiunt. Nec pro co- H  
pari modo genera animalium omnia, sensibus prædita omnibus sunt: sed  
olfactu canes præcellunt, uti quibusdam placet: uisu aquilæ: gustu proto-  
geustæ animalia Indica, unde & nomen acceperunt: tactu serpentes, & quæ-  
dam aues: auditu anseres. Verum Plinio auctore, ex sensibus ante cætera  
homini tactus, deinde gustus: reliquis superatur à multis. Aquilæ clarius  
cernunt: ultrius sagacius odoratur: liquidius audiunt talpæ. Cicero, omnis,  
inquit, sensus hominum multo antecellit sensibus bestiarum: quorum ita  
clara iudicia & certa sunt, ut si optio naturæ detur, & ab ea deus aliquis re-  
quirat, contentane sit suis integris incorruptisque sensibus, an postulet me-  
lius aliquid, non uideam quid querat amplius. Hæc Cicero.

*Quam sint cer-  
ta humanorum  
sensuum iudi-  
cia, plurib. ex-  
plicat Cicero  
libr. 2. De nat.  
deor. et 4. Acu-  
demic. quæst.*

A respiratione

A A respiratione & uoce, animalium discrimina. Cap. XLII.

**A** Nimantium alia accipiunt redduntq; aërem: quæ res respiratio nominatur, ut homo, & quæcunque terrestria habent pulmonem: alia uero minime, ueluti pisces & insectorum genus omne: & his quidem neq; uocis emittendæ, neque locutionis ulla facultas est, sed sonus tantum in nonnullis: differt enim uox à sono, & cum iis tertia res adnumeranda est locutio: gutture (*φάρυγξ* dicunt) parte una, uox agitur: locutio non nisi uocis per linguam explanatio est. Quamobrem quibus animantiū lingua libera absolutaq; non est, neque sermone utuntur, neque uocem emittunt, sed sonū tantum. Insectorum alia murmur edūt, ut apes: alia canere dicuntur, ut cicadæ: nullum molle, nullum crustatum, uel uocem uel sonum mittit naturale. Pisces uocis quidem expertes sunt, sed sonos stridoresq; mouēt, qui uocales esse existimantur: at uero, quæ & linguam habent & pulmonem, si quadrupedes ouiparæ sunt, uocem quidem emittūt, sed exilem: & alia longum sibilum edunt, ut serpentes: alia abruptum & perexiguum, ut testudines: alia uero exilem & imbecillē uocem: rana suum habet ululatum, quā ololyginem nominant. Genus auium uocem mittere potest: iisq; præcipua facultas conficiendæ locutionis, quibus lingua mediocriter lata uel tenuis. Quadrupedū genus quod animal procreat, uocem uarie mittit: neque est quod loqui possit, sed proprium id hominis est: omnium uero uocaliū animalium communis mos est, ut sui coitus tempore potissimum canant & blatterent præter hominem, ut aues tunc maxime plurimāsque emittunt uoces cum coeunt. Differunt tum uoces animalium, tum locutiones tractus ratione & regionis. Et uox quidem acumine grauitateq; maxime innotescit: in iis tamen specie nequaquam discrepāt, quæ generis eiusdem sunt. Ætatis quoque ratione differunt uoces: iunioribus enim quàm uetustioribus fere acutior uox est. Magna etiam ex parte uox marium fœminarūq; differt: eo quòd mares grauius sonant quàm fœminæ: uerū non in omni animalium genere ita agitur: sunt enim in quibus è contrario fit, ut in bubus: nam boum fœmina grauiorem, quàm mas agit uocem: & uitulis grauior, quàm adultis. Quamobrem castratis uox è contrario mutatur: transeunt enim quæ castrantur in fœminam.

A Spiratio, *ἐκπνοή* & *ἐκπνοή*. Vox, *φωνή*. Locutio, *Ἀλλῆλῆς*. Sonus, *ἡσυχία*.  
 DB Longum sibilum, *συνεχμῆς*. Abruptum & perexiguum sibilum, *συνμῆς μικρὸς*, uel potius *συνεχμῆς*. Ololygo, *ὀλολυγῆς*.

Animalium discrimina, quæ à somno & uigilia oriuntur: aut ætate, iuuenta scilicet & senectæ, à uitæ prolixitate & breuitate. Cap. XLIII.

**S**unt uero hæc animalibus omnibus cōmunia, uigilia & somnus, iuuenta & senectus, uita & mors: non tamen pariter omnibus eodemq; modo insunt: omnia enim animalia dormiunt quidem & uigilāt: (nullū enim reperitur, quod uel semper dormiat, uigiletue semper) sunt tamen quæ somno omnino adeo exiguo contenta sunt, ut sæpenumero quemuis lateat, dormiant, necne. Pedestria omnia & prædita sanguine dormire ac uigilare,

*Aquatilium,  
Quod pisces et  
aquatilis reli-  
qua dormiant,  
uide argumenta  
Aristo. histor.  
animal. lib. 4.*

sensu ipso percipiuntur: quibus enim palpebrę adiunctę sunt, conuiuendo E  
obdormiscunt. Aquatiliū quoque somnus apparet, ut piscium, mollium,  
& crusta opertorum, locustarum inquam, & ceterorum generis eiusdem.  
Argumentum uero, quāuis nullum deduci ab oculis potest, quia palpebris  
carent, ipsa tamen quiete cernuntur placida, seu soporata. Insecta etiā dor-  
mire argumentum, quod requiem capiūt, motuq; omni procul dubio ces-  
sant, quod præcipue patet in apibus: quiescunt enim noctu & conticescunt,  
ut nullus omnino bombus sentiat. Item somniare non solū homines, sed  
& alia quædam animalia, ut equos, canes, & boues palam est. Dormiētibus  
sanguinis copia partes exteriores deserit, subit interiores: ita ut adacto cul-  
tello non æque effluere possit. Et ætatem etiam ratione nonnihil discriminis  
accidit: etenim in prima ætate, & admodum iuuenili, sanguis sanie trahit, F  
& copiosior est: in senectute autem crassus, niger & paucus, medium tenet  
in media firmaq; ætate. Concrescit etiam facile senum, uel in corpore san-  
guis, qui per summa est, quod idem nunquam in iuuenibus accidit. Auge-  
scunt animalibus pili in senectute, durioresque redduntur: quod idem un-  
guibus quoque euēnit: piscibus quoq; senescētibus squamę duriores cras-  
sioresque efficiuntur. Quadrupedum etiā uilli lanęue senectute prolixius  
augentur: quanquam rarefcant, fiantq; pauciores. & ungulę quoque ma-  
iores in senectā redduntur, quod idem rostris etiam auium euēnit. Pennas  
gruum in senectā nigrescere perspectum est. Viuunt certe alia diutius, alia  
uero quo nata sunt, eodem die emoriuntur, ut ephemerus: longioris uitę  
sunt alii, quę gressilia sunt, pariter & sanguine prædita, ut homo & ele- G  
phas: & aquatilia terrestribus breuioris uitę sunt. In pedestribus sangui-  
neis uiuiparis maxima ex parte longioris uitę sunt mares quàm fęminę:  
fęminas autem piscium maribus esse uiuaciōres cōstat, eò quod fęminę  
ueteriores quàm mares capiantur. Quę semine abūdāt, & salacia sunt, ci-  
tius senescunt: quę contra, diutius uiuunt: ideoque mulus lōgiorem degit  
uitam, quàm aut equus aut asinus, ex quibus procreari solet. Mares, prope  
dixerim omnes, diutius uiuunt, quàm fęminę: accidit tamen uel ob sala-  
citatem, ut in passeribus, uel ob nimium laborem, ut in iumentis, ut mares  
quidam suis fęminis ocyus senescant.

Differentiæ animalium, quę à moribus constituuntur. Cap. XLIII. H

MORIBUS item animalia distinxit natura: habere enim uim quandam  
naturalem animantes in quauis animi affectione uidentur: hoc est  
prudentia, stultitia, animositate, ignauia, clementia, atrocitate, & reliquis  
habitus generis eiusdem. in quibusdam etiam commune aliquid disci-  
plinę eruditionisq; habetur: atque etiā prudētię imago quædam inest  
in nonnullis: alia enim uicissim inter se, alia ab homine (quę scilicet audi-  
tu non carent) non modo strepēdi, uerum significandi differentias possunt  
dinoscere. Sunt etiam animatum alia ciuiles, alia inciuiles: ciuiles appel-  
lo animātes, quę labori comunicāt: id est, quarum opus communi effici-  
tur operta, ut homo, apes, formica, grus. In omnibus uero generibus, in qui-  
bus

*Ciuiles, πολι-  
τικά.*

- A bus per marem & ſœminam procreatio eſt, mores diſtinxit natura, quibus mas diſſert à ſœmina: quod præcipue tum in homine, tum etiam in iis, quæ magnitudine præſtant, & quadrupes uiui paræ ſunt, percipitur. (mores nanque minorum animalium, parumq; uiuentium temporis, minus ſenſu percipiuntur: uiuaciorum euidentiores ſunt:) ſœminæ enim in iis moribus ſunt mollioribus, miſceſcunt celerius, & manum facilius patiuntur: diſcunt etiam, inuitanturq; ingeniouſius: ut in genere canum Laconico: ſed fere minus quàm mares ſunt animoſæ, uerum malicioſiores, aſtutiores, & inſidioſiores ſœminæ ſunt, atque in nutrienda prole ſolicitiores: mares cōtrā, animoſiores, ferociiores, ſimpliciores, minusque inſidioſi. Pugnant inter ſe ipſa animalia, quæ loca eadem incolunt, atque iſdem uſcūtur cibis: nam ſi ui-
- B ſtus penuria ſit, ſit certe ob eam rem, ut uel eiufdem generis animantes pugnam inter ſe conferant. Et quidam marinos uitulos eiufdem loci pugnare inuicem aiunt, & marem cum mare, & ſœminā cum ſœmina, donec alter ab altero, uel occidatur, uel eiiciatur: idemq; corū catulos facere. Carniuora etiam (Græci *ῥυποφάγα* uocant) oppugnantur à cæteris omnibus: & ipſa cum cæteris pugnat, quoniā uictus iis ab animalibus eſt. Sunt ferarum aliæ ſemper inter ſe inſeſtæ: alię hominum ritu, cum res ita tulerit. Piſcium autem, alij gregatim degunt, amicique ſunt: alij non gregatim, inimicique uiuunt. Conger & muræna caudas inter ſe prærodunt. Polypum intantum locuſta pauet, ut ſi iuxta uiderit, omnino moriatur. Locuſtam cōger, rurfus polypum congre lacerant. Genus ouile amens, & moribus ſtultiffimis eſt. Ferarum quadrupedum cerua non minime prudentia præſtare uidetur: id quod & pariçdo, & ſœtum educando oſtendit. Omnino ratio brutorum magnam refert uitæ humanæ ſimilitudinem: magiſque in minore genere, quàm in maiore uideris intelligentiæ rationem: quod primū in auum genere, hirundo in effingendo conſtruendq; nido, ac pullis educandis oſtendit. Columbi cum pluribus coire nolunt, neque coniugiū iam inde à primo ortu inittunt, niſi cœlebs aut uidua. quin etiam ſœminę parturienti mas adeſt, & cultu, omniq; officio fungitur. Domicilia quoque agreſtes uolucres aptiſſime ad uictum, & proliſ ſalutē moliantur. Sunt item aliæ parentes feliciores, & ſuorum gnatorum diligentiores: alię con-
- C Feliciores, & *καλῶτεροι*.
- D quoque animantibus permulta intelligi poſſunt, nō ſine ſolerti ingenio effici rationē uitæ commodioris: rana nanque, quę piſcatrix appellatur, præterea torpedo & paſtinaca ſeſe abſcondentes piſcantur. Obruunt arena ſeſe & aſelli, & raia, & paſſeres, & ſquatinæ: cumque nullam ſui corporis partē intactam reliquerint, uerberant radiolis ſui oris, quos piſcatores uirgulas uocant, quas piſciculi cum aſpexerint, adnatāt quali ad algas, quibus uſci ſoliti ſunt. Mollium aſtutiſſima ſepia eſt: maxime enim hæc ſuo uicetur atramento, non modo cum metuerit, uerum etiam abſcondendi cauſa. Polypus fatuus quidem eſt, cum ad manum demiffam hominis accedit: ſed prudens rei familiaris, cum omnia colligat, & ſuo in domicilio recondat: ſui etiam mutatione coloris uenatur piſces. Inſectorum operoſiſſimum, &

præ cæteris fere animalibus officioſiſſimum genus fornicarum & apū eſt. E Crabrones item & ueſpæ, & prope dixerim omnia huius cognata generis, & aranei quidam in uitæ muneribus ingenioſiores habentur. In moribus animantium percipi differentias licet: præcipue quidem ad fortitudinē & timiditatem, ad manſuetudinem quoque & feritatem, etiam in ipſo ſylueſtrium genere: leo enim quanuiſ in edendo ferociſſimus ſit, tamen paſtus & fame iam uacans, facilis mitiſque maiorem in modum eſt: elephātus omnium ferarum mitiſſimus & placidiſſimus eſt. E terreſtribus mures, è uo lucibus hirundines indóciles ſunt: cum elephanti iuſſa faciant, leones iugum ſubeant, in mari uituli, totque piſcium genera miteſcant. In marino etiam genere plurima de delphinis narrantur indicia morum placidorum ac mitium. Genera autem quæcunque placida ſunt, hæc eadē quoque fera ꝑ poſſunt reperiri, ut ſues, equi, homines, oues, capræ, canes, boues.

Ab affectuum quorundam immutatione, quæ oriantur animalium differentiæ.

Cap. XLV.

VT quæque animalia pro ſuis affectibus agere, ſic contra, pro ſuis quoque actionibus affici immutariq; moribus ſolent: quin & partes corporis nonnullæ ſæpenumero ratione agendi immutantur. In auium enim genere gallinæ cum mares uicerint, cucuriunt: & exemplo marium tētant ſuperuentu coire, criſta etiam caudaque erigitur. Cuculus etiam immutatur colore, & uocem minus explanat cum ſe abditurus eſt. Complures etiā aliæ immutantur aues per tempora, & colore & uoce: ut merula quæ ex nigra redditur ruſſa, & uocem mittit diuerſam: ſtrepitat enim per hyemem, cum per æſtatem tumultuanter cantet. mutat & turdus colorem, uoce tamen eadē eſt. Luſcinia quoque & colorem per tempora mutat & uocē: & quidem in terra Italia per id tempus, quo ſic immutari ſolet, alio nomine appellatur. Denique aueſtunc maxime plurimæque emittunt uoces, cū coeunt. Colorem etiam mutant & piſces, merulæ & turdi. phuca etiam mutat colorem: cum enim cæteris temporibus candida ſit, uerno uaria redditur. Mutantur uero animantium aliqua, forma & moribus, nō modo per ætates & tempora, uerum etiam caſtratione. Caſtrantur autem ea quibus ſunt teſtes. Gallinaceus ſi perfectæ ætate eſt qui caſtratur, illi criſta palleftit, & cucurire deſinit: neque coitum uenereum repetit: ſed ſi adhuc pul-  
Hlus eſt, ne inchoari quidem ex iis quicquam poteſt cū accreſcit. Quod idē in homine quoque accidere certum eſt: nam ſi puer adhuc excidatur, neque poſt geniti pili creſcunt, neque uox immutatur, ſed ſuum ſeruat acumen: at ſi iam puber, poſt geniti deſluunt pili præterquā pubis: hæc enim quanuiſ minuatur, tamen manet, & congeniti non deſluunt: nemo enim ſpado calueſcit. Quadripedum etiam exectorum uox omniū in ſcæminam mutatur. Omnia denique ſi dum creſcunt, caſtrantur, maiora elegantioraque, quàm incaſtrata euadunt: ſed ſi poſteaquam adoleuerunt & iam incremēto conſtiterunt caſtres, nihil præterea accedere ad magnitudinem poteſt. Cerui ſi cum per ætatem nondū cornua gerunt, caſtrentur, non edunt cor-  
na:

*Alia ſuca.*



A nua: sed si cornigeri exciduntur, non decidunt cornua, & magnitudine eadem seruantur. Et castrata denique auctiora quàm incastrata euadunt.

A ualetudine prospera uel aduersa differentia. Cap. XLVI.

**V**aletudines etiam & morbi per tempora, pro generum diuersitate uarie accidunt, & in totum non eadem omnibus ualetudo existit: uiuunt enim animalia prospere, non eisdem temporibus, nec omnibus æque qualitatum exuperantiis. Iam auibus profunt squalores, tum ad cæteram sanitatem, tum ad partum. At uero piscibus (exceptis quibusdam paucis) imbres conducunt: incommodi contra auibus anni pluuij sunt, piscibus sicci. Et pisces quidam suos morbos habent, ut cyprinus, glanis. Testaceo generi anni pluuij profunt, præterquàm purpuris. Quadrupedum, sues uariis morbi generibus laborant, scilicet raucedine, dolore capitis, alui profluuiio, & grandine: canes, rabie, angina & podagra. Boues gregales morbis duobus tenentur, podagra & struma. Equi gregales morbo immunes sunt, excepta podagra: at uero equi domestici morbis plurimis obnoxij sunt. Asini maxime morbo laborant, quam malidam uocant, Græci *ουλίδα*: elephantum morbis ex inflatione contractis: ægrotant etiam si comedant terram, nisi ea frequenter utantur: necnon profluuiio alui tentantur, & aliis quibusdam morbis. Insectorum maxima pars eo tempore ualet, cum annus humidus est & tepidus. Apibus præcipue nocent bestiolæ quædam, quæ in alueis innascuntur. Discrimen animalium ut prospere contrahere exigant, etiam cum utero C grauescant, existere nouimus: testa enim intacta atque etiam crustata, tunc optima sunt cum grauida, ut locustacea: mollia etiam præstant cum grauida sunt. Et pisces cum impleri incipiunt à coitu, boni omnes fere sunt: sed procedente uteri tempore alij præstant, alij non.

Animalium discrimina, eò quòd commoda magis minúsue, aut incommoda nobis sunt. Cap. XLVII.

**H**ominis causa uidetur natura cuncta animalia genuisse: alia nanque in consortium operum nobis ueniunt, ut ea quæ iumentum nomen à re traxere: quòd nostrum laborem, uel onera subuectando uel arando iuuarent: alia uoluptatis ac redditus & custodiæ causa parari solent, ut ouis, capella, sus, canis. Ouillum nanque pecus & contra frigoris uiolentiam nos D protegit, corporibusque nostris liberaliora præbet uelamina: tum etiam ea sei lactisquæ abundantia, non solum agrestes saturat, sed etiam elegantium mensas iucundis & numerosis dapibus exornat: quibusdam uero nationibus frumenti expertibus, uictum commodat: ex quo Nomadum Geta- rumque plurimi *γαλακτοπόροι* dicuntur. Capra pilos ministrat ad usum nauticum, & ad bellica tormenta, & fabrilis uasa: necnon quædam nationes harum pellibus sunt uestitæ, ut in Getulia & Sardinia. Canis aut custodiæ paratur, propellendis scilicet iniuriis hominum ferarumque: aut uenationi. Mella contrahunt apes, succumque dulcissimum ac saluberrimum, fauósque conficiunt & ceras. alimenta nobis præbent & alia nonnulla, tum



ex suis partibus, tum ex quibusdam, quæ in partibus ipsis continentur aut E  
generantur: cuius generis sunt sanguis, oua, lac, caseus & butyrum. E diuer-  
lo alia, ut serpentes & pisces nonnulli, mortem ilico afferre in cibis ferun-  
tur: & plurima ex animalibus morborum colliguntur remedia.

Ab alimentis, quæ ex animalibus nobis suppeditantur, diffe-  
rentiæ quibus modis constituentur. Cap. XLVIII.

**I**N iis quæ nos alunt, scire oportet hæc inueniri discrimina. Omne ani-  
mal quadrupes domesticum, omnem gradem feram, quales sunt capræ,  
ceruus, aper, onager: omnem grandem auem, quales sunt anser, pavo, grus:  
omnes beluas marinas, ex quibus cetos est, quæq; his pares sunt, alimento-  
rum ualidissimi generis esse: id ualentissimum uoco, in quo plurimum ali- F  
menti est. Caro quæ durior est, inquit Galenus, & crassiorū partium, si pro-  
be concoquatur: alimentū corpori præstat copiosius, quàm quæ humidior  
est ac mollior. In media uero materia numeratur, ex quadrupedibus lepor-  
es: & gallinaceum genus, phasiani, perdices, attagenæ, columbæ, merula,  
turdi, auiculæ omnes à minimis (ut inquit Celsus) ad phœnicopterū. Item  
pisces omnes, qui salem non patiuntur, solidius saliantur: uel ut Galeno pla-  
cet, pisces omnes & litorales & pelagici: qui neq; glutinosum habeant suc-  
cum, neque insuaue quicquam, aut uirosum referant. Imbecillissimā uero  
materiam esse tradunt, ex auibus, eas quæ in montibus uictitāt: sturnos sci-  
licet, turdos, merulas, columbasq; & passerēs, qui in turribus degunt: ex pi-  
scibus eos, qui in saxis uitam agunt, ut iulides, phucas, scaros, merulas, tur- G  
dos. Sed quauis hæc ita discreta sint, tamen etiam quæ sub eadē specie sunt,  
magna discrimina recipiunt: alia nanque res, alia uel ualentior est, uel infir-  
mior. Siquidem ex auibus, quæ in media specie sunt, ualentior ea quæ pedi-  
bus, quàm quæ uolatu magis nititur: & ex iis quæ uolatu fidunt, firmiores  
sunt quæ gradiōres, quàm quæ minutæ sunt, ut ficedula & turdus. Inter do-  
mesticas uero quadrupedes leuissima suilla est: grauiissima bubula: itemque  
ex feris, quod maius quodque animal, eò robustior ex eo cibus est. Piscium-  
que eorum, qui ex media materia sunt, quibus maxime utimur, grauiissimi  
sunt, ex quibus salsamenta quoque fieri possunt, qualis lacertus est: deinde,  
qui quanuis teneriores, tamen duri sunt, ut aurata, coruus, scarus, oculata,  
tum plani: post quos etiam leuiores, lupi mulliq;: & post hos sunt omnes sa- H  
xatiles. Leuiorem cibum præstant pisces, quàm uolucres: & hæc leuiorem  
quàm suilla: quæ inter domesticas quadrupedes, ut modo diximus, le-  
uissima est. Neque uero in generibus rerum tantummodo discrimē est, sed  
etiam in speciebus ipsis: quod & pabulo fit, & ætate, & membro, & solo, &  
cælo, & habitu affectionē. Nam animalia omnia quibus abunde suppe-  
tunt idonea alimenta, longe seipsis euadunt in alendo præstantiora: quem-  
admodum si desint, multo sunt deteriora. Et quadrupes animal omne, si  
lactens est, minus alimenti præstat: item quod tenerior pullus cohortalis est:  
in piscibus quoque media ætas, quæ nondum summam magnitudinē im-  
pleuit: nam alimentum humidius, ut distribuitur, ita etiam celerius discuti-  
tur.

*Galenus de  
nictu rat.*

*Apabulo.*

*Ab ætate.*

A titur. Deinde ex eodem sue, ungulae, rostrum, aures, cerebellum: ex eodem *A membro.*  
 agno hedoue cum pectiolis totum caput, aliquanto quam cætera membra  
 leuiora sunt, adeo ut in media materia poni possint: & ex eodem sue pedes,  
 quàm imum crus leuiores sunt, & hoc quàm reliquæ partes: ex auibis col-  
 la, ala: ue recte infirmis cibis annumeratur. Quod ad solum uero pertinet, *A solo & cælo.*  
 leuior piscis inter saxa editus, quàm in arena: leuior in arena, quàm in li-  
 mo: quò fit, ut ex stagno uel lacu, uel flumine eadem genera grauiora sint,  
 leuiorq; qui in alto, quàm qui in uado uixit. Omne etiam feru animal do-  
 mestico leuius est, & quodcunque humido cælo, quàm quod secco natum  
 est: quandoquidem ea quæ in montibus uiuunt, temperameto sunt siccio-  
 re, atque eorū caro minime pituitosa aut lenta est: quæ uero in locis aquo-  
 sis & campestribus degunt, humidiora sunt, & extremetosa magis. Eadem *Ab habitu.*  
 omnia pingua quàm macra: recentia quàm salsa: noua quàm uetusta plus  
 alimenti habent. Tum idem magis alie iurulētum, quàm assum, magis as-  
 sum, puàm frixum, ut Celsus prodit. Ouum durum ualentissimæ materiæ  
 est: molle uel sôrbile, imbecillissimæ. Fere uero sequitur, quò ualētior quæ-  
 que materia est, eò minus facile concoquatur: sed si concocta est, plus alat,  
 ut dictū est. Et imbecillis hominibus, rebus infirmisimis opus est: medio-  
 criter firmos media materia optime sustinet: & robustis apta ualidissima  
 est. Plus deinde assumere ex leuioribus potest: magis in iis, quæ ualentissi-  
 ma sunt, temperare debet: uerum hæc potius ad medicinam pertinent,  
 διαμετρικῶς scilicet.

C A Cara humidior, suillam carnem tradit Galenus ualentissime nutrire. Cōsidera.

B Ex auibis, has aues inter ea recenset Galenus, quæ in tenui uictus ratione conue-  
 niunt: at Celsus aues omnes à minimis ad phœnicopterum, in media materia reponit.

C Suilla. Omnium ciborum, inquit Galenus, plurimū nutrit caro suilla: idemque in  
 ratione uictus analeptice, id est renutritoria, à piscibus, ac deinde ab auibis ad carnes  
 suillas statim uictum mutat. A Et quodcunque uide an ita legēdum, sit apud Cel-  
 sum: Et quodcunque secco cælo, quàm quod humido natum est: sed nihil muto.

Alia quædam ab alimentis quæ nobis præstant  
 animalium discrimina. Cap. XLIX.

D Neque hæc sola quæ diximus, discrimina sunt, sed etiam alia boni suc-  
 ci, alia mali sunt, (ἀγαθὰ & κακὰ Græci uocāt) alia stomacho ido-  
 nea sunt, alia aliena: alia facile concoquuntur, alia difficilius: alia inflāt, alia  
 ab hoc absunt: alia intus facile corrumpuntur, alia minime uitiantur: alia  
 mouent aluum, alia supprimunt: alia citant urinam, alia tardant: alia succū  
 procreant crassiorē, alia tenuiorē: alia glutinosum, alia mediocrem: si-  
 cut alia magis excrementosum gignūt, alia minus. Boni succi sunt, ex qui-  
 bus probus gignitur sanguis: ut aues piscesque fere omnes, præterquam qui *ἐν γυμνῶ.*  
 in lacubus, paludibus, fluuiisq; uictitāt limosis, alioue quouis modo uicia-  
 tis. Quadrupedū carnes, si bene cōcoquatur, & in iis præcipue porcina quæ  
 ætate media est: lac omnium penē aliorum ciborum optimū procreat suc-  
 cum. Agrestium animalium caro succum efficit meliorem, quàm domesti-

corum. Boni succi sunt, inquit Celsus, omnis uenatio, omnes aues, quæ ex E media materia sunt: ex maioribus quoque, et, quas supra memorauimus. medij inter teneros durosque pisces, ut mullus & lupus. In summa, omnis pinguis caro, omnis glutinosa, omne iccur, ubera, rostra, & aliæ partes ex carnes ut uenter, intestina, uulua, & omnes extremæ partes, & caudæ succum gignunt, quàm carnes minus bonum. Mali uero succi sunt, quæ sanguinem efficiunt minime probum, sed humoribus uitiosis exuberantem: sunt autem & quæ frigidiora sunt, & pituitosa: & quæ calidiora biliosaque: & quæ melancholico succo abundant. Sunt uero inter animalia huius generis, pisces omnes, qui ex tenerissimo genere sunt, aut ij rursus, qui nimium duri, uirosique sunt: ut ferè quos stagna, lacus, limosiue riui ferunt, quiue in nimiam magnitudinem excesserunt. Mali succi est, & ouilla caro: caprina uero, & F acrimoniam habet. Hircorum caro deterrima est: arietum deinde & taurorum. In omnibus autem iis, ut castratorum meliores, ita pessimæ sunt seniorum carnes: his nihilo meliorem succum gignit ceruina caro. Lepores crassiorem quidem sanguinem generant, probiorem tamen succum, quàm aut bouilla caro; aut ouilla. In his sunt, & caro domestica permacra: & omnis caro salsa, omnèque fassamentum, atque animalium omnium caro, quæ in lacubus, paludibus, fluminibusue limosis uictum habent: præsertim si urbis cuiuspiam populose purgamenta, ut balnearum, latrinarumue, aut culinarum, in eas aquas defluant. Stomacho idonea sunt (inquit Celsus) omnis uenatio: atque utraq; uel assa, uel elixa: ex domesticis animalibus, bubula, si liquid ex cæteris sumatur, mactum potius quàm pingue: ex sue ungula, rostra, aures, uulua: duri ex media materia pisces, ostrea pectines, mu G rices, purpura, cochlea. Aliena à stomacho sunt omnia falsa, omnia pingua, cerebrum omne, & omnes medullæ. Ex his autem intelligi potest, non quicquid boni succi est, protinus stomacho conuenire: neque quicquid stomacho conuenit, protinus boni succi esse. Facile in uentre concoquuntur pisces, maxime saxatiles: auium genera omnia, si cum quadrupedibus conferas. Ex quadrupedibus, suilla caro facillime concoquitur, uitulina facilius quàm bubula: hedina, quàm caprina: & omnium eorum carnes quæ adhuc adoleseunt, facilius concoquuntur, quàm quæ ætate declinant: & hesternum, quàm recens necatum, facilius concoquitur. Caro caprina, bubula & ceruina difficilior concoquuntur: & sues cum senuerint, & anno H sa omnia: anserum, turdorum, merularumque, & auicularum caro: quibus adhuc durior est turturis, palumbi & anatis caro: magisque pauonis & turdi: raia, leuiria, squatina, dracones, cuculi, trachuri, muli, & ex piscibus alij quidam: cochlea, & ex cæteris testaceis, ea quæ duriorem habent carnem, ut purpura, buccina, crustacea omnia, & quæ mollia uocantur. Minima inflatio fit (inquit Celsus) ex uenatione, aucupio, piscibus, conchyliis, ouis, uel mollibus uel forbilibus. Inflant autem omnia pingua. Minime intus uitiantur aues, & ea potius duriore, aurati pisces, scari: neque hi solum, sed etiam loligo, locusta, polypus. Itemque bubula, omniff que dura caro: eademque aptior est, si macra, si falsa est: omniaque, fassamenta, cochlea,

Extrema partes, trunculos has uocat Celsus.

καλέματα.

Ευσμαχα.

κακόςμαχα.

Ενσπλη.

Αύσπλη.

Αφύτα.

Φυσίδη.

Δύσπλη.

- A**ta: cochleæ, murices, purpuræ, paruulæ chaneæ, & testacea alia quæcunque duram habent carnem. Dantur uero bis tære elixa iis, quibus ob humoris cuiuspiam uitium corrumpitur in uentre cibus. Facile autem intus cor-  
rumpuntur lactentia omnia, teneri pisces, ostrea, lac, caseus, & uetus & re-  
cens. Aluum mouent lac & lactentia omnia, cochleæ, ostrea, pelorides,  
echini, museuli, & omnes fere conchulæ, maximè que ius earum: falfamen-  
ta, omnes teneri pisces, scpiarum atramentum: si qua caro assumitur pin-  
guis, eadem uel uirulenta uel elixa, aues quæ natant. Cõtra, astringunt du-  
ra oua, magisque si assa sunt, minutæ aues, merula, palumbus, magisque si  
in posca decoctus est, grus: omnes aues, quæ magis currunt quàm uolant: le-  
pus, caprea: iecur ex iis quæ seuum habent, maximè que bubulum, ac seuum  
**B** ipsum: caseus, qui uehementior uetustate fit: in eadem carne, assa potius  
quàm elixa. Vrinam autem mouet, ex uenatione maxime lepus, pectan-  
culi, purpuræ, & quæ coriphia uocantur. Ad tenuem uictus rationē ido-  
nea sunt, pisces saxatiles, auiculæ montanæ: quæ enim in montibus degunt  
animalia, omnia siccior præbent alimentum, minúsque pituitosum ac len-  
tum. E diuerso sanguinem crassiorē procreant, pisces grandiores  
Græci uocāt, id est cetaceos) cuius generis sunt thumni, anguilla, cochleæ,  
ostrea, & testaceum genus omne: & quæ mollia uocantur, ut lolligines, se-  
piæ, polypi: earo ceruina, caprina, bouilla, leporina, porcina. Lentum glu-  
tinosumue succum gignunt fuilla atque agnina caro, tendines omnes, &  
quæ circa labra sunt partes atque lingua. Scire autem oportet, quæcunque  
**C** crassum glutinosumque succum procreant, si recte in uentre ac iecinore  
coneoquantur, optimum sanguinem efficere. Medium autem inter tenuē  
crassumque succum gignunt, gallinarum, phasianorum, perdicuni, attage-  
narum, merularum, omniumque paruarum auium earo. E piscibus, tam li-  
torales quàm pelagici, gobij, murenæ, buglossi, & quicunque neque lento-  
rem habent neque sctorem, neque aliàs insuaues sunt. In omni autem ge-  
nere, ad salubrem uictus rationem præferuntur animalia quàm exercitatis-  
sima, & quæ cibo siccior æreque purissimo utuntur: iis quæ aut otiose de-  
gunt, aut humidiorē alimēto, ærēque impuro crassòque uiuunt. Et ex pisci-  
bus eliguntur, qui carnem teneram habent & friabilem: qui uero aut durā  
aut lentam glutinosamue, reiiciuntur: sicuti & qui ex tenerrimo genere  
**D** sunt: & ut paucis rem absoluam, duobus hisce indicij, quod scilicet mol-  
les sunt & friabiles, omnium animalium carnes perpenduntur: quibus e-  
nim utrunque inerit, tuto usque ad saturitatem eduntur: cui uero neutrum,  
ab eo penitus abstinentium iudicāt medici. Quod si cui alterum solum in-  
sit, hoc genus quoque fugiendum admonent: nonnunquam tamen, ob a-  
liorum inopiam in usu cibario esse solet, sed citra satietatem acceptum: his  
saltem qui sanitati tuendæ student. In eibis quoque pituitosum succum ge-  
nerant alia, ut testacea, earo agnina: alia melancholicum, ut bouina, capri-  
na, & præsertim hircina taurinæque. Et nonnulla excrementosum pro-  
creant succum, ut palumbi, anseres, & aliæ, quæ in paludibus aut stagnis ui-  
uunt. Etitant aues. Poreina caro & ouilla, atque omnis nouellorum & domesti-

corum animalium caro, & eorum quæ otiose uiuunt: piscesq; qui in lacu- E  
bus aut fluuiis limolis degunt, atque cetacea omnia. Nonnulla minimū  
excrementi habent, ut syluestrium animalium caro, & eorum quæ in sic-  
cioribus locis uisitant: colla animalium & caudæ & alæ. Quin & ipsa  
præparazione (quod ad alimenta attinet) differunt animalia: reddūtūque  
nonnunquam & aliis: aut seipsis meliora deterioraue. Apparamus autē ea,  
sicuti & alios cibos: aut apponentes quippiam, aut aufertentes, aut modo  
quodam immutantes. Sordes eluuntur: ingrati uero si quid inest saporis,  
aut in humore macerando aufertur, ut falsugo, aut elixando: quæ enim ue-  
hementer amara aut austera sunt, si in aqua elixentur, exuperantem illam  
qualitatem exuunt: acria uero & mordacia in aceto diluto. Assorum quo-  
que & elixorum uirus fœtorūque, aut succi ipsius malitia, si qua adsit, partim F  
aufertur, partim uero immutatur, & ab igne, & ab iis, quæ cuique accom-  
modata sunt condimentis. Hæc Diocles. Differūt elixa ab assis, quod hæc  
sicciora, illa humidiora sunt, ut Galeno placet atque Ruso: contra Aristo-  
teli, elixa assis aridiora sunt, assorumque externæ partes internis sicciores:  
cum in elixis è diuerso, extremę humectiores sint. Vt rite assentur, quæ car-  
nosa aut pingua sunt, copiosiore indigent igne, lēto autē, quæ macra aut  
sanguinis expertia. Non parū carnis discrimen contingit, si sale macere-  
tur: sæpe nanque fit, ut animal quod sua natura sit humidum, salis ui red-  
datur alio, quod siccum natura sit, aridius: & quæ edulia dura sint, & sua na-  
tura sicciora, eadem sale macerata, reddantur ob nimiam siccitatem cibo  
inepta: sicuti contra, quæ excrementis abūdēt, succūmq; in se pituitosum G  
contineant undique permixtum, eadem sale macerata euadent meliora.  
Sunt quoque eadem sapore grata, & tenuis uictus rationi idonea, sed à sto-  
macho aliena: & succum gignunt non bonum, aluūmq; perturbant.  
Discrimen quoque in iis nō paruū uel hinc oritur, quod alia duriores  
habent carnem, alia mollem & ueluti fluidam, sicuti mediocrem alia. Rur-  
sum alia carnosā sunt, alia præpingua, & nonnulla graciliora macraue: &  
quædam iamdiu, quædam uero non ita pridem sale condita sunt. Sed de  
falsuris plura aliàs.

A medicamentis, quæ nobis præstant animalia, quibus modis con-  
stituantur differentiæ.

Cap. L.

H

N On alimenta solum uarie nobis præbent animalia; sed & medicas ui-  
res suppeditant plurimas. Rerū nanque omnium parēs, nullum ani-  
mal ad hoc tantum ut pasceretur, aut alia satietet, nasci uoluit: quin artes  
salutares inseruit & uisceribus: quippe cum surdis etiam rebus inferuerit,  
tum uero illa animæ auxilia præstantissima, ex anima alia esse uoluit, con-  
templatione ante cuncta mirabili. Exsiccant, humectant, calfaciunt, refri-  
gerant, tum ex animalibus nonnulla, tum ex eorum partibus. Sunt præter-  
ea quæ durities emolliant, ut adipēs atque medullæ: quæ concoquant, συ-  
μπιησι. Græci uocant, ut celsypus & butyrum. Pus mouent adeps uitulinus,  
porcinus & butyrum: per halitum digerunt nōnulla, ut coagulum omne,  
adeps

A adeps leoninus, pantherarum & hyænæ. Abstergendi uim habent, testaceorum omnium testæ, sepium ossa, erinaceorum ustorum cinis, lactis serum. Caustica uis cantharidi, buprestis, atque pityocampæ: totis nanque animalibus partim uistis, partim uero crudis nonnunquam abutuntur medici. Torpedinem integram capiti admotam eius dolores sanare tradunt. Terreni uermes triti, in potu ex passio urinam ciunt: impositi præcisos neruos glutinant. Limaces si totæ cum testis urâtur, admittis galla, omphacitide ac pipere albo, dysentericis mirifice profunt. Hippocampi cremati cinis cum pice liquida aut axúgia illitus, alopecyas replet. Per hæc potissimû, & si quæ huiusmodi alia possunt animalium generibus tribui, eorum differentias constituendas censemus.

B

## DE ANIMALIVM DIFFERENTIIS LIBER III.

De animalibus, quæ sanguine prædita sunt, partium exteriorum differentia. Cap. LI.



C VÆ in singulis animalium generibus repertiuntur differentia explicandû iam est. Amplissima animalium genera, ut dictum est, hac ratione inter se differunt, quod hæc sanguinea sunt, illa exarigua. Sanguine prædita sunt, ut homo: quadrupedes, tum quæ animal, tum quæ oua pariunt (dixerim hæc *ζωόντα*, id est ouipara, illa *ἠσώντα*, id est uiuipara) atque etiã aues, pisces, cete: & inter terrestria, quæ pedibus carent, serpentes. Caput habent omnia animalia sanguine prædita: hoc, ut dictum antea est, superiorem in omnibus obtinet situm, corporis sui ratione: at homo solus partem istam habet respondentem parti sublimi uniuersi, cû prona spectent reliqua fere. In capite paucis animalium, nisi uolucris, apices. Cornua multis quidem & aquatiliis, & marinorum, & serpentium, uariis data sunt modis: sed quæ iure cornua intelligantur, quadrupedum tantum uiuiparorum generi. Habent profecto oculos omnia præter talpam, quam modo quodam etiã habere dixerim. Et candidum oculi magna ex parte simile in omnibus est: at quod nigrum dicitur uariat: aliis enim atrum, aliis admodum casium, aliis fuluum, aliis caprinum est: & omnibus fere oculi in suo cuiusque genere unicolores sunt, ut bouum nigri, ouium aquini: aliorû rufi toto genere aut casij: nonnullorum caprini, ut caprarum generis: at hominû oculos uarios uersicolorésque esse euenit. Cæterorum animalium, equus maxime uersicolor est: aliqui enim casij altero oculo nascuntur, quod nulli fere ex cæte-



ris bestiis euenit manifeste: ut quorum oculi recens natorū nō plus, quā E  
 unum colorem habent sua natura. Genus hominum, quadrupedum tam  
 uiui parorum, quā ouiparorum, & auium, oculos uisus custodiendi gra-  
 tia integunt, sed uarie: quæ enim animal pariunt, geminam habent palpe-  
 bram, & conuiuere utrāque solent. Aues grauiorē, & quadrupedes ouipa-  
 ræ palpebra inferiore conuiuent: columbæ autem & similia, utrāque. Pi-  
 sces palpebrā non habent, sicuti neque insecta aut crustacea. Cilium habet  
 palpebris adiunctum omnia, quæ obtinent pilos: aues, & quæ cortice inte-  
 guntur carent, ut quæ pilos habeant. Auriculæ alijs sunt, alijs defunt: mea-  
 tusq; patent quibusdam audiendi, ut iis quæ penna aut cortice integuntur.  
 Quæ animal statim pariūt omnia auriculas habēt, excepto uitulo marino,  
 & delphino, & reliquis cetaceis: pisces uero auditus nullum continent mē- F  
 brum manifestum. Cætera suas auriculas omnia mouent, uerū homo unus  
 aurem non mouet. In iis quæ spirant animalibus, olfactus instrumentum  
 modo quodam euariat: quæ enim uiui para sunt, quibus maxillæ longæ ex-  
 eunt in acutum, iis nares in rictu appellato continētur: cæteris explanatio-  
 hæc pars habetur maxillis adiuncta: at elephātus peculiarem hanc partem  
 præ cæteris sortitus est animalibus. Aues uero & serpentes, & quæcunq; ex  
 quadrupedibus sanguinis compotes ouiparæ sunt, foramina quidē narium  
 ante os habent, sed non ita explanata, ut nares appellari possint, nisi spirandi  
 officio. Nares defunt iis quæ non spirant: aërem enim hac quoq; parte red-  
 dimus atque accipimus: efficiturq; sensus olfaciendi per spirationem in iis  
 quæ obtinent nares. Naribus labra subiacent iis, quæ simul & dentes habēt G  
 & sanguinem: auibus enim cibi armamentiq; gratia rostrum osseum habe-  
 tur, non nares. Maxilla cum duplex sit, ut ante dictum est, superior scilicet  
 & inferior, mouent animalia omnia maxillam inferiorem, crocodilo flu-  
 uiatili excepto: is enim unius superiorem mouet. Homo & uiui paræ qua-  
 drupedes maxillam inferiorem sursum deorsum, atque in latera agitant: pi-  
 sces uero, & aues, & ouiparæ quadrupedes sursum deorsumq; tantum mo-  
 uent. Oris officium omnibus commune cibus conficiendis est: robur non-  
 nullorum peculiare est: sermo aliorum: spirandi etiam usus (iis scilicet quæ  
 spirant) per os accidit. Fit itaque ut os alijs compressius, alijs amplius habeatur:  
 quibusdam enim cibi tantum conficiendi, & spirandi, & loquendi gra-  
 tia os datum est: atque iis compressius est: alijs auxiliij gratia: iis, si dentibus H  
 sunt ferratis, rescissum. Cum enim tota eorum uis in mordendo sit, hiatum  
 oris ampliorē esse necesse est: plenius enim morsum insigunt, quod amplius  
 rescissum os sit. Piscium quoq; mordacibus, & carniuoris tale os est, sicuti  
 nō carniuoris in arētum se colligit. Aues, quod rostrum uocatur, pro labris  
 & dentibus habent. Dentium serie os continetur & constat: horum natu-  
 ra communi quidem officio ad cibum conficiendum adiuncta est: quibus-  
 dam tamen seorsum roboris gratia, tum ad inuadendum, tum ad defendē-  
 dum, ut quæ ex feris natura carniuora sunt: alijs auxiliij tantum causa data  
 est, scilicet ne male ab alijs afficiatur: quibus simul & auxilio & robori sunt  
 dentes, hæc aut exertos habent (χαυλίειντα uocāt) ut sus: aut acutos pectina-  
 tim

ῥύγχος.  
 ῥίς.  
 ῥάμπος.

χαυλίειντα.



- A tim sese stipantes, unde ferratis dicuntur esse dētibus, *αερερόδοντα* Græci dicunt, ut pisces fere omnes. Dentium itaque tria genera, ferrati, aut cōtinui, aut exerti : ferrati pectinatim cōeūtes, ne contrario occurſu atterantur, ut serpentibus, piscibus, canibus : continui, ut homini, equo : exerti, apro, hippopotamo, elephāto. Qui canini dicūtur, sunt ferratis longissimi. Continui aut utraque parte oris sunt, ut equo : aut superiore primores non sunt, ut bubus, ouibus, omnibūſque fere quæ rumināt. Nulliſimul & ferrati & exerti sunt dentes : nec ulli, cui cornua, exerti. piscium omnibus ferrati, præter ſcarum. Maribus dentes plures, quā feminis, ut in genere hominum, ſuum, ouium, caprarum pater : uerum in ceteris nondum exploratum eſt. Quibus plures, hæc uiuaciora magna ex parte sunt : quibus pauciores & rariores,
- B hæc magna ex parte uitæ sunt breuioris. Cæteris cum ipſis naſcuntur dentes : homini poſtquam natus eſt ſeptimo menſe : reliquis perpetui manent, mutantur primores homini, leoni, iumento, cani, & ruminantibus : maxillares nullum animal mutat. Cæteris ſenecta rubefcunt : equo tantum candidiores ſiunt. Lingua in ore palato ſubiaceet : ſed terreſtribus fere omnibus modo cōſimili, cæteris diſſimili, tum eorundem ipſorum, tum terreſtrium comparatione. Hæc aut lata eſt, aut anguſta, aut medioeris ( quæ quidem optima & explanatiſſima eſt ) item aut abſoluta, aut conſtricta, qualis tortorum & balborum eſt, Græci *Μέλις* καὶ *ῥαχίς* uocant. Homo linguam habet abſolutam, molliſſimam & latā : quadrupes, quæ animal pariunt, duram, craſſam, nec adeo abſolutam. ſerpentes & lacerti longā habent, & biſi-
- C dam. piſcium generi data eſt lingua imperfecta, oſſea, nec fere abſoluta, ſed adhærens. Linguae color uariuſ eſt : perinde nāque eam, ac partem aliquam eſſe exteriorem putandum eſt, qualis manus aut pes eſt, quāquam ore operiatur : itaque cum animantium colore uariarū, cutis non ſit unicolor, cutis quoque linguam ambiens uaria erit. Linguam illam minorem operiendi miniſtram, quam *ὠδὴ γλωττίδα* Græci uocāt, quam etiam linguæ partem aliquam eſſe diximus, ea tantum habent, quibus pulmo, & cutis pilo inteſta, non cortex, non penna operimento eſt. Nulli enim ex iis, quæ ouum pariunt, ut aues & quadrupes, ſuperimpoſitā eam ſuæ arteriæ continet : ſed meatum ipſum arteriæ, modo contrahunt, modo laxant, pro ſui commodi deſiderio : atque ita efficitur, ne quid pōderis in pulmonem delabatur. Collum capiti ſubiaceet, iis quæ id habent animalibus : nō enim omnia habent, ſed ea tantū, quibus aſpera arteria productior eſt, atque gula. Aſperam autem arteriam habent omnia, quæ pulmonem : eadem quoque & gulā habēt. Ea uero quæ carent collo (ut piſcium genus) gulam hæc manifeſtam nō habent : & quidem à ſitu oris continuo uenter eſſe poteſt, pulmo non poteſt. Collum itaque omnibus uiuiparis eſt : ouiparorum aliis eſt, aliis deſt : quæ enim ſpiritum extrinſecus non accipiunt, carēt hac parte. ſerpētum etiam genus collū minime, ſed proportionale colli habere uideri poteſt. Hoc cæteris animalibus flexibile, & uertebriſ compactum eſt : at lupo & leoni perpetuo oſſe riget. Quæ alimēta ſibi à terra ore ſuppeditant animalia, collum habent longitudine cruribus æquale : at homo, & quæ illi ſimilia ſunt ani-

καὶ ἡ οὐρ  
ἀλνυλῶ.  
Theod. & πὶ  
νίμῃ ἀβolutā.

malia, breuius. Aues item quibus longa sunt crura, & collum longum, & E  
 præterea palmipedibus nonnullis: quibus breuia crura, iis collum breue fe-  
 re. Pectus homini latum, quadrupedibus arctius: auibis pectus acutum,  
 carnosumq; omnibus est. Mamma omnibus negata est, quæ animal nequeat  
 generare: nec uero uiuiparis omnibus data est: sed iis tantum, quæ protinus  
 animal intra se formant: nec primum ouum, deinde animal. Quæ pilis inte-  
 guntur, omnia mammas habent: & præterea cetera in aquatili genere. At ea  
 quæ oua pariunt, aut ouo intus concepto animal post in lucem excludunt,  
 hæc & mammis carent, & lacte, ut pisces, ut aues: lac enim fit iis fœminis,  
 quæ animal statim intra se generat. Mammas homo fere solus è maribus  
 habet: cetera animalia mammarum notas tantum. Mamas item uarie habe-  
 ri certum est: nam & inter se ipsa quadrupedes, & ab homine mammarum F  
 differunt ratione: aliis enim mammae in pectoris parte priore sunt binæ, bi-  
 nisq; papillis: ut homini: elephantis sub armis duæ, tam mari quam fœmi-  
 nę perquam exigua: ursæ mammas habent quaternas. Aliis mammae inter  
 fœmina binæ, papillæq; binæ, ut ouibus: aliis papillæ quaternæ, ut uaccis.  
 Quibusdam nec in pectore, nec in fœminibus mamas, sed in uentre habē-  
 tur, & quidem plures: uerum non omnes pares, ut canibus, ut suibus. Cum  
 itaque cetera id genus habeant plures, pantheræ quaternas medio uentre  
 gerunt: camelus quoq; in uentre mamas duas cum papillis quatuor habet, ut  
 bos: leonæ etiam duas in uentre. Umbilicū omnia habent, quæ uel utero ui-  
 uiparis, uel ouo ouiparis excluduntur: sed auibis iam adultis, hic delitescit  
 incertusq; est. Membrorū etiā, quæ ad uenerē coitum accommodata habē- G  
 tur, discrimen plane est: genitale mariū, quæ animal gignunt, aliis foris est,  
 ut homini, equo, & aliis multis: aliis intus, ut delphino. Quibus foris est, iis  
 aut ante habetur, ut homini, & reliquis multis: aut retro. Quinetiā iis qui  
 ante gerunt, aut penis & testes absoluti pendent, ut homini: aut alio adhæ-  
 rent & penis & testes: & aut plus aut minus absoluuntur: non enim pariter  
 apro & equo penis absoluta est: nec uero eodem modo ad alium omnibus  
 continetur, sed aliter iis qui ex aduerso mingunt, aliter iis qui ex auerso.  
 Aliis itaque, ut diximus, testes absoluti pendent, ut equo: aliis non sunt ab-  
 soluti, ut apro: elephantus non foris conspicuos, sed intus conditos habet.

Maris instrumentum alterum ab altero differt pro discrimine corporū:  
 aliis cartilaginofum carnosumque est, ut homini: aliis neruofum, ut came- H  
 lo, ut ceruo: aliis osseum, ut lupo, uulpi, mustellæ, uiuerræ. Augetur etiā &  
 minuitur hoc membrū sine ulla ualitudinis mutatione: partim enim ner-  
 uum, partim cartilaginem habet: itaque & contrahi potest & extendi, atq;  
 etiam flatus capax est. Parte eadem utitur natura, tum ad humidi excrementi  
 exitum, tum ad re uenerē: in sexu tum masculino, tum etiam fœminino,  
 in omni uiuiparo genere. Atque hos quidem in usus omnia id genus, tam  
 fœminæ quam mares genitale habent, quo & excrementum humidum se-  
 cernatur: quoq; maribus genitura, & fœminis partus emittatur: parte scili-  
 cet priore atque superiore, quam sit excrementi sicci meatus: diuersus enim  
 est in iis meatus, quo excrementum siccum & quo humidum exit. Omni-  
 bus

A bus autem quibus deest humidi excrementi secretio, & quæ genitali carēt, (etiam ouiparis, quæ uescam habent, ut testudinibus) meatus idem siccæ excrementi, qui & feminis coitusque foris pertinet: intus uero alter iuxta habetur: quæ quidem similiter tam in fœminis eorum, quàm in maribus sunt. Caudam omnia fere non solum uiuipara, sed etiam ouipara habent: nam etsi quibusdam magnitudine membrum id caret, tamē aliquid prominet, quod caudam describere possit. Homo unus cauda uacat: nates habet, quod nulli quadrupedū datum est. A collo & capite crura priora habentur: sed homo uice pedum priorum, brachia, & quas manus dicimus, habet, ut aues alas. Quadrupedibus autem pro brachiis & manibus, crura priora subdita sunt: posteriora uero bina omnibus gressilibus esse necesse est. Nullum quod pedibus constet, excepto homine, crura habere carnosâ perspectum est: sed nervosa ossulentâque sunt, carne autem deficiunt. Coxarum etiam carne exuberante in clune uacant omnia, quod in genere auium conspici apertius potest, at in homine contra. Homini pedes omnium maximi proportionem magnitudinis: fœminis tenuiores in omni genere. Pedes quibusdam digitati: quibusdam uero solidi, sicuti bisulci aliis. Ex iis quorum pedes in digitos finduntur, nonnulla quaternos digitos habent, ut aues: alia quinos, ut homo, elephantus. Ex quadrupedibus uero nonnullæ pedes priores quinis distinctos digitis habent, posteriores quaternis: sed quæ parua inter digitatas sunt, in posterioribus etiam quinos digitos obtinent. Ungues habent omnia fere quæ digitos, uti infra explicabimus. Humeri

C armisue contra, quàm cubiti aut crura priora flectuntur omnibus, quæ ea possident: coxæ etiam contra quàm suffragines. Flectūt autem crura priora fere contra, atque posteriora: sed cætera è contrario, quàm homo membra inflectat: quadrupedes enim, quæ animal generant, priores pedes ante se flectunt: posteriores uero in auersum. Aues etiā suos inflexus similes quadrupedibus uiuiparis agunt: at ouiparis quadrupedibus, ut crocodilo, laceratæ, & reliquis generis eiusdem crura, tum priora, tum etiam posteriora retro flectuntur, paulum in latus uergentia. Homo brachia retrorsum flectit, quanquam ita, ut paulum uergant in latera interiora: crura ante contrahit recte. Sed quod ante tam priora, quàm posteriora inflectat, nullū est.

Homo cum ad iusta incrementa peruenit, contrā atque cætera fere animalia, quæ sanguine consent, partem superiorem habet minorem, quàm inferiorem: partem superiorem intelligi uolo, quantum de capite ad eam pertendit partem, quā exitus patet excrementis: inferiorem autem, quantum ab ea ipsa subsequitur reliquum corporis. Animalibus ergo quæ pedibus inniti natura uoluit, crura posteriora, partem complent inferiorem: quæ autem pedibus carent, iis caudæ & quicquid uice caudæ similisque habetur, pro parte inferiore est. Et tales quidem perfectis iam incrementis, animantes euadunt: discrimen autem in crescendo est. Homo enim priusquā adultior sit, partem superiorem corporis habet maiorem, quàm inferiorem: & quò per ætatem amplius augetur, eò contrā euenit, ut scilicet inferiora sint superioribus longiora. Sunt quæ ex proportionem, incrementa partis u-

ἀλλὰ τοῦ  
καὶ οὐκ ἔχον-  
αι τὴν σῶλον.

Minorem, i.  
ἀστέω.

triusque capere soleat, ut canis. Nonnulla primum parte superiore minora E sunt, post maiora cum creuerint, eadem parte euadunt, ut iumenta. Partes exteriores sanguineorum animalium, quibus differentiis inter se dissonet, explicatum iam est.

C Sanguinea, uel sanguine prædita, *σαῖμα*. D Cæsum, *καυκίον*. Fuluum, *χρυσόν*. Caprinum, *αἰσώπιον*. Aquini, *ὠδαρῆς*. Rufi, *χρυσόπιον*. Varij uersicolorisq; *πολύχρον*. F Rictus, *ρύγχις*: *ρύγχις* fit homini tantum: *ρύγχις* & in canibus & aliis quadrupedibus: *ρύγχις* in auibus dicitur: Aristoteles tamen & in auibus *ρύγχις* dixit. D Aspera arteria, Plinius aliter distinxit: Ceruix, inquit, nulli, nisi quibus utraque hæc, scilicet gula atque arteria: exteris collum, quibus tantum gula: sed quibus ceruix è multis uertebraisq; orbicularim ossibus, flexilis ad circumspectum articulorum nodis iungitur: leoni tantum & lupo & hyænz singulis rectisq; ossibus rigens. E Pectus homini tantum latum, inquit Plinius, reliquis carinatum, uolucris magis. C Quam F suffragines, *ἢ ὁμοίαν γονάτω*, id est, quàm poplites aut suffragines.

Interiorum partium discrimina in animalibus, quæ sanguine prædita sunt. Cap. LII.

EXterioribus uero, cerebrum omnibus animantibus datum est, quæ sanguinem obtinent, ut ante dictum est: hoc ut adipe pinguescentium pinguiusculum est, uelut suis sebo obseorum squalidiusculum sentitur, ut ouis. In collo tendit arteria omnibus ad pulmonem, gula ad uentrem perfertur, transigens septum transversum, in iis scilicet quæ hæc habeant: pisces enim arteriam illam asperam non habent, & magna ex parte gula carent. Situm quoque utriusque, gulæ scilicet & arteriæ, similem habent G omnia, sed discrimine species earum partium affert. Viscera eorum propria sunt, quæ sanguinem habent: nulli enim exanguium animalium uiscus ullum est: & quædam certe omnia habent, quibusdam aliqua desunt. Cor enim & iecur omnibus animalibus sanguine præditis necessaria sunt: reliqua uero quibusdam desunt. Et in omnibus sanguine præditis primum omnium membrorum gignitur cor, ut Aristoteles author est: & in eo est innati caloris principium, sicuti in exanguibus, in eo quod est cordi proportionale. at contra Galenus cor posterius iecore formari contendit. Statim uero cum consistunt quæ sanguinem habent, exiguaque admodum sunt, deprehendi cor, & iecur sine dubio possunt: & in ouis triduo cubatis puncti iam magnitudine apparent: necnon in partibus aborticiis perquam exi H gua cernuntur. Et in partuum prima generatione, statim cor palpitare cernitur. Et uarie quidem hæc habentur: neque enim cor simile habet ea, quæ corde prædita sunt, neque aliud, prope dixerim ex uisceribus ullum. Cor, ut modo diximus, omnibus est, quibus sanguis: estque prorsus in medio pectore in homine, & omnibus præterquam piscibus suo turbinato mucrone tendit in priorem partem. Discrimina cordis, quæ amplitudine, exiguitate, duritia, mollitia existant, uel ad mores pertinent aliquatenus: quæ enim sensu hebetiori sunt, cor habent durum & spissum: quæ uero sensu ualent, mollius: quæ autem pauida sunt, iis cor grandius est: cor enim magnum proportionem fere omnibus est, quæ aperte timida sunt, aut propter metum

- A metum malefica: at audentiora fidentioraque, minus aut mediocre. Pulmo non omnibus datus est: quæ enim branchias habent, ut pisces, carent pulmone: quod nanque idem simul & pulmonem habeat & branchias, nulum adhuc animal uisum est. Verum quæ spirant, omnia pulmonem habent, ut sanguinea pedestria omnia: & aquatilia nonnulla, ut balena. Pulmo omnium bipartitus esse solet: uerum in iis quæ animal generant, distinctio non æque apparet, minimèque in homine: at in ouiparo genere, ut in auibus & quadrupedibus, quorum partus oui primordio inchoari solitus est, pars altera pulmonis multum discissa ab altera est, ita ut binos habere pulmones uideantur: atque à singulari arteria partes in utrūque pulmonis latus duæ dependent. Pulmonis differètia uaria est: aliis enim sanguineus magnusque, aliis minor, fungosus, & minus habens sanguinis: quæ enim uiuipara sunt, maiore, & copia refertum sanguinis habet: quæ contra ouipara sunt, quales sunt lacertæ, testudines, serpentes, atque aues, exiguum & sicciorè, sed aptum ampliari atque extumescere cum inflatur: & proinde desiderium iis etiam bibendi exiguum est. Septum transversum habent omnia, quæ sanguinem obtinent, æque ut cor & iecur, quæ omnibus insunt, ut iam diximus, sed uarie: iam enim iecur aliis multifidum est, aliis simplicius, uel in eorum genere quæ uiuipara sunt: sed longe magis piscium iecinora & quadrupedum ouiparorum, tum inter se ipsa, tum ab aliis dissident. Auium iecur maxime simile est iccori uiuiparorum: puro enim & sanguineo colore exhilaratur: at uero quadrupedum ouiparorum iecinora, maxime parte pallidiuscula sunt. Iecur si non fissum est, dextro latere totum continetur: sin à principio usque fissum est, uelut in iis quibus nullus aut exiguus admodum lien, & ueluti notæ tantum gratia habetur, in iis, inquã, iecur bipartitum est, & dextro lateri maior pars applicata est. Quibusdam uero partes ita sepositæ sunt, ut bina esse iecinora uideantur, nec eadem origine contineri: ut inter pisces galeorum præcipue generi: & inter quadrupedes, leporum generi cuiusdam. Iecur è uisceribus adipeum nonnullis consistit, ut inter aquatilia cartilagineis: quorum iecinoribus colliquatis oleum facimus. Lien magna ex parte, omnibus quibus sanguis est: sed magnæ parti eorum, quæ non animal, sed oua pariunt, lien usque adeo exiguus est, ut propemodum sensum effugiat: quod magna in parte auium, & quadrupedibus ouiparis experimur. Vt
- D lienis magnitudo, ita neque color idem omnibus inest: quippe leo, canis, omniaque fortia & calida animalia nigrum admodum: sus uero humidioraque & frigidiora magis candicantem habet. Fel etiam habet maior pars animalium quibus sanguis: idque aliis adnectitur iccori, aliis uero intestinis, ut piscibus quibusdam. Et aliis quidè deest, ut quadrupedibus quibusdam uiuiparis: & inter cetacea, delphino. Aues autem piscesque omnes fel habet: & quadrupedes quæ oua pariunt, dixerim in uniuersum omnes, aut plus, aut minus fellis fortuantur. Hæc Aristoteles. Galenus uero, quæ iecur habent, inquit, iis & lien omnino inest, & meatus, qui bilem recipiant: etsi uesica ipsa, qua bilis colligitur, non sit omnibus concessa. Renum & uesicæ similis ratio est: omnibus enim quæ sanguineum habent pulmonem, utrunque

membrum natura tribuit: quæ autē oua pariunt, ut aues, piscesq; & serpen- E  
tes, renibus uesciaq; carent. Quadrupedum etiam ouipararum, una testu-  
do marina habet: iis enim tantum ea tribuere uoluisse natura uidetur, quæ  
pulmonem haberent sanguineum, quæ omnium maxime animalium siti-  
bunda sunt. Ventrem habent omnia situ quidem simili, (septo enim trans-  
uerso continuo subest) magnitudine tamen ac specie dissimili: quadrupe-  
des enim uiuiparæ cornigeræ altera maxilla dentatæ, quaternos habent si-  
nus, quæ quidem & ruminare dicuntur: at uero quæ uiuiparæ sunt, & de-  
tatæ maxilla utraque, uentrē simplicem paruumq; habent, ut homo, canis,  
sus. Differentiam autem duplicem fere omnia recipiunt, quæ utrinq; den-  
tata sunt: alia enim canino similem, id est paruum, nec multo ampliorem  
intestino, leuēque intus: alia suillo, qui amplior est, mediocres quosdā ha- F  
bens cancellos rugāsque, ~~ut aues~~ Græci uocant: atque hæc tam in maiore, q̄  
in minore animalium genere: sed discrimen in iis quoq; magnitudine, fi-  
gura, corpulentia, exilitatēque oritur. In ouiparis etiam, quadrupedibus sci-  
licet, serpētibus atque piscibus eadem fere ratio est: uenter enim iis unicus  
& simplex, sed figura uaria est: & piscibus etiā appendices exeunt circa uē-  
triculum, aliis plures, aliis pauciores. Aues etiam inter se ipsas, & à ceteris  
discrepare animalibus uentriculi ratione apertum est: aliis enim ingluuius  
præposita uentriculo est: aliis ingluuius deest: nec desunt, quibus uētricus  
ipse similis sit ingluuici: at parti plurimæ carnosus callosusq; est. A uentre  
natura intestinorum posita in omnibus est: differūt autem inter se magni-  
tudine, crassitudine, replicamentis. Sunt certe maiora intestina non utrin- G  
que dētatis, nec immerito: nam ipsa ita dentata, omnia sunt auctiora: pau-  
ca enim parua in eo genere habentur. Est uero intestinum, aliis quidē sim-  
plex & partibus omnibus simile, ut piscibus, aliis uero dissimile: quibusdā  
enim, parte qua uētri iungitur, laxius est, qua desinit arctius, ut canis: sed ta-  
men maiori animalium numero arctius parte superiore est, latius inferiore.  
Quæcunque enim intestina habent minus recta, sed anfractus orbēsque  
plures continētia, iis omnibus in latius tendunt: & quod colon uocatur ha-  
bent, & cæcum quiddam ac tumidum: mox arctatur, & in anfractus com-  
plicatur. Ab hoc rectum ad exitum usque excrementi pertendit: quæ quidē  
pars aliis pinguis, aliis sine pingui est. Quæ igitur continentiora esse ad cibi  
desiderium conuenit, hæc sua in aluo inferiori, neque intestinorum sinus H  
laxiores magnosque habent, nec intestino utuntur rectiore, sed quod anfra-  
ctus orbēsque plures contineat: laxitas enim intestini auiditatem auget cibi:  
rectitudo accelerat auiditatē. Indēque fit, ut animalia quæ uel simplex, nec  
adeo in anfractus conuolutum habent intestinum, uel conceptacula inte-  
stinorum ampla, cibum aut copiosum capiant, aut celerius repetāt. Appē-  
dices habent quædam infra, parte intestini extrema: ut aues, & ex uiuiparis  
etiam animalibus nonnulla. Lactes quoque & omentum habent omnia,  
quæ sanguinem: sed alia pingue, alia macilentū: oritur id, & depēdet in iis  
quæ animal generant, eademq; dentata utraque parte sunt, à medio uētre,  
qua ueluti quædam futura ducitur (inest enim & in uentre, ut in corde, su-  
tura



- A turæ uestigium quoddam) nec fecus in iis quæ altèto dentiũ ordine carent, à maiore uentre depender: in aliis quoque animalibus sanguineis uentriculo intestinisq; & iis quæ sub septo sunt, uisceribus prætenditur: maximum hoc habent homines & simia. Quæ uero partes ad generationẽ ministrant, feminis omnibus intus conditæ habentur: maribus enim multiplici differentia euariant: aliis enim testes nulli omnino sunt, ut piscibus, serpẽtib; nulli deniquè quod pedibus careat, testes ad sunt, nisi intra se formare animal possit, ut delphinus: aliis sunt quidem, sed intus quibuscumq; ut auib; quibuscumq; foris dependent. Et iis quæ intus continet, aut lumbis adheret cetero sedem renum, ut auibus & quadrupedibus ouiparis: aut in ultima alui parte priore conduntur, ut delphino ex iis quæ pedibus uacant, & elephantino ex iis quæ quadrupedes sunt: omnibus enim quæ animal generant, testes ante habentur, uel intus, uel extra, præterquàm erinaceo. Quibus itaque testes intus continentur, iis protinus cum meatibus seminariis intus firmantur: quibus autem foris sunt, horum quibuscumq; ut modo diximus, absoluti pendent, ut homini aliis non sunt absoluti, sed aluo adherent, ut apro. Quæ intus continet suos testes, eos nulla cute habent obductos: quæ autem foris, hæc coniectos in conceptaculum, quod scortum uocamus, gerunt. Omnibus autem quæ oua edunt, siue bipeda, ut aues, siue quadrupeda sunt, testes lumbis annexi infra septum continentur, uel candidiores, uel pallidiores, uel nulis admodum tenuibus circumdari. meatus singuli de singulis pertinent, eademque coeunt supra ostium excrementi, sicuti & in piscibus serpentibusque: atque is meatus, qui ex coitu amborum consistit, genitale est: quod in minoribus latet: in maioribus uero, anserem dico & reliqua huiusmodi, euidentius est, cum recens inierint. Iis quæ foris testes habent, meatus utrinque bini à uasis illis maximis, quæ per dorsum feruntur (uenam dico magnam atque arteriam, quæ aortam uocari diximus) deorsum pertedunt ad eam partem, quæ *σπινθη* dicitur: est autem *σπινθη*, ut nomen ipsum indicat, testium superimposita capiti, ex qua meatus quidam ueluti fistulae feroso quodam humore plenæ in testes permeant, suiq; partem quadam exiguam ipsis distribuunt, atque ita testibus committuntur. A capite deinde ipsorum testium meatus utrinque oriuntur singuli, superioribus illis spissiores atque neruosiore, (meatus uocant, aut uasa seminaria: aliqui uero *περὶ τὸν οὐτὸν* *καὶ τὸν σπινθη*, quasi uaricosos dixeris) qui inde progressi multifariamque sese flectentes, in idem postea coeunt, & ceruicem subeunt genitalis, humorem iam habentes in se candicantem, quæ *σπινθη*, id est genitura dicitur, quæ ab epididymi ad penis meum defert. Quæ uero testibus carent, ut serpentes & pisces, meatus & ipsa seminarios continent binos, qui de septo exorti latus spinæ utrinque perreptent coeantq; superne, & ad spinæ locum in unum, atque ita ad ostium excrementi finiant. Testes animalium, & quæ seminaria dicuntur uasa, ita se habere cognitum est. Pars autem seminarum ea, quæ semen recipit, non meatus, tractusq; quidam est, sed uterus amplior. Vteri autem bipartiti omnium sunt: sed nec eodem situ habentur, nec similes omnium sunt: sed differunt, tum eorum quæ animal generant inter se, tum



ab illorū uteris, quæ ova pariunt. Situs uteri, aliis infra longius a septo trās- E  
uerso, iuxta genitale, ut mulieribus, & omnibus quæ animal non solum fo-  
ras, sed etiam intra se generant, & piscibus qui ova edūt: aliis iuxta septum  
transuersum, ut auibus omnibus, & piscibus qui animal pariūt, atque qua-  
drupedibus ouiparis. Serpentes tam ab aliis supra dictis, q̄ inter se differre  
apertū est: uiperæ nanq; uni uulua similis, ut cartilagineis: aliis uero serpeti-  
bus tēdit uulua prolixior modo corporis, exorsa inferius ab uno meatu cō-  
tinua diductaq; utrinq; in latus spinę, quasi duplex meatus usq; ad septum.

Sunt & omnes uteri, qui infra iuxta genitale continētur, ueluti bifariam  
diuisi, in sinistrum scilicet & dextrum: initium uero unum est & commu-  
ne ostium, uidelicet ceruix, carnosā admodum cartilagineāque, parti plu-  
rimā auētissimāque animantium tributum. Sunt partes uteri, Eudemus, F  
καρῶναι, ἢ κα-  
ρῶτες. πλακταί, id est cirros, Diocles καρῶτες, id est cornua dixit, Praxagoras & Phi-  
lotimus κέλπες, id est sinus uocarunt: mulierisque uterū δὲ κέλπες dixerunt,  
id est binos habere sinus, in quibus & fœtū contineri existimabant: uerum  
quæ multos simul habēt fœtus, ut sus, sinus quidem habere multos uerum  
est, in quibus & fœtum gestent (sinus enim tot in utero reperias, quot ha-  
bet fœmina ipsa mammas.) Mulier autem & cætera animalia quæ uterum  
muliebri similem habent, ut capra & uacca, non in cornibus illis (quippe  
quæ multo minora sunt, quàm ut fœtum continere possint,) sed in toto u-  
teri spatio fœtum habere conspiciuntur. Validiores esse eas uuluas, quæ  
animal contineant necesse est: quamobrem omnes hæ carnosæ sunt: quę au-  
tem ad septum iunguntur, ut auium, & præterea piscium uteri, exceptis car- G  
tilagineis, membrana constant, & tenues sunt. Vulua omnibus, quæ & in-  
tra se & foras animal generant, super aluum posita est: quæ ova pariunt, iis  
lumbis adhæret: quæ animal edunt in lucem, cum intra se ova generant,  
ut cartilaginea, iis anceps ratio est: nam & lumbis adiūgitur ea pars uulvæ,  
qua ova continentur, & supra intestina ostiū eius sustinetur. Et partes qui-  
dem dissimiles animalium, quæ sanguine prædita sunt, hunc in modum  
se habere constat.

G Cor, Cōuenit inter omnes (inquit Solinus) eorda primū ex uniuersa formari ear-  
ne, eaq; in diē quintum & sexagesimū crescere, deinde minui. H Sinus laxiores ma-  
gnosque, διευχέλιες μεγάλας. Appendix, ἐκφώνες, ἢ ἐκφώνες. C. Meatus, Hæc ex Galeni  
sententia afferuntur: nā, ut Aristoteli placet, nullam partē meatū testes complent, sed H  
adiecti pendunt eo modo, quo pondera textrices telis adnectunt, ut motū excrementi  
genitalis stabiliore faciant: his enim detractis meatus intro se retrahunt. Hæc Aristot-  
eles. Vas seminarium uel meatus seminalis, ἡ σῆνις, ἢ σπέρματικὴ, ἢ πῖρος σπέρματικὴς.

Similarium partium differentiæ in animalibus sanguineis.

Cap. L I I I.

Similarium uero sanguis potissimum cōmunis animalibus sanguineis  
Somnibus est, ut ante dictum est. Habet & genus animantium sanguinis  
compos uasa illa maxima, quæ aliarum quoque uenarū arteriarumq; ini-  
tia sunt, eo quo diximus modo. Nam reliqua uenarum copia non simili ra-  
tione in omnibus est: neque enim animalium partes eodem modo aut ead-  
dem

**A**dem in omnibus habentur. Nec uero æque in omnibus patet uenarum series: sed potissimum in iis constat, quibus sanguinis copia & præcipua magnitudo est. Nam in minutis, sanguinis uel inopibus, uel per naturam, uel per immodicam corporis obesitatem, haud æque inspicere possunt: alteris enim meatus quasi canales multo intersepti limo uix conspiciuntur: alteris parua, eadēque fibræ potius quàm uenæ habentur: una tamen, quam maiorem ex præcipua magnitudine cognominauimus, potissimum euidens in omnibus etiā minutis animalibus est. Copia sanguinis in primis iis animalibus inest, quæ animal & intra se formant, & in lucem edūt: mox iis sanguineis, quæ pariunt oua. Præpinguia omnia sanguinem quantius purum, tamen paucum habent: & quò plus pinguedinis, eò minus possident sanguinis: pingue enim omne exangue est. Discrimina uero sanguinis ad sanguinem, qui melior sit aut deterior, hinc habentur: alius enim tenuior, alius crassior est: & alius syncerior, alius turbulentior: item alius frigidior, alius calidior, tam in eodem animali, quàm in diuersis. Quātum enim sanguinis parte continetur superiore, his differentiis discrepat cum inferiore: inferioribus nanque partibus crassior & atrior est, quàm superioribus. Animalium, fortiora quibus sanguis crassior: sapientiora, quibus tenuior: quibus minimus hebetia. Dormientibus porro sanguinis copia partes exteriores deserit, subit interiores, ita ut adactò cultello nō æque effluere possit. Fæminis sanguis nigrior & crassior quàm maribus est, dummodo cætera adsint pariter, quæ uel ab ætate uel à sanitate proficiuntur: & minus sanguinis per summa corporis fæminarū est: plus enim parte inferiore continetur. Ætatum etiam ratione sanguis discriminetur, tum in modo, tum in genere, (hoc est in quantitate & qualitate) recipit. Etenim in ætate iuuenili, saniem trahit & copiosior est: in senectute autem crassus, niger, & paucus: mediū tenet in media firmâque ætate. Concreuit etiam facile senum, uel in corpore sanguis, qui per summa est, quod idem nunquā in iuuenibus euenit. Quibus datus est sanguis, iisdem omnibus nerui adiuncti sunt: sed quæ nullos habent articulorum flexus, priuatæque pedibus & manibus sunt, iis prætenues incertiæque habentur: quapropter in piscibus, qui iuxta pinnas positi sunt, ij præcipue ueniunt in conspectum. Ossa habent, quæ sanguine prædita sunt omnia, aut aliquod, quod uice fungitur ossis, ut spinam, cartilaginem: ossa, inquam, caluariam, maxillas, dentium genus, uertebras quæ spinam constituunt, & pectoris ossa: nullum enim animal est, quod circa uentrem os habeat. Sunt item ossa humerorum, & quæ scoptula appellantur, & quæ iis annexa dependet brachiorum & manuum ossa saltem in homine: & modus idem compaginum uel in iis est, quæ crura habent priora. A coxendicibus ossa iam crurum oriuntur, quæ græco nomine *καλκίς* dicuntur. Ab iis ossa pedis subiacent. Quæ igitur ex sanguineis pedestribus animal generant, hæc ossa non multo diuersa habent scire, sed ad proportionem tantummodo, duritia, mollitie, magnitudine, figuræ uel aut multitudinis discrepantia. Costæ homini tantum octonæ, inquit Plinius, suis, denæ, cornigeris tredecim, serpentibus triginta. Ossium item

animalis eiusdem, alia medullam intra se continent, alia minime: sunt enim nonnulla, quæ suis in ossibus nullam omnino medullam habere uideantur, ut leo. Cæterorum animalium sanguineorum ossa aut paulo differunt, ut auium: aut proportionem eadē sunt, ut piscium. Qui enim inter eos animal generant, cartilaginem pro spina habent, (*χρυσόλευκος* Græci uocāt) ut ea quæ cartilaginea appellantur: qui autem oua pariunt, spinam continent, quæ perinde ut spina dorſi in quadrupedum genere habetur: omnia nanque animalia quæ sanguinem habent, dorſo constant, aut osseo, aut spinoso, aut cartilagineo. Cætera ossa aliis insunt, aliis desunt: ut enim partes corporis quæque habentur, ita ossa quoque ad partes accommodata habentur: quibus enim crura & brachia desunt, iis pernæ aut culinæ etiā desunt: nec uero quibus partes eadem quidem sed dissimiles sunt, eadē ossium ratio seruatur: sed aut pluriſ minorisue modo differūt, aut proportionem. Ossia igitur ita se habent. Cartilago terrestrium, quæ & sanguinem habent & animal gignunt, nullo foramine hincit, nec ossium more medullam continet: at uero aquatiliū cartilagineis, quod per dorſum proportionatum ossibus tendit, cartilago est, humorem in medullæ speciem continens. Cartilagine constant gressilium, quæ animal gignunt, auriculæ, nares, extremæque ossium nonnulla. Ungues habent omnia fere, quæ digitos: alia uero, quæ scilicet solidos pedes habent, ut equus, pro unguibus ungulas obtingunt: quæ autem bisulcos, chelas. Quæ habent ungues, aut rectis unguibus sunt, ut homo: aut aduncis, ut inter pedestria leo: inter uolatilia aquila: simiæ imbricati sunt, & homini lati. Pilos habent, quæ pedestria eadēque uiuipara sunt. cortice autem integuntur, quæ ouipara sunt pedestria: squama uero pisces tantum. Differentiæ autem, pilorum existunt duritie, molitie, longitudine, breuitate, rectitudine, crispitudine, multitudine, paucitate: ad hæc coloribus ut albedine, nigredine, eorumque mediis. Crassitudinis, tenuitatis, copię, magnitudinis pilorum discrimina pro partium quibus adhærent conditione, atque pro cutis qualitate proueniūt. Fit enim magna ex parte, ut pili duriores, & crassiores cuti crassiori enascantur: plures autem & longiores humidioribus (dummodo sint ad gignendum pilum idonei) prodeunt. Regionum etiā tepore & frigore differentia est: ut pili hominum locis calidis duri, frigidis molles oriuntur. Sunt præterea molles, qui promissi: duri, qui crispi. Nonnulli pili paulatim adeo duritate degenerant, ut non iam pilis, sed spinis similes esse uideantur, ut erinaceorum.

Differunt & colore: aliis enim niger pilus est, aliis albus, aliis flauus, & rufus aliis. Et colorum causa cæteris animalibus cutis natura est, & ut unicolora sint & uaria: alborum enim alba est cutis, uariorum permixtorumque partim alba partim nigra esse conspicitur. Sed homini nihil causæ cutis affert, (qui enim sunt albi, admodum nigros habent capillos), nisi quandoque ad canitiem, uidelicet eam quæ morbo, non quæ senio accidat: nam eo uitio corporis, quæ λευκία, id est utiligo uocatur, pili efficiuntur albi. Mutatur color pilorum in senectute, candidique pili efficiuntur in hominibus: quod uel cæteris animalibus accidit, sed non adeo aperte, præterquam in equo.

- A** equo. Pilos habent cetera animalia, nec intra os, nec parte pedum refupina: lepori uni pili in bucca, & sub pedibus sunt. In sanguineis animalibus sunt & membranæ, ut antea exposuimus, caroque & quod carni simile est: & præterea sebum & adeps: sebum enim habent, quæ non utrinque dentata, sed cornigera sunt. At uero genus utrinque detatum & cornuum expers & multifidum, uice seui adipem habet. Animalia quæuis aut intra carnem, aut seorsum pinguescunt: quibus autem pingue separatim non est, ea minus per uentrem omentumque pinguescunt, ut anguillæ: plurima tamen pars animalium uentre pinguescit, & præcipue quæ parum se moueant. Steriliora cuncta, pingua & in maribus & in fœminis. Senescunt celerius præpingua: quædam non pinguescunt, ut lepus, perdix, author Plinius.
- B** Semen genitale habent omnia, quæ sanguinem: non eodem tamē modo in omnibus est, sed quibusdā pro genitura, *ἄρσος*, id est genitale uirus sui generis habetur, ut piscibus. Lentum semen est pilos habentium, cæterorum nullam habet lentitiam.

**C** Fœminis sanguis nigrior, Contrà Plinius (nisi exemplatia sint mendosa) maribus quàm fœminis nigrior, & in iuuenta magis quàm senio. **D** Scoptula, Theodorus scapulas uocat. *καλῶνες*, Theodorus pernas aut culinas interpretatur. **G** Disserunt & colore, De his fusius apud Galenum secundo De temperament. libro.

Eorum quæ ad generationem pertinent discrimina, in iis quæ sanguine prædita sunt animalibus. Cap. LIIII.

- C** IN omnibus sanguine præditis, paucis quibusdam exceptis, ut piscibus nonnullis, sexus discrimen ita habetur, ut alterum mas, alterum fœmina perfectum euadat. Coitus autem in iis, nec similes omnibus sunt, nec similem in modum aguntur. Eorum enim quæ pedestria uiuipara sunt, magna ex parte modus quidem coeundi idem est, fœminā scilicet mare superingrediente: uerum non omnia simili modo coniunguntur. Aliis coitus complexu mutuo supinarum partium agitur, ut serpentibus, murenis & laceratorum generi: alia, ut pisces omnes, exceptis planis cartilagineis, admotis inuicem partibus supinis copulantur. Aues mare fœminam superueniente coeunt. Morantur in coeundo diutius omnia quæ animal generant, quàm quæ oua. Cum uero tempora coitus descripta, & ætates certas ad uenerem singulis animalium natura finxit & statuit: quæ tamen cum homine uiuunt pedestria coitum nullo tempore aspernātur, uidelicet propter teporem, & pabuli ubertatem: quorum tempus etiam gerendi uteri breue est, ut suis, ut canis, ut uolucrum quæ sapius pariūt. Semel anno magna pars syluestrium animalium parit: tam eorū quæ animal generant, quàm quæ oua, quæ scilicet non ut lepus superfectant. Omnium maxime animalium grauidæ coitum patiuntur mulier & equa: cætera ubi grauida fuerint, fugiunt mares: ea scilicet quorum natura superfectare more leporis recusat. Quæ sanguinem habent omnia, aut animal pariūt, aut ouum, nisi omnino sterilia sunt: bipedum solus homo animal generat. Semen ubi à coitu insinuatū in utero fuerit, aliquandiūq; contentum, membrana obducitur: quippe quod si

antequam articulis discernatur membra, eiiciatur, uelut ouum in sua mē- E  
branula contentum apparet detracto putamine: membrana autem ipsa ue  
nis referta est. Omnia uero tum natatilia, tum pedestria, tum etiam uolati-  
lia, siue animalis, siue oui forma procreantur, simili modo gignuntur: nisi  
quod alia umbilicum habeant uulua adherentem, uidelicet quæ animalis  
forma enascuntur, alia ouo, alia utroque modo, ut in quodam piscium ge-  
nere, cartilagineo scilicet. Pari quoq; modo tam in uiuiparis, quam ouipa-  
ris uocantur ea, quibus obuolutus est fœtus, uti inter membranas antea di-  
ximus: alia secunde (Græci *χελος* dicunt,) alia membranæ, quas *αμνιον* & *αλ-*  
*λαπιδον* uocant nonnulli. Augentur omnia animalia, quibus est umbilicus,  
per ipsum umbilicum. Est autē umbilicus uena in aliis simplex, in aliis mul-  
tiplex (in maiore enim animali plures sunt uenæ, ut in boue: binæ in me- F  
diocribus: singulæ in minimis, ut Aristoteles author est) quam uenam pu-  
tamen cuticulare ambit, quod & umbilicus uocatur: uenæ autem quali ra-  
dices aguntur, per quas alimētum haurit fœtus. Hæc Aristoteles. Galenus,  
Coëunt, inquit, in unum, & uenæ, & arteriæ, quæ à *χελος* membrana, id est  
à secundis producantur in fœtum: atque ex eo coitu, coniugiū fit utrorum-  
que uasorum, quod in umbilicum inferitur. Animalia quæ non utrinque  
dentata sunt omnia, etiam dētatorum utrinque, quorum uterus uenā non  
singularem habet pertinentem grandē, sed pro una plures frequentes con-  
tinet, hæc in utero habent, quæ acetabula appellātur, in quæ umbilicus de-  
uenit atque adhæret. Sunt autem acetabula, uasorum ora, quæ in uuluā pe-  
netrant: & in quæ ueluti in mammas reponitur à natura fœtui alimentum G  
sanguineum, quæ ferendi uteri tempore, quandiu scilicet fœtus sit minor,  
nec multum alimenti assumere possit, in matrice prominēt, in pustularum  
(*θηλαθήματα* uocant) & inflammationum morem: & conspicua maioraque  
sunt, non aliter quā in recto intestino hæmorrhoides solēt: fœtu uero ac-  
crescente proficiscentēque ad exitum, minora subinde reddūtur, demū-  
que confidunt, obliteranturq; cū perfectus iam est: minuta uero & utrinq;  
dentata nonnulla acetabulis uteri carent: tendit umbilicus iis in uenā sin-  
gularem, quæ per uterum maiuscula fertur: iam quæ ouo nascūtur omnia  
incrementum foris recipere abiuncta ab utero apertum est. Situs in ute-  
ro quadrupedum omnium extensus est: expedum autem obliquus, ut pi-  
scium: bipedum uero inflexus contractusque, ut auium, hominum. O- H  
mnibus æque animalibus, dum in utero continentur, caput primū supe-  
rius est: sed cum creuerint, & iam exitum appetāt, deorsum deducitur: ita  
fit, ut omnibus partus secundum naturam in caput, contra naturam in pe-  
des, aut inflexo circūactōque corpore agatur. Animalia quorū natura im-  
perfectior est, conceptum cum perfectus iam est, sed nondum animal per-  
fectum, foras edunt (perfectum autem est animal, cum conceptus iam aut  
mas, aut fœmina est, scilicet in quibus sexus hæc differentia habetur: sunt  
enim quæ nec marem nec fœminam generent: uidelicet quæ & ipsa nō ex  
fœmina, marēque & coitu animalium procreantur.) Quæ autem animal  
intra se generant, scilicet naturæ perfectæ animalia, quousque animal pa-  
riant

Umbilicus,  
ομφαλον.

Acetabula,  
κετυληδες.

**A** riant, forasque emittant, gerunt intra se innexum quod gignitur. At uero quæ foras animal pariunt, cum intra se prius ouû genuerint, eorû nonnullis ouum iam perfectum absoluitur, ut eorum quæ foras pariunt ouum, atque ita animal ex ouo intra foraminam nascitur: aliis cum alimentû in ouo contentum absumptum iam est, perficitur ab utero, atque ob eam rem ouum utero non abiûgitur. Atque hæc fere cartilagineorum piscium differentia est, de quibus post seorsum per se disceremus. Partus cæteris animalibus minime laboriosi eueniunt: minus enim cum parturiunt infestari uidentur: ac mulieribus dolores uehementissimi incidunt. Postquam conceperit femina, definit lac atque extinguitur, tam in homine, quàm in quadrupedum uiuiparo genere. Habent quod coagulum uocatur, omnia quæ plures continent uentres: carent fere quæ unum habent, excepto lepore.

Morû actionûmq; & affectionû quarundã aliarû differētiz. Cap. LV.

**S** Anguinci generis multa temporibus quibusdam se condunt, urea quæ cortice intecta sunt: serpētes dico, lacertos, stelliones crocodilos fluuiales. Piscium etiam cōplures latere nouimus, alios hyeme, alios etiã æstate: & præterea aues nonnullas, ut hirundines. Quadrupedum etiam quæ animal generant, nonnulla cōduntur, ut hystrices, glires. Et ex iis nonnulla exunt id quod senectus uocatur: ueluti ea quæ cortice molliori intecta sunt, ut serpentes & lacerti. Maiora sunt quæ sanguinem habent, quàm quæ non habent: & in iis magna ex parte, quæ maiora perfectioraq; sunt animalia, C plus temporis uiuunt: sed tamen non omnia maiora sunt uiuaciora: homo enim plus temporis, quàm quoduis animal uiuit, excepto elephante: quamquam homo minoris est incrementi, quàm ueterina & alia multa. Singulis generibus pro sua natura cibus statutus est: nec omnibus eadē esse in cibo idonea, cum in multis palam est, tum omnium fere consensu in ceruis patefcit, qui uiperas edunt, quibus cætera moriuntur: & Iucretius,

Præterea (inquit) nobis ueratrum est acre uenenum:  
 At capreis adipēs, & coturnicibus auget.  
 Atque uidere licet pinguescere sæpe cicuta  
 Barbigenas pecudes, homini quæ est acre uenenum.

**D** Eorum quæ in his alimenti aut medicamenti rationem obtinent, discrimina. Cap. LVI.

**A** Limenta quæ ex his animalibus sumuntur, non paruam præ se ferunt differentiam: non omnium etenim caro (quæ maxime in usu cibario est) idem præstat nutrimentum: quædam hoc ipsum tantum sunt, alimentum scilicet. Alia præterquam quod nutriunt, habent & medicam quædam facultatem: nempe ut excalfaciendo, refrigerando, humectando, siccādoue corpus nostrum immutent: ut uiperarum carnes, cum in anguillarum morem condiuntur, calfaciunt palam, desiccantq; & corpus totum per cutem expurgant. Alia medicamenti duntaxat uim habent: eorum quibus quotidie uescimur, quæ domestica sunt, otiosæq; uiuunt, carnem habent humi-

dio rem, & quæ magis extremis abundet: quæ uero syluestria, durio rem E  
 excrementisq; uacuum: & quæ lacustribus palustribusue locis, aut in flumi  
 nibus immundis ac turbidis lutosisq; degunt, deterrimam habent. Cõmu  
 ne & hoc quoque, & uolucris & quadrupedibus, longe præstantiorem,  
 concoctusq; faciliorem esse carnem eorum, quæ adoleſcunt, quàm aut recēs  
 natum, aut iam ſenſcentium. Hæc enim dura eſt, neruoſaque & arida:  
 ideoq; & concoctu difficilior, minusq; alimētū præbet: illa uero mucosa,  
 præhumida, atque excrementoſa eſt, eorum præſertim animaliu, quæ ſua  
 pte natura humidior ſunt carne, ut agni & ſues: uerū hœdi & uituli, ut qui  
 natura ſunt ſicciores, melius multo & concoquuntur & nutriunt. Sicuti e  
 nim in humidioribus natura animantibus ipſe ætatis ſlos temperiem affert  
 mediocrem, ita in ſiccioribus ætas adoleſcens, & quæ adhuc creſcat: nam F  
 quod præhumidum eſt alimētum, ut diſtribuitur, ita etiam celerius diſcu  
 titur. Non lôge poſt tempore, quàm maſtata ſunt animalia (inquit Ruſus)  
 coqui ſolent, ex quadrupedibus ſuilla caro, & ouilla atque caprina: ex aui  
 bus turtur, columba, & turdus: diutius ſeruantur uenatio omnis, & bubula  
 caro: maiores quoque aues & paluſtres: & gallinaceum genus, phaſianus,  
 perdex, pauo, & attagena. Piſciū genus omne fere, uel antea quàm expiret,  
 coquendum eſt: haud facile nanque ſeruari patitur. Caſtratoꝝ animalium  
 carnes in ſuo cuiusque genere præſtant: auium caro, ſi cum quadrupedibus  
 conſeras, minus præſtat alimenti. Piſces leuiorem cibū præſtant, quàm ca  
 ro ſuilla, quæ inter domeſticas quadrupedes leuiſſima eſt: & alimentum  
 quod ex piſcibus prouenit, ſanguinem procreat tenuiorem, quàm quod G  
 ex pedeftribus animalibus, & qui non tam abunde nutriat. Ex piſcibus ta  
 men nonnulli teneriorem, alij durio rem carnem habent: quæ cete appellā  
 tur, eorū caro dura eſt, maliq; ſucci. Quod uero ad medicas uires attinet,  
 ſylueſtris ſuis caro uehementius exſiccatur, quàm domeſtici: ſue ſiccior ouis  
 eſt, oue capra: hanc bos ſuperat, illum denique leo. Erinacci utriusque uſti  
 cinerem ulceribus ſordidis impoſuere quidam: hirūdinum quoque com  
 buſtarum cinis, cum melle gutturis affectibus medetur.

Ex animalium ſanguineorum partibus, alimentorum medica  
 minūmq; uires diuerſæ.

Cap L VII.

E Reliquis animalium partibus, oculi à paucis eduntur. conſtant autem H  
 ex partibus diſſimilibus: alia nanque tunica ſortita ſunt naturam, mu  
 ſculi aliam: denique humores aliam, qui cryſtalloides & hyaloïdes uocan  
 tur, in quibus ſoli muſculi facile concoquuntur. Lingua (uti diximus) car  
 ne ſubſtantia eſt rariore, minusque continens ſanguinis: huius natura fere  
 glanduloſa eſt: & glandulæ ipſæ à linguæ ſubſtantia tantum reſeſcere, quā  
 tum lingua ab ipſa carne. Omnibus autem glandulis illud commune eſt,  
 quod in cibo ſuaues pariter & friabiles ſentiuntur: ſuccum gignunt craſ  
 ſuſculum. Mammæ autem lactantium certe animalium (ut dicitur) appel  
 lant) habent à lacte comparatam dulcedinem: quocirca maxime à gulofis  
 expetuntur, præſertim ſuillæ. Alimentum uero, quod ex iis gignitur, ſi pro  
 be fuerint



- A** be fuerint in uentriculo concoctæ, prope ad carnis alimentum accedit, sed crassum efficit succum. Atque si animal ipsum, ex quo sumuntur, boni habitus fuerit, abunde nutriunt, & probum generant succum: sin minus probe, succum crudū aut pituitosum procreant. Sunt qui renes quoque inter glandulas adnumerent: habent uero ij ex urina uirosi quippiam: ac proinde uitiosum gignunt succum, concoctūque difficiles sunt. Virus quoque habent testes à semine contractum, ex adultis saltem quadrupedibus: altitium autem gallinaceorum testes & suaues sunt, & optimum præbent corpori succum. Quadrupedum quoque iuniorum testes manduntur: tauro- rum uero; hircorum & arietum, sapore sunt ingrato, cōcoctū difficiles, malique succi. Viscera ad concoctionem difficilia sunt, crassique succi, atque
- B** excrementosi: in iis tamen iecur uel quadrupedum nonnullarum succum procreat non omnino malum. Cerebrum omne pituitosum crassumque est, nec probum efficit succum. ægre concoquitur, tardēque permeat, atque à stomacho alienum est, idque haud modice: quippe quod nauseam concitat, adeo ut si cui à cibo uomitum ciere decreuerint, cerebrum postremum ciborum exhibendum suadeant medici. Idem tamen si probe concoquatur, alimentum præstabit corpori nō exiguum. Auium cerebrum paruum quidem est, sed quod pedestrium cerebro tanto præstantius, quanto durius est. Cerebro dulcior est, suauior quoque & pinguior, quæ in ossibus reperitur medulla: ut si utrunque gustando inter se conferas, uidebitur certe cerebrum austeri in se quiddam continere: & medulla ipsa quoque si liberius edatur, nauseam excitat ut cerebrum: & si probe fuerit concocta, nutrit non aliter atque cerebrum. Facillime omnium putredinem sentit medulla, ut Rufus author est: cōque fit, ut eorum animalium ossa, quorum caro grauius olet, quamprimum confringi soleant. Emollit medulla, quæ in corpore nostro dura sunt: etiam quæ scirrum patiuntur, siue in musculis, siue tendonibus aut ligamentis, siue etiam in uisceribus id accadat. Mollunt, inquit Dioscorides, omnes medullæ, calfaciunt, rarefaciunt, ulcera explent: &, ut Plinio uidetur, exsiccant. Laudatissima est ceruina, proxima uitulina aut bouum iuniorum: dein caprina, inquit Plinius. Hircorum uero, taurorumque medulla & acrior & siccior est, quàm ut scirrosas durities emollire possit, uti Galeno placet: Dioscorides taurinam caprinæ præfert & ouillæ. Curantur medullæ hyeme, ut uult Galenus: alij uero æstatis exitu, uel ante autumnum. Utimur autem medulla, non ea solum quæ in ossibus, sed & quæ in spina reperitur, quam & spinalem medullam nuncupant: quæ altera illa & durior & siccior est. Hæc pinguetudinis habet minimum, quo fit ut nauseam minime ciat: non exiguum dat corpori alimentum, sed quod crassio- rem succum efficiat. Pinguetudo omnis, siue adipē dixeris, siue seuum, pauci nutrimenti est: potiusque carnis, quæ nos alit, cōdimentum est, quàm alimentum. Excalfacit, mollit, rarefacit & humectat omnis pinguedo: uerum cuiusque differentia in maioris minorisque ratione consistit. Nam pinguedo suilla, omnium est humidissima, oleiq; instar fluida: caprina ob crassitiem citius concre-  
G iiij

calidior & siccior est, minus tamen, quàm sit leoninus: uitulinus quoque E  
 taurino minus tum calidus est, tum siccus: & hœdinus quàm sit caprinus:  
 minus quoque hic, quàm hircinus. Adeps anserinus suillo calidior est, in-  
 ter quos medium locum obtinet gallinaceus. Piscium adipem ad suffusio-  
 nes imposuere nonnulli: Massurius palmam lupino adipi dedisse antiquos  
 tradit. A renibus autem est laudatissimum omne sebum. Perficitur omne  
 sebum exemptis uenis membranisque. Sanguis omnis concoctu diffi-  
 lis est, præcipue qui crassus, qualis est bubulus: leporinus tamen, utpote o-  
 mnium suauissimus, in pretio est. Suum quoq; & iuniorum & eorum qui  
 castrati sunt, sanguine pro alimento utuntur quidam: sicuti & gallinarum  
 & caprarum nonnulli. agrestesque nonnunquam caprarum sanguine unà  
 cum adipe sese replent, uti & Homerus de Penelopes procis retulit. Apro- F  
 rum sanguinem, qui uel gustare quidē uelit, nemo est: taurorū sanguis re-  
 cens epotis uenenum est. Sanguis anseris, anatis & hœdi, utilissime in anti-  
 dota miscentur: palumbi autem, turturis, columbæque ac perdicis, oculis  
 cruore suffusis, & recentibus eorundem uulneribus illinuntur. Partes ani-  
 malium excarnes, ut pedes, rostra, aures, cartilagine, minimum præstant  
 alimenti: & neruosa partes omnes, ut ligamenta atque tendones alimen-  
 tum gignunt lentum glutinosumue: nec sane aliud, quàm partes ipsæ coctæ præ-  
 se ferunt. Et quæ circa quadrupedum labra sunt, eandem habent naturam:  
 glutinosum nanque, sed minime grassum generant succum: uerum facile  
 concoquuntur & hæc & uolucrum alæ. Ossa cremata digerunt atque ex-  
 siccant egregie: maxime uero (ut nonnullis placet) humana. Quidam autē G  
 arthritim & comitalem morbum epotis ossibus uistis sanauere. Pili uisti  
 calfaciunt egregie, atque desiccant: & lanæ crematæ eodem modo.

D Curandæ medullæ rationem uarie explicant Galenus, Dioscorides & Pli-  
 nius. E Quomodo curari debeat omne pinguedinis genus, docent Dioscorides  
 & Plinius.

De excrementorum, quæ in animalibus sanguineis reperiuntur,  
 differentiis. Cap LVIII.

Hvmorum omnium qui in animalibus insunt, bilis calidissima est: cu-  
 ius proinde uis acris excalfaciensque est. Excalfacit, inquit Plinius,  
 mordet, scindit, extrahit, discutit. & calidissimorum animalium fel, cate- H  
 ra quoque in calore superare palam est. Quin & in animalibus, quæ magis  
 calida sunt, colore flaua uidebitur bilis: quæ uero minus calida, pallidior e-  
 rit. Et cum animal quod sua natura calidum est, fame sitique torquetur, ad  
 atrum colorem uergit bilis. Porcorum fel omnium humidissimum est, ac  
 proinde maxime imbecillum, præterquam agrestium: hoc itaque felle tan-  
 quam ad aurium ulcera idoneo medicamento utuntur. Suillo felle acrius  
 paulo est ouillum: ouillo caprinum, cui bubulum ursinumque similia sunt.  
 taurinum ualentius est, quod tamen ab hyænæ felle uincitur: hoc quoque  
 superat callionymi bilis, scorpiique marini & testudinis marinæ. Minorū  
 animalium fel subtilius intelligitur: & ideo ad oculorū medicamenta uti-  
 lius

**A**lius existimatur. Auium fel omne & acrius & siccius est, quàm quadrupedum. Perdici fel atque gallinæ ad medicinę usum cæteris præferuntur. Felle quocunque facile, infantibus præcipue, alui deiectionem quis molietur, si intinctum linamentum sedi subiiciat. Sudor omnis falsus est: sæpe uero & amaritudinem præ se fert minime obscuram. Vrinarius non minor est uarietas, quàm bilis esse diximus. Et omnium quidē uis calida est: magis autem eorum quæ calidiora sunt, sicuti frigidiorū minus. Homini, ut & ex cæti suis domestici, maxime est imbecillis: apri uero syluestris ualida est, ut ex odore facile apparet, qui utique acerrimus est. Salua canis certe rabidi, in homine quoq; rabiem excitare potest, si in eius corpus inciderit. Homini salua uenenosis omnibus bestiis aduersatur. Hoc autem scire oportet, **B** saluæ discrimina contingere, tum in animalium speciebus, tum in eorum unoquoque sano aut ægro, ieiuno & sitibundo, aut cibo potuq; sumpto: à cibo nanque imbecilla est: ualida acrisque earum, quæ longa inedia aut siti uexantur: mediocrius eorum, quæ probe concoxere, nondum tamen cibum potumue hausere. Stercus fimumue omne digerendi facultate pollet: uarie tamen pro animalium temperaturis: eorum nāque quæ sicciores sunt temperatura exsiccantius stercus est, sicuti & quæ calidiorē, calfaciens magis. Quin & pro eorum quæ pascuntur natura, numerosa fiunt discrimina: id quod in hominibus maxime conspicuum fuerit: quandoquidem hoc animal ciborum generibus utitur maxime uariis: caprarum quoq; pilulæ, pro pastus uarietate nonnihil discriminis habent. Quorundam animalium **C** fimum non modo medicamentis quæ foris imponuntur, sed iis quoque quæ intro in os sumuntur admiscet nonnulli: caprarum etenim fimum, earum præsertim quæ in montibus uictitant, in uino potum, regium morbum emendat. E sue syluestri fimum aridum ex aqua aut uino potum, sanguinis reiectionē sistit, diuturnum lateris dolorē lenit: ad rupta & conuulsa ex aceto bibitur. Horum certe usus contingit nonnūquam, dum aut ueniamur, aut peregre, aut ruri agimus: cum scilicet præstantius nihil affuerit. Humanum autem stercus ob factorem omnino reicitur.

**H** Taurino felli, inquit Plin. præcipua potentia. **A** Quonā modo curabitur felis genus quoduis docet Dioscorid. lib. 2. & Plin. lib. 29. **C** Fimi stercorisue animalium discrimina, quod ad agrum lætificandum attinet, ostendit rei rusticæ auctores, **D** Columella scilicet ac Plinius lib. 17.

De lacte, & iis quæ ex lacte sunt, ut caseo, butyro, & aliis. Cap. LIX.

**I**N lacte non parua est huius generis animalium differentia: humanū etenim lac corpori humano maxime accommodatum est, ut quod & suauissimum sit, & optime nutriat: aliorum uero quorundam animalium lac, homini ingratum est, ut canis, lupi, leonis, uulpis, ursi, & id genus aliorum: caprino autem ouillo, bubulo, asininóq; libētius uescimur: caseosq; nobis ex iisdem conficimus, præterquam ex asinino. Horum animalium lac generatim omne probatissimum gignit alimētum: discrimen uero est, quod crassius est bubulum, ouillum, caprinum: minus autē crassum equinum, & asininum (quanquam Plinio crassissimum asininum) camelinum omnium

liquidissimum est. Vt uero paucis eius facultatem definiamus: lac medico E  
rum omnium consensu, inter omnia edulia quam optimum gignere succū,  
multūqueimenti præstare dicimus: ex contrariis quibuldam substan-  
tiis, ac facultatibus compositum: uentrem scilicet mouendi, ac sistendi, ob-  
struendiq; ac tenuandi. Quod nanque in eo serosum est, succos extenuat  
crassos, & aluum citat: contra, quod caseosum aluum sistit, succosque reddit  
crassos. Quò fit, ut lac, quod serosum ac tenue est, minus nutriat, aluum ma-  
gis moueat: sicuti contra, quod crassius est, aluum minus citat magisq; nu-  
trit. Camelinum, asininumq; serosi humoris plus habet: plus casei ouillum:  
pinguetudinis bubulum: caprinum inter cetera mediocritatem obtinet, ut  
quod nec pingue admodum, nec crassum sit: bubulum pingue, ouillū cras-  
sius, cōtrā asininum tenue. Optimi succi lac ex iis habetur animalibus, quæ F  
optimo sunt corporis habitu: idq; si, ubi emulctum fuerit, quam primū hau-  
riatur: ubi nanque diutius emulctum manserit, genuinæ bonitatis nōnihil  
amittit. Quod uero postea coctū amplius fuerit, succum gignit crassiorē:  
multo uero maxime, si uel farinam triticeam, uel milium aut amyllum in-  
coxeris. Lac, ne in uentriculo coaguletur, mellis, aquæ, & salis nonnihil ad-  
miscet quidam: nam uel caprinum ipsum, absq; melle sumere, minime  
erit tutum: plerisque enim qui illud purum hausserint, in casei speciem in  
uentriculo coactum est: quod cum acciderit, mirum quā aggrauet homi-  
nem, ac prope dixerim, strangulet. Non parua quoq; lactis discrimina sunt  
ab anni tēpore: ab eo ipso spatio, quo à partu in lucē edito, distat: ab ætate,  
& à passionibus. Quanquam sunt qui pascuorum rationē plane pro nihilo G  
habeant, quasi nihil parumue ad lactis bonitatem conferant. Caterū haud  
dubie uidemus, animalium, quorum usuri lacte sumus, si scammonia aut  
marinarum lactucarum quapiam (tithimallum uocant) uescantur, in lacte  
quoque laxandi uires inesse. Ex quo patet, quòd ex uitioso pascuo, acre, aci-  
dum, & austerum reddetur, natura uidelicet herbarum imitatu: & à uiridi  
pabulo lac aluum magis emollit, inquit Dioscorides. Quod uero ad anni  
tempora pertinet: uernum lac ut liquidissimum, ita copiosissimum: ætate  
uero media, ipsum etiam mediocre est: post id uero temporis, sensim iam  
crassescit, quoad prorsus deficiat. A partu dilutissimum est: procedente de-  
inceps tempore crassescit semper. Probi lactis improbiue hæc sunt indi-  
cia: quod optimum est, id gustanti olfacienti q; suaue dulcēque mediocri- H  
ter: nec amarum, nec acidum salsumue aut acre, aut grauis odoris: intuenti  
candidum, æquabile, liquidū, crassūq; medium apparebit, ut si ungui instil-  
letur, hæreat, nō defluat. Quod uitiosum est, è diuerso crassum & caseosum:  
aut liquidum & serosum ac liuidum consistentia ipsa calorēque uidebitur:  
idem gustantibus amarorem, aut salsedinem, aut qualitatē quampiam ex-  
traneam exhibebit: tale uero nec olfacienti suaue erit. Lac animalium sa-  
norum, aduersus acres, mordacesq; fluxiones est utilissimum: quandoqui-  
dem non solum à partibus affectis eas abluit, sed & corpora ipsa ueluti illi-  
nit: ne quod defluit, in loca nuda incidat. Continet enim in sese extergentē  
quandam humiditatem, quam serum uocat: & præterea crassum quiddam  
pinguēq;

- A pingueq; quod corpori illinitur, atq; adhæret, non aliter ac pinguedo adêps ue aut ceratū aliquod: ex triplici nanq; substātia conficitur lac omne, ut ante diximus: serosa scilicet, caseosa, & pingui. Serum abstergentem uim habet, qua uel absque rosione abluit acres humores. Pars lactis crassior, & quæ casei naturam refert, ceu illita adhæret, nō aliter atque pinguedo adêpsue, aut ceratum aliquod, acrimoniamq; humorū ea ratione obtūdit: lac uero ipsum torum lene mitigānsque pharmacum est (τρίπυρον uocant) & mordacitatis expers: præcipue uero si ex mediocri decoctione partis serosæ plurimum sit exhaustum. Ob succi quem lac gignit probitatem, nonnulli uel pulmonis ulceribus afflitos sola lactis portione curari putauere: antea scilicet quàm ampliora fiant ulcera ipsa, callumq; contrahant. Sed in tabificis
- B morbis, lac muliebri præcipue laudatur, tanquam eiusdem naturæ nobisq; accommodatissimum: maxime uero si infantium in morem ab ita affectis ex uberibus exugatur. Ad acres oculorum fluxiones ipsum lac, tum per se, tum cum molliorum collyriorū aliquo imponitur: præterea ad hypopia & hyposphagmata. Palpebris quoque extrinsecus unā cū oleo rosaceo & ouo impositum, iis qui ophthalmia laborant, ubi somno sese dabunt, phlegmonas ipsas cōcoquit: mulieris autem lac esto, quod recens ex mammis expressum sit. Vbi uero exsiccantem uim quampiam adiunctā habuerit, lac crassum caseosumque, optimū euadet dysenterix, acriumq; omniū uentris fluxionum remedium: quam sane facultatem accipiet potissime à lapillis (quos λίθοις uocant) uel ferreis quibusdam cylindris candentibus
- C lacti ante decocto iniectis. Decoqui autem lac eousque debet (ut modo diximus) dum serosi in eo humoris pars. maxima absumpta fuerit. Hæc Galenus: Plinius uerò, Et si urat dysenteria, inquit, infunditur decoctum cum marinis lapillis, aut cum ptissana ordeacea. Item contra rosiones intestinorum bubulum aut ouillum utilius. recens quoque dysentericis infunditur. Vtero quoque ulcerato infunditur lac: atq; omnibus, quæcunque leniri possulāt, prodest impositum, siue ob phlegmonē, siue ob humorū acrimoniam malignitatēue, ut sedis pudendorumq; ulceribus & cæcerosis omnibus. Infunditur quoque lac cōtra rosiones à medicamento factas. Oris, gutturisq; inflammationes lenit collutum gargarizatumq;: ac proinde anginas mitigat, tonsillāsque & columellam, si phlegmone afficiantur. Datur & ad
- D uenena quæ erodendo interimunt, qualia sunt lepus marinus, & cantharis. Sunt qui lac exhibeant, & iis qui aconitum & thapsiam sumpserint. Priuatim bubulum iis qui cholicon biberint, aut cicutam, aut doxicnium, aut leporem marinum: sicut asininum contra gypsum, & cerusam, & sulphur, & argentum uiuum. Sunt inter exempla, inquit Plinius, qui asininū bibendo liberati sunt podagra chiragraue. Vfus lactis ad omnia intus exulcerata, maxime renes, uellicam, interanea, fauces, pulmones: foris pruritus cutis, eruptiones pituitæ post abstinentiam: thoraci quoque ac pulmōni lac omne utile est. Lactis usus contrarius spleneticis, hepaticis, comitiali morbo affectis, uertiginosis, neruorum uitio laborantibus, febres habentibus, caput dolentibus, uertigini, inquam, præterquam purgationis gratia, grauedini, tuf-

*Vsque ad dimidium, ut uult Dioscorides.*

Oxygala.

Aphrogala.  
Schiltton, &  
σχίλτον.

Serum, &amp;ρίον.

Caseus, τυρίον.

sientibus, lippis. Minus inflat quodcunque decoctum. nocet usus eius affi- E  
duus dētibus & gingiuis. Lac quod feri habet plurimum (inquit Galenus)  
nihil affert periculi: quod uero feri exiguum habet, crassumque est & ca-  
seosum, non sine periculo assidue estur: ab iis præsertim, qui renum calculo  
aut iecinotis obstructionibus obnoxij sint. Oxygala quod uocant, frigi-  
dum est, crassique succi: dentes, qui iusto sunt frigidiores, lædit: euenit na-  
que iis, qui oxygala sumpserunt, symptoma quod dētium stuporē uocant:  
quale post acerborum acidorumque esum accidere solet. Ventriculus fri-  
gidior oxygala haud bene concoquit: temperatus uero, quanuis ægre, confi-  
cit tamen: sed qui iusto calidior est, præterquam quod minime læditur, cō-  
modi nonnihil ab eo sentit. Fit autem oxygala uno modo, acido lacte addi-  
to in recens quod uelis accescere. Oxygala fit & alio modo, dum crebro ia- F  
ctatu in longis uasis conficitur butyrum, additur paulum aquæ ut acescat:  
quod est maxime coactum in summo fluit, atque id exemptum addito sale  
oxygala appellant. Medici speciem unā addidere lactis generibus, quod  
schiltton appellauere. Id fit uel citra coagulum, cum scilicet ipsius partes la-  
ctis fecernuntur, & discedit serum à lacte, cum lacti abunde calido acetum  
mulsū affundimus, aut uinum mulsū. Interdum etiam citra omnem li-  
quorem infusum uasculo frigidissimam aquam continēte, in lac dum fer-  
uet dimisso, lactis partes separamus. Ad hæc lac quod statim ab edito sætu  
emulsū fuerit, uel absque coagulo concreuit, si super cineres calidos pau-  
lisser ferueat: quod uero hoc pacto concreuerit, ueteres comici πυρίτιον, a-  
siatici uero πυρίφιον uocarunt: & hoc quidem lac syncerum est, nulla admi- G  
sta aliena natura. Cum uero una cum melle addito, per coagulum fiat χηρός,  
id est separatio concretioque: discedit certe quod tenue & aquosum est, ue-  
rum id solum mandunt nonnulli, quod coactum est, quod tum ex caseosa  
lactis substantia, tum ex feruida igneæue coaguli facultate, tum uero ex  
melle ipsis admisto compositum est. Alij uero non hoc solum, sed unā cum  
eo quod concreuit, serum etiam deuorant: & id quidem uel pariter totum  
serum cum eo toto quod concretum est, uel corundem altero alterum co-  
piosius. Euenitque ut his quidem magis, illis uero minus uenter moueatur  
pro quantitatis serosi humoris ratione. Ac præterea quod, qui solū id quod  
coactum est comedant, uberius alantur: qui uero unā serosi quicquam hu-  
moris deuorauerint, minus: ac longe minus ij, qui eius quod concreuit pa- H  
rum, serosi uero liquoris multum hauserint. Serum nanque postquam à  
lacte discessit, aluum egregie mouet, & ad purgationes ualentius redditur:  
datur autem potissimum, quibus sine acrimonia uolumus deiectionem  
moliri, ut melancholicis, comitialibus, in lepris, elephantiasis, erumpentibus  
ex toto corpore pustulis, articularibusque morbis, (ut sentit Plinius) & pa-  
ralyticis. Bibitur autem efficacissime heminis, per interualla temporis usq;  
ad quinas: ita ut per interualla illa temporis potantes ambulent. Serum ex-  
empto caseo potum cum exiguo sale, phthiriasin à toto corpore inhibet.  
Lac coagulatum expressumque caseus est: non ita tamen ut uniuersa la-  
ctis moles in caseum cogatur, sed quod crassum est duntaxat, separatōque  
eo quod



- A** eo quod serosum est. Porro dictum iam est habere lac in se naturam quandam pinguem & oleosam: hæc ubi à reliquo lacte sciuncta fuerit, solaque per se constiterit, butyrum appellatur: uerum si unà cum crassiore lactis *Витум.* parte coacta coagulataque fuerit, (seroso duntaxat lactis humore separato) caseus ipse pinguior efficitur. Abunde nutrit in cibo caseus sine sale recens, stomachoque idoneus est, & facile in corpus digeritur, corpus auget, & aluum leniter emollit: alius tamen alio præstat, pro lactis natura ex quo conficitur. Elixus autem & expressus, ac deinde affatus aluum sistit: oculorum inflammationibus atque hypopiis impositus iuuat. Qui uero recens nuperque salitus est, in cibo minusimenti præbet, carnique minuendæ aptus, stomacho aduersatur, uentrem & intestina turbat. Vetusior aluum sistit, corpusque minuit, & stomacho utilior est. Hæc ex Dioscoride & Plinio. Ut uero Galenus refert, caseus omnis crassum procreat succum, uetus etiam malum: recens autem & qui nuper coactus est, neque malū gignit, nec æque atque uetus, crassum. Caseus cum conficitur, acrimoniam quandam ab iniecto coagulo contrahit, humiditatemque amittit, id quod maxime cum inueterauerit, conspicuum est: quo tempore & acrior & manifestior calidior sentitur. quo fit, ut & sitim excitet magis, & concoctu difficilior, deteriorisque succi euadat. Quapropter reiciendum penitus suadent medici id genus casei: ut quod neque ad concoctionem sit utile, aut in corpus digestionem, nec utique ad probi sicci generationem. Malus deinde, sed prædicto minus, iudicatur, qui necdum uetus est, nec magnam contraxit acrimoniam: recens ut diximus, succi malignitate uacat. Crassities cum lentore non omni caseo inest: quandoquidem non paruum casei discrimen est, tum à lacte ex quo fit, tum ab animalium ex quibus colligitur natura, tum uero à pabuli uarietate: nonnihil itē à præparationis modo: præterea quod alius mollior, alius durior, aut densior laxiorue, glutinosior aut friabilior sentitur. Sapor deinde alius acidus, acrior alius aut dulcior. Mollior duriore præstat: rarior quoque & laxior eo, qui densus admodum aut eousque friabilis est, ut & asperitatem habeat. Inter hos qui mediocritatem obtinet, præferendus est. Quod uero ad sapores attinet, is omnium præstantissimus esto, qui nullam refert qualitatem insignem, ut dulcis tamē alias modo dice exuperet. Melior quoque suavis, quàm qui ingrati saporis est: & qui salis modicum, eo qui uel permultū habeat, aut qui experts omnino salis est.
- D** Qui oxygalactinus à nonnullis appellatur, omnium caseorum recetium nouellorumque præstantissimus est: ut qui in cibo suauissimus, & stomacho minime omnium noxius est, aliisque concoctu facilius: sed neque uitiosum, neque usque adeo crassum præbet succum, quod uitium omnium caseorum commune esse diximus. Huius generis est qui Romæ diuitibus habetur gratissimus, *Βουβιν* nomine, & alij quidam in aliis regionibus. Quæ plures quaternis mammas habent, inquit Plinius, caseo inutilia sunt, & meliora, quæ binas. Caprarum gregibus sua laus est in recenti maxime, cum augent gratiam fumo, qualis in ipsa urbe conficitur, cunctis præferendus. Trans maria uero Bithynius fere in gloria est. Commodum ad conficiendum repo-



# DE DIFFERENTIIS

nendumque caseum, lac præcipue ouillum caprinumque est, mox bubulū. Equinum ac asininum miscēt interdum. Bubulū fertilius caseo est, quàm caprinum. Caseos, si cerebrum mustelē coagulo addatur, negant corrumpi uetustate, aut à muribus attingi. Tradunt Zoroastrem in desertis caseo uixisse annis uiginti, ita temperato, ut uetustatem non seneiret. Vetus caseus pernæ suille decocto maceratus ac probe in mortario subactus, arthriticis, quibus tophi (quos *μύπος* uocant) in articulis creuerint, impositus plurimum iuuat. mollis uero & qui recens iam coactus est, repulsoriam uim obtinet & modice frigidā. Tritus itaque uulnus mediocriter cōglutinatum impositus. Oxygalactinus autem uim habet præterea digerendi, sed paruam, ut uel magnum uulnus, etiam in rusticano corpore glutinare possit. Saprum uocant, inquit Plinius, qui cū sale & sorbis siccis è uino tritus potusq; F medetur cœliaciis. Quod hippacen uocāt, caseus est equinus: ea uirus olet, magnopere alit, bubulūque proportionē respondet. Non desunt qui hippacen equinum coagulum appellarint. Hippocrates Scytharum inueniū hippacen dixit: esseque quod in equino lacte in alueolis subacto, in fundo subsederit: quo gens illa quotidie uesceretur. Hippace exiguo gustu famem sitimque sedat, ut Plinius author est. E lacte fit & butyrum, barbararum gentium laudatissimus cibus. Spuma id est lactis, inquit Plinius, concretiusque quàm quod serum uocatur: fit autem crebro lactis iactatu in longis uasis, donec pinguior lactis pars separetur: plurimum è bubulo (inde nomen) & pinguisimū, ut Galenus author est: ut uero Dioscoridi placet atque Plinio, pinguisimum ex ouibus: fit & ex caprino. Quod magis uirus respuit, hoc præstantius iudicatur. Recens oblongis additum, olei uicem pensat: & in bellariis adipis loco ponitur. Neque omittendum in eo olei uim esse: & barbaros omnes infantesque nostros ita ungi. Butyrum exiguo gustu famem sitimque sedat, conseruatque uires. Butyrum natura oleosum & emolliens est: unde si largius sumatur, aluū soluit: & contra uenena, si oleum desit, utile est. cū melle admistum dentitiones adiuuat, si adfricetur. Phlegmonas quæ in mollibus sunt corporibus, cōcoquit ac discutit, ut parotidas, bubonas, oris ac similium partium phlegmonas in puerorum & mulierū corporibus postea quàm fluxio constiterit. Cōtra uulnæ inflammationes, atque duritias efficax est butyrum, quod neque uirus respit, neque uetustum est. In medicamenta additur, quæ pus mouent, præsertim in neruorum uulneribus aut cerebri membranarum, aut ceruicis uesciæ. Natura butyri est mollire & (ut Dioscoridi placet) purgare, replere & carnem creare, & astringere quoque ut Plinio uidetur. Aspidis morsui utilissime imponitur. Deuorātū uero & in corpus digestū, pleureticis peripneumoniacisque confert plurimū, ut & liberior fiat excreatio & materiæ cōcoctio facilior. Quod si syncerum butyrū linctū hauriatur, cōcoquit quidē magis, sed sputum minus educit: uerū unā cum melle & amigdalīs amaris, minus certe concoquit, sed educit liberius. Fuligo ex butyro collecta, in ocularibus medicamentis exsiccandi astringendique uim habet: oculorum fluxiones cohibet, & ulcera ad cicatricem facile perducit. Coagulū omne

*Caseus mollis.*

*Caseus mustel.*

*Caseus uiridis.*

*Saprum.*

*Hippace.*

*Butyrum.*

*Coagulum,  
Λύχν.*

**A** ut Dioscorides prodit, & dissipata cogit, & coacta separat. Ego uero (inquit Galenus) coagulo uti, acri certe medicamēto, ad affectum aliquem qui adstrictionem desideraret, nunquam sum ausus. Porro coagulum omne acre est, facultatēque habet extenuantem, digerentem, & exsiccantem. Lac in uentre coagulatum diffecit: & sanguinem in uentriculo concretum, non leporinum solum, sed coagulum quoduis epotum: quanuis efficacius id faciat leporinū. Hædi, agni, hinnuli, dorcadis, platicerotis, dorci, uiruli, & bubali coagula similes habent naturas. Coagulum hinnuli, inquit Plinius, leporis, hædi, laudatum: præcipuum tamē dasypodis, quod & profluuii alui medetur, unius utrinque dentatorum. Et hæc quidem animalibus quæ sanguine prædita sunt, partim omnibus communia sunt, quibus uidelicet ab **B** iis quæ sanguine carent, ea differre constat: partim uero generibus quibusdam propria: de quibus accuratius generatim deinceps pertractandum iam nobis restat, ab homine exorsis.

**G** Si scammona aut &c. Hoc confirmant Theophrastus lib. 9. De historia plantarum, & Dioscorides lib. 2. De lacte quoque tabiarum, quantum disceperet ab aliis, leges apud Galenum lib. 5. Method. medend. **E** Oxygala, aliis quoque modis oxygalam conficit Columella lib. 11. Est quod aphrogala uocatur, quod æstate dant media in caloris siccitatisque leuamen: an idem sit quod hoc loco ex Plinio oxygala appellatur, coniecere potius licet quàm certi aliquid pronuntiare: cum neminem hæcenus aut græcum autorem aut latinum (quod certe memini) uiderim, qui quid sit aphrogala explicet. Melca autem quid sit (quod è lacte quoque obsonium est, cuius & usus idem qui aphrogalactis est) descripsit nobis Constantinus Cæsar in agriculturæ lib. 12. ex Paxamo autore. Melcam scilicet lac esse, in ollas fistiles, quæ acrum fetuescens ebiberit, coniectum repositoriumque: atque quod hoc pacto acidum fuerit redditum, melcam uocat. Interdum etiam &c. Hoc à Dioscoride & Plinio sit, non ad separationem, sed ne superfundatur lac cum feruet. Setum à lacte ) Modus separandi describitur à Dioscoride, & Plinio lib. 28. *πυρίτω*, aliàs *πυρίτω*, *πυρίτω*, inquit Athenæus, à nonnullis uocatur primum lac, quod statim ab edito foetu mulgetur.

**H** Caseus, Casei faciendi ratio traditur à Columella lib. 7. **A** Stomacho utiles, inquit Plinius, qui non sunt salsi, id est recentes. Caseus mollis, ut Plinio uidetur, alui fistit. Elixus, *ελυξ*: ita habetur in Dioscoride, sed non sine suspitione mendosi exemplaris. Caseus recens cum melle, inquit Plinius, suggillata emendat. **D** *βυρς*, aliàs *βυρς*. Latinus interpres uetus baynticus legit. an fortasse bithynius? ut idem sit, de quo statim ex Plinio. De caseorum præstantissimorum uarietate ex locis, plura habet exempla Plinius lib. 11. **E** Mollis, Mollem caseum, & qui recens coactus est, Columella (ut arborior) caseum uiridem, Plinius musteum uocauit. Saprum, id est putridus caseus, uel uetustate putridus. **H** Fuligo ex butyro, *λίγος ἐκ τοῦ βουτύρου*. Quo pacto colligitur ex butyro fuligo, docet Dioscorid. lib. 2.

H ij

# DE ANIMALIVM DIFF- E FERENTIIS LIBER IIII.

De homine.

Cap. LX.

*Homo.*



VM animalium differentias quæ dictu dignè videbūtur, prout natura cuiusq; admonebit generatim speciatimque simus notaturi, iure potissimum ab eo ordiemur quod primum est: prima autē sunt quæ perfectæ: cuiusmodi uero sunt quæ animal generant perfectum, eorūque primum & præcipuum homo est: utpote quæ rerum natura, sensus iudicio & rationis capacitate præposuit omnibus. Sapiēs enim est hoc animal, & unum ex omnibus animalibus nobis cognitis diuinitatis particeps, aut omniū maxime simul & prudentissimum omnium. Homo itaque cum sit animalium omnium diuino cultui maxime deditum, nō abs re effectum est, ut omniū maxime erectus uiuat, superiorem sui partem ad uniuersitatis supremum erectum habēs: caput scilicet, quod membrum corporis totius diuinissimū esse cæterorūque principē asserit Plato: cui totum corpus connexū subest & ueluti pareat: atque in hoc tanquam in summa corporis arce præstantissimam animi nostri partem, ipsam scilicet rationem, sedem habere dicimus. Et cum alia item animalia imaginationem habeāt, quæ per sensus sit, (φαντασία αἰσθητικὴ uocant Græci) homo unus ex numero animalium, quæ nobis cognita sunt, τὸ βωλῶντικόν, id est uim obtinet cogitandi deliberandiue. Et memoriæ quidem atque disciplinæ plures animantes participes quandoque sunt: nulla tamen præter hominem potest reminisci: quādoquidem id nulli contingit absque νομοθεσίᾳ, id est rationis quodam ueluti discursu, quid prius & quid postea factum fuerit colligere. Quod uero ad sensus attinet, homo quanquam pro corporis magnitudine minime fere omnium animalium procul sentire potest, sensilium tamen differētiarum sensu atque iudicio maxime omnium ualeat. Et in tactus quidē acumine & gustus (nam & hic tactus quidam est) homo reliqua facile superat animalia: uerum olfactum habet, nō solum aliis animantibus obtusiorē, sed & omnium sensum suum, qui uel in seipso sunt, maxime stupidam.

G Præstantissimam. Variam authorum sententiam de principalis animi partis sede, explicat Iulius Pollux, lib. 2. Quod uero ad sensus. Humanorum sensuum quàm sint certa iudicia pluribus explicat Cic. lib. 2. De nat. deor. & 4. Academ. quæst.

De partibus hominis exterioribus.

Cap. LXI.

Habet sane homo solus inter animalia caput superiorem obtinens sitū, non corporis sui ratione tātum, ut cætera, sed quod parti sublimi uniuersu

- A** uerſi reſpondeat, ut ſupra dictum eſt. Eſt autem propria naturalisq; capitis figura, ueluti ſi excogitares ſphæram paulo lōgiuſculam utrinque compreſſam: prominet enim pars utraq; prior ſcilicet & poſterior. Facies homini cātum, nomēque à re accepſiſſe uidetur *πρωτοπρως*: (quod enim unus animalium homo erectus eſt, ſolus proſpicit ante uerſus uocēque ante uerſus mittit.) cæteris os aut roſtrum: nam piſcis aut bouis faciē dicere non ſolemus. frons & aliiſ: ſed homini tantum triſtitia, hilaritatis, clementia, ſeueritatis index eſt. Supercilia homini & pariter & alterne mobilia: & in iis pars animi, negamus an annuimus: ſupercilium homini dextrum magis attollitur, & arcuatum magis quā ſiniſtrū habetur. Diſtant oculi hominis ſibi interuallo proportionē magnitudinis reſpectu cæterorum animalium minimo. Puerorū omnium oculi ſtatim à partu cæſiuſculi ſunt: poſt uero imitantur in eam naturam quæ futura eſt: quod in cæteris animalibus non euenit manifeſte. naſcuntur etiam nonnulli altero tantum oculo diuerſo, cæſio ſcilicet, quod item cæteris fere non contingit. Cum cæteris quidem animalibus in ſuo genere fere ſingulis color ſit idem, ſolus, uel ſaltem potiſſimum animalium homo numerofa oculorū uarietate notatur: quod enim nigrum oculi dicitur, aliis atrum conſpicitur, aliis admodum cæſum, aliis fuluum, aliis caprinum, quod ad cernendi claritatē primatum obtinet. Sunt & oculi in homine grādioreſ, modici, parui, prominentes, (quos hebetiores putant) cōditi: (quos clariſſime cernere) præterea alij contuentur longinqua: alij niſi prope admota nō cernunt, *μυωπες* dicuntur & luſcioſi. Multorum uiſus fulgore ſolis conſtat, nubo die non cernētium, nec poſt occaſum: alij interdiu hebetiores, noctu præter cæteros cernunt: utique nyctalopes uocantur. Augurium eſt ex homine ipſo nō timēdi mortem in ægritudine, quādiu oculorum pupillæ imaginem reddāt. Inter ea quæ pilos habent, homo unus cilium in utraq; palpebra obtinet, & parte magis ſupina quā prona, contra quā quadrupedum generi accidat: & frequentius conuiuet homo, quā alia. Aures homini tantum immobiles: & ſitum utroque ex latere, eodem in orbe quo oculi obtinent: nō, ut quadrupedum nonnullis, poſitæ ſuperius ſunt. mobiles eſſe nares natura uoluit, nec ſicut aures immobiles. Labra homini mollia, carnoſa, & quæ ſeparari poſſint data ſunt: tum dentium tuendorum gratia, ut & cæteris, tum etiam ad uſum ſermonis agilia. Barba nō pari modo effunditur omnibus, ſed aliis tam muſtax, quā maxillæ & mentum, pilorum frequentia integuntur: aliis mentum leue & muſtax, maxillæ uero pilofæ cernuntur. Homo contra quā cætera animalia dentibus carens uenit in lucem, niſi quid præter naturā interceſſerit: pueri deinde ſeptimo menſe dentire incipiunt: primo edunt primores, alij ſuperiores, alij inferiores: ſed fere ſuperiores, uti Plinio uidetur. Denique omnes maturius dētiunt, quorum nutrices lachabēt calidius. Mutantur poſtea homini dentes (ſicuti & quibuſdam aliis) primores: nam ſeptimo eodem decidere anno, aliōſq; ſuffici palam eſt: ac canini amiſſi caſu aliquo, nunquā renaſcūtur: & maxillares nullū animal mutat, ut dictum eſt. Homini nouiſſimi maxillares, quos genuinos uocamus,

circiter uicesimū annum gignuntur & uiris & mulieribus. Iam uero quibusdam mulieribus anno etiam octogesimo maxillares illi nouissimi non sine dolore exierunt. Viris quoque idem euenisse accepimus: quod certe iis accidit, quibus in iuuentute ipsi genuini nati non fuerint: sed quibus in iuuenta non fuere nari, inquit Plinius, decidere in senectā, & mox renasci certum est. Dentes habet plures mas, quā fœmina. triceni bini uiris attribuantur, fœminis minor numerus. Aliqui uice dentium continuo offe gignuntur. Hominum dentibus quoddam inesse uirus irraditur: nanque & speculi nitorem ex aduerso nudatos hebetare, & columborum fœtus implumes necare. Linguam habet homo absolutam maxime, mollissimam & latam: ut sit non ad sapores solum percipiendos, sed ad literatū explanationem, & sermonis expressionē accommodatissima. Latū pectus humanū est, cætera angusta. Et præter hominē nullum est animalū, quod mammas parte gerat priore. Mammas homo solus ē maribus habet: cætera animalia mammarum notas tantum: maribus mammarū conspectiores & fœminationes tum iunioribus tum senioribus efficiuntur, qui humidiores, leuiiores, nec uenulenti sunt: eorūque ipforum, iis magis qui fuscī, quā qui candidi sunt. In mamminis etiam maribus lac fieri potest: uerum caro iis spissa, mulieribus fungosa foraminulentaque. uiris post pubem exiguum nonnullis lac exprimitur: ueruntamen per suctum frequentiore, uel multum prodisse aliquibus traditum est. In muliere lac quod ante septimum mensem contractum est, inutile est: sed simul infans natalis est, & lac esse utile incipit: prius autem falsum etiam est, ut pecoris. Mulieris lac commodius lactentibus est, ex Aristotelis sententia, quod liuotem trahit, quā quod candidum est: & fuscæ salubrius quā candidæ. Galenus candidū lac, Paulus quod non solum crassitudine, odore, & sapore, sed & colore quoque mediocriter est, commodius arbitratur. Maris genitale foris prominet & ante habetur, testēsque absoluti pendent. Genitale illi cartilaginofum carnosūque, quod ut parte catnosa inflari nequit, sic cartilaginosa intumescit. Homo unus sanguineorum cauda uacat: nates habet, quod nulli quadrupedū datum est. Homo uice pedum priorum brachia habet & manus: & ungues in digitis habet rectos ac latos. Solus quoque animalium ambidexter, hoc est dexter uttaque manu nascitur. Hominis digiti articulos habet ternos: pollex binos, & digitis aduersus uniuersis flectitur: per se uero in obliquum porrigitur, crassior cæteris. Huic minimus mensura par est: duo reliqui, sibi: inter quos medius longissime protenditur. Digiti quibusdam in manibus seni. Inflexus articulorum tum brachij, tum digitorum omnium agitur ad interiora. Crura homini fœmore suraque carnulenta sunt: nallamque fere sui corporis pattem, tam carnosam habet, quā nates, fœmora, tibias: (quas enim suras uocamus, non nisi carnis copia parte tibiæ posteriore complentur) cum cætera animalia quæ cruribus constant omnia, uacua carne hæc habeant. Sura aliis retracta ad poplitem est, quibus scilicet nates sunt pleniores: aliis detracta, quibus graciliores. In ipsa genu utriusque commixta dextra latuāque, à priore parte gemina quædam buccarum in-

*Nates pleniores,  $\mu\gamma\alpha\lambda\lambda\eta$  τῶν ἰσχίων.*

A nitas inest, qua perfossa, ceu iugulo, spiritus fugit, ut Plinius author est. Homini pedes omnium maximi proportionem magnitudinis: quibus pars interior plantę non caua, sed ita pleniüscula est, ut solū toto attingat uestigio, ij uersuti sunt, ut inquit Aristoteles, & fraudulentı. Digitorum manus magnitudo, contra quam pedis est. manus enim longos, pes uero breuior habet digitos. ungues habet homo pro digitorum magnitudine minimos. Homo cōtra atque cetera animalia inflectit crura brachiaque: quippe qui brachia in posteriora flectat, (quanquam ita ut paulum uergant ad latera interiora:) crura autem in anteriora. Partes naturales hominis unius, secundum naturam dispositę sunt, tam superiores quam inferiores: quandoquidem partem superiorem ad uniuersū supremum erectam obtinet: solus enim animalium erectus incedit. Homo cum ad iusta incrementa peruenit, partem superiorem habet minorem quam inferiorem, cōtra quam cetera animalia quę sanguine constant: (partem superiorem intelligi uolo, quantum de capite ad eam pertendit partem, qua exitus patet excrementis: inferiorem autem, quantum ab ea ipsa subsequitur reliquū corporis.) homo nanque in prima ipsa etate, antea quam adolescat, partem superiorem corporis habet maiorem quam inferiorem: & quō per etatem amplius augetur, eō contra cūnit, ut inferiora superioribus magis crescant, donec ad iustam peruenerint magnitudinem. Quamobrem unus ipse non eodē modo ingredi solet, infirma adhuc etate, quo iam firma ingreditur: sed dum infans est principio, ne serpere quidem potest, sed immobilis iacet: deinde

C primum quadrupes reptat: postea se erigit, bipēsq; incedit, nisi formam pomilionis habeat. Est autē pomilio cuius pars superior magna est, inferior, quę sustinet pondus motumque exercet, parua. Partı dextrę habilior ascribitur motus, leuę firmitas maior: unde altera gesticationibus promptior est, altera oneri ferendo accommodatior. Vires tamen quibusdā dextera parte maiores esse, quibusdā æquas utraq; aliquibus leuā manu precipuas obseruatum est.

Nardus.

D Quosdam etiam cum dentibus esse natos, exempla sunt & apud Plinium & Solinum. Genuini, *αγγερινες, ὁ ἄλγος*. F. Natalis, *γενναίος*, id est ad partum habilis: Plinius uitalem dixit. Quod liuorem trahit, *πενιαιώτερος*, id est quod ad liuorem accedit, uel subliuidum. H Pollex, inquit Aristoteles, uno inflectitur nodo, ceteri binis adducuntur: ut uero Galenus, compactus pollex est ex triplici ossē: primumque eius internodium tanquam palmę pars minime est accipiendum. A Partes etiam crurum brachiorumque, quo pacto & contrario modo inter se flectantur, & contra quam in ceteris animalibus, pluribus explicat Aristoteles lib. De gressu animalium.

De partibus interioribus hominis, & similaribus. Cap. LXII.

Homo plurimum cerebri proportionem magnitudinis, ac humidissimū habet: & mas plus quam femina. Vni animalium homini cerebrum in infantia palpitāt, nec roboratur ante primum sermonis exordium. Cor animalibus ceteris in medio pectore est: homini tantum infra leuam papillam turbinato mucrone in priora eminens. Est hominis pulmo simplicior, nec ita multifidus, ut nonnullorum animal procreantium est: nec leuis,

sed inæquabilis est. Fibras habet, quas *λέγους* uocant, quatuor quidem maiores, utraque scilicet parte binas: unam autem simplicem & minorem. Rotundum hominis iecur est, ac simile bubulo: superne quæ manu tangitur, gibbum est, intrinsecus cauum. Iecur quatuor fibras habet, in iis duntaxat qui procero corpore sunt, uti Theophilus prodidit: non in omnibus enim hominibus fibrarum numerus similis conspicitur, sicuti neque magnitudo. etenim uti recte scripsit Herophilus, in quibusdam ne fibras quidem habet iecur, sed ex toto rotundum est: quibusdam duas, aliis plures, nonnullis quatuor. Iecori fel adnexum habetur: aliqui tamē eo carere uidentur, quorum ualetudo, inquit Plinius, firmior, & uita longior. Carent eo qui absinthio uescuntur in Ponto. Est hominis lien suillo similis specie angusta & longa. Hominū renes, inquit Aristoteles, similes bubulis sunt: quippe qui P tanquam compositi ex multis exiguis renibus constant: neque æquabiles sunt, quomodo renes ouium cæterarumque quadrupedum habentur. Galenus uero eorum figuram, ea parte qua uenæ atque arteriæ in ipsos inferuntur, simam esse prædicat: altera uero, quæ illi parti opposita est, plane rotundam. Venter humanus canino similis est: (quippe qui nō multo amplior sit quàm intestinum) figura illi rotunda, sed oblongior, & quasi intestino similis ampliori. Intestina homini suillis ac simiarum proxima sunt: in quibus quod colon appellatur, amplius est: & quod post ipsum in sedem porrigitur, breue id corpulentumque est. Omētum homini proportionē magnitudinis maximum est: oritur id & dependet à medio uentre, quæ ueluti futura ducitur. Est & hominis uesica proportionē, quàm cæterorum amplior. Sanguis homini tenuissimus ac purissimus est: extremumque sanguinis uitium habetur, cum sit uel in picis liquidæ modum crassus, uel serosus adeo, ut posteaquam è uena effusus concreuerit, plurimum habeat liquidi humoris supernatās: optimus uero qui inter hos medius est. Omnium fœminarum maxime mulier sanguine abundat: & quæ menstrua appellamus, plurima fieri in mulieribus solent. Sunt & hominis uenæ crassæ proportionē humani corporis. Inter ossa sinciput ultimum confirmatur: iam enim cum partus in lucem uenit, molle hoc infantis os est, palpitātque, ut antea dictum est. Caluaria homini raro solida sine futuris est: sed tamen & uiri caput uisum sine ulla futura est. Spina hominis ex uertebis quatuor & uiginti constat: (excepto etiam ossē sacro) nam in reliquis, ex pluribus compacta est. Homo omnium animalium, quæ pilos habent, nudissimo corpore est: pilis enim paucissimis exiguisque integitur, nisi in capite: qua quidem parte, hirtissimus omnium ipse est. Et cum cæteris, quæ pilis uestiuntur, partes pronæ pilosiores sunt, supinæ aut glabræ omnino, aut minus pilosæ habentur: homo contra. Cilium etiam homini utraque in palpebra, ut dictū est: & alæ oppletæ pilis, & pubes, quod cæteris deest. Pili in homine omnium animalium uno, partim simul, partim postea per ætates gignuntur. Congeniti sunt pili capitis, superciliorū & palpebrarum: postgeniti pubis primum, mox alarum, postremo menti: loca enim quibus pili proueniant, totidem sunt congenitis deputata, quot post

*Colon, Theodorus alius interpretatur.*



- A post genitis. Deficiunt ac defluunt maxime primisque per ætatem pili capitis, non tamen omnes, sed tantum primores. ergo capitis leuitatem caluitium nuncupamus, Græci *φαλαγγίται* dicunt: quam rem in superciliis *Caluitium, φαλαγγίταις.* hoc est salitium appellamus, quoad melius uocabulum inuenimus, inquit Theodorus. Mutatur color pilorū in senectute: cādidiq; pili efficiuntur in hominibus, quod uel in quibusdā aliis, uerum per paucis animalibus accidit, sed non adeo aperte, præterquam in equo: hunc pilorum candorem canitiem uocamus, Græci *πυλίται*. Caluitium uni tantum animalium homini, præterquam innatum: parte itaque capitis priore non nulli caluescunt. sed pueri aut mulieres raro caluescunt: uiri autem procedente ætate sæpius calui euadunt. ne chon capite homines senescentes canescunt, quod nulli fere ex cæteris accidit manifeste. Canescunt homines primo temporibus: sed nemo uel temporibus, uel occipite caluescit. Pili post geniti iis, qui ante pubertatem castrati sunt, nō exeunt, & post pubertatem excisis, soli decidunt, præterquā pubis: hæc enim quanuis minuat, tamen manet. congeniti uero iis non defluunt: nemo enim spado caluescit. Pili in mento mulieris non prodeū, nisi interdum pauci: reliqui pili qui postea gigni solent, mulieribus quoque proueniūt, sed parcius. Fieri potest, ut homo tum mas tum etiam fœmina pilis post genitis careat, iam inde ab ortu naturæ uisio contracto: & nisi ut pubescant contingat, steriles in gignendo sunt. Crescūt pili quibusdam in morbis, ut præcipue in tabificis: quinetiam in senectute & defuncto augecūt durioresq; redduntur, quod
- C idem quoque unguibus euenit. Copiæ pilorum defectusq; discrimina pro corporis temperatura, atque pro cutis qualitate proueniūt. Qui enim calida & sicca intēperie sunt, magna ex parte hirsuti euadunt: uerum hoc, si in summo fuerit: mediocriter autem, si calida quidem est intemperies, sed in altera cōtrarietate mediocritatem habeat. similiter & quæ sicca quidem, sed in calido & frigido media est temperie: est enim ea quoq; modice hirta. Raro pilo sunt omnia frigida temperamenta, siue ea mediocriter se habeant in humiditate, siue immodice. Cæterum ad summum glabra est frigida temperies & humida: minus hac quæ frigida est, sed in altera cōtrarietate temperata: adhuc minus, quæ frigida & sicca est. Nō ut in cæteris animalibus quæ pilum habent, colorū causa cutis est: qui enim alba sunt cute, nonnunquā nigros admodū habent pilos. Cutis homini proportionem magnitudinis tenuissima est: ea uero quæ in manu est, quā proxime ad mediocritatem accedit: ideoque & tactus instrumentum in homine præcipuū est. cutis quoque affectus secundum naturam est, tum Ægyptiorum nigritia, tum Gallorum candor, tum Scytharum rufus color.

De uoce hominis, &amp; somno.

Cap. LXIII.

Vocem quidem mittunt & alia animalia: nullū tamen aliorū est, quod loqui possit, sed proprium id hominis est. Qui surdi iam inde ab ortu naturæ sunt, iidem etiam muti. uocem ergo emittere possunt, locutionem autem nullam. Pueri ut cætera sua membra continere ac regere nequeunt,

E

Cap. <sup>1</sup>LXIIII.

Semen habet homo pro corporis magnitudine plurimū: & homini maxime omnium animalium temporibus omnibus oportunus coitus est. G  
Cæteris enim animalibus statim per tempora anni concubitus: homini uero omnibus horis dierum noctiumque: cæteris satietas in coitu, homini prope nulla. Stimulatur ad uenerem mas hominum magis tempore hyberno, femina æstiuo, ut Hesiodus prodidit. Ætas uero accommodata ad coitum innotescit homini, tum uocis mutatione, tum etiam testium non magnitudine tantum, uerum etiam specie: quemadmodum etiam mammis declaratur, sed præcipue ortu pilorū pubis. Mas semen genitale magna ex parte incipit ferre anno peractō bis septimo: simul etiā pubescere incipit eo tempore. Vox item per id tēpus mutari in sonum asperiores inæquabilioremque incipit: quanquam nondum grauis, neque acuta præterea est, neque tota æquabilis. Mammæ etiam extuberant: & genitale nō solum magnitudine, H  
sed etiam specie proficit. Fæminis etiam per id tempus exurgunt ubera: & quæ menstrua uocantur erumpunt: & uox eodem tempore puellarum mutatur in grauiorem. In puellis item diuersitas uberum est: aliis enim admodum magna, aliis exigua sunt: euenit sane ut immodice crescant, cum puellæ excrementis redundant. Semen profecto infæcūdum usque ad bis septimum annum est: mox prolificum quidem est, sed exigua imperfectaq; generant iuniōres & mares & fæminæ, ut in cæterorum quoque animalium plurimis euenit. Conciipiunt quidē facilius natu minores: sed ubi cōceperint, laborant in puerperio uehementius: corpore etiam minus magna ex parte perficiuntur: & senescunt celerius mares salaces, & mulieres quæ frequētius

- A** frequentius pariant: nam ne incrementum quidem post tertium partum effici posse uidetur. Post annum ter septinū mulieribus quidē opportune iam procreatio est: sed uiris accedere aliquid potest adhuc ad perfectionē. Homo mas ad annū usque septuagesimum, uidelicet termino ultimo potest generare: fœminæ usque ad quinquagesimum, uerum id raro: paucis enim proles in eo ætatis tēpore procreata est: sed magna ex parte maribus sexagesimus, aut quintus & sexagesimus annus finis progenerandi est: fœminis quintus & quadragesimus. Bipedum solus homo animal generat: & homo maxime sua natura uniparum est: cum omnibus tamen generibus ambigit: nam & uniparum, & pauciparum, & multiparum interdum est: hinc tempus etiam uteri ferendi enorme unum hoc animal sortitū est. cæ-
- B** teris enim unū est tempus: homini uero plura sunt. Nam & septimo mense & octauo & nono parere potest: & quod plurimū, decimo, nonnullæ etiam undecimum attingunt. Fœtus qui maturius quàm septimo mēse prodeat, nullo pacto uitalis est: septimo, non nisi pridie postēorū plenilunij die aut interlunio concepti nascuntur, ut Plinius author est: qui septimo mense, uitalis quidem hic primus exit: sed magna ex parte infirmior. Nonnullis etiam meatus quidam infissi, ut aurium & nariū, sæpenumero generantur: sed accrescenti articulantur infanti, & demum suam formam recipiunt: & in his multi etiam uiuere atque adollescere possunt. Qui autem mēse octauo nascuntur, non nisi per pauci seruantur: unde fit ut si quis in locis saltem Græciæ seruetur, non octauo mense natus existimetur, sed mulierem
- C** sui conceptus initium latuisse. Simili modo & qui diuturniores quàm undecimo mense nasci uidentur, eorum conceptus initium latēre putatur. Ita multiplex perficiendi tempus, pariēdique diuersum homini datum est. Et cum alia singulos pariant fœtus, alia plures, genus humanum, uti diximus, in ancipiti est. Nam quod plurimum & locis plurimis agitur, mulieres singulos singulæ pariunt: sed sæpe geminos etiam: (nam in Ægypto plerumque geminos pariunt) quandoque etiā & tres & quatuor: sed quinque cum plurimum nascuntur: iam enim hoc pluribus euenisse cōspectum est. Et quædam uiginti, partibus quatuor edidit: quinque enim singulis partibus enixa est. Verum supra ter geminos nasci, inter ostēta adducitur, (ut inquit Plinius) præterquam in Ægypto, ubi fœtifer potu Nilus: quo in loco septenos
- D** uno utero simul gigni author est Trogus. Et cū in cæteris animalibus gemini nati, etiam si mas & fœmina sint, nihilominus enutriantur seruēturque, quàm si mares ambo aut fœminæ sint: in genere certe humano pauci gemini seruātur, si alter mas sit alter fœmina. E geminis si remanēte altero alter abortiuo fluxu exciderit, alter qui legitime natus est, uopiscus nominatur. Mulier grauida quidem maxime fere animalium coitum patitur: uerum raro euenit ut superfœtet, sed factum tamē aliquando est. Qui itaque longo post tēpore sint cōcepti, minime perfici possunt, sed præmaturius dolore, quo ipsi & primus fœtus intereāt, mouēt. At uero si proxime à primo cōceptu secundus sit factus, alfolui ediq; potest quod superfœtarit: ut quasi gemini nasci uideantur: quomodo Hercule & Iphidem procreatos esse fa-

bulantur: unum quidem omnino, aut alterum superfœtat mulier. Extat in E  
monumentis etiã medicorũ, & quibus talia cõsectari curę fuit, uno abortu  
duodecim puerperia egesta. In ferendo etiã utero homines cum cæte-  
ris animalibus dissident: cum enim cætera animalia plurimum temporis  
ualeant corpore cum utero ferunt, mulieres magna ex parte ægre degūt.  
Quibus autem gentibus solitum est, ut mulieres labores suscipiant, iis nec  
uterus tam difficulter gestatur, & partus facilis est. denique quibusuis lo-  
cis mulieres quæ laborare consueuerunt, facilius pariunt. Omnium ani-  
malium mulieribus inter fœminas plurima mensium purgatio euenit: ut  
uero Democritus physicus ostendit, mulier solum animal menstruale est.  
Conceptus mulieribus à menstruorum profluuii sua natura contingit: &  
quæ iis carent, steriles magna ex parte exigunt: uerum fieri potest, ut aliquę F  
etiã sine eorum profluuii concipiant, uidelicet quibus tantum humoris  
colligitur, quantum iis mulieribus, quæ purgātur restare solet: quanquam  
non tanta copia ut & foris possit profluere. Sunt quibus prægnantibus etiã  
menstrua usque in postremum gerendi tempus eueniant: quibus accidit ut  
paruos fœtus pariant, & proles aut minus uitalis, aut infirma procreetur.  
Desinunt plurimis menstrua circa quadragesimum annum: quod tempus  
quæ excesserint, iis ad quinquagesimum seruantur nonnũquam: etiã non-  
nullæ eo tempore pepererunt, ut dictum est: sed ultra hoc tempus nulla po-  
test protrahere. Et ipsæ fœminæ quibus munus est necessitatis huiusmodi,  
quandiu sunt in sua lege, non innocentibus oculis contuentur: aspectu spe-  
cula uitiant, ita ut hebetetur uisu fulgor offensus, & solitam æmulationem G  
uultus extinctus splendor amittat, faciēsque obtusi nitoris quadam caligi-  
ne nubiletur. Mulierum aliæ in æternum steriles sunt: aliæ mutatis coniu-  
giis exuunt sterilitatem: nonnullæ tantum semel pariunt: quædam autem  
fœminas aut mares semper. Euenit quippe multis & uiris & mulieribus, ut  
qui coniuncti inter se nequeant procreare, ubi dissociati se iungere cum a-  
liis, queant. Quod idem in maris quoque aut fœminæ procreatione nimi-  
rum euenire certum est. plerunque enim tum mulieres tum uiri, quandiu  
cum eisdem iunguntur, fœminam tantũ marẽmue procreant, seiuncti au-  
tem cõtra. Ætatis etiã ratione immutātur, ut scilicet iuuenes inter se fœ-  
minas generent, seniores facti, mares, aut contra. Et qui iuuenes nihil pro-  
creent, seniores iam incipiant generare: aut contra, ut qui ante possent, post H  
nihil possint fœtificare. Sunt etiã aliæ mulieres, quæ uix concipiunt: sed  
si concipiant, perficiant atque edant: aliæ contra, facile quidem cõcipiunt,  
sed seruire non possunt. Sunt & uiri qui non nisi fœminam procreent, &  
mulieres quæ non nisi marem: & contra, ut de Hercule fabulantur, qui in-  
ter duos & septuaginta liberos, fœminam unam tãtummodo genuit. Quæ  
concipere nequeunt, si uel cura adhibita, aut aliquo casu conceperint, fœ-  
minam magna ex parte pariūt potius quàm marem. Multis etiã uiris e-  
uenit, ut cum antea possent generare, post nequeant: deinde rursus faculta-  
tem recipiant generandi. Fœtus in utero in semet conglobatus, sic gesta-  
tur, ut nasum inter genua habeat. Nascuntur pueri (ut cetera etiã anima-  
lia)

A lia) in caput uerſi: iꝑſe pedes autem procedere naſcentem, contra naturã eſt: quapropter uelut agre parti appellantur agrippæ. Ita editi minus proſpere uiuunt, & de uita aũo breuiori decedunt. Sed pueri manus quoque ad coſtas porrectas extenſasque habent: qui cum exierint, uocem ſtatim emittunt, & manus in os admovent. Excremētum etiam reddunt, alij ſtatim, alij breui, ſed omnes intra diem: quod excremētum copioſius quàm pro infantis magnitudine eſt: *μικρόν*, id eſt papauerculum hoc mulieres uocant, colore cruentum atque admodum nigrum & piccum eſt: poſtea lacteum iam & albidum redditur: ſugit enim conſeſſim ubera infans. Vocem antequam egrediatur nunquam emittit, uti ante dictum eſt: etiamſi cum diſſiciliter egreditur, caput extet, corpus intus ſit totum. Naſcentium uox prima uagitus eſt: lætitiæ enim ſenſus diſſertur in quadageſimũ diem. Nam infantes, ut modo diximus, primis quadraginta diebus, neque rident cum uigilant, neque lachrymantur: ſed noctu & per quietem utrumque interdũ faciunt: nec uero ſentiunt magna ex parte, cum ſcalpuntur. Plurimam huius temporis partem dormiunt: cæterum in dies quò ſubinde auctiores fuerint, eò magis ad uigilandum immutantur. Pueris ſinciput, ut modo diximus, molle eſt, ſeroque duratur: cum tamen cæteris animalibus diſcrimen oſſium nullum ſit: ſed omnia perfectã iam à natiuitate proueniant.

Fœminæ non ſimiliter atque mares perficiuntur: quippe cum & intra parentem fœmina tempore longiore conficiatur quàm mas: & ubi in lucem uenerint, celerius fœminæ quàm mares perficiantur. Nam & pubes & uigor & ſenectus fœminis prius uenit quàm maribus. Partus cæteris quidem animalibus minime laborioſi cueniunt: at mulieribus dolores uehemētiffimi incidũt, & præcipue ſtabilibus & ſellulariis, & quibus nō bona latera ſunt, neque facultas retinendi ſpiritus ſuppetit. Poſt partum purgationeſque lactis copia excitatur, & nonnullis effluit non ſolum de papillis, ſed etiam paſſim per ubera: aliquibus etiam per alas. Edurãt in poſterũ globuli, (*σπυγχαλίδες* dicunt) quoties humor non coquatur nec exeat, ſed redundet: ubera enim tota fungoſa ita ſunt, ut ſi in poculo pilum forte hauſerit mulier, dolor moueatur in mammis, quod malum *τεταχας* uocant, id eſt pilare appellant: nec ſedatur, donec pilus uel preſſus exeat ſponte, uel cum lacte exugatur.

Solent pueri plurimi conuulſione excipi: & præcipue corpulentiores, & lacte ueſcentes copioſiore aut craſſiore, & nutriceſ lactentes ſucci plenam & corpulentam. Plurimi ante ſeptimum diem intereunt: plenilunio etiam infeſtantur hoc malo periculoſius. Et quia ſolus homo, aut certe maxime animantium omnium homo comitiali morbo in tenera ætate laborat, quod morbi genus tranſuertere oculos, ſicut & cætera etiam membra poteſt, eò fit, ut ſoli aut certe maxime animantium homini oculi deprauentur per limitatem, fiãtque limi. Mares potius quàm fœminę oblatſi muti: licet in genere hominum naſcuntur: cum in cæteris animalibus nihilo potius mares quàm fœminæ ita proueniant.

A Extant apud Plinium & Solinum exempla quorundam, qui uel poſt ſeptuageſimum annũ liberos genuiſſent. D De paruũ ſuperſtitatione exempla uideas apud Ariſtotelem lib. 7. hiſt. animalium, & Plinium lib. 7, & Solinum cap. 4.

qui pueri conuulſi ſentiantur.

Hominis uita, ætates &amp; statura.

Cap. LXV.

E

Vluit homo plus temporis quàm quoduis animal, excepto elephanto, quod quidem usu rerù adhuc fide digno nouerimus, inquit Aristoteles: quanquam alij aliter sentiant, uti ex Hesiodo circumferuntur uersus. Tertia secula hominis transmittit garrula cornix. Quatuor & peragit cornicis tempora ceruus. Porro ætatù gradus Varro ita distinxit: pueritiâ ex puritatis ratione ad quintumdecimum extendit annum: inde ad tricesimum, adolescentiam: ad quintum uero & quadragesimum iuuetam: ad sexagesimum denique senectutem: in qua qui agunt, iam uocantur senes. Quinquennio fere corpus in homine quidem dimidium capere uidetur omnis magnitudinis eius, quæ reliquo toto tempore comparetur, ut sentit Aristoteles. In trimatu suo, inquit Plinius, cuique dimidiam esse mensuram stature certum est. Homo crescit in longitudinem ad annos usque ter septenos: tum deinde ad plenitudinem. Maxime autem pubescens, nodum quandam soluere, & præcipue ægritudine sentitur. Proficere uero homines ad annum usque tricesimum, aut longitudine aut crassitudine prodit Aristoteles. Corporis mensuræ ratio bifariam conuenit: nam quantus manibus expansis inter digitos longissimos modus est, tantum constat esse inter calces & uerticem. Nunc si de ipsis hominum formis requiramus, liquido manifestabitur, inquit Solinus, nihil de se antiquitatem mendaciter prædicasse, sed corruptâ degeneri successione sobolem nostri temporis, per nascetium detrimenta decus ueteris pulchritudinis perdidisse. Licet ergo plerique definiant nullum posse excedere longitudinem septem pedum, quod intra hunc modum Hercules fuerit: priscorum tamen molem testantur etiam Orestis suprema, cuius ossa Tegeæ inuenta à Spartanis didicimus implese longitudinem cubitorum septem. Procerissimum hominem ætas nostra, inquit Plinius, diuo Claudio principe, Gabbarum nomine ex Arabia aduectum, nouem pedum & totidem unciarum uidit. Iam uero ante tot annos uates ille Homerus non cessauit minora corpora mortalium, quàm prisca conqueri. In India multos quina cubita constat longitudine excedere. Oniscritus, quibus in locis Indiæ umbræ non sunt, corpora hominum cubitorum quinum & binorum palmarum existere prodidit: & uiuere annos 130, nec senescere, sed ut medio æuo mori. Cirnos Indorum genus Ifigonus tradit annis centenis quadragenis uiuere.

Longitudine septem pedum. Et alia inueniuntur exempla magnitudinis humanorum corporum, & apud Plinium & Solinum.

Multiformes hominum effigies, & mira quædam de hominibus alia.

Cap. LXVI.

ET monstriferæ narrantur hominum effigies: à litore Scytharum tridui nauigatione feruntur insulæ, in quibus equinis pedibus homines nascantur, Hippopodes appellati: alia in quibus nuda alioqui corpora prægrâdes ipsorum aures tota integant. In quadam conualle magna Imai montis regio quæ uocatur Abarimon, in qua syluestres uiuunt homines, auersis post crura planus, eximie uelocitatis, passim cum feris uagantes. Hos in alio non

spirare

Alia, ad quadragesimum uero inuentam.

Hippopodes  
Alia, Timani montis.



- A** spirare solo, ideóq; ad finirimos reges non pertrahi aiunt: & in quadá Africę parte quoque homines feri sunt, & uiri & mulieres. In Scythia iuxta septentrionem produntur Arimaspi uno oculo in fronte media insignes: id quod ne crediderim quidem, inquit Herodorus, ut uiri nascantur unoculi, cæterum naturam habentes hominibus parem. Ferunt certe in Æthiopia ab oriētis parte intima, gentes esse sine naribus, æquali totius oris planitie: alias superiore labro orbas, alias sine linguis. Pars etiam ore concreto & naribus carens, uno tantum foramine spirat: potumque calamis auenę trahit, & grana eiusdem sponte prouenientis ad uescendum: quibusdam pro sermone, nutus motusq; membrorum. Megasthenes gētem inter Nomadas Indos narium loco tantum foramina habētem prodit. Supra Nasamonas
- B** confinēsque illis Maclias Androgynas esse utriusq; naturę, inter se uicibus coeuntes, Caliphanes tradit: Aristoteles adiicit, dextram māmam iis uirilem, leuam muliebrem esse. In monte cui nomen est Milo, homines esse a uersis plantis, octonos digitos in singulis pedibus habentes, author est Megasthenes. In multis autem montibus genus hominum, capiribus caninis, ferarum pellibus uelari: pro uoce latratum edere, unguibus armatū: uenatu & aucupio uesci. Ctesias scribit, in quadam genere Indię scēminas semel in uita parere, genirósque confestim canescere: esse rursus genrē alreram quę in iuuenta sit cana, nigrescat in senectute, ultra æui nostri terminos perennātem. Perhibent esse & genrem scēminarum in Calingis Indię gēte, quę quinquennes concipiunt: sed ultra octauum anñum uiuendi spatium
- C** non protrahunt. At Cirnos, Indorum genus Isigonus tradit annis centenis quadragenis uiuere. Legimus quoque Monoscelos in India nasci singulis cruribus, & singulari pernicitare ad saltum, eisdemque Sciopodas uocari: qui in maiore æstu humi iacentes resupini, umbra se pedum protegant: nō longe eos à Troglodytis abesse: rursusq; ab his occidentem uersus, quosdam sine ceruice, oculos in humeris habentes. Sunt & Satyri in subsolanis Indorum montibus, perniciosissimum animal, tãquam quadrupedes: tamen recte currentes, humana effigie, ut propter uelocitatem, nisi senes aut egri, non capiantur. Satyri cum senuerint Sileni uocantur, inquit Pausanias. Euphemus prodidit in insulis, quę Satyrides in extero mari uocantur, incolas rufos esse, & caudas habere haud multo equinis minores. Satyri in Æthiopia,
- Satyri. In Æthiopia, inquit Solinus, & Plin. quęque lib. 5. ca. 8. Sileni.*
- D**ur inquit Plinius, in Lybia, ut Solinus, de hominibus nihil aliud præferunt, præterquam figuram. India præterea habet genus hominum, qui non alia quàm testudinis carne uiuunt: hirsuti omnia facie tenus, quę sola leuis est: iidem coriis piscium uestiuntur, Chelonophagi cognominati. Blemmyas in Æthiopia credunt truncos nasci parte qua caput est: os tamen & oculos habere in pectore. Himátopodes flexis nrisibus crurum, repūt potius quàm incedunt, & pergendi usum lapsu magis destinant quàm ingressu. Post uastam Ægypti solitudinem feruntur Cynoprofopi homines habitantes, qui ex uenatu dorcadum & bubalorum uiuunt, nigro aspectu, capite & dentibus caninis: uocis quidem expertes, sed strident acute. eorum manus robustis armantur unguibus atque acutis: similiterque toto pectore, ut capite
- Cynoprofopi. Cynocephali.*



ipso, hirsuti habentur, pedum celeritate ualent. Cynocephali ex eo nomen **E**  
 traxere, quod caninum caput habeant, cetera membra homini similia. Fe-  
 rarum pellibus induuntur: & iustitiæ retinentes lædunt neminem: cumq;  
 Indici sermonis intelligentes sint, nihil tamē loquuntur. Choromadarum  
 gentē uocat Tauron syluestrem, sine uoce, stridoris horrendi, hirtis corpo-  
 ribus, oculis glaucis, dentibus caninis. Eudoxus in meridianis Indiæ uiris  
 plantas esse cubitales prodit: sc̄eminis adeo paruas, ut strutopodes appellē-  
 tur. Megasthenes ad extremos fines Indiæ ab oriente circa fontem Gangis  
 Astomorum gentem sine ore, toto corpore hirtam: uestiri frondium lanu-  
 gine, halitu tantum uiuentem, & odore quem naribus trahūt: nullum illis  
 cibum, nullūmq; potum: tantum radicum florūmq; uarios odores syl-  
 uestrium malorūmq; secū portant longiore itinere, ne desit olfactus: gra-  
 uiore paulo odore haud difficulter exanimari. Super hos extrema in parte **F**  
 montium, spithamæi Pygmæi narrātur, ternas spithamas longitudine, hoc  
 est ternos dodrantes non excedentes. Quidam & Pygmæorum gētes pro-  
 diderūt ante paludes ex quibus Nilus oriretur: ubi & cum gruibus pugna-  
 re dicuntur. Degunt uero in cauernis: neq; id fabulam esse arbitratu Ari-  
 stoteles. Strabo autē qui uidisse se diceret, fide dignum neminē esse prodit.

Homini, quæ ex homine aut eius partibus, oriuntur  
 commoda. Cap. LXVII.

**N**unc quæ in ipso homine homini utilia inueniantur indicabimus,  
 ipsum sibi exquirentes. Quorundam hominū tota corpora profunt: **G**  
 ut ex iis familiis, quæ sunt terrori serpentibus, tactu ipso leuant percussos  
 suctūue modico: quorum ē genere sunt Pphyli Marfij, & qui Ophiogenes  
 uocantur in insula Cypro. Et in insula Nili Teutiri nascētes tanto sunt cro-  
 codilis terrori, ut uocem quoque eorum fugiant. Quæ autem nonnulli de  
 hominis partibus excrementisque prodiderint, nec referenda arbitror: san-  
 guinem nanque gladiatorum bibēre nonnulli, ut bibentibus populis pro-  
 cul essent comitiales morbi. Et hercule illi ex homine ipso sorberi efficacis-  
 simum putāt calidum spirantēmq; & una ipsā animam ex osculo uul-  
 nerum, cum ē plagis hunc, ne ferarum quidem admoueri ori fas sit huma-  
 na. Ad elephantiaſin quoque in Ægypto, cum in reges incidisset morbus,  
 in balneis folia temperabantur humano sanguine: alij medullam crurum **H**  
 quærunt, & cerebrum infantium. Nec pauci apud Græcos singulorum ui-  
 scerum, membrorūmq; etiam sapes dixere, omnia persecuti usque ad  
 reſegmina unguium: quasi uero sanitas uideri possit, ferā ex homine fieri.  
 Xenocrates, tanquam sane ille ipse fuerit expertus quosnam affectus cura-  
 re ualeat in cibo cerebrum, aut carnes, aut iecur humanum, prodidit: quos  
 etiam capitis, tibiarū, & digitorum ossa epota: quos denique sanguis, sudor,  
 urina, muliebria, & sterces deuorata: instestabilia hæc & dictū quoq; fasti-  
 dienda. Quæ autem retulisse fas sit, pleraque etiam ex iis non sine honore  
 dicto, explicabimus. Sanguine ipsius hominis ex quacunque parte emissio  
 efficacissime anginam illini tradunt Orpheus & Archelaus: item ora comi-  
 tiali

*Alijs, cū pla-  
 gin ne ferarum  
 quidem admo-  
 ueri ora fas sit  
 humana.*

- A** tiali morbo lapforum, exurgere enim protinus: quidam si pollices pedum pungantur, exq; his guttæ referantur in faciem. Lac muliebre corpori hu- *Lac*  
mano inter omnia lactis genera accommodatissimum est, ut quod & dul-  
cissimum mollissimūque est, & plurimum alit. Mulieri ante septimum  
mensē profusum lac inutile: ab eo mense, quod uitalis est partus, salubre.  
Lac utilissimum cuique maternum est. Cōcipere nutrices exitiosum est: hi  
sunt enim infantes, qui colostrati appellantur, densato lacte in casei speciē.  
Mammis quoque exuctū lac, stomachi rosionibus prodest & tabi, pulmo-  
nūmque incommodis. In longa febre celiacis utilissimū arbitrantur, ma-  
xime eius quæ iam infantem remouerit. Item mammarum collectionibus  
cum thure: & oculis ab ictu cruore suffusis: & in dolore aut epiphoris si e-  
mulgeatur, plurimum prodest: magisque cum melle & narcisci succo, aut  
**B** thuris polline: mixto præterea ouorum candido liquore, madidāque lana  
frontibus impositum, fluxiones oculorum suspendit: nam si rana saliuā sua  
oculum asperserit, præcipuum est remedium: & contra morsum eius bibi-  
tur stillatūq; . Qui simul matris filiaq; lacte inunctus sit, liberari oculorū  
metu in totam uitam affirmant. Aurium quoque uitiiis medetur, modice  
admixto oleo: aut si ab ictu dolent, anserino adipe tepefactū: & contra mor-  
bum regium in morbis relictum, instillatur cum elaterio. Podagris quoq;  
iubent illini cum cicuta: alij cum æsypo & adipe anserino: (qualiter etiam  
uuluarum doloribus imponitur) alij cum opio & ceruto: peculiariter ualet  
potū contra uenena, quæ data sunt cum marino lepore buprestiq; : & con-  
**C** tra insaniā, quæ fit hyoscyami potu. Sempérq; in omni usu efficacius eius  
quæ marem nixa sit: multoque efficacissimum eius, quæ geminos peperit  
mares, & si uiuō cibisque acrioribus abstineat: eius uero quæ fœminā eni-  
xa sit, ad uitia tantum in facie sananda præualet: eius quæ marem peperit  
lacte gustato, canes rabiosos fieri negant. Hominum qui probe concoxe-  
rint ieiuna saliuā, lichenas puerorum illitu assiduo sanat: item lippitudines  
*Saliva,*  
matutina quotidie uelut inunctione. Mulieris quoque saliuā ieiunā, potē-  
tem diiudicant oculis cruentatis, & si contra epiphoras feruentes anguli o-  
culorum subinde madificentur: efficacius si cibo uinōque se pridie ea absti-  
nuerit. Scorpiones interficit hominis saliuā: & omnibus bestiis uenenosis  
sua natura aduersatur: feruntq; ictas saliuā, ut feruentis aquæ contactū fu-  
**D** gere. Martion Smyrneus qui de simplicibus effectibus scripsit, rumpi sco-  
lopendras marinas sputo tradit. item tubetas aliāsque ranas: Ophilus ser-  
pentes, si quis in hiatum earum expuat. Nunc mirum dicemus, sed experi-  
mento facile: Si quē pœniteat ictus eminus cominūsue illati, & statim ex-  
puat mediam in manum qua percussit, leuatur ilico percussus à pœna.  
Hoc sæpe delumbata quadrupede approbatur, statim à tali remedio, cor-  
recto animalis ingressu. Morsus hominis inter asperissimos iudicatur: me-  
dendur sordes ex auribus: ac ne quis miretur, etiam scorpionum ictibus,  
*Aurium sordes.*  
serpentiūque statim impositæ. Melius è percussi auribus profunt: ita &  
reduuias sanari. Gymnasiorum strigmenta molliunt, calfaciunt, discu-  
tiunt, complent, sudore & oleo medicinam facientibus. Vuluis inflamma-  
*Strigmenta gymnasiorum.*

tis contractisque admoventur: sic & menses ciet, sedis inflammationes & E  
condylomata leniunt: item neruorum dolores, luxata, articulorum no-  
dos. Efficaciora ad eadem, strigmenta à balneis, & ideo miscentur suppu-  
ratoriis medicamentis. Nam illa quæ sunt ex ceromate permixto cæno,  
articulos tantum molliunt, calfaciunt, discutiunt efficacius: sed ad cæte-  
ra minus ualent. Imo etiam ipsos gymnasiorū rasere parietes: & illæ quo-  
que sordes ex calfactoriam uim habere dicuntur. panos discutiunt. ulceri-  
bus senum puerorūque & desquamatis ambustis uel illinuntur. Hæc Pli-  
nius. Vt uero Galenus prodidit, hominum sudor in palæstris miscetur  
subiecto pulueri, quem *μῆλ* Græci uocāt. Quod ex his componitur, con-  
salon dicunt, uim habet digerendi cum adstrictione quadam: quo fit, ut ef-  
ficacissimum sit mammis inflammatis remedium: & lac quod à partu in F  
mammillis exundet, reprimat. inguinum quoque tumores discutit. Uri-  
na hominis, quàm sit aliorum animalium, multo imbecillior est, absterge-  
di tamen uim obtinet: id quod uel maxime ostendunt fullones, qui ea præ-  
cipue ad uestium sordes eluendas utuntur. Quin & medici psoras & lepras  
ea colluunt, ulceræque præhumida ac sordida, maxime ubi putridi insit  
quippiam. Impubium puerorum urina contra saliuas aspidū, quas pryadas  
uocant, quouiam uenena in oculos hominum expuant, prodest: contra ocu-  
lorum albugines, obscuritates, cicatrices, argema, palpebras: & cum erui fa-  
rina contra adustiones, contra aurium pituitas uermiculósque, si decoqua-  
tur ad dimidias partes cum porro capitato, nouo fictili. Vaporatio quoque  
ea menses fœminarum ciet. Hac & atramenti lituræ abluuntur. uirilis, po- G  
dagris medetur, argumento fullonum, quos ideo tentari eo morbo negāt.  
Veteri miscetur cinis ostreorum aduersus eruptiones in corpore infantū,  
& omnia ulcera manātia. Ea exesis, ambustis, sedis uitiis, rhagadiis, & scor-  
pionum ictibus illinitur. Obstetricum nobilitas non alio succo efficacius  
curari pronuntiauit corporum pruritus nitro addito, ulcera capitem, pru-  
rigines, nomas præcipue genitalium. Sua cuique autem (quod fas sit dixisse)  
maxime prodest, confestim perfuso canis morfu, echinorūque spinis  
inhærentibus, & in spōgia lanisue imposita, aut aduersus canis rabidi mor-  
sus cinere ex ea subactō: contræque serpentium ictus. Ostantes contra ma-  
la medicamēta omnia promisit auxiliari matutinis horis suum cuique in-  
stillatum in pedem. Stercus humanum in medicamenta ob fœtorem ra- H  
rissime admittitur. Inter omnes tamen cōuenire uideo, humanum stercus,  
non aliter atque caninum gutturi impositū anginis auxiliari. Capillus pue-  
ro, qui primum decisus est, podagræ impetus dicitur leuare circumligatus,  
& in totum impubium impositus: uirorum quoque capillus canis morfi-  
bus medetur ex aceto. Et capitem uulneribus ex oleo aut uino: combustus  
æque capillus carcinomati. Capilli mulieris si crementur, odore serpentes  
fugari produntur: eodem odore, uulæ morbo strangulatas respirare. Ci-  
nere eo quidem, si in testa sunt cremati, uel cum spuma argenti scabries  
oculorum ac pruriges emendari: item uerrucas & infantium ulcera cum  
melle. Capitis quoque uulnera, & omnium ulcerum sinus, simul addito  
melle

*Urina.*

*Alias, contra  
antimum pura.*

*Stercus.*

*Pili.*

A melle & thure, panos: podagras cum adipe suillo: sacrum ignem, sanguinemque sisti ilico, & fornicationes corporum. Pueri qui primus ceciderit dens, ut terram non attingat, inclusus in armillam, & assidue in brachio habitus, muliebrium locorum dolores prohibere traditur. Ossa humana combusta, ut quibusdam placet, uim habent maxime omnium ossium digerentem exsiccantemque. De homine satis dictum habeo. Nunc ad reliqua transcamus animalium genera, primumque terrestria.

## DE ANIMALIVM DIF-

## B FERENTIIS LIBER V,

De quadrupedibus uiuiparis, & eorum partibus exterioribus. Cap. LXVIII.



Omini proximum genus quadrupedum est. Inter uniuersa nanque animalium genera, homini simillime sunt quadrupedes: tum ossibus ipsis (quæ maxime totius corporis figuram constituunt), tum reliquis etiam partibus omnibus, tum uero totius corporis forma. Quæ in genere quadrupedum non penatæ continentur, sanguine quidem omnia prædita sunt: sed alia animal pariunt, & uiuipara dicuntur, (quæ & perfectiora sunt) alia ouum edunt, & ouipara uocantur. Quadrupedes quæ animal generant, caput, collum, & omnes partes corporis sortiuntur: (nam & talpæ modo quodam oculos habere dixerim) uerum ipsæ singulæ partes inter se differunt. Sunt quadrupedum alia cornigera, alia mutila: & quæ cornuta sunt, eadem omnino quadrupeda esse certum est: nisi quid per similitudinem & translocationem cornu habere dicatur, quemadmodum Ægyptij de anguibz Thebanis perhibent, quasi aliquid illis ueluti uestigium cornus extuberet. Nec alibi quàm in cornibus maior naturæ lasciuiæ: sparsit hæc in ramos, ut ceruorum: aliis simplicia tribuit, ut in eodem genere subulonibus ex argumento dictis: aliorum finxit in palmas, digitosque emisit ex iis, unde platycerotæ uocant. Dedit ramosa capreis, sed parua, nec fecit decidua: conuoluta in anfractum arietum generi: rupicapris in dorsum adunca: damis in aduersum. Erecta autem rugarumque ambitu contorta, & in leue fastigium exacuta strepsiceroti: mobilia eadem ut aures, Phrygiæ armætis: Troglodytarum in terram directa, qua de causa obliqua ceruice pascuntur. Aliis singula dedit: omnia in mucronem migrantia. Quæ cornua gerunt, bisulca magna ex parte per naturam sunt: & bisulcorum magna pars cornua gerit: ut bos, ceruus, capra. Quod autem idem & solipes & bicornes sit, nullum est,

quod nos adhuc nouimus, inquit Aristoteles: at folipes idémque unicomne, & quanquá rarum, ut asinus Indicus: unicomnis uero idémque bifuleus oryx est. Gerunt sane medio sui capitis cornu fixum ea quæ unū habent, aut certe naribus. Sunt nonnulla quæ simul bifulca sunt, & iubam habeant, & cornua bina orbem inflexu mutuo colligentia gerant, ut bonafus. Conigerum nullum admodum paruum esse nouimus: omnīū enim quæ explorata habemus minimum dorcas est. Tenuiora fœminis plerunque sunt cornua, ut in pecore: multis ouium nulla: nec ceruarum ulli. Quæ pedes multifidos habent, cornu omnia carent: & quæ superne priores habent dentes. Cornua parte plurimā caua sunt ab radice, quatenus ossium quoddā solidum ambiunt: in mucronem tamen solidum exeunt, & simplici parte extrema constant. Pars caua ex cute potius oritur: at solidum illud osse enascens subit

*Ceterorū cornua ossibus adhaerere, ceruicū tantum cutibus nasci sentit Plinius.*

implētque totum, quomodo cornua boum constare uidemus. Ceruino generi ex cornigeris uni, tota solida & sparsa in ramos: & omnibus annis decidua, nisi castrentur, cum ex cæteris cornigeris nulli cornua decidunt, sed omnibus perpetua sint, nisi per uim aliquam amittant. Auriculas habent omnia, excepto uitulo marino: & eas quidē maxima ex parte ueluti capiti appensas, & propterea mobiles: quas etiam non eodem orbe quo oculos, quemadmodum homines, sed supra oculos sitas habere uidentur: uerumtamen non ita est, sed conspectum ementiuntur: quoniam bestię non erecto, sed prono sunt corpore. Quadrupedum quæ multifida sunt, ut canis, leo, lupus, uulpes, lupus cetuarius, omnia cæcos generant: post palpebræ dehiscunt. Cilio carent palpebræ inferioris quadrupedes: sed paulo inferius pili

*Nares, quæ sunt.*

rari nonnullis exeunt. Nares quibus maxillæ longæ exeunt in acutum, in ritu appellato continētur: cæteris explanatus magisque discrete ad maxillas iunguntur. At elephantus peculiarem hanc partem præ cæteris sortitus est animalibus. Maxillæ aliis rotundæ, ut simijs. lumentorum omnium ca put paruum est: maxillæ longæ. Oris etiam magnitudine discrimen existere iis animalibus planum est: aliis enim os magno hiatu rescissum est, ut canis, leoni: denique omnibus quibus dentes serrati: aliis mediocres, ut generi suum. Linguam habet quadrupedes duram, crassam & minime abolutam: indēq; fit, ut uocem parum explanare possint. Habet dentes omnia quæ quadrupeda & uiuipara sunt, sed uarie: sunt enim alia utrinq; dentata: alia altero dentium ordine carent. Quæ enim cornua gerunt, hæc nō dentata utrinq; sunt: quippe quæ primoribus maxillæ superioris careant dentibus: quanquam sunt nonnulla quæ & cornibus uacēt, & utrinq; dentata non sunt, ut cameli. Item alia dentes habent exertos (χαυλιόδοντα dicuntur) ut aper: alia sine iis sunt. Et aliis dentes serrati, ut canis, leoni: aliis continui, ut equo, boui. Sunt enim dentibus serratis, (σερρεόδοντα uocant) quorum series acutorum dentium mutua insertionem pectinatim se constipat. Quod autem simul & dentes exertū & cornua habeat, nullum est: nec uero quod simul & serratis dentibus sit, & alterutrum habeat illorum, hoc est uel cornu uel dentem exertum. Raro fœminæ, & tamē sine usu sunt dentes exerti: itaque cum apri percutiunt, fœminæ fues mordent. Primores dentes plu-

rima

**A**rima habent acutos, interiores planos. Minutis quadrupedibus primores bini utrinque longissimi. Genus autem quod duplicem dentium ordinem habeat, nullum nostro in orbe est. Mutantur dentes, ut homini, ita quibusdam aliis animalibus, ut equo, mulo, asino: homini, ut diximus, primores mutantur: maxillares autem nullum animal mutat. In collo gula arque arteria iis omnibus est, & eodem situ quo homini. Pectus maxima ex parte non ut homini latum, sed in iis coarctata hæc pars est: unde fit ne quadrupedes eo loco habeant mammas. Ipsas autem mammas haberi uarie certum est: nam & inter seipsas quadrupedes & ab homine mammarum differunt ratione: elephanto enim mammarum parte prior, hoc est in pectore, aut iuxta pectus sub armis sunt binæ, binisq; papillis: ursæ mamas habet quaternas. **B** aliis mammæ inter fœmina binæ: quibus enim solida ungula, aut cornua & partus numero pauciore, hæc mamas inter fœmora habet, easque binas. Et inter hæc aliis papillæ binæ, ut ouibus: aliis papillæ quaternæ, ut uaccis. Quibusdam nec in pectore nec in fœmoribus mammæ, sed in uentre habentur, & quidem plures: uerum non omnes pares: quæ nanque numeroso partu & pede multifido sunt, hæc aut plures per uentrem duplici ordine utroque de latere gerunt, ut sues, ut canes: aut binas tantum medio uentre, ut leo: pantheræ quaternas in medio uentre gerunt. Camelus quoque in uentre mammas duas cum papillis quatuor habet ut bos. Genitale mariū aut ante habetur, ut equo & aliis multis: aut retro. Testes autem omnibus esse conspicuos natura uoluit, præter elephantum & erinaceum. & iis quæ **C** genitale ante gerunt, aut penis & testes absoluti pendent: aut alio uel loco cuiuspiam illi proximo adhærent, & aut plus aut minus absoluuntur: non enim pariter apro & equo membrum hoc absolutum est, testes namq; apro non pendent absoluti aut tremuli, sed hærent annexi retro. Ossea sunt genitalia, lupis, uulpibus, mustelis, uiueræ: urso quoque simul ut expiraue-rit, cornefcere aiunt: elephantus testes non foris conspicuos, ut diximus, sed intus conditos habet. Quadrupedes fœminæ omnes in auersum mingunt: mares uero perpauci ita in auersum mingunt, ut lynx, leo, camelus, lepus: solidipes nullum sic mingit. Magna item quadrupedum pars caudam habet. Cauda quibusdam proluxior dependet, nonnullis uero perexigua est: & quibusdam tam exigua, ut uix dignosci à sensu possit: aliquid tamē prominet quod caudam describere possit: quibus enim corpus admodum pilosum natura cōdiderat, caudam iis diminuit: quod in ursis perspicuū est. **D** Quinetiam caudas proluxiores pilis natura ornauit: alias longis, quibus tenor caudæ brevis, ut equis: alias breuibibus, quibus tenor longus, ut bubus. *Tenor, sēlas.* Habent quadrupedes, quæ animal generant, omnes uice brachiorū crura priora: non tamē omniū crura priora cubitis manibûsq; proportionē respōdent, sed quæ multifidæ sunt: hæ præcipue manibus suo digitato pede respondent: hoc enim non sustentandi tantum corporis causa, sed ad plura etiam quasi manu utuntur: quippe quæ & capiant prioribus cruribus & repugnent, quod solidipedes posterioribus faciunt: atque ob id nonnulla ex iis quorum pedes in digitos finduntur, pedes priores quinis distinctos digi-



tis habent: posteriores quaternis, ut leones, canes, atque etiam lupi & pantheræ. Sed quæ parua inter digitata sunt, posteriores etiam quinque digitos obtinent. Sunt è quadrupedibus quæ sanguine constant, eadēque animal generant: aliæ multifidæ, quales hominis manus pedesque habentur: sunt enim quæ multiplici pedum fissura digitentur, ut canis, leo: aliæ bifidæ sunt, quæ *χῆλας*, id est forcipem pro ungula habeant, ut oues, capræ, cerui: aliæ infisso sunt pede, ut quæ solipedes nominantur, ut equus, mulus. Genus sane suillum ambiguum est: nam quibusdam in locis sues solipedes gignuntur, ut in terra Illyriorum & Pæonia, & quibusdam aliis locis. Bifulca igitur binis fissuris utrinque, id est à parte priorē & posteriore diducuntur. Solipeda eam partem continentem ex toto habent. Omnibus autem ungulæ in senectū maiores redduntur. Per multa ex bifulcorum numero talum habent: solipeda eo carent omnia, excepto asino Indico. Multifidum item nullum adhuc talum habere cognitum est, sed lynxi semitalo quiddam simile: leoni autem tortuosum in anfractum est. Omnia uero quibus datus est talus, cruribus cum non prioribus, sed posterioribus continent in cruris articulo. Talus autem, ut qui ueluti clauus est, tanquam alienus artus duobus illis interfertur qui articulum ipsum constituunt. Quædam ut manibus utuntur priorum ministerio pedum, ut dictum est, sedentque ad os illis ad mouentia cibos, ut sciuri. Quibus ex rapina uictus quadrupedum, quini digiti in prioribus pedibus, reliquis quaterni: leones, lupi, canes, & pantheræ in posterioribus quintos unguēs habent, uno iuxta cruris articulum dependente. Sed quæ parua inter digitata sunt, posteriores etiam quinque digitos habent, ut modo diximus, quoniam serpē solēt: scilicet ut unguibus numerosioribus facilius obrepant ad superiora. Mirum pardos, pantheras, leones, & similia, cōdito in corporis uaginas unguium mucrone, ne refringantur hebetenturque ingredi: auersisquē falcibus currere, nec nisi appetendo prætere. Quadrupedibus contrā quā homini, in prima ætate inferior pars maxima est, tum processu temporis superior crescit, quæ scilicet ea est quæ ab ano ad caput porrecta est. Partes quas homo habet priores, quadrupedes infra habent lupinas: quas autem ille posteriores, hæ pronas. Et motus omnium quadrupedum per diametrum agitur, quo modo etiā subsistere solent. Flectunt autem quadrupedes uiuiparæ crura priora contrā atque posteriora: & è contrario quā homo membra inflectat, excepto elephantō. Priores enim pedes ante se flectūt, posteriores uero in auersum: aduersaque inter se habent conuexa curuaturæ crurum suorum. Partem corporis læuam minus quā homo absolutam habent & agilem, excepto elephantō.

Interiorum quorundam partium discrimina in quadrupedibus uiuiparis.

Cap. LXIX.

**I**N hoc genere fel quibusdam deesse notatum est ut ceruo & illi qui proxuocatur, equo, mulo, asino, uitulo marino, & murium nonnullis. Sunt etiam quæ partem habeant, partim nō habeant uel in eodem genere, ut mures:



- A** res: quod idem & homini accidere diximus: aliqui enim fel in iecore habere uisuntur, aliqui carent. Hoc idem ouibus etiam caprisque euenit. Hæc Aristoteles. Galenus uero, quæ iecur habent, inquit, iis meatus quidam insunt, qui bilem recipiant: etsi uescicam, quæ amaram bilem colligit, non omnibus concesserit natura. Lienem bisulca & cornigera habent rotundum, ut capra, ouis, & reliqua omnia: nisi aliqua pro sua magnitudine auctiorem in longitudinem habeant, ut boues: at multifidis prolixus omnibus est ut muri, cani: solidipedibus autem medium tenet, & promiscuus est: partim enim latus est, partim angustus, ut equo, mulo, asino. Renes atque uescicam, omnes quæ animal generant, quadrupedes possident. In his, quæ seuo pinguescunt, magis quam quæ adipe, in renibus opimandis luxuriant,
- B** ac omnium præcipue oues: quippe quæ renibus pingui undique obductis, quandoque intereunt. Ventris in iis dissimilitudo est: quæ enim cornigera sunt, altera maxilla dentata, quaternos habent uentris sinus: (quæ quidem & ruminare dicuntur): gula enim incipiens ab ore, deorsum tendit ad pulmonem septimumque transuersum: hinc se ad uentrem applicat maiorem: qui parte interiore asper interceptusque est, ac prope gulæ commissuram, sinum sibi adnexum habet, quem ex argumento *κακρύφην*, id est reticulum uocat. Est enim uentri extrinsecus similis, intus reticulis capilli mulierum implexis, magnitudine multo quam uenter minor: hunc excipit omasum, parte interiore asperum, cancellatum, crustatum, magnitudine reticuli. Abomasum, uenter ab eo alius iungitur, magnitudine amplior omaso, forma oblongior: cancellis intus & crustis multis magnis & leuib. inornatus, mox intestinum sequitur. Cornigera altera maxilla dentata omnia ad hunc modum suum habere uentrem certum est: sed differunt inter se magnitudine & figura: atque etiam quod gula uel in medium uentris tendat, uel in latus uergat. At uero omnia dentata maxilla utraque, uentres singulos habent, ut canis, sus, ursus, leo, lupus. iis igitur omnibus simplex uentriculus est, quæ excipit intestinum: uerum aliis amplior, ut sui, ut urso: aliis arctior, nec multo amplior intestino, ut cani, leoni. Cæterorum etiam formæ omnium respectu eorum quos modo numeravi, distinguuntur: aliis enim uenter suillo similis, aliis canino, tam in maiore quam in minore animalium genere. Sed discrimen in iis quoque, magnitudine, figura, corpulentia, exilitate uel oritur: atque etiam situ gulæ, quo meatum ad uentrem ducat, & conuiuo iungat foramini. Intestinorum etiam natura utrique illi animalium generi, hoc est utrinque dentato, & altera maxilla dentato, sibi differt magnitudine, crassitudine, replicamentis. Sunt certe maiora omnia intestina non utrinque dentatis, nec immerito: nam ipsa ita dentata omnia sunt maiora: pauca enim parua in eo genere habentur. admodum nanque paruura inter cornigera nullum est. Rectum autem intestinum nulli est cui non utraque parte dætes. Quibusdā & appendices intestinorum, sicuti & aui. bus nonnullis. Oritur omentum atque dependet superiore sui parte, in iis quæ utraq. parte dentata sunt, à medio uentre, quæ ueluti quædā futura ducitur. Nec se- cus in iis quæ altero dentium ordine carent, à maiore uentre dependet.

*Reticulū, Theodorū  
odorus asineū  
quoque uocat.  
Omasum, ὠμα-  
σόν. Aboma-  
sum, ἀβόμασόν.*

*Iuba, χαίτη.*

**O**Mnia fere quadrupeda eadēque uiui para sunt pilosa, nec hominis modo leuia esse nouimus: partes enim pronæ, contrā quā hominis, pilosiores sunt: supinæ aut glabræ omnino, aut minus pilosæ habentur. Cilium etiam, ut diximus, non ut homo habent in utraque palpebra: neque pubem, aut alas oppletas pilis. Ipsorum autē quadrupedum pilis intersectorum, aliis corpus totum est hirtum: aliis collum hirtius pari undique modo, ut quæ iubam habent: qualis est leoni mari: aliis prona tantum colli parte à capite ad artus usque, ut quæ iubam habent, quā *νοχέω* dicunt: qualis est equo & mulo. Quadrupedum uilli lanæue senectute prolixius augentur: quanquam rarescant fierique pauciores. Quadrupedibus pilum cadere atque **F** subnasci annuum est: quæ molles suapte natura pilos habere solent, hæc per usum pabuli meliores, duriores incipiunt gerere: contrā autem molliores paucioresque, quæ duros copiososque habuerint, eadem illa scilicet ratione. Aquarum diuersarum usu animalia suos immutant colores: alibi enim candida, alibi nigra redduntur. Sunt etiam aquæ multis in locis, quas cum oues biberint moxque inierint, nigros generet agnos: ut in Assyritide agri Chaldeici Thraciæ facit amnis quem Pŷchrum uocant. Et in Antandria quoque duo sunt fluij, quorum alter candorem, alter nigritiam pecoribus facit. Scamander etiam amnis flauas reddere oues creditur. Vocē uarie mittit quadrupedum genus quod animal procreat: neque est quod loqui possit, sed proprium id hominis est. Exsectorum omnium uox in scæminā mutatur. **G**

De coitu partuque, & aliis quæ ad generationem pertinent in quadrupedibus uiui paribus. Cap. LXXI.

**C**ommune omnium quadrupedum est, ut cupidine uoluptatēque rei ueneræ maxime incitentur. Ferociunt scæminæ à partu, mares tempore coitus. Iam equi equos mordent: sternunt equitem atque insequuntur. Sues quoque feri acerrime scuiunt: dimicant inter se, mirum in modum armantes sese: simili modo & tauri efferantur, & arietes, & hirci. Qui enim superiore tempore socij iugi concordia pascuntur, coitus tempore dissident, & alter alterum libidinis rabie inuadit: camelus etiam mas sequit tempore coitus: & elephantum quoque ad coitum efferari solent. Idem feris quoque cunire apertum est. nam ursi, lupi, leones acius per id tempus in eos qui accesserint sequuntur: inter se tamen minus hæc dimicant, quia nulli ex his gregale est. quin etiam ursæ à suis catulis uehementer ferociunt, ut canes à catellis. Quæ autem non uno tempore, sed sæpius anno coeunt, ut ea quæ cum homine degunt: uerbi gratia canes, sues, ut minus efferentur, facit coitus copia. Omnino fera omnia, aut certe plurima, non ante cū scæminis ad commune pascuum ueniunt, quā tempus sit coeundi: sed cum iam per ætatem licuerit, segregantur mares à scæminis, scorsumque pascuntur. Plurimæ quadrupedes pedibus innitendo exerceant uenerem, scæminam scilicet mare superingrediente, admotæque parte maris supina ad dorsum scæminæ rem peragunt.

- A**gunt. Quæ retro urinam mittūt, aversa iunguntur, ut leones, lepores, lynces. Quadrupedes tempore coitus nonnihil humoris suo genitali, tum mares tum etiam fœminæ emittunt, atque ad motus ad genitale naribus odorantur: prominet etiam genitale in fœminis cum ad coitum stimulantur. Viui parorum quadrupedum aliæ imperfectum animal pariunt, alię perfectum. Quæ multifida sunt, fœcundiora sunt: multipara enim id genus animalia sunt: nec tamen partum perficiunt complura: fœtum nanque adhuc recentem alere possunt, auctum iam adeptumque magnitudinē nequeūt: sed cum corpus ad nutriendum non sufficiat, partum emittunt, ut ea quæ uermem pariunt: quædam enim ex iis catulos inarticulatos propemodum pariunt, ut uulpes, ursæ, leæna, & alia nonnulla, sed omnia fere cæcos. Sola
- B** inter multipara suis parit perfectos: solipedes & bisulcæ perfectos edunt. Bisulca pauca generant præterquam sues: singulos enim aut binos magna ex parte edunt fœtus. Quæ autem maxima inter animalia sunt, ea singulos pariunt, ut elephas, camelus, equus, & reliquæ solipedes. Quadrupedes in utero gestantur extensis ad longitudinem cruribus & ad aluum suam applicatis. Pinguescunt quadrupedes cum gerunt partū, comeduntque amplius. omnes autem cum lactentur extenuari solent.

De quadrupedum uictu & ætate.

Cap. LXXII.

- P**inguescunt uero quadrupeda omnia melius, si præfatigata fame fuerint: & præterea quiete immotionēque. Quadrupedum quæ animal
- C** generant, quæ syluestres eadēque serratæ dentibus sunt, carne omnes uescuntur: (nisi quod lupos aiunt terram quandā cum esuriunt edere: hoc igitur peculiare luporum sit.) herbas autē non alio tempore tangunt, nisi cum morbo laborant: quomodo & canes herba ingesta euomunt, atque ita purgantur. Sunt inter quadrupedes feras, quæ uictum ex lacu & fluuiis petant: at uero à mari nullum, præterquam uitulus marinus: sunt in hoc genere fiber, fetheriū, satyrium, lutris, & latax. Cornigera animalia, tam fera quàm urbana, & quibus dentes serrati non sunt, omnia fruge herbæque uescuntur, nisi uehementer esuriant, sue excepto. unum animal digitos habentiū herba alitur lepus. Bibunt quibus dentes serrati sunt animalia lābendo: atque etiam nonnullæ ex non serratis, ut mures: quibus autem continui, sorbēdo,
- D** ut equi, ut boues: ursus neque sorbendo, neque lābendo, sed morsu. Iumēta pro aquæ quam bibant usu, suo fruuntur pabulo: & quod minus potum aspēnatur, id appetentius pabuli est. In Africa maior pars ferarū ætate non bibunt inopia imbrium. Ætatem dignosci quadrupedum confirmant, qui in eorum cura sunt constituti, si cutis prætenta maxillis detracta, mox relaxata, ilico in suum redeat locum: hoc enim indicium recētoris quadrupedis est: ueteris contra, si diutius rugata maneat cutis. Ætas ueterinorum dentibus indicatur, & dentium brochitate, superciliorum canitie, & circa ea lacunis cum fere xvi annorum existimantur. Ut uero Columella tradit, decimo anno equis tēpora cauari incipiunt, & supercilia nonnunquam canescere, & dentes prominere.

## DE DIFFERENTIIS

E

De quadrupedum ruminatione, latitatione, & aliis quibusdam  
actionibus affectibusque. Cap. LXXIII.

**R**uminant quæ superiore dentium ordine carent, ut boues, oves, capræ. Ex feris nullum adhuc ruminare constat, præterquam ea quæ aliquando cum hominibus exigunt, ut ceruus. Iacent potissimum cum ruminant omnia: & hybernis præcipue mensibus solent ruminare: septem fere mensibus hoc faciunt, quæ intra tecta aluntur: gregales minus, breuioræque tempore ruminant, quoniam foris pascuntur. Sunt etiam ex dentatis utrinque nonnulla quæ ruminant, ut mures pontici, ut lepores. Ruminantia omnia coagulum habent: etiam inter dentata utrinque lepus. Conduntur nonnulla hyeme, ut hystrices, ursæ. Glires etiam latent in ipsis arboribus: itidem & mures pontici. Volutatio solidipedum propria est. Cū cætera nisi nouella fastrentur intereant, aper unus quæ ætate castretur non refert. Omnia denique si dum crescant, castrantur, maiora & elegantiora quàm incastrata euadunt: sed si postea quàm adoleuerunt, & iam incremento constiterunt castres, nihil præterea accedere ad magnitudinē potest. Magnas quadrupedes Epirus gignit, excepto asino: sed præcipue boues & canes, indicio sunt boues quæ Pyrrhica uocantur. Pusillas bucculas fert regio Phasiana.

Alimenta ex quadrupedibus & eorum partibus uaria.

Cap. LXXIIII.

**Q**uæ herbis pascuntur inter quadrupedū genera, aut tenellis arborum ramis germinibusque, ea omnia cum hæc abundant nitidiora sunt ac pingua, nobisque alendis accommodatiora. Ideoque quibus altior herba pro pabulo est, ea hyeme primoque ac medio uere fiunt gracilia macraque, & succum præstant uiciosum, ut boues: qui procedente tempore fiunt obesiores meliorisque succi: postquam scilicet auctæ fuerint herbæ. Quæ uero ex quadrupedibus humiliori herba pasci solent, ut oves, ea primo ac medio uere sunt præstantiores. Capræ æstate prima ac media, cum scilicet plurima fruticibus insunt germina: nam iis audivissime uescuntur capræ. Cuiusque quadrupedis caro deterior est, cum locis palustribus quàm cum editioribus pascit. Et in domesticis ipsis, castratorum caro in suo cuiusque genere præstantissima est, uti ante diximus: pessima uero, tum ad concoctionem, tum nutritionem, tum etiam ad succi bonitatem, senescentium animalium caro. Probatissimum alimentum inter pedestria præstat suilla caro, deinde hœdina, mox uitulina. Agnina uero præhumida lentaque est & mucosa: succumque gignit pituitosum. A cæteris autem abstinendum suadeo, inquit Galenus, iis qui probum succum procreare studēt. Caro etenim bubula multum quidem præbet alimentum, sed quod sanguinem gignat crassum ac melancholicum: præcipue uero taurina. Ouilla caro excrementis abundat, ac succum præstat deteriorem. Caprarum autem caro, præterquam quod succum præbet uiciosum, acrimoniam etiam habet: & melancholicum gignit succum, præsertim hircina. Leporina caro sanguinem gignit crassiorem, sed qui meliorem procreat succum, quàm aut bubula aut ouilla.

*Inter quadrupedes gloria prima lepus, inquit Martial.*

- A** ouilla. Ceruina succum generat uitiosum ac concoctu difficilē. Huic proxima est agrestis asini caro, si minor adhuc ætate fuerit & optimo corporis habitu: nam & domestici asini caro melancholicum succum procreat: sicuti & camelina, uulpina, canina, leporina, & è sue syluestri caro. Et cæterarum quadrupedum caro ipsa quanto suilla in alimenti probitate fuerit inferior, tanto & illarum reliquæ pattes quæ excarnes sunt, ut pedes, aures, rostra, suum partibus sunt deteriores. Iecur omnium quadrupedum crassum in cibo præbet succum, tardius permeat & ægre concoquitur: uerum succum procreat non omnino malum. Et quæ lactent adhuc, si matris lac probum fuerit, eorum iecur boni succi est. At quorum deprauati humores fuerint, aut quæ iam consenuerint, eorum iecur bonum efficere succum nō potest.
- B** In omnibus uero, quod *συνωτερί* uocatur, eo quod animal quod mactatur caricis sit faginaturn, præstantissimum est, tum ad alia, tum uero ad saporis gratiam: & in iis præcipuum suillum est. E reliquis autem uisceribus, lien neque gustui suauis est (habet enim in se acerbitem perspicuam) & succum præterea gignit uitiosum ac melancholicū. suillus uero lien non adeo malus est. Pulmo utroque concoctu facilius eo est quo rarior: iecinore tamen longe minus alit, atque quod ex eo gignitur alimentum, pituita magis naturam habet. Cor ad concoctionem item difficile est: uerum si recte conficiatur, alimentum gignit neque exiguum, neque quod malū succum efficiat. De renibus inter sanguineorum glandulas diximus. Venter, uterus & intestina quadrupedum, ipsa carne duriora sunt, ideoque concoctu difficiles: quod si rite concoquantur, succum gignunt, qui non omnino inculpatus sit, sed frigidiorē, crudiorēque, & qui tempus prolixius desideret, ut ex eo probus fiat sanguis: minus quoque alunt quàm caro ipsa. uulua cincto partu melior est quàm edito. Quadrupedum testes concoctu sunt difficiles malique succi, ut qui uirosus quiddam sapore referat. Caudæ duriores sunt, uerum ob frequentem earum motum, minimum habent excrementi. Aurium cartilago in uigentibus saltem ætate animantibus, & sicca est, & minime nutrit. Earum cutis tenuis aridaque est: ægre item concoquitur, & paucissimi nutrimenti est. In quadrupedum lacte non parua reperitur differentia: siquidem boum lac, ut Galeno uidetur, crassissimum est & pinguisimum: casei butyrique habet plurimū, ualentius nutrit. Minime uero pingue camelinum est: liquidissimum quoque & scri multū habet, imbecillius dat alimentum, & aluum ciet: mox equinum liquidissimū minimēque pingue est: postea asininū. Caprinū mediocriter crassum est: ouillū crassius illo est. Plinius uero de lacte hæc prodidit: maxime alit quodcunque humanum, mox caprinum, dulcissimum ab hominis camelinum, efficacissimum ex asinis, magnorum animalium & corporum facilius redditur. Stomacho accommodatissimum caprinum: bubulum medicatius: aluus enim maxime soluitur bubulo. Ouillum dulcius & magis alit, stomacho minus utile, quoniam est pinguius. Aluum minus tētat lac caprinum, inquit Dioscorides, quoniam pecus hoc adstringētibz pabulis fere utitur: & inde quoque stomacho idoneum est. Ouillū uero dulce, crassum & præ-

pingue, non usque adeo stomacho utile. bubulū asininūque & equinum E alium cient magis. Minus inflat lac quodcūque decoctum: & omnino innocentius est decoctum, præcipue cum calculis marinis. Medicamentosa partium & excrementorum vires earūque discrimina, explicata in sanguineo animalium genere sunt.

De quadrupedibus uiuiparis multifidis, & primo  
de elephanto. Cap. LXXV.

Generis quadrupedum quæ animal gignunt, plura quidem genera intelliguntur, sed nullis fere notata nominibus, nisi quod singularū specierū nomina habentur, ut leonis, equi, cerui, canis, reliquorūque ad hūc modum. Seorsum igitur eorum naturam singillatim consideremus necessarium est, ut differentias quæ cuique animalium generi conueniant accipiamus, à multifidis exoriri. In quadrupedū genere maximum est elephas, proximūque humanis sensibus, idēque multifidum. Elephanto oculi quanuis magni habeantur, minores tamen sunt quàm pro corporis magnitudine. Promuscidem pro nare gerit: atque hanc partem sortitus est præ cæteris animalibus peculiarem, prolixam adeo, ut ad terram pertingat, & ualidam, gracilem tamen pariter & mollem, aptāque ad flectendum. Eius uero ulus idem qui manus: ea nanq; cibos tam secos quàm humidos colligit, capit & in os perinde ac manu admouet solum animantium omnium: & arbores quoque eadē prosternit. Et quoties immersus per aquam ingreditur, ea ipsa edita in sublime refert atque respirat: adūciuscula parte sui postrema naris hæc est, ac cartilaginea, & proinde rigidiuscula. Dentes illi utrinque quatuor intus, quibus conficit cibum atque in farinæ speciem molliat. Duo præterea prominent grandes, quos mares grandiores resimatosq; habent: fœminæ minores, & contra quàm mares: uergūt enim deorsum pronique deuiant. Statim cum natus est elephantus, dentes habet: quanquam grandes illos non ilico perspicuos obtinet: & candore dentium intelligitur iuuenta. Decidunt elephanto dentes isti grādiore, & renascuntur quibusdam temporum interuallis. Et deciduos casu aliquo uel senectā defodiunt: hoc solū ebur est: cætero & in iis quoque, quod corpus intexit utilitas ossæ. Linguam perquam exiguam habet elephas, atque interior positam quàm in cæteris sit, ita ut uix eam uidere possis. Mammæ duas quidē, & papillas H item duas, uerum non in pectore habet, sed paulo citra sub armis: quæ tam mari quàm fœminæ per exiguæ sunt, nec pro corporis uastitate, ita ut eas à latere conspiciere propemodum nequeas. Crura habet priora multo posterioribus logiora: & malleolos posterioribus imis cruribus possidet paruos. Pedes habet, ut dictum est, multifidos, & digitos numero quinque indiuisos leuiterque discretos: & ungues omnino nō sunt, sed ungulis potius 3 similes. Flectit hic suos posteriores poplites modo hominis: ut uero Solinus scribit, suffragines flectere nequit. Nequit certe præ nimio pōdere, utrūque in latus equilibrio quodā uergere, sed aut leuo incubat aut deætro: atque eo ipso habitu requiescit. Genitale habet simile equo, sed paruū, nec pro corpo

prole: omis.

Atq; hæc pars  
hæud impro-  
prie appellatur  
manu, Plin<sup>9</sup>

Ebur.

**A**ris magnitudine. Testes itē nō foris cōspicuos, sed intus cōditos habet: quo circa initum celerius agit. Vt in quadrupedū genere, elephas minime hirtus est: & setarū certe, ut inquit Plinius, nullum illi tegumentū: ne in cauda quidē prēsidium abigēdo tēdio muscarum, sed cancellata cutis, & inuitans id genus animalium odore. Ergo cum extēti recepere examina, arētatis in rugas repente cancellis, comprehensas enecant. Hoc iis pro cauda, pro iuba, pro uillo est. Durissimū dorso tergus est, uentri mollius. Viscera illi suis proxima, sed maiora: iecur enim quadruplo maius bubulo est: & reliqua pari ratione, excepto liene: hic enim minor ex proportionē est. Iecur sine felle est: inciso tamē, parte qua fel adhærere solet, humor felleus effluit plus minus. Fel ad pectus habere traditur à nōnullis: Galenus, Huic, inquit, uesicæ bilis iecori adhæreret, magnitudine ad uisceris rationem. Intestinum per amplum est, equino simillimum: ita tamē sinuosum, ut aluos habere quatuor uideatur. In hoc etiā cibus recipitur: nullum enim conceptaculum cibi separatū adest. Gratissimas in cibatu palmas habent: quanquam & truncos edunt, & lapides deuorant. Elephanti solitudines petunt coituri, sed præcipue secus flumina, & quā pasci cōsueuerunt: est enim hoc animal uti mox explicabimus, sua natura simul terrestre & palustre. Incipit autem coire tam mas quā fœmina ante annum ætatis uicesimū. Fœmina enim incipit coire aut duodecimo cum celerrime, aut quintodecimo cum lentissime. Mas quinque aut sex annos natus superuenit incūte uere: & coit quini, non amplius, in anno diebus. Coitum triennio interposito (uel uti aliis placet, biennio) repetit mas. Quam grauidam reddidit, eandem præterea tangere nunquam patitur. Ad coitum efferari solent elephantī, adeo ut pluribus incommodis homines afficiant: mitigari pabuli copia narrantur. Ferendi uteri tempus, alij annum & sex menses, alij biennium, alij triennium statuunt. Causa quam ob rem incertum hoc sit, quod nō pateat coitus. Decem annis gestare in utero uulgu existimat: Aristoteles biennio. Parit posterioribus cruribus subsidens innitēsq̃, & manifesto cum dolore: parit in uere. Parit autem singulos: uniparum nanque est. nec amplius quā semel gignere tradūt Plinius & Solinus. Fœtum magnitudine bimestris aut trimestris uituli edit: uel, ut aliis placet, uituli anniculi, aut porci ætatis integræ. Pullus statim cum natus est, cernit & ambulat. Citra nares ore ipso

**D**uocem elidit spirabundam, quemadmodum cum homo simul & spiritum reddit & loquitur: at per nares simile tubarum raucitati sonat. Elephantus dum in syluis uersatur, ferocissimus est: at mansuetus, omnium ferarū mitissimus & placidissimus euadit. Facillime autem omnium mansuecit: ac permulta officia & eruditur, & quasi intelligit. Valet sensu atque memoria, & reliqua sagacitate ingenij excellit. Elephantī pugnant inter se uehementer, & dentibus alter alterum ferit: qui autem uictus fuerit, adeo animum amittit, ut ne uocem uictoris toleret. Propter fœminas tamen nunquam dimicant: nulla enim nouerunt adulteria. Sunt apud Indos in usu rei bellicæ non solum mares, sed etiam fœminæ: uerū fœminæ pauciores sunt, & longe minores. Differunt inter se elephantēs mirum in modum robo-

Anno decimo Solinus & Plinius.

In quibusdam exemplaribus Plinius hæc non habetur.

Minores, The odoratus timido res dixit, ὑλάττις.



re atque animo. Duo nāque sunt eorū genera. Nobiliores indicat magnitudo: minores nothos dicunt. Indicos elephantos Mauri timent, & quasi paruitatis suæ conscij aspernantur ab iis uideri. Elephantem alij annos ducentos uiuere aiunt, alij trecentos: & alij mares annos ducētos uiuere, alij centum & uiginti aiunt: scēminas etiam fere totidem, sed florere ætate circa sexagesimum narrant. Hyemis ac frigoris impatiens hoc animal esse dicitur. Amat annes: & quamquam non fluuiatile sit, tamen riparium dici potest. Incedit etiam in aquis, & eatenus progreditur, quatenus eius promuscis superat: refat enim per eam, & spiritum accipit & reddit: sed natare satis pondere sui corporis non potest. Elephantos cæteris malis immunes esse aiunt: inflatione autem alui acrius infestari. Ægrotant etiam si comedant terrā, nisi ea frequenter utantur: nam si frequenter, nihil sentiunt mali. Lapidēs etiam interdum deuorant, ut diximus, & truncos: necnon fluore tentantur. Odorem muris uel maxime fugiunt: pabula etiam quæ à musculis contacta sunt, recusant. Mortem suam præsentunt, sicuti & olores. Est elephantis animalium humanis sensibus proximum: quippe intellectus illis sermonis patrij, & imperiorum obedientia, officiorūque quæ didicere memoria, amoris & gloriæ uoluptas: imo uero, quæ etiam in homine rara, probitas, prudentia & æquitas: religio quoque, ut prodidere auctores, & magna docilitas. Et hæc quidem uestigia morum animi humani in hoc cernuntur animali. Elephantes fert Africa ultra Syrticas solitudines & in Mauritania. Ferunt etiam Æthiopes & Troglodytæ, sed maximos India. Elephantes Italia in Lucanis primum bello Epirotico uidit: & boues lucas inde dixit. Elephantorum dentibus ingens pretium, uim adstringēdi obtinent: eorum scobe imposito paronychia sanātur. Ita Dioscorides. Plinius uero, Ramentis, inquit, eboris cum melle Attico (ut aiunt) nubeculæ in facie, scobe paronychia tolluntur. Elephantī sanguis, præcipue maris, fluxiones omnes, quas rheumatismos uocant, sistit. Proboscidis tactu, capitis dolor leuatur: efficacius si & sternuat. Dextera pars proboscidis cum lennia rubrica adalligata, impetus libidinum stimulat. Sanguis & ischiadicis prodest: iccūque comitialibus morbis.

1 De dentibus hisce, an dentes dicendi sint, an potius cornua, uide Pausaniā in Heliacis, & Oppianū De uenation. lib. 2. 2 Decimo quoque anno, ut refert Ælianus, quo pacto dentes etiam defodiant, idem narrat. 3 Indiuisos leuiterque discretos, ut ait Plinius, id est, ut ait Plinius, id est, ut ait Plinius. Plinius informes dixit. 4 Hinc Plinius uentres elephanto quatuor esse dixit. 5 De elephanti pastu & portione Aristoteles lib. 8. histor. animalium. 6 Quo pacto uenatu capiuntur elephanti, & quomodo domentur atque mansuescant, ostendunt Aristoteles lib. 9. histor. animalium, & Strabo lib. 14 & 16, & Solinus. 7 Philostratus de Appollonij uita, lib. 2. tria prodidit elephantorū genera: palustrium, montanorum & campestrium.

## De simiarum generibus.

## Cap. LXXVI.

Corporis figura simiarum genera perfectam hominis simulationē cōtinēt, inquit Plinius. Conueniunt certe cum homine plurimum sua facie simiarum uulgu. Est enim hoc genus, inter omnia simiarū genera homini simillimum: facies nāque iis rotunda est: & aures, nares dentēsque tam primores,

De elephanti  
in homines ele-  
mentia uide  
Solinum &  
Plinium.  
Boues lucas.

Simia, n. 2. n. 3.

Simiarum  
uulgu.

A primores,quàm maxillares hominis more habent:natura tamen in iis  
- narcsque à fronte remissas

Contudit,& rugis peraravit anilibus ora.

Cilium etiam cum cetera quadrupedes non in utraque palpebra habeat, simia habent:quanquam pratenue ac prolixius, potissimum in inferiore. Collum ite ut homini breue. pectus habet omnium quadrupedum latissimum. In pectore quoque binas mammarum papillas: & brachia hominis modo, sed hirtiuscula, quæ & ipsa & pedes, ut homo inflectunt: hoc est ita ut circumferentia membrorum utrorumque obuerset inter se adducatur. Ad hæc manus, digitos, ungues homini similes: & pollex iis quoque & articuli, ut homini: uerum omnia rudiora effertioraque, - Vt eadem

B Dissimiles homini possent similesque uideri.

Pedibus paulum differunt: sunt enim ut manus prælongi: & digiti ut manus constant, medio longiore: & uestigium palmarum simile faciunt, atque iidem & ut pedibus & ut manibus utuntur: inflectuntque eisdem perinde ac manus: & ut paucis dicam, pedes manibus habent similes, & quasi ex manu pedequæ constitutos: & calcis postremum ad pedem, reliquæ autem particulae ad manum facile referuntur. Lacertos & fœmora habet breuia proportionem cubitorum & tibiæ. Umbilicum qui emineat nullum habet: sed durum quiddam continetur loco umbilici. Partem corporis superiorem multo minorem habent quàm inferiorem, uidelicet more quadrupedum: quinarum enim fere ad ternarium ratione constat. Degunt plus temporis pro-

C nare quadrupedum more quàm erectæ. Carent natibus, utpote quadrupedes: priuata cauda sunt, utpote bipedes: exigua enim cauda omnino inest, quatenus nota solum habeatur. Genitale fœminæ, mulieris est: mari potius canis quàm hominis. Partes interiores humanis similes continent. Simia animal ad omnia imitanda habile est: & omne quod corpore agitur, si doceatur, facile discit, & id ipsum actione representat, saltat, tibia canit: denique adeo uariū natura animal est & multiplex, ut ad omnem actionem sese uerset. Apud Indos simiarum quoddam genus rufum est, quod in urbes non adducitur: quippe quod ueneris libidine adeo inflamatur, ut ad muliebrem sexum furiat. Has itaque si quando deprehendunt, statim interficiunt Indi. Simiarum generi præcipua erga fœtum affectio. Gestant catulos, ut quos

D immoderate amant, magnaque ex parte complectendo necant: quo fit ut catulos facilius amittant, quos impendio diligunt, & ante se gestant: quoniam neglecti pone matrem semper hærent: ex binis nanque, quos fere parere solent, alterum amant, alterum uero negligunt. Pro uoce stridor quidam iis est. Post hominem nullum animal præter simiam *ἄνθρωπος* uexatur: omentum enim illi omnium quadrupedum maximum est. Sunt & alia simiarum genera: nempe cercopitheci caudas habent: hæc sola discretio est inter prius dictas. Cercopithecos generat Æthiopia nigris capitibus, pilo asininio, & dissimiles cæteris uoce. Megasthenes author est, cercopithecos in India apud Prasios gigni maximis canibus maiores: & totos albos præter faciem, quæ nigra est (quod aliis contra euenit) caudis longis supra duos cu-

*Cercopithecus,*

*Cephus.*  
*Cephus.*

*Caniceps.* bitos: & præterea mitissimos. caniceps etiam (sic enim cynocephalum uo-  
*Cynocephalus* co) è numero simiarū, & eadem forma qua simia est: sed maior ualidiorq;,  
 & facie, caninæ similior, unde & nomen accepit: adhæc moribus ferocio-  
 ribus est, & dente robustiore, caninōque propiore. Ad saltum uiolenti sunt  
 cynocephali, feri morsu, nunquam ita mansueti, ut non sint magis rabidi:  
*Simia cynocephalo similis.* in Æthiopiæ partibus frequentissimi. Cynocephalorum plura sunt genera.  
*Xoipemithæx.* Sunt & cynocephalis similes quædam, rostro scilicet porrectiore, & quæ  
*Simia porcariæ.* dentes caninos, quos *κυνόδοντες* uocamus, habent prominentiores. Hæ uix  
*Sphinx.* binis cruribus erectæ insistant ut aliæ, tātum abest ut ita incedere aut cur-  
*Sphinxium.* rere possint. Inter simias habentur & sphinges, uillosæ comis, & pilo fusco:  
 manimis in pectore prominulis ac profundis, dociles ad feritatis obliuio-  
 nem. Æthiopia has generat. Cōdunt in thesauros maxillarū cibum sphin-  
*Satyri.* giorum & satyrorum genus: mox inde sensim ad mandēdum manibus ex-  
 primunt. Sunt etenim inter simias, & quas uocāt satyros facie admodum  
*Callitriches.* grata gesticulatis motibus inquietæ. natura his mitissima. Callitriches to-  
 to pene aspectu à cæteris differunt. In facie barba est. cauda primore parte  
 lata. Has capere non est arduum, sed proferre rarum. hoc enim animal ne-  
 gatur uiuere in alio, nisi in Æthiopico quo gignitur cælo. Et quemadmo-  
*Simia marina.* dum in terra, sic etiam in mari aliquod est simiarum genus, quod delphino  
 medicinam in morbo affert. In mari rubro, aiunt, simia est, non piscis qui-  
 dem illa, sed bestia cartilaginea, & uelut squamarum experts: eaque ipsa nō  
 magna, colore & aspectu terrenæ simiæ: non pisces tegmine, sed ueluti te-  
 studinis cortice uestitur. Eadem similiter atq; terrestres simia est: reliquū  
 corpus instar torpedinis latū est, ut dicas auem esse alas explicantem. Cum  
 natat, uolare uidetur. maculis quibusdā distinguitur.

1 Simiarum genera. Tria tātum genera notat Oppianus, sicut & Aristoteles. 2  
*κῆκος*, cæbus est apud Aristotelē, simia gerens caudam. Inter monstra Æthiopiæ cen-  
 setur cæphus apud Solinum: & cephus apud Plinium, quem Pompei Magni ludi pri-  
 mum ostenderunt Romæ ex Æthiopia: cuius pedes posteriores pedibus humanis &  
 cruribus, priores manibus fuisse similes. Hoc animal postea Roma non uidit. Cepum  
 etiam refert Aelianus rostri forma cynocephalo similem, magnitudine canis Ery-  
 thriensis, colore perquam uario. Snt apud Indos, inquit Plinius, simiæ toto corpore  
 candentes. 3 In hoc forsitan genere est, qui *χοιρὸν* dicitur ab Aristotele uocatur, id est  
 simia porcariæ, cui rostrum simile habet chameleon. 4 Quibus artibus capiuntur  
 simiæ, explicant Plinius, Solinus, Diodorus, & Strabo, aliique nonnulli.

De canibus.

Cap. LXXVII. H

*Canis, κύων.*

EX iis quæ nobiscum degunt canes sunt, atq; hominibus fidelissimi. So-  
 li dominum nouere: & ignotum quoque si repente ueniat intelligunt:  
 soli nomina sua, soli uocem domesticam agnoscunt. Itinera quanuis longa  
 meminere: nec ulli præter hominem memoria maior. In uenatu sagacitas  
 & solertia præcipua est. Plurima alia in his quotidie uita inuenit. Detes ca-  
 nibus ferrati sunt: ex quibus qui canini uocantur, decidunt sicuti & homi-  
 ni, idq; quarto ætatis mense: & præter caninos illos nulli mutantur. unde fit,  
 ut diuersa sit authorum sententia: alij enim cum hos mutari uiderint, cæte-  
 ros quoque pari ratione mutari existimant: alij, quod duos tantūmodo mu-  
 tant,

A tant, negant omnino ullos mutari, cum eos paucos reperire difficile sit. uerum hoc propterea latet, quia non ante decidunt, quàm alij intus enascantur. Iuuenibus dentes candidi & acuti: ætate prouectis nigriores atque obtusi: indèque fit, ut ætas uetustiorum recentiorumque canum dentibus iudicetur. Mammæ gerit canis, nec in pectore, ut homo, nec in fœminibus, ut ouis, sed in uentre. caudam sub aluum flectunt, qui degeneres sunt. Pedes priores quinque distinctos digitis habet canis: posteriores quaternis. ungues canibus recti, præter eum, qui à crure plerisque dependet. Venter cani paruius, & qui non multo amplior sit quàm intestinum, sed quasi intestino similis, intus leuis. Inferior intestini pars arctior est: idèoque uehemèti nixu, nec sine cruciatu eam partem leuat excremento. Ætas canum, ut modo di-

B ximus, dentibus iudicatur: sed & senescentibus uox grauior redditur. Coeunt canes aliorum more retro mingentium: diutiusque in coitu ligati co-

*Huius rei causam inuestigat Alexander Aphrodisiensis in problematum lib. primo.*

hærēt, etiam inuiti. Canes tam mares quàm fœminæ anniculi magna quidem ex parte coeunt, sed nonnunquā mense octauo, quod magis fœminæ euenit quàm mari: nonnullæ canes & semestres coitum patiuntur. Indiciū in fœminis in mammis apparet, cum ætatem coeundi iam habent: fit enim perinde ac in hominibus tumor in papillis māmillarū, & ueluti cartilago quædā consistit: sed difficile id perceperis, nisi habeas usum rei: carēt enim hæc indicia magnitudine. hoc igitur fœminæ euenire certū est: mari nihil eiusmodi accidit. Tēpus quo toto fœmina libidine tenetur, diebus quatuordecim magna ex parte describitur: uerū nonnullæ etiā ad sextūdecimum

C pruriunt. Canes non per totā coeunt ætatē, sed usq; ad quendā ætatis uigorem: ad annos enim duodecim magna ex parte & coeunt & implētur. uerum iam aliquibus tum fœminis tum maribus uel annū octauū & decimū, atq; etiam uigesimali natis, facultas nō defuit prolifici coitus. Laconicæ coeunt quandiu uiuunt & mares & fœminæ. Hęc Aristoteles: Columella uero, Nares, inquit, in uillatico & pastoralis canum genere iuueniliter usq; in annos decem progenerant. Post id tempus ineundis fœminis nō uidentur habiles: quoniā seniorum pigra soboles existit. Fœminæ concipiunt usq; in annos nouem: nec sunt utiles post decimum. Canes etiam cum alienigenis coire apertum est. In Cyrenensi agro, (uel apud Gallos, uti Plinius refert) lupi cum canibus coeunt. & Laconici canes ex uulpe & cane generātur. Impletur canis uno initu, quod in furticiis maxime constat initibus: implent enim qui semel inierint. Gerit uterū diebus fere sexaginta & uno aut duobus, aut ad summū tribus: nec minus quàm sexaginta diebus. Quòd si quid celerius prodierit, educari ac perfici nequit. Cū peperit, rursus sexto post mense, nec citius, coitu impletur. Catulos parit articulatos quidem, sed cæcos: nec ante duodecimum diem uisum recipiunt. Quæ ante iustum tempus concepere, diutius cæcos habēt catulos: nec omnes totidē diebus. Sunt quæ duobus & septuaginta diebus uterum ferant, quarum catelli quatuordecim diebus luce carent. Quidam tradunt, si unus gignatur, nono die cernere: si gemini, decimo: idēque in singulos adiici, totidēque esse tarditatis ad lucem dies. Quò largiore alūtur lacte, eò tardiorē uisum acci-

*Pregnantes solent esse canes, inquit Varro, ternos menses.*

*Catuli, inquit Varro, diebus viginti uidere incipiunt.*

piunt: non tamen unquam ultra uicesimum primum diem, nec ante septi-  
mum. Optimus in fœtu qui nouissimus cernere incipit: aut quem primum  
fert in cubile fœta. Primos mares pariunt caniculæ: in cæteris alternant. Ca-  
nes fœminæ à catulorum partu uehementer ferociunt, & canire tum dicū-  
tur, quod Græci *σκύειν* uocant. Et tantundem etiam temporis canire putan-  
tur dum catelli luce carent. Parit canis duodecim cum plurimum, sed ma-  
gna ex parte quinque aut sex: unum etiam aliquam peperisse certum est,  
quod tamen prodigium putant, sicut omnes mares aut omnes fœminas gi-  
gni: Laconicæ magna ex parte octo pariunt. Lac ante diebus quinque  
pariant, fœminæ habent magna ex parte: uerum nonnullis etiam septē die-  
bus anticipat. Genus canum Laconicū post coitum diebus triginta habere  
lac incipit: utile statim ut pepererint, est. Crassum inter initia omnium est: **F**  
deinde processu temporis tenuius redditur: crassius canum quàm cætero-  
rum animalium lac est, excepto scrofæ ac leporis. Crus mares tollentes  
mingunt, magna ex parte quidem sexto mense ætatis: sed nonnulli uel se-  
rius, octauo scilicet mense id faciunt: atque etiā maturius quàm sexto: id-  
que signum est cōsummati uirium roboris. Quod autem simpliciter dixerim,  
cum coire incipiunt, tollunt. Fœminæ omnes confidentes mingunt: uerum  
in hoc etiam sexu nonnullæ crure elato minxerunt. Viunt canes maxima  
quidem ex parte ad annos quatuordecim: sed nonnulli uel ad uiginti pro-  
trahunt uitam. Viunt Laconici, inquit Plinius, annis denis, fœminæ duode-  
nis: cætera genera quindecim annos, aliquando uiginti. Canes tribus præ-  
cipue laborant uitiiis, rabie, angina, podagra. Facit rabies furorem: intereūt **G**  
canes hoc morbo, & quæ morfa sunt omnia: solus homo non absque mor-  
tis quoque periculo euadit. Angina etiam interimit. Et podagra tētati pau-  
ci euadere possunt. Rabies canum Syrio ardente homini pestifera: ita mor-  
sis lethalis aquæ metus. Quapropter obuiam itur per triginta cos dies gal-  
linaceo maxime fimo mixto canū cibis: aut si præuenerit morbus, ueratro.  
Canum plura sunt genera, quibus nomina fere regiones dedere, ut Laco-  
nicum, Salentinum, Molossicum, Arcadicum, Indicum, Britannicum, Me-  
litenfe. Quanquam & aliqui à nutritoribus appellantur, ut Castorij, Me-  
nelaides. Laconicis catellis nares porrectæ longius: ideoque olfactu ualent.  
Coit Laconicum genus mense suæ ætatis octauo: & crus iam circa id tem-  
pus attollentes nonnulli urinam reddunt. Gerunt Laconicæ uterum sexa-  
genis diebus, aut uno uel altero plus minúsue, uti modo diximus: & post  
coitum diebus triginta habere lac incipiunt. Magna ex parte octo pariunt:  
coeunt quandiu uiuunt & mares & fœminæ. Sūt ex his quæ ex cane & uul-  
pe procreantur, alopecides dictæ. Et peculiare generis Laconici est, ut cum  
laborarint, coire melius quàm per otium possint. Viuit in hoc genere mas  
ad annos decem, fœmina ad duodecim: fœminæ enim in hoc genere, quia  
minus laborant quàm mares, uiuaciores maribus sunt. In hoc quoque ge-  
nere fœminas sagaciores esse quàm mares apertum est. In canum generi-  
bus triplex ratio est: nanque unum genus aduersus hominum insidias eli-  
gitur: & id uillam quæque iuncta sunt uillæ custodit: uillaticū appellamus.  
At alterum

*Atque, rabies.*

*Laconicæ canes.*

*Alopecides.*

*Sagaciores, A-  
visioſa.  
Canis uillaticus  
domesticus.*

- A At alterum propellendis iniuriis hominum ac ferarum: & id obseruat domni stabulum, foris pecora pascencia, pastorale uocamus & pecuarium. Ter-  
 tium uenandi gratia comparatur. Villaticus eligendus est amplissimi cor-  
 poris, uasti latratus canorique, ut prius auditu maleficum, deinde etiam cō-  
 spectu terreat. Niger potius eligendus quàm albus aut uarius: siue enim lu-  
 ce clara sur aduenerit, terribilior niger conspicitur, siue nocte, ne conspici-  
 tur quidem propter umbrę similitudinē. Probatur quadratus potius quàm  
 longus aut breuis, capite tam magno ut corporis uideatur pars maxima,  
 deiectis & propendentibus auribus nigris uel glaucis oculis acri lumine ra-  
 diantibus: amplo uillosoque pectore, latis armis, curibus crassis & hirtis:  
 cauda breui, uestigiorum articulis & unguibus amplissimis. Hic erit uilla-  
 tici canis status præcipue laudandus. Mores autem neque mitissimi, neque  
 rursus truces: quod illi furem quoque adulantur, hi etiam domesticos inua-  
 dunt. Satis est seueros esse nec blandos, ut nonnunquam etiam conseruos  
 iratius intueantur: semper exandescant in externos. Maxime autem debet  
 in custodia uigilaces conspici, nec erronei, sed assidui & circumspecti ma-  
 gis quàm temerarij. Nam illi nisi quod certum compererunt, non indicant:  
 hi uano strepitu & falsa suspitione concitantur. Nec multum refert an uil-  
 latici corporibus graues & parū ueloces sint: plus enim cominus & in gra-  
 du, quàm eminus & in spatio cursu facere debent. Nam semper circa se-  
 pta & intra ædificium consistere, imo ne longius quidem recedere debent.  
 Satisque pulchre funguntur officio, si & aduenientem sagaciter adoriuntur,  
 C & latratu conterrent: uel si constantius appropinquantem uiolenter inua-  
 dunt. Atque hæc de domesticis custodibus: illa de pastoralibus. Pecuarius  
 canis neque tam strigosus aut pernix debet esse, quàm qui damas ceruoscq;  
 & uelocissima sectatur animalia, nec tam obesus aut grauis quàm uille hor-  
 reique custos: sed & robustus nihilominus, & aliquatenus proptus ac stre-  
 nuus: quoniam & ad rixam & ad pugnam, nec minus ad cursum compa-  
 ratur: cum & lupi repellere insidias, & raptorem feram consequi fugientē,  
 prædāque excutere atque auferre debeat. Quare status eius longior pro-  
 ductiorque ad hos casus magis habilis est, quàm breuis aut etiam quadra-  
 tus: quoniam, ut dixi, nonnunquam necessitas exigit celeritate bestiam cō-  
 sectandam. Cæteri artus similes uillatici canis æque probantur. Colore eli-  
 D gatur albus potius quàm aut niger aut uarius: quoniam hic est fera dissimi-  
 lis, magnoque opus interdum discrimine est in propulsandis lupis subob-  
 scuro mane, uel etiam crepusculo: ne si non sit albo colore conspicuus, pro  
 lupo canem feriat pastor. Huic quadrupedi neque forminę neque mari, ni-  
 si post annum, permittenda uenus est: quæ si teneris conceditur, carpit &  
 corpus & uires, animosque degenerat. Hæc Columellæ sententia est. Duo  
 canum genera M. Varro prodidit, unum uenaticum, & pertinet ad feras be-  
 stias ac syluestres: alterum quod custodia causa paratur, & pertinet ad pa-  
 storem. Hi facie debent esse formosi, magnitudine ampla, oculis nigranti-  
 bus aut ravis, naribus congruentibus, labris subnigris aut rubicundis, neque  
 resimis superioribus, neque pendulis subtus: mento suppresso, & ex co ena-

*Pastoralis.*  
*Pecuarius.*  
*Villaticus.*

*Canis pecua-*  
*rius.*  
*Pastoralis.*

*Canis uenati-*  
*cus.*  
*Pastoralis.*



tis duobus dentibus dextra & sinistra paulo eminulis superioribus, directis E  
potius quàm brochis, & acutis, quos habent labro testos: capitibus & au-  
riculis magnis ac flaccis, crassiss ceruicibus ac collo, internodiis articularū  
longis, cruribus rectis, ac potius uaris quàm uaciis, pedibus magnis & al-  
tis, qui ingredienti ei displodantur: digitis discretis, unguibus duris ac cur-  
uis. talo nec ut corneo nec nimium duro, sed ut fermentato ac molli: à for-  
minibus summis corpore suppresso: spina neq; eminula neq; curua, cauda  
crassa, latratu graui, hiatu magno, colore potissimum albo: præterea fœmi-  
nas uolunt esse mammosas, æqualibus papillis. Venatici canum generis  
nō eadē est omniū species, iidēque mores: sed ut præclare cecinit Gratius,

*Venaticus ca-  
nis.*

Mille canum patriæ, ductique ab origine mores  
Cuique sua. - Siue indomitos uehementior hostis  
Nudo Marte premas, seu bellum ex arte ministres.

F

*Medi canes.*

- Magna indocilis dat prælia Medus.

*Geloni canes.*

Arma negant contrà, martēque odere Geloni,

*Perfes canis.*

Sed natura sagax, Perfes in utroque paratus.

*Seres canis.*

Sunt qui Seras alant genus intra stabili iræ.

*Lycaones.*

At contrà faciles magnique Lycaones armis.

*Britan. canes.*

Britannici non specie tantum & decore, quantum uiribus pollent, & taci-  
turna solertia. Athamania canis, Acyrus, Pherea, Acarnan, uersutæ omnes,

*Athamania  
canis.*

- Et quæ subiēre pericula furto.

*Acyrus.*

Ætolica multo clangore feras insequitur. Sicambri uelocitate præstant: ita  
& Petronij, & præterea inuestigandarum ferarum sagacitate: sed quæ cum

*Pherea.*

*Acarnan.*

*Ætolica.*

*Sicamber.*

*Petronius.*

*Vmber.*

*Canis hircan<sup>o</sup>.*

*Indicus.*

multo fiat latratu. Canis Vmber naris quidē sagacitate ualet, sed imbellis  
est. At Hircani (quos & Indicos uocāt) ex paterno semine ferocissimi: Indi-  
cos enim canes ex tigride & cane gigni confirmant: uerum non statim, sed  
ex tertio coitu natos educant Indi: primo enim & secundo sortu beluinos  
adhuc catulos procreari aiunt. Alligantur canes locis desertis: & nisi belua  
incensa libidine sit, sæpe lacerantur. Forma quoque differunt uenatici ca-  
nes: est enim ex his genus quoddam

Seu Laçedæmonia natum, seu rure molosso

Elegeris, promptum ac strenuum: & qui sit

- Curfu facilis, facilisque recurfu:

corpore longo ac robusto, capite leui, pulchris oculis, cæruleis, splendenti-  
bus, rostro porrectiore, dentibus eminulis, acutis: auribus paruis mollibus-  
que, tenuibus & ueluti membrancis: collo lōgo, pectore amplo robustoq;  
cruribus gracilibus, altis, rigidis: coxis diductis, prioribus pedibus minori-  
bus: latis armis, costarum ordine in obliquum magis tendente, &

Qui sensim rursus sicca se colligat aluo:

lumbis amplis & bene carnosis, sed minime obesis, cauda gracili, prælōga.  
In hoc uenaticorū canum genere sunt, quibus ceruos, dorcadas, leporēque

*Petroni<sup>o</sup> canis*

*Sicamber.*

*Verraha.*

prosequimur: ut qui Petronij uocātur, & Sicambri, & quā Verrahā uocāt.  
Hanc elegatissimo carmine depinxit Gratius poeta. - Te leue si quā

Tangit opus, pauidōsque iuuat compellere dorcās,

Aut



A Aut uersuta sequi leporis uestigia parui,  
 Petronios (sic fama) canes uolucresque Sicambros,  
 Et pietum macula uertraham delige falsa:  
 Ocyor affectu mentis pinnaque cucurrit:  
 Sed premit inuentas, non inuentura latenteis  
 Illa feras, quæ petroniis bene gloria constat.

Hæc Gratius. E uenaticis autem canibus quibus tauros uenamur,  
 suisque syluestres atque id genus ferocia animalia: iis corpus robustius est,  
 & pilis hirsutius, nares simæ magis, aspectus trunculætiore, fronte & super-  
 ciliis prominentibus, oculis acri lumine radiantibus, dorsum amplum: nec  
 sane uelox hoc genus est. Tertium uenaticorum genus, Britanni agasæum *Agasæum.*  
 B uocant: strenuus generosusque hic est, uerum prædictis longe minor: ma-  
 gnitudine potius ignobilioribus hisce canibus, qui sub mēsis in ædibus no-  
 stris aluntur æqualis, gibbus, strigosus, hirsutus, aspectu oculorum ignauo,  
 unguibus duris rigidisque, dentibus iis qui canini uocantur, magnis, naribus  
 sagacitate in peruestigandis ferarum uestigiis cæteros omnes facile super-  
 rat. Tuscos canes uocat Aurelius, *Tuscos canis.*

Forma quibus licet oblita uillo,  
 Dissimilesque habeant catulis uelocibus artus,  
 Haud tamen iniucunda dabunt tibi munera præda.  
 Nanque & odorato noscunt uestigia prato:

Atque etiam leporum secreta cubilia monstrant.  
 C Gratius glympicum nominat & metagonta, *Glympicus.*  
 Quem primum celsa lorum ceruice ferentem *Metagon.*  
 In syluis egit Beotius Hagnon. Hic  
 Vnus præsidium, atque operi spes magna petito  
 Assumptus metagon, lustrat per nota ferarum  
 Pascua, per fontes, per quas triuere latebras  
 Primæ lucis opus: tum signa uapore ferino  
 Intemerata legens, si qua est qua fallitur eius  
 Turba loci, maiora secat spatia externa gyro:  
 Atque hic egressu iam tum sine fraude reperto,  
 Incubuit spatiis.

D Sed ne qua ex nimio redeat iactura furore,  
 Lex dicta officij neu uoce laceraret hostem,  
 Næue leuem prædam aut propioris pignora lucri  
 Amplexus, primos nequicquam ostenderet actus.  
 Iam uero impensum melior fortuna laborem  
 Cum sequitur, iuxta domus quæ sita ferarum  
 Vt sciat, occultos & signis arguat hosteis:  
 Aut effecta leui testatur gaudia cauda,  
 Aut ipsa infodiens uncis uestigia plantis  
 Mandit humum, celsæque apprensât naribus aures.

Et hæc quidē uenaticorum canum genera à ueteribus celebrata memini-

*Molotticus  
canis.  
Pecuarinus.*

*Melite<sup>o</sup> canis.  
Melitenfis.*

*Quomodo cõ-  
buri debeat ca-  
nini capitis of-  
fa, docet Plin.*

mus. Sunt autè & in eodem genere canum, alij uenatici, alij pecuarij: ut in E  
genere molottico. Cum enim molotticum genus uenaticum nihilo à cæte-  
ris discrepat, quòd scilicet fœminæ moribus sint mollioribus quàm mares,  
pecuarium tamen magnitudine & animositate contra beluas præstat: infi-  
gnes uero & animo & industria, qui ex utroque, molotticis dico & laco-  
nicis, prodierint. Sunt præter hæc nobilia canum genera, imbelles quidam  
paruique, & prope dixerim inutiles, qui in domibus nostris oberrât, & sub  
mensis aluntur: ex quibus paucos admodum ab authoribus celebratos me-  
minimus: in quibus est qui catulus Meliteus à Melita insula dictus à Calli-  
macho est: paruus hic est, quàm sit uiuerra maior. Hi stomachi dolorè fe-  
dant applicati sæpius: transireque morbos, ægritudine corû intelligitur, ple-  
runque & morte. Præcordia uocamus uno nomine exta in homine: quo- F  
rum in dolore cuiuscunque partis, si catulus lactès admoveatur, apprima-  
túrque his partibus, transire in eum morbus dicitur: idq; exenterato persus-  
sóque uino deprehendi, uitiato uiscere illo quod doluerit hominis: & ob-  
rui tales religio est. Sunt occulti interaneorum morbi, de quibus item mi-  
rum proditur. Si catuli priusquam uideant applicentur triduo, stomacho  
maxime ac pectori, & ex ore egri suctum lactis accipiât, transire uim mor-  
bi: postremo exanimari, dissectisque palâ fieri ægri causas: mori & humari  
debere eos obruta terra. Canis rabidi iecur si assum edatur, pro remedio iis  
qui ab ipso fuerint morfi à nonnullis proditum est. Audiui autem quosdâ,  
inquit Galenus, cum illi soli remedio fidem habuissent, postea statim mor-  
tuos. Multo tamen utilissime (ut tradit Plinius) iecur eius qui in rabie mo- G  
morderit, datur, si possit fieri, crudum mandendû: si minus, quoquo modo  
coctum: aut ius incoctis carnibus. quin & necesse catuli statim in aqua ad  
sexû eius qui momorderit, ut iecur crudum deuoretur ex iis. Hæc Plinius.  
Vtuntur quoque ad arcendos aquæ pauores (ut author est Dioscorides) ca-  
nino dente eius, qui momorderit canis, folliculo includetes: quem brachio  
pro amuleto adnectunt. In canis rabidi morfu tuetur à pauore aquæ capi-  
tis canini cinis illitus uulneri: idem in potione proficit: quidam ob id edẽ-  
dum dederunt: aliqui & uermem à cadauere canino adalligauere. Est limus  
saliuæ sub lingua rabiosi canis, qui datus in potu fieri hydrophobos non pa-  
titur. saliantur & carnes eorum qui rabidi fuerunt, ad eadem remedia in  
cibo dandæ. Sanguine canino cõtra toxica nihil præstantius putatur: & ad H  
scabiem ante omnia ualet sanguis caninus. Ossibus fractis caninum cere-  
brum linteolo illito superpositis lanis quæ subinde suffundântur, fere xiiii  
diebus solidat. Lendes tolluntur adipe canino: aurium grauitatem sedat a-  
deps cum absinthio & oleo uetere: caniniquè lactis instillatio sedat aurii  
dolorem. Stercus caninum anginis medetur, & dysenteria: necnon ulceri-  
bus, præcipue malignis.

1 Canes & c. Alios etiam canum morbos ostendunt rei rusticæ authores: sed quibus  
faciliora remedia adhiberi possint: ut Col. lib. 7. Gratius de uenatione. 2 Meliades.  
Petronij à petronibus dici putantur: quos ueteres rusticos appellauerunt. 3 Olfactus  
ualent. Interpretes Arabicus leuerarium hunc uocat.

De lupis.

A De lupis.

Cap. LXXVIII.

- C Ani pecuario magno simillima corporis figura lupus est. Collū illi u- *Lupus, λύκος.*  
 nico osse perpetuo rigidum: cauda crassa, uillosa. Genitale ossis naturā  
 sequitur. pedes habet priores quinis distinctos digitis, ut canis. Auerſi co-  
 eunt lupi eodem modo quo canes, sed uno tempore tantum: & dies quibus  
 coeunt toto anno non amplius duodecim. Fert etiam uterum lupa, & parit  
 ut canis, tum tempore, tum fœtus numero. Cæcos etiam generat canis mo-  
 do: parit ineunte æstate. Animal est insidiosum & ferox: inertes tamen hos  
 paruósque Africa & Ægyptus gignunt: asperos trucésque frigidior plaga.  
 Visu præditus est lupus acutissimo, ut qui nocte intempeſta & tenebroſa, lu-  
 ce tamen perfruitur: noctu itaque uagatur & pecora deuorat. *Quin & tau*  
*B* ros quoque inuadit & asinos, atque etiam uulpes. Lupi hominem illi po-  
 tius uorandum petunt, qui *μονοπύρροι*, id est uniparæ aut ſolitarij ſunt, quàm *μυνοπύρροι*,  
 qui uenatores, *κλυωγῆσαι* uocant. Lupos etiam aiunt terram quandam cum *κλυωγῆσαι*.  
 1 eſuriunt edere. Quinetiam apud paludem Mæotidem, lupos eſſe piſcatorū *Lupi piſcatores.*  
 familiares, eorūque ſocietate piſcari aiunt: & niſi partem ſuam eorum  
 quos capiunt piſcium à piſcatoribus acceperint, retia cum in terra expanſa  
 reſiccantur, lacerant. In Italia creditur luporum uiſus eſſe noxiſ: uocemq;  
 homini quem priore contēplentur, adimere ad præſens. Lupi iecur tri-  
 ritum hepaticis datur, iis qui febris ſunt expertes cum uino nigro calido: fe-  
 brientibus uero cum aqua calida. Offea ſunt lupis genitalia, uti diximus, &  
 iis calculo humano præcipua remedia. Plura ſunt luporum genera: pri-  
 2 mum *πῆλινος* uocant, quaſi iaculatorem ſagittariūm uel dixeris, toto cor- *πῆλινος.*  
 pore ſuluo breuiſque. Caput habet lōge maius quàm pro corporis ratione:  
 uentrem ueluti canitie multa albicantem, curſu pernici, horrendo ulularu,  
 aſpectu truculento, capite fere nutante. Alterum genus circum appellāt, *Circus, κύρως,*  
 & *ἀρπῆξ*, id eſt raptorem, priore maius, corpore oblongo, colore & in late *ἀρπῆξ.*  
 ribus & cauda candido, uelocitate cæteros lupos omnes facile ſuperat. mul-  
 to cum ſtrepitu prima aurora & in ipſo crepuſculo ad prædam proficiſci-  
 tur. In montibus degit: urgente uero acriore hyemis aſperitate, urbes pro-  
 pius accedit, quo facilius è gregibus uictum paret. Eſt in Tauro, Amano,  
 & Ciliciæ montibus, non lupus, ſed lupis beſua longe præſtantior, prægrā- *Aureus lupus,*  
 dis atque procera, aureum uocat & *χρύς*, à pilorū fulgore, inter feras pul- *χρύς.*  
 3 chritudine eximia: inſigni oris duritate roboreſque, quo ferrum, æs, lapidēſ  
 que uel duriffimos emollit atque frangit. Caniculæ ortū ſentit hæc beſua  
 metuítque: ſtatim nanque in terræ ſpeluncam quampiā abdit ſeſe, donec  
 feruor ille ſolis deſerbuerit. Duo item ſunt alia luporū genera, *ἄμμιος* uo- *ἄμμιος.*  
 cant: collo breui, dorſo lato, cruribus pedibúſque uilloſis, roſtro toto & ocu-  
 lis quoque paruis. Horum alter & dorſo & uentre eſt candidiore: in oculo-  
 rum duntaxat ambitu nigricat: hunc quidam *ἰκτινός* dicunt: alter uero colo- *ἰκτινός, πλινός.*  
 re nigricante inſignis, minor priore eſt, ſed uiribus nihilo inferior. Setarū *πλινός, dixit*  
 in modum horrent undique pili, lepores frequenter inuadunt. Thos lu- *Oppianus.*  
 pus eſt Æthiopicus paruus & deformis, ex lupo & panthera prognatus, qui *Thos, θῶς.*  
 3 utrunque refert parētem, facie ſcilicet genitorem, reliquo corpore matrē.

Corpus illi ad caudam porrectius est, sed minus procerum. Interna omnia j lupi similia habet. Impletur ut canis, & catulos etiam cæcos generat. Velocitate præstat, saltuque ualet, quauis crura habeat breuiora: mollis enim & agilis est, prosilireque longius ob eam rem potest. uenatu uiuit: hominē diligit, quem neque offendit neque metuit ualde. pugnat cum canibus & leonibus, imo leones ipsos superat: quod fit ne in eodem loco sint thoes & leones. Huius alij duo genera statuunt, alij tria, sed plura esse non uidentur: sed ut piscium, auium, quadrupedum genera aliqua, ita thoes quoque per tempora inmutantur, & colorem diuersum hyeme æstatē trahunt: atq;

*Nudi, laniatores, sitim leues, uel nitidi.*

*Lupus ceruarius.*

*Lycæon.*

*Lynx, λύξ.*

*Vergil. Quid lynces Bacchi uaria?*

*Lyncurium. De lyncurio plura apud Plinium lib. 37, cap. 2.*

*Langurium.*

*Languria.*

*Langæ.*

*πρωτό.*

*Lup<sup>o</sup> canari<sup>o</sup>.*

*Chaus.*

*Rhaphilus.*

æstate nudi, hyeme hirti redduntur: itaque habitum, nō colorem mutant, inquit Plinius. Lupus ceruarius (eūdeme esse arbitrantur nōnulli, qui thos: alij chaum dici māsunt,) insatiabilis est, ut cui à uentre protinus recto intestino transeunt cibi. Hic tamen, quāuis post longa ieiunia, repertas ægre carnes si mandere cœperit: ubi quid casu respiciat, obliuiscitur: & immemor præsentis copię, abit quæsitum quam reliquerat satietatem. Mittit Æthiopia & lycæonem & India quoque. lupus est ceruice iubatus, & tot modis uarius, ut nullum illi colorem dicant abesse. In hoc animalium genere numerātur à quibusdam & lynces. Duo eorum genera: animal utrūq; paruum est, forma utrique similis, oculi splendētes, facies formosa, exiguū caput, auriculæ curuæ. Differūt magnitudine & colore: minori enim generi color rufus: maiori ad crocē uergit. Genus hoc maius ceruos orygalq; magna cum agilitate inuadit. Animal peregrinū lynx est, clarissime omnium quadrupedum cernit. In cruribus posterioribus simile quid semitalo habet. In auersum mingunt lynces, auersæque coeunt canum more. Harum urinas coire in geminas carbunculi similes & igneo colore fulgentes, fatentur, qui naturas lapidum exquisitius sunt persecuti: lyncurium uocatur (è 4 maribus fuluum & igneum: a sceminis languidius atque candidum.) Istud etiam ipsum lynces persentiscere hoc documento probatur: quod egestū liquorem ilico arenarum cumulis quantum ualent, cōtegunt, inuidia scilicet ne talis egeries transeat in usum nostrum, ut Theophrastus perhibet. Hoc non folia tantum & stramenta ad se rapere, sed aris etiam atque ferri laminas contendunt: quod Diocles quidem & Theophrastus credidit: Ego falsum id totum arbitror (inquit Plinius) nec uisam in æuo nostro gemmā ullam ea appellatione. Et quod de medicina simul proditur, calculos uesicæ H eo poto elidi, & morbo regio occurri, si ex uino bibatur aut si portetur. Vnques earum omnes cum corio exuri efficacissime in Carpatho insula tradunt hoc cinere epoto, propudia uirorum, eiusdem aspersu, sceminarum libidines inhiberi. Item pruritus corporum, urina, stillicidia uesicæ: itaque eam protinus terra pedibus aggesta, obruere traditur. Eadem autem & iugulorum dolori monstratur in remedio. Alij dixere languriū, & esse in Italia bestias langurias: Zenotimus lāgas uocat easdem, & circa Padum iis uitam asfirmat. πρωτόξος lupum canarium uocauere quidam: animal est aspe- 5 ctu pulchrum, sed uirium expers & imbellē. Catulos parit cæcos luponum ritu. Chaum galli rhaphium uocabant, effigie lupi, pardorum maculis. 6

- A 1 Apud paludē Mæot. Secundū Mæotidis paludis Conopiū nuncupatū lupi, quos minime à domesticis canibus differre dicas, cum piscatoribus stultiose uersantur.  
 2 Breui, *ῥωδία καὶ γύα*, id est mēbrorū compage prope rotunda. 3 Reliquo corpore, *ῥωδία*, id est tergo, uel ut Gillio placet, pellis uarietate. 4 Igneo colore fulgēres, Esse autem quālē in igneis succinis colorem, scalpique refert Plinius. 5 *ῥαδία*, Pollux *ῥωδία* inter maiora numerat animalia. 6 Chæm eundē esse cum lupo ceruatio cēset Hermolaus: & ex chao conceptas canes chaonidas nominari: etiā si Iulius Pollux altiore de his fabulam recenseat.

## De hyæna &amp; crocuta.

## Cap. LXXIX.

- V T lupo non dissimilis, ita nec omnino similis hyæna est, quam nōnulli glanum dicunt: dorsum illi medium gibbum est. colore lupi prope, sed hirsutior, latere utrinque fusca distincto uilla. & iubam habet ut equus, sed quæ per totum dorsum porrecta est, & seta duriore longiorēque. Varietas multiplex inest oculis, ut qui in mille colores transeat subinde, in quorum pupilla lapis inuenitur, hyæniū dictum, præditum illa potestate, ut cuius hominis fuerit linguæ subditus, prædicat futura. Spina illi riget, & collum continua unitate, flectique nequit, nisi toto corpore circūactō. Corpus illi non minus quàm lupi est, longum & gracile: & cauda quoque longa gracilisque, sed hirsuta. Quod autem de ea fertur, genitale simul & maris & fœminæ eandem habere, itaque inire & iniri alternis annis coniectitium est: sed uirile similiter atque in lupis & canibus habetur. Quod uero fœmineum esse uidetur, tam in mari quàm fœmina sub cauda positum, est.
- C lineæ quædam similis genitali fœminino, sed sine ullo meatu: sub hoc meatus excrementorum est, atque sub eo genitale uerum in fœmina continetur. Quæ quidem nota quanuis utrique sexui communis sit, tamen in maribus potius cernitur: quia mares quàm fœminæ magis capiuntur, quòd iis ingenita est callidior astutia. Iam inter undecim numero, unam tantum cepisse uenator retulit quidam. Nocte grassatur, ut quæ noctu melius cernat. Molitur hæc insidias homini, sequiturque stabula pastorum, & auditu assiduo addiscit uocamen, quod exprimere possit imitatione uocis humanæ, ut in hominem astu accitū nocte sæuiat. Vomitus quoque humanos mentitur, falsisque singultibus sollicitatos sic canes deuorat. Sepulchra quoque effodit humanæ auida carnis, ac eruit. Præcipue pantheris esse in metu hyæna dicuntur, ut ne contentur quidem resistere, & aliquid de corio earum habentem, non appeti. Mirumque dictu, si pelles utriusque contrariæ suspendantur, decidere pilos pantheræ. Cum fugiunt uenantem, declinant ad dextram, ut prægressi hominis uestigia occupent. Quòd si successerit, alienari mente, ac uel ex equo hominem decidere: at si in læuam detorserit, deficientis argumentum esse, celeremque capturam. Hyæna plurimæ gignuntur in Africa. Hyæna quemadmodum & uulpes in oleo elixa oleum efficit diffusorium, articulari morbo utilissimum: usus omnino idem quem de uulpino docebimus. Hyæna fel taurino efficacius est: suffusionem oculorum per initia digerit, aciemque eorum exacuit. Lippitudini fel illitum frontibus prodesse dicitur: aut ne lippiat decoctum cum mellis Attici cyathis

*Hyæna,  
Glanus.*

*Alia hyæna,  
ex oculis hyæna, inquit Plinius.*

tribus & croci uncia illitum: sic & caligines discutit & suffusiones. Claritate excitari melius inueterato medicamento: asseruari autem in Cypria pyxide. Eodem sanari argema, scabritias, excrecētia in oculis: item cicatrices. glaucomata uero iocineris recentis inassati sanie cum dispumato melle inunctis. Dētes eius dentium doloribus tactu prodesse: (si credimus) uel alligatos ordine humeros, humerorum, & lacertorum doloribus. Pulmones in cibo sumptos cœliaci: uētriculis, cinerem cum oleo illitum: neruis, medullas è dorso cum oleo uetere ac felle. Febribus quartanis, iecur degustatum ante accessiones: lumborum doloribus, carnes è lumbis edendas, illinendāsque cum oleo: uenerem stimulari, genitali ad sexus suos in melle sumpto, etiam si uiri mulierum coitus oderint. Hyæna quodcunque animal ter lustrauerit, mouere se non posse, sed in uestigio hætere traditur: F quapropter magicam scientiam inesse ei pronuntiauerunt, quam & magi ex omnibus animalibus in maxima admiratione posuerunt. In Æthiopix parte coit cum læna, unde nascitur monstrum, cui crocutæ nomē est: uoces hominum pecorūque & ipsa pariter affectat. Nunquam conuiuet aciem orbium, sed in obtutum sine nictatione cōtendit. In ore gingiua nulla, dens unus atque perpetuus: qui ut nunquam contrario cursu hebetetur, naturaliter capfularum modo clauditur. Crocutas etiam generat Æthiopia ex cane lupoque conceptos, omnia dentibus frangentes, protinusque deuorata conficientes uentre.

*Cœliaci, aliis  
iliaci.*

*Crocota, κρο-  
κωτῆς.  
Aliis crocota,*

1 Genitale, Nec minus stulte, inquit Aristoteles, magnoque errore trochum. Herodorus Heracleota scribit duplex genitale habere, maris ac feminae: atque trochum seipsum inire. **G**

De leonibus.

Cap. LXXX.

*Αἰας, leo.*

**L**eo rarum genus animalis est, nec multis nascitur locis. In Europa potius quàm in Asia inueniuntur leones: & in Europæ ea parte quæ inter Acheloum tantum & Nestum amnes est: & ij uiribus longe præstantiores sunt iis, quos Africa aut Syria gignant. Qui uero prope Istrum Europæ amnem, quique in Armenia aut Parthia procreantur, non adeo uiribus pol-

- His leuia fuluæ

*Leones fului  
sunt omnes,  
inquit Aristoteles, πυρρίνοι.*

Colla iubæ uelant, digiti curuantur in ungues:  
Proque humeris armi sunt in pectora torum  
Pondus abit, summæ cauda uerruntur arenæ:  
Iram uultus habet. pro uerbis murmura reddunt.  
Pro thalamis celebrant syluas.

**H**

Verum pro regionum, in quibus gignuntur uarietate, eorum quoque forma diuersa est. In Parthia nanque & Armenia nascuntur colore fuluo, crasso collo, capite magno, oculis splendore radiantibus, superciliis extantibus, & fere ad nares usque propendentibus, collo simul & mento, plurimo pilo luxuriantibus. Qui in Erebis gignuntur, collo quoque & pectore nō minus iubati sunt, & oculis item splendore fulgentibus: uerum ex iis pauci, uel in regione ampla reperiuntur, & supra modum pugnaces: in Africa autē plu-

res,

- A res, uerum non ita hirsuti pilosius: sed neque oculis adeo radiantibus, aspectu tamen terribili. Totius corporis color nigricās his fuscusue, ac si nigrū cœruleo permisceas: corporis robur eximium. Ex Æthiopia migrant nonnunquā leones, cætero nigricantes, solo rictu fuluo colore rufescentes, plurima iuba, capite grandiore, oculis nigricātibus: ut uero Plinius scribit color leonum tantum in Syria niger. Abundat Æthiopia & leonibus qui *μύρμυκας*, uocantur, id est formicæ: sunt etiā in arenosis Indiæ desertis. Habet autem hoc genus genitale auersum, colorem aureum, glabriores hi sunt quā Arabici. Ipsi, inquit Plinius, color felium, magnitudo Ægypti luporum, uel ut Solino placet, ad formam canis maximi: ut uero Herodoto quā sit canum magnitudo minor, uulpiū uero maior, pernicitate miranda: uenatu uiuunt, pedibus quos leoninos habent, arenas aureas ex cauernis egerunt terre, talparū more, quas uigilantissime custodiunt, ne quis auferat: captantesque ad necem persequuntur: in cauernis aestu conduntur. Nearchus uidisse se scribit formicarum ferarum pelles pacherarum pellibus similes. Herodotus corporis specie formicis Græcis similes esse tradit: eodēque modo arenā ab illis effodi. Plinius, Indiæ formicæ cornua, inquit, Erythris in æde Herculis fixa, miraculo fuere. Dentes leonibus omnibus ferrati: & ex iis eos tantūmodo mutant, qui canini uocantur quatuor, duos superius, totidēque inferius: idq; sexto ætatis mense fit. Lingua leonibus imbricata asperitatis est, & limæ similis, attenuānsque lambendo cutem hominis: ceruix ossē uno rigida cōstat, nec uertebriis ullis iungitur. Iuba caret læna:
- C maris enim hæc propria est, ut scilicet pili in armis largi depēdeant: at quos pardi generauere, semper insigni hoc carent. Binas tantum gerūt mammas in medio uentre: quæ etiam in fœminis paruo abundant lacte. In cruribus posterioribus talum gerunt in anfractum tortuosum: pedes priores quinis distinctos digitis habent, posteriores quaternis: ungues iis adunci, quorum macrones cum ingrediuntur, uaginis corporū claudunt, ne acumina attritu retundantur: nec nisi appetendo prætenduntur. Pedatim incedit leo, hoc est ut sinister pes non transeat dextrum, sed subsequatur. cauda leoni, infima parte ut bubus hirta: Leonis ossa exigua admodum, & perobscuram habent medullam, eāque solis in fœmoribus & brachiis: eius ossa adeo dura sunt, ut ex iis concussis, ignis quasi ex filice excutiat. Ventrem habet leo ut canis arctiorem: & interiora item omnia canibus similia continet. Leo auersus coit, urināque retro reddit. Coit & parit nō omni tempore: singulis tamē annis uere parit, & magna ex parte geminos: sed cum plurimum sex catulos: nonnunquam etiam unum. parit autem catulos informes inarticulatosq; in initio magnitudine mustellarum, & cæcos: sed qui uident protius atque nascūtur, soli in eo genere quod dentes habet ferratos. Sunt uero cum in lucem eduntur adeo parui, ut semestres uix ingredi possint, nec nisi bimestres moueri. Leones terræ Syriæ quinquies uita pariunt: primum quinquē, post uno subinde pauciores: anno enim secundo quatuor, mox tres: deinde pari modo per annos singulos minus uno, postremo nullum: atque ita læna partus multitudine sterilefcit. Semel in uita

*μύρμυκας,*  
*Formicæ Indiæ.*

*Alias, ipsis color fuscus.*



leānam parere scribit Herodotus, unāque cum foetu uterū emittere, quod E fabulosum esse asserit Aristoteles. Vescitur quidem carne leo ritu cæterorum syluestrium ferratorum: sed cibo incontinēter admodum utitur, multāque deuorat solida, sine ullo dissectu. Mox nihil biduo, aut certe triduo edit: ferre enim in ediam potest, ut qui iam ad multam satietatem repletus est. Parum bibit: excrementum uero emittit tertio die: uel utcunque accidit egerit, idq; durum, aridum, & simile ut canis. Flatum etiam acerrimum emitit, & urinam grauiter olētem. Mingit crure elato ut canes ad stipites: fœdum quoque odorem in cibo relinquit ex suo halitu: profcisso nanque leone, interiora grauiter olent. Leo quanuis in edendo ferocissimus sit, tamen pastus & fame iam uacans, facilis mitisque maiorem in modum est. Clementiæ in iis indicia multa sunt: prostratis parcūt: in uiros potius quā F in fœminas sœuiunt: infantes non nisi magna fame perimūt. Animos leonum frons & cauda indicant: sicut motus equini de auribus intelliguntur: immota enim cauda est placido, clemens blandientq; similis, quod rarum est: crebrior enim iracundia eius. In principio terra uerberatur: incremento terga seu quodam incitamento flagellantur. Vis summa leoni in pectore est, firmitas in capite præcipua. Infirmus parte ilium est cōtra ictus: sed reliquo corpore multas patitur plagas. Leonum genus trifariā scinditur: nam breuiiores & iubis crispi, plerunque ignaui sunt & imbelles: longiores & coma simplici, generosi acresque magis ac potentes. Leoni præcipua generositas tunc, cum colla armōque uestiunt iubæ: id enim ætate cōtingit è leone conceptis: at hi quos creant pardi, in plebe remanent iubarum inopes. G Adulterinis enim coitibus degenerantur quandoque partus leānarum: & leones quidem procreantur, sed ignobiles. Leones cum premuntur à canibus aut uenātū multitudinem, cōtemptim recedunt sensum pedatimq; subsistentēque interdum ac respectantes dissimulant timorem. Idq; agunt, si in campis patentibus ac nudis urgeātur: nam syluestribus opacisque locis, quanta possunt se fuga subtrahunt. Cum insequuntur nisum saltu adiuuāt: & ubi iam prædæ appropinquarent, insiliunt: cum fugiunt, non possunt salire, sed cursus eorum continens, ut canum intēditur: fugiunt nonnunquā leones demissa inter crura cauda, ut canes. Iam uisus est leo, qui cum suum aggrediretur, ut setis horrentem aspexit, fugeret. Ignem præcipue formidant, & cantus gallinaceorum, & rotarum strepitus: sed ignes magis. Leo H nis adeps cæteros & caliditate exuperat, & partium tenuitate: ac proinde digerendi facultatem habet maiorem. Leonis adeps cum rosaceo cutem in facie custodit à uitiiis, candorēque seruat, & sanat adusta niuibus, articulorumque tumores. Fel aqua addita, claritatē oculis inunctis facit: & cum adipe eiusdē comitiales morbos discutit leui gustu, & ut protinus qui sumpsere cursu id digerant. Cor in cibo sumptum, quartanis medetur: adeps cū rosaceo quotidianis febribus. Leontophonus uocari accipimus bestias modicas, nec aliubi nascentes, quā ubi leo gignitur: quarum urina aspersa leoni extialis est: quæ & captæ exuruntur, ut earum cineres pollutæ iactæq; per compita concurrentium semitarum leones necēt, si quantuluncun-

Parte ilium,  
eis ulō τὰ  
καὶ α.

Leontophoni.

A cunque ex illis sumplerint: Propterea leones naturali eas premunt odio: atque ubi facultas data est, morfu quidē abstinēt, sed dilaniatam exanimāt pedum nifibus. Illa contrā urinā spargit prudens, hanc quoq; leoni exitiale.

De tigride.

Cap. LXXXI.

**T**igrin Hircani & Indi ferunt. Hoc bestiarum genus insignes maculis *Tigris* notæ & pernicitas memorabile reddiderunt. Aspectus pulchritudine reliquas omnes quadrupedes non minus superat tigris, quā pauo alites, corporis magnitudine, oculorum intuitu, superciliis prominentibus, caudæ longitudine, toto denique corporis habitu, præterquam coloris uarietate. leonē simillima tigris fœmina est, (nam mas cani similior extat.) Fuluo nitet corpus: hoc fuluum nigrantibus segmentis interundatum, uarietate apprime decet. Velocitatis tremendæ sunt tigres: nihil enim tam longum quod non breui penetrent: nihil adeo antecedit, quod nō ilico assequatur: at maxime potentia earum probatur, cum maternis curis incitantur, cum catulorum insistent raptoribus. Succedant sibi equites licet, & astu quāto libet amoliri prædā uelint, nisi in præsidio maria fuerint, frustra est ausum omne. Totus tamen eius fœtus, qui numerosus est, ab insidiante rapitur, equo quā maxime pernici: atque in recentem subinde transfertur: at ubi uacuum cubile reperit fœta (maribus enim cura non est sobolis, sed nec eos aliàs temere conspexeris) fertur præceps odore uestigans. Raptor appropinquante fremitu, abiicit unū ex catulis: tollit illa morfu, & pondere etiā C ocyor acta, remeat: iterū consequitur, & subinde, donec in nauim regresso, irrita feritas sequit in litore. Notantur enim frequentissime, si quando raptore, suis asportatis catulis, renauigātes uident, in litore irrita rabie se dare præcipites, uelut propriam tarditatem uoluntaria castigantes ruina. Tigres apud Prasios maximas gigni Megasthenes author est: quippe quæ leones magnitudine dupla fere superant. Tigres Arrianus (qui Alexandri res gestas conscripsit) magnitudine equum maximum æquare, cæteras uero quas uulgu tigres nominat, non tigres, sed thoas esse maiores prodidit.

De panthera pardo & ceco.

Cap. LXXXII.

**P**anthera & tigris macularū uarietate prope solæ bestiarum spectātur. *Panthera.* *Πάνθηρ.* *Πάρδαλις.* *Πόρδαλις.*  
D Ferox animal pāthera est, & in homines sequit. Macularum, ut diximus, uarietate spectabilis est, & minutis orbiculis picta, ita ut oculatis ex fuluo aut nigro circulis, uel cœrulea, uel alba distinguatur tergi supellex. Sunt qui tradant in armo iis similem lunę esse maculam crescentem in orbes, & cauātem pari modo cornua. Duplex pantherarū genus, alterum maius, quod & dorsum latius habet: alterum minus quidem, & corpore gracilio-  
re, at uiribus nihilo inferius. Similes sunt utræq; præterquam quod caudis differunt: minori enim maior est cauda, maiori uero minor. Corpus utriq; oblongum maculisque uarium, ut modo diximus. Oculi splendore radiantes: dentes habent serratos: mammas in medio uentre quaternas, crura cō-  
pacta firmæque: pedes priores quinis digitis distinctos, posteriores quater-

nis. Ingrediuntur leonum more, cōdito scilicet in corporis uaginis unguū E mucrone, nec nisi appetendo prætendunt. cor habent pro corporis ratione magnum. Animalium nullum odoratum, inquit Plinius, nisi si de pantheris quod dictum est credimus. Tradunt odore earum, & contemplatione armenta mire affici: atque ubi eas persentiscant, præparato conuenire: nec 2 terri, nisi sola oris toruitate. quam ob causam pantheræ absconditis capitibus, quæ corporis reliqua sunt, spectanda præbent, ut pecuarios greges stupidos in obtutu populentur secunda uastatione. Pantheræ in Europa nulla sunt: in Hircania numerosæ. uino plurimū delectantur. Capiuntur maxime, non agno aut hædo, sed canicula palo alligata: uerum Hircani, ut hominibus intentatum nihil est, frequentius eas ueneno quàm ferro necant: aconito carnes illinunt, atque ita per compita spargunt semitarum: F quæ ubi esse sunt, fauces earum angina obsidentur, ideo & gramen παρδαλιάχης appellauerunt: sed pantheræ aduersus hoc uirus, excrementa humana deuorant, & suo ingenio, pesti resistunt. Quocirca uenatores stercus in uasculo suspendunt ex arbore aliqua, ne procul belua abeat petēs suum medicamentum, idque altius quàm ut queat saltu contingere. itaque insiliens ibidem, & spe capiendi perseuerans, in se efferenda emoritur. In pantherarum genere fœminam animosiores esse quàm marem apertum est. Nunc & uarias, & pardos qui mares sunt, appellant, in eo omni genere, creberrimo in Africa Syriæque. Quidam ab iis pantheras solo candore discernunt, nec adhuc aliam differentiam inueni, inquit Plinius. Insidunt in 4 Africa pardi cōdensa arbore: occultatque eius ramis, in prætereuntia desiliunt, atque de uolucrum sede grassantur. Est in Æthiopia cepus, reliquo quidem 5 corpore pantheræ similis, sed facie leonina, magnitudine dorcædis.

Varia.  
Pardi.

Cepus, κῆπος,  
καπός.

1 Pantheris in candido breues macularum oculi, inquit Plinius. Cœrulea uel alba dixit Solinus, quod Oppianus ὑδρικομάνισσι, ἰδρύδρ. 2 Quo modo pantheræ simias captant, ostendit Gillius, ut ait, ex Æliano: item hinnulos, dorcadas, capras syluestres, atque alia eiusmodi animalia. 3 Quo pacto capiantur ostendit Oppianus lib. 3. De uenatione, & 3. De pisc. 4 Solinus. In his syluestribus & pardi sunt, secundum à pantheris genus, notis satis: quorum adulterinis coitibus degenerantur partus leonum: & leones quidem procreantur, sed ignobiles. 5 Cepus, κῆπος colunt Babylonij, qui sunt iuxta Memphim, faciem habet satyro similē, cætera inter canem & ursum: nascitur in Æthiopia.

De urso.

Cap. LXXXIII.

H

Ursus.  
Ursa.  
ἄρκτος.

URsus animal est aspectu horridum, corpore latiore, hirsuto uillo, & -Ora illi lato deformia rictu. -Vox iracunda minaxque, Plenæque terroris rauco de gutture fertur.

Dentes illi ferrati, naris nigra, mammas habet quaternas, & pedes hominis manibus pedibusque similes. Cauda urso tam exigua ut uix dignosci à sensu possit. urso simul ut expirauerit genitale cornescere aiunt. Ventrem intus amplum habet. ueneris mirum in modum nocte diēque appetens est: & fœminæ sapissime mares ad coitum incitant: quæ & dum utero gerunt, in libidinem exardescunt: & statim post editos fœtus, simul & rei ueneræ dant

A dant operam & catulis alendis: & defyderium ueneris etiam hyems suscit. Cocunt non uulgari quadrupedum more, sed amplexibus mutuis, ambobus cubantibus, uelut humanis coniugationibus copulantur: deinde secessus in specus separatim: specus si non habuere, ramorum fruticúmque congerie ædificant impenetrabiles imbribus, mollíque fronde constratos. Secreti honore reuerentur mares grauidas, & in iisdem licet foueis, partitis tamen per scrobes secubationibus diuiduntur. In iis specubus pariunt ursæ (nec enim quicquam homini rarius, quàm parientem uidere ursam.) tricesimo die, tum unum, tum etiã duos: sed cum plurimũ quinque. Hi sunt candida informisque caro, paulo muribus maior, sine oculis, sine pilo: unguium tantum liniamenta prominent. Hanc lambendo paulatim figurant, & interdum ad pectora fouet, non alio incubitu quàm oua uolucres: ut assiduo incubatu calfacta, animalem trahant spiritum. Mares quadragenis diebus latent: feminae enixæ, quaternis mensibus. Et sane diebus primis quatuordecim tam graui somno premuntur, ut fertur, ut ne uulneribus excitari queant: tum mirum in modum ueterno pinguescunt. Cibi tunc nulla argumta: nec nisi humoris minimum in aluo inueniri aiunt: sanguinis exiguas circa corda tantum guttas, reliquo corpori nihil inesse. Procedunt uere, sed mares præpingues. Oculi eorum hebetantur crebro, qua maxime fauos causa expetunt, ut conuulneratum ab apibus os, leuet sanguine grauedinem illam. Inualidissimum urso caput: ideo urgente ui, præcipitaturi se ex aliqua rupe, manibus eo operto iaciuntur ac sæpe in arena colaphis inflicti exanimantur. uis maxima in brachiis & lumbis: unde interdum posticis pedibus insistant. Vrsus animal omniuorum est, quippe qui & fructus arborum edat, & legumina, & mel perfringens alueos, & cancos, & formicas. carne etiam uescitur: uiribus enim suis confidens, inuadit non solum ceruos, sed etiam fues feros, si clam repenteque potuerit agere. Tauros aperto Marte aggrediuntur ursi, quos ex ore cornibusque eorum pedibus omnibus suspensi, pondere fatigant. Vrsæ cum fugiunt, suos catulos ante se compellunt, susceptosque portant: cum ab insectante iam occupantur, insiliunt in arbores. Vrsinus adeps alopecias curat, pernionibus subuenit. Ab hyberno somno mirum in modum pinguescunt ursi, ut diximus: illi sunt adipēs medicaminibus apti, contraque defluuium capilli tenaces. Pulmo D ursinus, attritus qui à calciamentis fiunt, ab inflammatione tuetur. Cerebro ueneficium esse Hispaniæ credunt: occisorumque in spectaculis capita cremant, testato, quoniam potum, in ursinam rabiem agat.

*Cocunt humanitus strati, Plinius.*

*Vrsi dimicatio cum tauro describitur ab Aristotele lib. 8. de hist. animalium.*

De hystrice, erinaceo, & scyuro.

Cap. LXXXIII.

HYstrix etiam latet, totidémque diebus fert utero, & reliqua facit perinde ut ursæ. Hystrix in Æthiopia frequentissima: eam generat & India & Africa. Est autem ex erinaceorum genere, & erinaceis similis: spinis tergum hispida, (aculeos nanque pilorum uice gerit, ut erinacci, sed longiores) quas plerunque cum intedit cutem, laxatas iaculatione emittit uoluntaria, ut assiduis aculeorum nimbis canes uulneret ingruentes. Magni-

*Hystrix.*

tudine paulo minor lupo est, qua haud facile inter feras aspectu magis horribilem inuenias ullam. Quæ uero de medicinis produntur, quæcunque de erinaceis dicuntur, omnia tanto magis ualebunt in hystrice. Aculeos quoque pilorum uice gerunt erinacei: uerum parte omni inferiore rarâ & innocuam habent lanuginem. Erinaceorum alij maiores sunt (inquit Oppianus) & maioribus aculeis horrentes: alij minores, spinis minoribus minufque nocuis armati. Testes erinaceo non qui foris pendeant, sed intus lumbis adhæreant. Dum coeunt erinacei, non superueniunt tergis more quadrupedum, propter aculeos: sed stantes ambo inter se complexi coniunguntur partibus supinis hærentibus sibi aduersis. Pugnant cum serpentibus erinacei. Præparant hyemi & erinacei cibos, ac uolutati super iacentia poma affixa spinis, unum non amplius tenentes ore, portant in cauas arbores. Idem mutatione aquilonis in austrum, condentes se in cubile, præfagiunt. Et qui in cauernis sunt, commutant sua cubilia aquilonum & austrorum: qui autem intra tectum aluntur, ad parietes discedunt: quod ita fieri cum Bizantijs quidam animaduertissent, cōsecutus existimationem est, ut tempus futurum posset præfagire. Vbi uero sensere uenientem erinacei, contracto ore pedibusque ac parte omni inferiore, conduntur in formam pilæ, ne quid comprehendi possit præter aculeos. in desperatione uero urinam ex se reddunt. Erinacei terrestres combusti cinis uim habet extergentem digerentemque: quo fit ut eo nonnulli ad ulcera sordida carnemque in ulceribus excrecentem sint usi. eius itaque cinis cum melle, aut corium combustum cum pice liquida alopecias emendat. Caput quidē eius uustum per se etiam cicatricibus pilos reddit: alopecias autem in ea curatione præparare oportet nouacula & sinapi: quidam ex aceto uti maluerunt. Caro erinacei inueterata adseruatâque cum aceto mulso epota, renum uitio laborantibus (nephreticos uocant) auxilio est: aquam intercutem habentibus, conuulsionibus, elephantie, malo corporis habitu affectis: fluxiones quibus uiscera obnoxia sunt, exsiccat. Eiusdem iecur testa solibus excocta arefactū ad eodē usus datur. Hæc ex Dioscoride. Alij erinacei carnem iucundam esse aiunt, si capite percusso uno ictu interficiatur, priusquam in se urinam reddat: eos qui carnem ederint, stranguriæ morbum contrahere minime posse. Hæc caro ad hunc modum occisa, stillicidia uesicæ emēdat. item suffitus ex eodem. Quod si urinam in se reddiderint, eos qui carnem ederint, H stranguriæ morbum contrahere traditur. Pilos in palpebris incommodos euulso renasci non patitur fel erinacei. Præuidet tempestatem & sciuri: obturatique qua spiraturus est uentus cauernis, & alia parte aperit fores. Sciurus animalculum est pilosum, cui uillosior cauda pro tegumento est: nam in solis præsertim æstu cauda se obtegit. Manibus utitur priorum ministerio pedum, sedetque ad os illis admouens cibos.

De uulpe &amp; leporibus.

Cap. LXXXV.

Vulpes.  
Αλώπηξ.

Vulpes quoque non aliter quàm ursa catulos parit, cæcos atque informes inarticulatosque: quos cum ediderit, lingua lambendo refouet & conco-

- A concoquit atque figurat: caudam gerit uillosam. mas genitale osscum habet. Coeunt uulpes, ut Plinius refert, in latera proiectę, maręmque fœmina amplexa: ut uero Aristoteles, uulpes superueniens coit. Parturiens ita secedit, ut raro grauida capiat. parit cum plurimos quatuor. Animal astutū uulpes est & maleficum. insidiatur plurimū auibus atque leporibus. Foueā incolit altam, & quę multos habeat exitus procul inter se distātes, ne uno in loco insidiis à uenatoribus locatis, facile cōprehēdatur. Vulpiū carnibus autumnō uenatores in Asia uestuntur: eo nanq; tēpore uuarū cibo pinguescunt. Est autem eius caro (quantū coniiicere licet, inquit Galenus) eiusdem cū leporina facultatis: & animal ipsum tēperatura siccū ut & canis. Vulpes & uiua & mortua in oleo elixata, digerētē facultatem addit oleo, facitq;
- B ut ad corporis extremam superficiem euocet quę in alto dolore excitet: quo fit, ut articulari morbo laborantes, si sępe atq; diutius in eo insederint, in principio quidem à morbo liberētur: leuamen quoq; in diuturnis morbis sentiant. Pulmo uulpinus si in puluerem redactus bibatur, asthmaticos iuuat. Adeps liquefactus infususque, auris dolorem sedat. Ossca uulpibus, uti modo diximus, genitalia, & iis calculo humano remedia pręcipua. Sunt in leporum genere, quę & in specubus degunt subterraneis, ut mox explicabimus. Est uero lepus animalculū pilosum, auribus longis, cruribus breuib; & minime aequalibus: priora enim posticis breuiora sunt. Color non omnibus idem est. lepori uni pili & in bucca intus, & sub pedibus sunt, inquit Aristoteles: cum cętera animalia nec intra os habeāt pilos, nec par-
- C te pedum resupina, sed prona. ut uero Plinius scribit, pili dasypodi & in buccis intus & in pedibus: quę utraque Trogus & in lepore tradit. Cor habet lepus pro corporis ratione magnum. Iecur cuidam leporum generi & locis quibusdam ita fissum est, ut bina esse iocinera credideris: nam cuniculorū exta in Betica gemina sępe reperiuntur. Sanguis leporum non concreuit, coitu scilicet firmiore: sed aliquantulum spissatur eo modo quo lac quod iniecto coagulo coiuerit. non pinguescere lepores tradit Plinius. Lepores & auersi coeunt, & retro mares urinam reddunt: & fœmina sępenumero
- 3 prior marem superuenit. Coeunt & pariunt quoque tempore: dumque utrum ferunt superstant, & singulis mensibus generant: sed fœtus edunt non uniuersos: interpositis enim diebus quot res tulerit, peragūt partitionē:
- D sępenumero nanque euenit ut fœtus alios imperfectos gestent, alios perfectos iam edant. Partū autē (ut maior fidi pedum pars) cæcū edit. Habet fœmina lac priusq; pariat: & statim à partu repetit coitū: & lactans adhuc cōcipit fœtum. lac suillo simile sua crassitudine est. Coagulū habet lepus inter ea quę unicū habēt uentrē. Et unū animal digitos habentiū, herba alitur lepus: ruminare quoque illi in more est. parētibus oculis dormiunt lepores. Horum genera, ut quibusdam placet, duo sunt, maius scilicet & minus. M. Varro tria distinguit genera: unum Italicum pedibus primis humilibus, posterioribus altis, superiore parte pulla, uentre albo, auribus longis, qui lepus dicitur, cum pręgnans sit tamen concipere. In Gallia transalpina & Macedonia fiunt permagni: in Hispania & in Italia mediocres. Alterius generis

κέρως.  
Ἰσθμίου.  
Δυσκέρως.  
Δυσκέρως  
uocat Theophrastus.

Λεπύς.  
Λεπύς, ἡ λεπύς.  
Δυσκέρως.  
Ἰσθμίου.  
Δυσκέρως, ἡ λεπύς.  
quoque à Nicandro dictus est.

Λεπὸς, δὲ λεπὸς.  
πρὸς.

Λεπύς, δὲ λεπύς.  
πρὸς.

Λεπύς.

est, quod in Gallia nascitur ad Alpes: qui hoc fere mutant, quòd toto cadi- E  
di sunt. quibus hybernis mensibus, pro cibatu niuem credant esse: certè li-  
quescente ea rutilescunt annis omnibus: & est alioqui animal intolerandi  
frigoris alumnum. Tertij generis est, quod in Hispania nascitur, simile no- 4  
stro lepori ex quadam parte, sed humile, quem cuniculū appellant. & lon-  
gius quidem prospicienti paruulus uidetur esse lepus: at si manibus contre-  
ctaueris, non paruam ostendit differentiam. Et maxima ex parte in subter-  
rancis specubus degit: animal fecunditatis innumera: quatuor enim si in-  
tromiseris in leporarium, breui solet repleti: ut olim in Astypalæa insula,  
cum prius non essent: ex duobus tantum in insulā immisissis, in eam creuissè  
multiplicitudinem feruntur, ut uno anno supra sex millia uenatione caperētur. F  
Leporum fœtus uentre excētos, uel uberibus ablatos non repurgatis inte-  
rancis, gratissimo in cibatu habent: laurices uocāt. Leporum ipsorum caro  
sanguinem gignit crassiolem: meliorem tamē procreat succum quā aut  
bubula aut ouilla: estq; nonnunquam ad siccā uictus rationem idonea.  
Sanguis leporinus ceteris præfertur omnibus, ut qui suauissimus est: quem  
& nonnulli cum iecinore, alij unā cum reliquis quoque uisceribus coctum  
edunt. Sartagine inassatus dysenterias, & cœliaca profluuiā sistit: in uino  
potus, contra toxica efficax est: si tepidus illinatur, uitia cutis in facie, quæ  
ιελιάς dicuntur, & lentigines emendat. Cerebrū leporis (capite scilicet to-  
to clixo) & attritum & commansum pueris dementibus utile est: non ta-  
men eximia uis eius est, sed similis melli & butyro atq; id genus aliis. qui-  
dam etiam aduersum metum utiliter edi cerebrū hoc prodidere. Aslatum G  
nonnulli cerebrum exhibent, edendū aduersus tremores, qui ex mala affec-  
tione corporis sint contracti. Caput leporisustum cum adipē ursino alo-  
pecis nonnulli imposuere. Coagulum leporis ad lac sanguinē uel dissecā-  
dum quod in uentre concretum est, ceteris præfertur omnibus. Comitia-  
lem quoque morbum, si cum aceto bibatur, & præterea profluuium mu-  
liebre sanare traditur.

1 Quibus artibus uolucres decipiat uulpes, explicat Oppianus lib. 2 De pisc. quo-  
modo lepores capiat, ostendit Gillius ex Aliano lib. 7: uerum quæ refert Gillius, aga-  
sæo cani magis propria uidetur. 2 Villosissimus animalium lepus est, inquit Plinius.

3 Dasypodes omni mense pariunt, inquit Plinius, & superferant sicut lepores.

4 Cuniculum nonnunquam Theodorus pro δασιπιδε uerit, ut dasypus quādo-  
que speciem significet: sed confunduntur hæc nomina lepus & dasypus, ut utrunque H  
& pro genere & pro specie quandoq; accipiat. Λαπὴς fere genus est. Cuniculos Strabo  
λεβρίδας à quibusdam appellari tradit: qui & λαγίδια καλεῖται, id est lepuleuli fossor-  
es ab ipso cognominantur, & λαγίδες. Chelidoniam uocauit Diphilus etiam leporis  
genus quoddam.

De uiueris, mustelarum generibus, & de fele. Cap. LXXXVI.

**M**agna propter uenatum cuniculorum uiueris gratia est. Iniciūt eas  
in specus, qui sunt multiformes in terris, nonnunquam & funiculis li-  
gatas: at illæ quos deprehendunt, aut unguibus extrahunt, aut in apertum  
egredi cogunt: atque ita cicētos superne capiunt uenatores. Osca sunt ui-  
ueris

Cuniculus,  
κωινλος.

Laurices.

Dasypus.  
Lepus,  
λαπὴς.  
λεβρίδας.  
λαγίδια κα-  
λεῖται.  
λαγίδες.  
Chelidonia.

Viueris.



A uerris genitalia: & iis calculo humano remedia præcipua. Iocinerum doloribus medetur uiuerra porcelli modo inassata. Sunt qui eas *in Zedæ* uocant: est uero ictis in mustelarum syluestrium genere: sunt enim mustelarum genera duo: alterum domesticum, alterum syluestre. Hæc autem quæ in domibus nostris oberrat, & carulos ore suo susceptos (ut author est Cicero) quotidie transfert, mutatq; sedem, (atque hinc eas ore parere nonnulli putarunt): hæc inquam & serpentes prosequitur, & aues quoque uenatur & mures. Mustelæ syluestres magnitudine distant. Cor habet mustela pro corporis ratione magnum. Osca sunt mustelis genitalia, & iis quoque calculo humano remedia præcipua. Ex mustela ipsa inueterata sale denarii pòdus, ut Plinius docet, in uini cyathis tribus datur à serpente percussis: ut uero Dio

B scorides, mustela flammis depilata, deinde exeterata, salæque inueterata, in umbra siccatur. Ea binis drachmis in uino pota præsentaneo est remedio aduersum omnia reptilium uenena: & ad toxicum quoque similiter datur. Eius uentriculus coriandro fartus inueteratusque serpentum morsui & comitiali morbo in potu auxiliatur: & catulus mustelæ etiâ efficax. Mustelæ cinerem cum aceto illitum sunt qui tradant podagricos arthriticosque iuuare: & cum melle aut tercbinthina, aut butyro impositum, strumas discutere: ut quod uehementem digerendi uim possideat. Cinerem mustelæ uel felis diluto & semine sparso, mures à segetibus abigunt: uel decoctarum aqua: sed redolet uirus animalium eorum etiam in pane. Sanguis mustelæ strumis uiliter illinitur: qui & comitialibus prodest. Iocinerum doloribus

C medetur mustela syluestris in cibo sumpta, uel iocinera eius. Ex hoc genere ictis est, id est mustela rustica, magnitudine quàm paruus catellus Melitenensis minor: sed pilo, forma, albedine partis inferioris, & morum astutia mustelæ domesticæ similis. Mansuescit mirum in modum: officit alucariibus: mellis enim auida est: aues etiam perit ut feles. Genitale quoque osseum habet ictis. Fel ictidis contra aspides dicitur efficax, cetero uenenum. Fel catinum (ait Plinius) ueneficium ex mustela rustica factis contrarium est. Illa solertia in metu melibus, sufflata cute distenta: ictus hominum, & morsus

canum arcet: leporibus plurimum insidiantur. Iccur melis ex aqua oris grauitatem sanat. Feles quoque & leporibus insidias moliantur, & auibibus, ac nouissimum muribus. Quo uero silentio, quàm leuibibus uestigiis obrepunt

D auibibus, quàm occulto speculatu in musculos exiliunt? imbelli aliàs animal & ignobile. Excrementa sua effossa obruunt in terra, intelligentes odorem illum indicem sui esse. Nocturnum animal feles est, & in tenebris illi fulgent radiantque oculi. Felem maræ Ægyptij dicunt pupillas ad solis rationem uariare: cum enim exoritur sol, tum longæ fiunt: in meridie rotundæ uidentur: ad uesperam autem obscurantur. Lingua feli imbricatæ asperitatis & limæ similis, attenuansque cutem hominis. In coitu feles non parte posteriore se coniungit: sed mas stat erectus, fœmina subiacet. Sunt porro in eo genere fœminæ ipsæ libidinosæ & salaces: itaque mares ad coitum ipsæ frequentes alliciunt, inuitant, cogunt: puniunt etiâ nisi pareant. Feles tornerum pariunt, quot canes: uescunturq; eisdem: & felium reliqua ut canum.

*ictis.**Mustela.*  
*italia.**Mustela domestica vulgaris.*  
*γαλιναπαιδιος.**Mustela salæstris.**ictis.**Mustela rustica.**Melen.**Feles, αἰλῶν.*

Viunt circiter annos sex-Duplex earū genus:nam sunt & ex iis syluestres E  
quedā,sicuti & aliæ quæ in domibus uersantur.Spinā aliūdue quid fauci-  
bus adhærēs,felis extrinsecus fimo perfricatis,aut reddi,aut delabi tradūt.

*Viuetra.*

*Γαλήνη.*

*Catus sylue-*  
*stris.*

*Martes.*

*Mars.*

1 Viuetram Strabo γαλήνη uocat : at Theodorus apud Aristotelem, γαλήνη  
κατέλας,catum syluestrem uertit. 2 Theodorus etiam uiuetram interpretatur lib.9  
hisor.animal. 3 M.Varro lib.3 De re rustica admonet,oportere leporarij septa te-  
torio esse tecta,ne meles aut feles intrare possit: musleæ genus quoddam procul du-  
bio intelligens: sicuti & aliud genus, martes aut mars uocatur:de quo Martialis: Ve-  
nator capta Marte superbus adest.

De mure,& murium generibus.

Cap. LXXXVII.

*Mus.*

*Mûs.*

Sunt & in murium genere quidam domus incolæ, qui nec feræ iure dici  
possunt,nec placidi,sed mediæ inter utrunque naturæ: plane tamen in- F  
dociles sunt. Dentes habent mures continuos, & bibunt lambendo, ut ca-  
nes:in Africa tamen mures cum biberint moriuntur.cor habet mures pro  
corporis ratione magnum:& nonnullis fel inesse,aliis uero deesse notatum  
est. In murium iccusculis fibræ ad numerum lunæ dierum in mense con-  
gruere dicuntur,totidmq; inueniri,quotum lumen eius sit:præterea bru-  
ma incrementum.Salacissimum animal mus est: & fœminam mutem maiore  
ueneris rabie flagrare dicunt.Murium generatio mirabilis præter cetera a-  
nimalia maiorem in modum est:iam enim fœmina prægnante in uase mi-  
liario occupata,paulo post reserato uase, musculi numero uiginti & centū  
reperi sunt. Murum etiam percipimus ortum redundantis agrestis muriū  
generis:(sorices uocant & αἰσχροποιῖς μῦς:) locis enim compluribus agri fru- G  
mentarij,tam inaudito modo oriri solent, ut parum ex uniuerso frumenti  
relinquatur:tam cito absimitur,ut nonnulli mediocres agricolæ cum pri-  
die metendum statuerint,postridie mane cum messoribus accedentes ad se-  
getem,absumptam inueniant totam.Terræ Persicæ parte quadā,mure fœ-  
mina rescissa,fœtus fœminini prægnantes comperiri traduntur.Sunt qui  
uehementer confirmant,mures si salem lambant,impleri sine coitu.Pro-  
uentus eorum siccatibus tradunt:uerum illud adhuc latet, quonam mó-  
do illa multitudo repente occidat:nam nec exanimis reperiuntur,neq; ex-  
tat, qui murem hyeme in agro effoderit:paucis tamē diebus omnino abo-  
lentur. Nō aliud quicquam omnium superare copiam & celeritatem pro-  
uentus ualet nisi imbres: iis enim quàm primum intereunt. Deturgente H  
ab inundatione Nilo, musculi reperiuntur inchoato opere genitalis aquæ  
terræque,iam parte corporis uiuentes, nouissima effigie etiamnum terre-  
na,ut cecinit Ouidius,

*Sorex.*

*Ἀσπραιὸς μῦς.*

*Mus syluestris*

*Mus agrestis.*

*Mures Nilo-*  
*trici.*

Altera pars uiuit,rudis est pars altera tellus.

Muribus iam obituris uermiculum in capite gigni tradūt. Ex panibus mul-  
tis & uariis simul positis optimum quenque feligentes aiunt circumrodere  
mures:quare optimi panis indicium in iis existimatur esse.Mures in insula  
Paro ferrum exedere & conficere dicuntur: Amyntas in Teredone Baby-  
lonica scribit eodem cibo uti.Pericula nobis imminencia præmonent mu-  
sculi:ruinis imminetibus præmigrant. Mures a segetibus abigunt cingere  
mustela

*Musculi.*

A mustela uel felis diluto & semine sparso, uel decoctum aqua. Sorices *Sorices.* *Muscerda.*  
 gari aiunt si unus castratus emittatur, soricibus pilosa sunt aures: soricum si  
 bras respondere numero lunæ exquisiuerit diligentiores: sorices & ipsos  
 condi auctor est Nigidius: sorices & ardeolæ inuicem fortibus insidiantur.  
 Pulmonum uitiiis medentur mures, & maxime Africani, detracta cute, in  
 oleo & sale decocti, atque in cibo sumpti. eadem res & purulentis uel cruē-  
 tis excreationibus medetur. Muribus elixis in cibo datis urina infantium co-  
 hibetur. Murem domesticum dissectum scorpionum ictibus utilissime im-  
 poni tradunt. affatos si infantes ederint, oris saliuam exficari. Si mus ara-  
 neus iumenta momorderit, mus recens cum sale imponitur. murium cinis  
 cum melle instillatus, aut cum rosaceo decoctus aurium dolores sedat. Si  
 B aliquod animal in aurem intrauerit, præcipuum remedium est murium  
 fel aceto dilutum. Ossibus fractis, cinis syluestris muris cum melle, aut cū  
 uermium terrenorum cinere linteolo illito, superpositis lanis quæ subinde  
 suffundantur, fere *xiiii* diebus solidat. Arūdines & tela quæque alia extra-  
 henda sunt corpori, euocat mus dissectus impositus. alopecias cinis è mu-  
 rium capitibus caudisque: & totius muris emendat: præcipue si ueneficio  
 acciderit hæc iniuria. Murinum fimum (quod item muscerdas uocant) a-  
 ceto tritum atque illitum alopeciis medetur. Subditæ infantibus muscer-  
 dæ, alui deiectionem moliantur. In Cyrene tum colore tum forma diuer-  
 sa murium genera nasci ferunt: & quosdam ipsorum quemadmodum  
 feles, ita lata facie esse: alios uiperæ \* specie gerentes, acutas habere spinas:  
 C quos indigenæ echenatas uocant. Sunt è muribus qui erecti bipedes am-  
 bulent, ceu Alpini: habent enim crura posteriora magna, priora parua. Cō-  
 duntur etiam Alpini, quibus magnitudo media est: sed pabulo ante in spe-  
 cese conuecto: cum quidam narrent alternos, marem ac fœminam, supra  
 se complexo fasce herbarum, supinos cauda mordicus apprehensa inuicem de-  
 trahere ad specum: ideoque illo tempore detricto esse dorso. Sunt his pares  
 & in Ægypto, quibus prædurus fere ut erinaceis pilus est: similiter resident  
 in clunes, & binis pedibus gradiuntur, prioribusque ut manibus utuntur.  
 & ortus horum quoque numerosus est. Conduntur hyeme & Pontici mu-  
 res, hi duntaxat albi. Dentes utrinque habet mus Ponticus, & tamen rumi-  
 nare solet. Sunt uel alia genera murium plura: nam & in Cyrenaica regio-  
 D ne alij lata sunt fronte, alij acuta, alij erinaceorum genere pungentibus pi-  
 lis. In Africa quoque tria sunt murium genera, quorum alij bipedes uocan-  
 tur, alij zegeries Punica lingua, quos græce *Barbous* dixeris, alij *zins*. Condi-  
 ti & glires tota hyeme cubant in arboribus tãquam mortui, nihilque edunt:  
 pinguescunt tamen per id tempus uehementer: rursus æstate iuuenescunt:  
 semiferum & ipsum animal, paruum, molle & imbecillum. In uiuariis ser-  
 uantur, ubi non aqua, sed maceria locus sepitur. In iis arbusculas esse oportet,  
 quæ ferant glandem: quæ cum fructum non ferunt, intra maceriam ia-  
 cere oportet glandem & castaneam, unde saturi fiant. aquam oportet esse  
 tenuem, quod ea non utuntur multum, & aridum locum querunt. In iis no-  
 taturnon congregari nisi populares eiusdem sylvarum: & si misceantur alie-

nigenæ, amne uel monte discreti, interire dimicando: hi saginantur in do- E  
liis quæ figuli faciunt. In hoc dolium addunt glandem & nuces iuglandes,  
aut castaneam: quibus in tenebris cum cumulatim positum est in dolis, fiunt  
pingues. Genitores suos fessos senecta alunt insigni pietate. senium finitur  
hyberna quiete. Gliris detracta pelle intestinisque exemptis, decoquitur  
melle in uase nouo: sed medici malunt è nardo decoqui usque ad tertias, at-  
que ita asseruari: deinde cum opus sit, strigili tepefacta infundere. Constat

*Mus araneus.* deplorata aurium uitia eo remedio sanari. Murem araneum *μυγάλιω* uo- 5  
*μυγάλι.* cant: magnitudine muri æqualis est, colore mustela similis, unde & nomē

illi *μυγάλις*. Os illi oblongum, cauda parua, dentes quoque exigui, & utraq;  
maxilla duplici ordine digesti: indeque fit ut à mure araneo morsu facilli-  
me dinoscantur: quadruplici nanque ordine morsus impressio cernitur. F  
Hoc animal plerunque testes impetere solet, non hominis modo, sed cuius  
uis etiam aliorum animalium, morsu nonnunquam pernicioso: quando-  
quidem in Italia muribus araneis uenenatus est morsus: eosdem ulterius

*Alia Apennina.* Apennina regio non habet. Cæca traditur à Nicandro *μυγάλι*, indeque non  
*nino.* transiri rotarum orbitam: sed si forte in eam conciderit, ibidem emori.

Ipse mus araneus contra se remedio est diuulsus & impositus: optimum, si 6  
is imponatur qui mox orderit: sed & alios ad hunc usum seruant in oleo  
aut luto circumlitos. est & contra morsum eius remedio terra ex orbita: fe-  
runt enim non transiri ab eo orbitam torpore quodam naturæ. In Palesti-  
na frequens animal est, non maius erinaceo, habens similitudinem muris  
& ursi, ferèque in eaquem petrarum & terræ foueis degere cōsuevit: *ἀρκίς*. G

*Ἀρκτεμύς.* *μῦς* incolis dicitur: *χειρογάλιος* hunc esse opinatur D. Hieronymus, qui inter ea 7  
*χειρογάλιος.* numeratur animalia, quæ cum ungulam non habent bisulcam diuisamue,  
ruminant tamen. In Lucania Italiæ ora, inquit Galenus, animal quoddam  
est, quo & uescuntur incolæ, quod mediam quandam formam habet inter 8  
ursum & suem: sicuti & aliud in eadē regione, & aliàs quoq; reperitur in-  
ter murem & glirem medium.

1 In utroque genere tam murium quàm soricum reperiri uidetur & domesticum  
& agreste. Columella lib. 15. Vites quæ secundum ædificia sunt, à soricibus & muribus  
infestantur. Plin. lib. 10. Sorices & ardeolæ inuicem scetibus insidiantur. 2 Alpini,  
quos aliqui marmoras uulgo dictos intelligunt, magnis oculis prominentibus, media  
magnitudine. Hæc Hermolaus. Sūt qui legant, quibus magnitudo neliū est. 3 Sunt  
Pontici mures, inquit Hermolaus, unius coloris: sunt & uarij. Parte tantum prona, u-  
arij candicant, uenetus in dorso color quādoque ferrugineus deterior priore. 4 Ea-  
dem fere *μυρσίς* Oppianus, quæ Plinius gliribus tribuit: uidetur tamē ex Galeno diuer-  
sa esse animalcula: nepe quod *μυρσίς* idem potius sit qui mus agrestis lib. 3. De alimēt.

5 Nicandri interpres in Theriac. Amynta auctore *μυγάλιω* ex mure & mustela  
procreari scribit: unde *μυγάλι* dicta est. 6 Mutis aranei morsus remedia tradūt præ-  
cipue Plinius, Aëtius, Paulus & Dioscorides: & pro iumentis Columella. 7 *χειρο-  
γάλιος*, in quibusdam codicibus habetur cyrogrillus in Leuirica lege: sed nescio an cor-  
rupte. Ilichius in illo loco chyrogrillus, inquit, animal rapax est. 8 Vide an recte le-  
gatur apud Galenum *μυρσίς* *ἀρκίον* καὶ *οὐρς*, an potius legendum sit *ἀρκίον* καὶ *μυρς*:  
ut idem intelligatur animal cum *ἀρκίον*: an idem fortasse sit animal *ἀρκτεμύς* & *ἄρ-  
κίον*, an etiam distincta.

*Cyrogrillus.*  
*Chyrogrillus.*

*Ἀρκτεμύς.*  
*Ἀρκίον.*

A

De quadrupedibus aquaticis, ut de fibro, lutra, & quibusdam aliis.

Cap. LXXXVIII.

**S**unt inter quadrupedes feræque, quæ uictum ex lacu & fluuiis petant: in hoc genere sunt fiber, satherium, satyriū, lutra, & latrax. Per uniuersum Pontum fiber plurimus est, quem alio uocabulo dicunt castorem. Circa fluuios etiam Hispaniæ frequentes inueniuntur fibri: uerum ex eis castoreum quod uocant, non eandem habet cū Pontico uim. Ambigit fiber terra & aqua: sed maxima ex parte in aquis uictū quærirat ex piscibus & cancris. Animal est horrendi morfus: quippe quod hominis parte cōprehensa, non antequam fracta cōcrepuerint ossa morſu resoluit. Cauda huic pisciū, cætera lutræ similis: utrique mollior pluma pilus. Euomit castor fel suum.

*Satherium.*  
*alius, Satheriū.*  
*Satyrium.*  
*Fiber.*  
*Castor.*

B

Ad multa medicamenta utile: item coagulum ad comitiales morbos, ob ea se peti prudens. Pontici castoris testiculi potissimum appetuntur in usum medelarum (castoreum uocant medici: & efficacissimum è Ponto Galatiæ, mox Africæ): idcirco cum urgeri se intelligit, eas partes sibi amputare ferunt: ob hoc quoque se peti gnarus. uerum amputari hos ab ipsis cum capiuntur, negat Scitius diligentissimus medicina: quinimo paruos osse substrictosque & adhærentes spinæ, nec adimi sine uita animalis posse. Adulterari autem renibus eiusdem, quæ sint grandes, cum ueri testes parui admodum reperiuntur. Præterea ne uescas quidem esse cū sint geminæ, quod nulli animalium: itaque inter probationes falsi, esse folliculos geminos ex uno nexu dependentes: fieri enim non potest ut gemini folliculi uescicæ uel

*Castoreum.*  
*Alius castorin.*  
*Kαστόρεον.*  
*Alius Sextium.*

C

in una membrana coniuncti reperiuntur. Dioscorides quoque frustra hæc credi prodit: non posse enim fibrum testes ore contingere, cum adeo natibus adhæreant aprorum more. Ad medicamenta eligi debent testes cōnexi, ex uno ortu dependentes, liquore intus ceroso: uel (ut Plinius scribit) liquore ueluti mellis cerosi, odoris grauis uirosiq; gustu amaro & acri mordacique, ac friabiles. asseruatur sale. Dissecta cure (inquit Galenus) melleus liquor unā cum membrana ambiente eximitur, siccaturq; ac potui datur. Calidum est & siccum castoreum, partibusque cōstat admodum tenuibus, & ob hoc in uniuersum uarios obtinet usus: siquidem menses ac partus ciet, secundasque eiicit cum pulegio aut calaminthe. Contra inflationes, tormina & singultus, qui à frigidorum crassorumque humorum multitudine oriuntur, ex aceto mulso bibitur. Lethargicos & utcunque ueternosos, colli

D

capitisque irrigatione cum aceto & rosaceo excitat, aut odoris suffitu: tremulis quoque & conuulsionibus: ac ubi partem quampiam sensu motuue priuatam esse contigerit, aut ægre sentire moueriue, & omnibus neruorum uitiiis prodest, & epotum & illitum. Nec sane febrientibus nocet, ubi febris lenta mediocrisue contigerit, qualis cathaphoram & lethargum comitari solet. Ac multis certe castorium exhibuimus, inquit Galenus, cum pipere albo, utrunque cochlearij mensura, ex aqua mullā: nec quispiam inde ullam sensit noxam. Sternutamentum olfactu monet. somnum conciliat cum rosaceo & peucedano peruncto capite: uuluarum exanimatorum uel subditum excitat. Medetur & dentibus infusum, cum oleo tri-

tum in aurem à cuius parte dolcant: aurium doloribus melius si cū meco-<sup>E</sup>  
nio:claritatē uisus facit cum melle Attico inunctum:capitis doloribus uti-  
liter illinitur cum peucedano & rosaceo.Suspiriosis castoreum cū ammo-  
niaci exigua portione ex aceto mulso ieiunis utilissime potatur:cadem po-  
tio spasmos stomachi sedat ex aceto mulso calido.Ileos & inflationes pellit  
castoreum cum dauci semine & petroselini,quantum ternis digitis suma-  
tur ex mulsi calidi cyathis quatuor:tormina uero cū aceto uino mixto.Co-  
mitiales morbos pellit castoreum in aceti mulsi cyathis tribus ieiunis da-  
tum: iis uero qui sæpius corripiuntur,clystere infusum mirifice prodest: ca-  
storei drachmæ duæ esse debebunt,mellis & olei sextarius,& aquæ tantun-  
dem: ad præsens uero correptis,olfactu subuenit cum aceto.Castoreum ex  
mulso potum,mulierum purgationibus prodest:cōtrâque uuluam olfactū<sup>F</sup>  
cum aceto & pice,aut subditum pastillis. Ad secundas etiam uti codē pro-  
dest cū panace in quatuor cyathis uini:& à frigore laborantibus ternis obo-  
lis. Lutra, quæ & *euopsis* græce dicitur,& è fibrorum genere est,castori præ-  
terquam cauda similis est,& utrique mollior pluma pilus:nunquam mari  
immergitur lutra.Hæc & hominē mordet,nec desistit,ut ferunt,nisi fracti  
ossis crepitum senserit.Latax quoq; dētes habet robustos: & noctu plerūq;<sup>2</sup>  
egrediens,uirgulta fluuiis proxima, suis dētibus ut ferro præcidit.Hęc,in-  
quā,lutra latior est:pilum habet durum,specie inter pilum uituli marini &  
cerui.Ichneumon in ripis & arundinetis uiuētitur,animal paruū,forma mu-<sup>3</sup>  
steli cētidi proxima,cauda oblonga. Iisdē uescitur quibus canis:& tot nu-  
mero pariunt ichneumones quot canes:& corū reliqua ut canum. Viuunt<sup>G</sup>  
circiter annos sex.Pugnat cum aspide & crocodilo,& utrunque interficit.  
Ichneumon Ægypti cum aspide pugnaturus,flumē ingressus mergit se li-<sup>4</sup>  
mo sæpius siccātque sole:mox ubi pluribus eodem modo se coriis lorica-  
uit,in dimicationem pergit:in ea caudam attollēs,ictus irritos auersus ex-  
cipit.Sūt uero qui tradant enhydrium alterum ichneumonum genus esse,  
qui crocodilum interimat.Sunt & fluuiatiles caniculæ,terrestriū canum  
paruulorum similes:pilosa his cauda.Horū sanguis aqua & aceto mixtus,  
intumescētes hominum neruos lenire existimatur:atq; ex pelle ipsorum  
calcei conficiuntur,qui neruis salutares esse dicuntur.

1 Satherion. Satheron legit Hetmolaus. 2 Quæ alij partim lutræ, par-  
tim lataci, ea Plinius fibris tribuit:nempe quod sit animal horrendi morfus: arbores<sup>H</sup>  
iuxta flumina, ut ferro cedit.hominis parte comprehensā non antequam fracta con-  
creperint ossa morfus resoluit. Quod idem & Varro quoque facere in lytra uide-  
tur:qui lutram potius eam quàm lytram uult dici:quoniam succidat dissoluātque in  
ripis arborum radices,ut non longe diuersa uideantur hæc animalia. 3 Hæc æta-  
te(quod murinam speciem similitudinēque gerit) uulgo murem Indicum uocant.  
Hæc Gillius,ex authore quopiam,sed incerto. 4 Ichneumonis pugnam cum aspi-  
de & crocodilo pulcherrime describunt Oppianus,Plinius & Strabo.

De uitulo marino.

Cap. LXXXIX.

*Vitulus mari-  
nus, & Cæna.*

QVæ à mari uictum petat,nulla fera quadrupes est,præterquā uitulus  
marinus.Hic uero generis ambigui est:nam & in mari degit,quan-  
quam humorem non recipit,sed spirat ac dormit,& egressus in  
terram



- A** terram parit in litore ut terrestres: sed quoniam plus temporis mari quàm terra immoretur, cibumque ex humore petat, ideoque inter aquatica fere numeratur. Auricula non habet, sed meatus continet manifestos quæ audit. Oculi in mille colores transeunt subinde. Dentes habet serratos acutosque, ut generi piscium affinis: linguam autem bifulcam. Cruribus tãquam lesa imperfectaque quadrupes est: quippe quæ cõtinuo à scapulis pedes habeat manibus similes modo ursæ: in quinos enim finduntur digitos, qui singuli ternis articulis flectantur, & unguibus muniantur non magnis. Pedes quoque posteriores quinis discretos digitis habet, & curvatura & unguibus cum prioribus conuenientes, uerum forma proximos piscium caudis aut pinnis: his in mari, ut pinnis utitur: & humi quoque uice pedum serpit.
- B** Caudam habet uitulus exigua. genitale maribus grande est: fœminæ simile raia est, aut mulieris. Fel non habet uitulus marinus: sed renes solidissimos, & forma bubulis similes. cartilaginem habet, non ossa. Cocunt uituli marini modo animalium retro mingentium: & diu ligati in coitu coherant. Animal non ouum statim intra se concipit, & parit fœmina, & lac reddit modo pecudum. parit singulos aut geminos, & cum plurimum treis. Mâmis quas geminas habet, educat fœtum ritu quadrupedum. parit ut homo omni tempore, sed maxime cum primis capris. Prole circa duodecimum diem à partu deducit in mare, subinde assuefaciens: illa precipitater fertur, nec ambulat: cum nodum inniti suis pedibus ualeat. Colligere se ipse uitulus, & contrahere potest: carne enim abundat mollisque est, atque ossibus
- C** cartilaginosis constat, ut modo diximus. Interficitur difficulter, nisi elisis temporibus capitis: corpus enim totum carnosum est. Mugitus ei in sono boui similis est: unde nomen uituli accepit. nullum animal grauiore somno premitur. Canis rabidi morfu potum expauescentibus, faciem perungunt adipe uituli marini: efficacius si medulla hyenæ, & oleum è lentisco & cera misceatur. lichenas & lepras tollit adeps uituli marini: & instillatur igni naribus intermortuarum uuluarum uitio: & cum coagulo eiusdem in uellere imponitur. Vituli marini coagulum tradidere quidam uiribus simile esse castorio: ac proinde comitialibus morbis uuluarumque strangulationi conuenire epotum: excipitur autem catulis, ut præcipit Dioscorides, qui nondum natare possunt. Coagulum uituli marini bibunt cum lacte equino asininoue, aut cum
- D** punici succo: quidam ex aceto mulso: necnon aliqui per se pilulas deuorant. In lethargum uergentibus, coagulo uituli marini ad olfactum utuntur: & lethargicos coagulum uituli adiuuat in uino potum oboli pondere.

*Nonnunquam  
& inter terre-  
stra, ut lib. 1  
hystor. animal.*

*Tertiodecimo  
die, ut uult Op-  
pianus.*

De talpa & uespertilionem.

Cap. XC.

**M**utilum animal & talpa est: quippe qui omnino quidem nec uideat, nec perspicuos habeat oculos: sed cæcitatæ perpetuæ animal est terraque obrutum, & tenebris etiamnum defossum, sepultisque simile: uerum si quis prætentam membranam detraxerit, locus oculorum appareat, & pars nigra eorundem: situs denique & descriptio eadẽ, quam legitimam conspicui oculi obtinent: ac si obducta cute oculi pressi, confusi, oblitique

*Talpa, ἀσπίς  
λαψ.*



essent dum crearentur. In tanta hac tamen cæcitate, liquidius audiunt talpæ uel in terra, tam denso atque surdo naturæ elemento. Talpæ cinere strumas illinunt ex melle: alij iecur eiusdem contritum inter manus illinunt, & triduo non abluunt. Dextrum quoque pedem eius remedio esse strumis affirmant: alij præcidunt caput, & eum terra à talpis excitata tufum, digerunt in pastillos pixide stannæ, & utuntur ad omnia quæ intumescunt, & quæ apostemata uocant, quæque in ceruice sunt. Ambigunt & uespertiliones cum uolucris & pedestribus: quemadmodum uituli marini cum aquatilibus & terrestribus. Et quadrupes est uespertilio, sed mæca: ut sit ad quadrupedes comparata, uolucris: ad aues uero, quadrupes. Cauda tam quadrupedis quam uolucris caret. uolat, sed cuteis pennis membranæ. Horumque alij articulos habent: & uoluerum animal parit uespertilio tantum. Dentes habet ut quadrupes, & lacte foetum nutrit, ad mouens ubera quæ in pectore gestat. geminos uoluit amplexa infantes, secumque deportat. Noctu uictum sibi quarunt: & in cibatu culices gratissimi.

- Minimam pro corpore uocem

Emittunt: peraguntque leui stridore querelas.

Tectaque non syluas celebrant, lucemque perosa

Nocte uolant. seroque tenent à uespere nomen.

In Assyria circa Borsyppum gignuntur prægrandes: quæ sunt apud incolas in usu cibario. Cor uespertilionis solifugis contrarium est: omnibusque formicis & salamandris resistit. Somnū areet uespertilionis caput aridum adalligatum. In paludibus circæque paludes Arabiæ, in quibus nascitur casia, degunt ferè alata uespertilionibus simillima, stridore diro, & uiribus eximii: quas ægre ab oculis arcetes Arabes casiam colligunt. Est & quod cuteis pennis uolat aliud animal: ἀλώπηξ à Græcis uocatur.

De monstrosis quibusdam aliis animalibus in India aut Æthiopia prognatis.

Cap. XCI.

Plinius in Æthiopia.

Mantichoras.

Apud Indos (si Ctesia credendum est) belua gignitur, cui nomen mantichoræ: dentes triplici utrinque ordine: magnitudo & aurium hirtitudo, & pedes leonis: facies & aures hominis, oculi cæsi, color rubricæ. Cauda, scorpionis modo terrestris, aculeo armata, spiculæque adnata iaculans. Vox tam sibila, ut imitetur fistularum modulos, tubarumque concentum: Hicursus non minoris pernecitatis, quam ceruis. humanas carnes audivissime affestat. hominum sermones imitari & mantichoram in Æthiopia author est Iuba. In India quoque fera traditur nomine axis, hinnuli pelle, pluribus candidioribusque maculis. Sed atrocissimum monoceros monstrum est, quem & cartazonon uocant, reliquo corpore equo simile, capite ceruino, pedibus elephanto, digitis scilicet indiuisis, cauda apro, mugitu horrido: cornu unum nigrum è media eius fronte protenditur cubitorum duum, splendore mirifico, ita acutum, ut quicquid impetat, facile ictu eius perforatur: nec leue quidem hoc, sed uersuras quasdam naturales habet. Hanc feram uiuam negant capi: quippe quæ in intimis Indiæ & desertissimis regionibus

Axis.

Monoceros.

Cartazonos.

Ad longitudinem pedum quatuor. Solinus.

A gionibus degit. Apud Hesperios Æthiops fons est Nigris, ut plerique existimauere, Nilicaput: iuxta hunc catoblepa nascitur, modica & incers be- *Catoblepa.*  
stia, caput pragraue agre ferens, idque deiectum semper in terram, aspectu hominibus pestilenti, omnibus qui in oculos eius offenderint, cōfestim *Plinius, omnibus qui oculos eius uiderent.*  
expirantibus. De onocentauro Pythagoram hæc narrasse testatur Crates Pergamenus: homini ipsum ore & promissa barba simile esse, simul & collum & pectus humanam speciem similitudinēque gerere: mammas distantes ex pectore pendere: humeros, brachia humanam figuram habere: dorsum, uentrem, posteriores pedes asino persimiles esse: & quemadmodū asinum, sic cinereo colore esse: imum uentrē leuiter exalbescere. Duplicem usum ei manus præstare: nam celeritate ubi sit opus, pedum loco illis utitur: ex quo fit ut cæterarum quadrupedum cursu non superetur: ac ubi rursus necesse fuerit uel cibum capere, uel aliud quiddam tollere, qui antea pedes erant, manus efficiuntur. Animal est graui animi acerbitate: nam si capiatur, non ferens seruitutem, libertatis desiderio ab omni cibo abhorret, & fame cibi mortem consciscit. Hactenus de multifidis dixisse abunde est.

1 Quæ in hoc capite continentur animalia, an multifida sint omnia, nondum satis constat. 2 Color rubricæ, *ῥομβοειδὲς*: Plinius & Solinus colore sanguineo. 3 Pedibus sic uiget, inquit Solinus, saltu sic potest, ut morari eam nec extentisima spatia possint, nec obstacula latissima.

De quadrupedibus bisulcis, & primò de boue & boum generibus. Cap. XCII.

C

Proximum est ut de bisulcis doceamus, quæ unguium loco & ungularum chelas forcipemue habere, eademque fere cornigera esse diximus. Inter hæc primas partes iure boui tribuere maiores: cuius tanta fuit apud antiquos ueneratio, ut tam capitale esset bouem necasse, quàm ciuem. De hoc igitur genere primum dicemus, cuius potissimum usus nostri laboris est particeps, & quòd laboriosissimus sit bos hominis socius in agricultura.

*Bos, βούτι.*

1 Primum in bubulo genere ætatis gradus dicuntur quatuor: prima, uitulorum: secūda, iuuenecorum: tertia, boum nouellarum: quarta, uetulorum. Discernuntur in prima, uitulus & uitula: in secunda, iuuenecus & iuuenca: in tertia & quarta, taurus & uacca. Quæ sterilis est uacca, taura appellatur: *Vitulus, μωβέτι.*  
*Iuuenecus, iuuenca.*  
*Taurus, ταύρος.*  
*Uacca, ταύρα.*

D quæ prægnans, horda fordæue. Boues pro regionibus cælique statu, & habitum corporis, & ingenium animi, & pili colorem gerunt. Aliæ formæ sunt Asiaticis, aliæ Gallicis, Epiroticis aliæ. Circa paludem Mæotim boues sunt sine cornibus: & apud Mysios quoque. bubus Indicis capellorum altitudo traditur, cornua in latitudinem quatuor pedum. Sunt & Indici boues unicornes tricornesque, solidis ungulis nec bindis. Æonij quoque boues solidipedes sunt, singulæque habent cornua, & hæc medio capite. In Hercynia sylua est bos cerui figura, cuius à media fronte inter aures unum cornu existit excelsius magisque directum iis, quæ nobis nota sunt cornibus. Ab eius summo sicut palmæ ramique lati diffunduntur. Eadē est fœminæ marisque natura: eadem forma magnitudōque cornuum. Armeniis, bina *Horda, uel Forda.*  
*Mæotici boues.*  
*Indici boues.*  
*Boues unicornes.*  
*Boues tricornes.*  
*Æonius bos.*  
*Hercynia sylua bos.*

*Armenius bos.* quidem cornua, sed in infractum conuoluta. *Ægyptus* boues gignit can- E  
*Ægyptius bos* didos maximosque & mites: *Phrygia* uero fuluos & rufos, quibus proluxa  
*Phrygius bos.* à ceruice dependent palearia. Cornua quoque iis capiti nequaquam affixa, 2  
*Syriacus bos.* sed ut aures mobilia. *Syriaci* Pelleique nigri, robusti, feroces, fronte lata, a- 3  
*Pellens bos.* spectu horrido: suaque natura neque obeli nimium neque strigosi: ac pro-  
*Scythicus bos.* inde & ad pugnam & ad cursum idonei. *Scythici*, quorum in dorso gibber  
est, & procerissimi, & ex omni parte cãdidi, per paruis cornibus sunt, & mi-  
nime acuti: similiterque ut cameli eminenti dorso existunt: simul & cum  
dorso clitellæ imponuntur, perinde ut cameli genu flectunt: rursúmque su-  
cepto onere surgunt, ab hominibus nimirum edocti. *Syriacis* non propen-  
dent palearia, sed in dorso gibber est. *Carici* quoque in parte Asiæ sædi ui-  
*Caricus bos.* su, tubere super armos à ceruicibus eminente, laxatis cornibus, excellentes F  
in opere narrantur: ceteri nigri coloris candidiue ad laborem damnantur.  
*Bistones.* *Bistones* iuba uisu horrenda à ceruice utrinque & pectore leonum in mo- 4  
rem dependente insignes, cornua habent peracuta, & nequaquam aliorum  
more in aduersum sese spectantia, sed supina & plane recta. Lingua his an-  
guستا, sed asperissima, & quæ linctû sanguinẽ eliciat. In *Pæonia* boues sunt,  
*Pæonia bos.* inquit *Paulanias*, toto quidẽ corpore pilis hirsuti, sed pectore maxime &  
circa maxillas. *Trogodytarum* bouum cornua in terram directa sunt: qua  
de causa obliqua ceruice pascuntur. Feruntur & in *Africa* boues, qui retro  
ambulantes pascuntur, indeque ὀπίσσω dicti: nec enim aliter ob cornua  
*Boues ὀπίσσω* pasci possunt, quæ illis antrorsum & in terrã directa sunt: uerũ hoc fabulo-  
*Hos Aelianus* sum arbitratur *Vlpianus*. *Phœniciũ* libri testantur indigenas uaccas ea esse G  
*Lybicos boues* magnitudine, ut uel procerissimi pastores cũ mulgent, stare, atque adeo in  
scabellũ ascẽdere habeant necesse, ubera ut possint pertingere. In nostro or-  
*Phœnicia bo-* be *Epiroticis* laus magna: ac *Pyrrhi* (ut ferũt) iam inde regis cura prægran-  
*mes.* des fuere, hodiẽque reliquæ stirpiũ durant. *Epiroticæ* uaccæ præ sua præ-  
*Boues Epiro-* cipua magnitudine amphoras singulas singulę implēt lactis: mēsuręq; eius  
*tici.* dimidium mammis duabus præstant. Erectus stat qui mulget, aut paululũ  
se inclinat: quoniã sedendo ubera contingere nequeat. Nec tantũ diuer-  
sitas prouinciarum, sed eadẽ quoque regio, ut *Italia* ipsa partibus suis dis-  
crepat. *Campania* plerunque boues progenerat albos & exiles: *Vmbria* ua-  
stos & albos, eadẽmq; rubros, nec minus probabiles animis q̃ corporibus:  
*Hetruria* & *Latium* compactos & ad opera fortes: *Apenninus* durissimos, H  
omnẽmq; difficultatem tolerantes, nec ab aspectu decoros. *Altinæ* uaccæ,  
*Altinæ uaccæ.* quas eius regionis incolæ ecuas appellant, humilis sunt staturæ, lactis abũ-  
*Cena,* dantes. In bouum genere cornua sere habent tam mares quàm fœminę: sed  
uaccarum cornua & taurorum inter se dissident: tauris enim minora sunt  
cornua tenuioraque. Dentes habet bos, ut & reliqua cornigera continuos:  
bimũsque dentes amittit, non tamen uniuersos. Bouum caudis longissimus  
caulis, atque in ima parte hirtus. Huic tantum animali omniũ quibus pro-  
cerior cauda, non statim nato, consummata ut cæteris mēsuræ: crescit uni,  
donec ad uestigia ima perueniat. Renes boui quasi ex multis exiguis reni-  
bus cõstituti. Taurorum sanguis ubi ẽ uena effluxerit, crassissimus est & ni-  
gerrimus

Agerimus: celerrime omnium coit durescitque, ideoque pestifer potu. Coire tum mares tum fœminæ anno ætatis primo peracto incipiunt, ita ut etiã nonnunquam generent: uerum quod magna ex parte fit, uel anniculi, uel nacti octauum mensem uenerem adeunt. Iuuenca recentior quàm annicula non patitur uenerem, nisi ostento: iam enim uel quarto ætatis mense coisse perspectum est: sed enim quod maxime confessum habemus, bimatu generant: sed tauri generationem quadrimi implent. Et qui quadrimis minores sunt, prohibentur admissura: sicuti & qui maiores quàm duodecim annorum: illi quoniam quasi puerili ætate seminandis armentis parum habentur idonei, hi quia senio sunt effecti. Et tauris singulis fœminę denique eodem anno traduntur: uel (ut aliis placet) unus nas quindecim uaccis sufficit. Apud Magonem duo tauri in septuaginta matribus sunt. Maxime idoneum tempus ad concipiendum, à delphini exortu (ad quartum scilicet idus Iunii) usque ad dies triginta, ut sentit Plinius: uel XL, aut paulo plus ut Varro. Quæ enim ita conceperint, temperatissimo anni tempore, & adultis iam pabulis pariunt. uerum Aristoteles initium coitus plurimis quidem mense Aprili & Maio prodidit: sed nonnullæ uaccæ etiam ad autumnum usque tempus coeundi deducunt. Et gentibus quidem quę lacte uiuunt, ita dispensatur, ut omni tẽpore anni superfit id alimentum. Bos uno initu implet, agitque uehementer, ita ut fœmina uix tolerans succumbat. Et quidem uaccæ tauros in coitu non patiuntur nisi raro, propter rigorem genitalis: eaque causa gradiuntur in coitu, elunibúsque subductis semen recipiunt.

C Genitale. Si forte conceptio pererrauerit, uicesimo post die marem fœmina repetit. Seniores tauri nec sæpius quidem fœminam eandem eodem su perueniunt die, nisi fortasse ex interuallo: & nō sæpius quàm bis die incut: at uero iuniores & eandem sæpius cogunt, & plures petunt ac superueniunt uigore suæ ætatis. Salax minime inter mares taurus est: at ex fœminis intenduntur libidine, post equas, potissimum uaccæ: tempore enim coitus libidine quandoque adeo inceduntur, ut bubulci eas tenere aut capere nequeant: ad hæc uaccæ tauros superueniunt, & sequuntur sedulo, & assunt. Ferunt uterum uaccæ menses nouem: decimo pariunt. sunt qui decem totos menses, exceptis paucis diebus, uterum gestare affirmant. Quod autem in lucem præcurrit hæc tẽpora, id abortiuum est, uitalẽque minime, etiam

D si paulo maturauerit partum: præmolli nanque imperfectaq; ungula prodit. Boues grauidas negant, præterquam in dextro uulua sinu ferre, etiam cum geminos ferant. Pariunt singulos, geminos raro. Lac à partu utile est: ante partum lac non habet bos. Ex primo semper à partu colostrum fiunt: ni

Colostrum.

Vita fœminis  
(Plinio ancho  
re) xv annis  
longissima, ma  
ribus x.

# DE DIFFERENTIIS

errauerit, reliqui sequuntur: quapropter boarj, nisi prauenerint, totum ar-  
mentum requirant necesse est. Boues & fruge & herba uescuntur: pascun-  
tur etiam commodissime in nemoribus, ubi uirgulta & frons multa. Pin-  
guescunt iis quæ flatum cient, ut eruo & faba frefis, atque etiam fabarum  
herba. Lauatione quoque calidæ aquæ traduntur pinguescere. Boues ani-  
malium soli, & retro ambulantes pascuntur: & sunt in Africa qui ita perpe-  
tuo pasci ferantur, neque aliter quàm recedendo in auersum pasci solere. Bi-  
bunt boues forbendo, & claram bibere gestiunt: adeo ut nisi aqua sit clara,  
frigida & lymphida, libenter bibere nolint. Augentur iuuenç amplius, cum  
plus temporis expertes ueneris degunt: quapropter terræ Epiri incolæ bo-  
ues quas Pyrrhicas uocant, annis nouem intactas uenere seruât. Laborant  
armenta uehemētius pruina sollicitata quàm niue. Boues gregales morbis  
duobus tentantur, podagra & struma (καύρη Græci dicunt:) facit podagra,  
ut pedibus intumescant, & quanuis non intereant, tamen ungulas amittât.  
Euenit in καύρη, ut calidius frequētiusque spiretur. Quod deniq; in homi-  
ne febris, idem in boue est καύρη (febrem uocat Columella:) indicium mor-  
bi, ut aures flacceant, & ut comedere nequeât: sed breui moriuntur. Boues  
cælum olfactantes, seque lambentes contra pilum, hyemem præfagiunt.  
Qui gregem armentorum emere uult, hæc quasi communia & certa in e-  
mendis bobus præcepta sequi debet. Parandi sunt boues nouelli, quadrati,  
grandibus mēbris, cornibus proceris, ac nigrātibus & robustis, ac sine cur-  
uaturæ prauitate lunatis, frōte lata & crispa, magnis & hirtis auribus, oculis  
& labiis nigris, naribus resimis patulisque, ceruice torosa & cōpacta, pa-  
learibus amplis & pene ad genua promissis, pectore magno, armis uastis,  
uentre non paruo, sed capaci & tanquam implente utero, lateribus porre-  
ctis, lumbis latis, dorso recto planoque, uel etiam subsidente, clunibus ro-  
tundis, cruribus compactis ac rectis, sed breuioribus potius quàm longis,  
genibus eminulis, distantibus inter se, ungulis magnis, caudis lōgissimis &  
setosis pilosisq; , pilo totius corporis denso ac breui: colore rubeo uel fusco,  
tactu corporis mollissimo, non aspero ac duro. At uero colore, ut Varroni  
placet, potissimum nigro, deinde rubeo, tertio heluo, quarto albo: molissi-  
mus enim hic & durissimus primus: de medijs duobus, prior quàm poste-  
rior melior, utrique pluris, quàm nigri & albi. Hęc maris forma spectanda  
est: neque enim alio distat bonus taurus à castrato, nisi quòd tauris in aspe-  
ctu generositate: torua fronte, auribus setosis, torosiore ceruice: uentre pau-  
lo substrictiore, cornibus breuioribus & in procinctu dimicationē poscen-  
tibus: sed tota comminatio prioribus in pedibus stat: ira gliscente alternos  
replicans, spargensque in altum arenam, & solus animalium eo stimulo ar-  
descens. Vacca probantur altissimæ formæ longæque, maximis uteris,  
frontibus latissimis, oculis nigris & patentibus, cornibus uenustis, & leui-  
bus, & nigricantibus, pilosis auribus, compressis malis, palcaribus & caudis  
amplissimis, ungulis modicis & cruribus. Cætera quoque eadē fere in fœ-  
minis, quæ & in maribus desiderâtur. Boues hyeme ac uere primo medió-  
que gr aciles sunt: prauumque succū in cibo præbent: procedente uero anni  
tempore

Non ante qua  
drimatum. Plu-  
nius.

Taurus.

Vacca.

**A** tempore, obefiores euadunt succiq; melioris, cum scilicet auēta fuerit herba. Bubula caro plurimum nutrit, sed sanguinem generat, uel quā suilla crassiore: nam bos temperamento longe sicciore est quā sus. Senibus minime, sed nec ulli alij utiles sunt carnes bouille, inquit Galenus. Bubulas carnes additi caules caprifici magno ligni compēdio percoquunt. Ad eam quā in uentriculo fit concoctionem, uitulina bouillæ præstat: meliūsque nutrit, ac minime mucosa est, & secundum hœdinam optima. Lac bubulū pinguiſſimum omnium est & crassimum, eōq; minus aluum mouet, si Galeno credimus: alijs uero aluus maxime soluitur bubulo. Casco fertilius est bubulum quā caprinum ex eadem mensura pene altero tanto: & ut cascum, ita & butyrum habet plurimum, ualentiusque nutrit. Datur

**B** priuatim iis qui colchicon biberint, aut cicutam, aut doricnium, aut leporem marinum. bubuli lactis serum orthopnoicis prodest ante cætera addito nasturtio. Taurinus sanguis recens, inter uenena est, ut modo diximus: cum polenta illitus duritias emollit ac discutit. Taurinus adeps calore siccitatēque suillam longe superat: sed leonino inferior est: ut inter utrunque medium locum tenere uideatur. Non inepte igitur medicamenti admiscetur, & quæ scirrhosis medētur affectibus, & quæ phlegmonas concoquunt. Medulla uitulina utrum emollit tum appositum, tum in pefſo inditum. Felle taurino priuatim angina cum melle perunguntur. Sedis ulcera sanat, inquit Dioscorides, & ad cicatricem usque perducit. medetur & aurium sibilo ex porri succo instillatū. Felle bubulo semina attingi utile putant, quo mures à fegetibus abigantur. Taurino felli præcipua potentia etiam in ære pellibūsque colore aureo ducendis. In iuuenearum secundo uentre, inquit Plinius, reperitur pilæ rotunditate nigricans tophus, nullo pondere, singulare (ut putant) remedium ægre parientibus, si tellurē non attigerit. Talum bouis combustum dentes mobiles firmare tradunt cum melle autem epotum teretes lumbricos expellere: cum oxymelte lienem minuere: & uenerem quoque excitare. Femoris ossa cremata, sanguinis fluxiones epota sistunt, & uentris quoque. Bouis armentarij firmū, dum uiridi herba pascitur, si recens apponatur, uulnere inflammationes mitigat: folijs autem inuoluitur, cinerēque feruente calfactum apponitur. coxendicis dolores fotu compescit. illitum ex aceto duritias, strumas, pa-

**D** uosque discutit. Eorum uero qui paleis uescuntur fimo oblinūtur aqua intercute laborantes, ita ut mox in sole reclinentur. Habet enim sterces bouinum uim etiam attrahentem: qua ratione apum uesparūque ictibus medetur. Priuatim autem suffitu fimi, quod à masculo boue collectum est, procidentes uulua reprimuntur: cuiusque nidore culices (uulua dicti) fugantur. Boum coriis glutinum excoquitur, taurorūq; & id præcipuū: xylocollam hoc uocant, & taurocollam: præstantissimū candidū & translucens: nigrum uero deterius est, & lignolum quoque damnatur. Præstantissimum fit ex auribus taurorum & genitalibus: nec quicquam efficacius prodest ambustis. Ex aqua calida dilutum atque illitum pustulas erumpere non patitur. Sed adulteratur nihil æque quibusuis pellibus inueteratis

*Xylocolla  
Taurocolla*



calciamentisque etiam decoctis: Rhodiaceum uero fidelissimum, eoque pi- E  
ctores & medici utuntur. Glutinum in aceto resolutum, impetigines cu-  
tisque lepras delet: melle & aceto dissolutum uulneribus prodest. In boum  
*Bos syluestris.* genere sunt apud Arachotas boues syluestres, qui differunt ab urbanis, quā-  
tum inter suos urbanos & syluestres interest. Sunt colore atro, corpore ro-  
busto, rictu leuiter adunco, cornua gerunt resupinatiores. Atrocissimos ha- 9  
*Taurus Ac-* bet Æthiopia tauros syluestres, maiores agrestibus, uelocitate ante omnes, 10  
*thiopicus.* colore fuluos, oculis cæruleis, pilo in contrarium uerso, rictu ad aures dehi- 11  
*Fuore Solin.* scente iuxta cornua mobilia: tergoris duritiam filicis, omne respuens uul-  
*Bonafus.* nus. feras omnes uenantur: ipsi non aliter quàm foueis capti feritate sem-  
*Βουπρος.* per intereunt. Bonafus gignitur in terra Pæonia mōte Mefapo, qui Pæo-  
*Monapos.* niæ & Mediæ terræ collinitium est, & Monapos à Pæonibus appellatur: ma- F  
gnitudine tauri, sed corpore quàm bos latiore: nequaquàm enim oblongior,  
sed in latera auctior est. Tergus distentum eius locum septem accubantiū  
occupat: cætera forma bouis similis est, nisi quod ceruix iubata armorum  
*Compositiore,* tenuis ut equi est: sed pilo molliore quàm sit equinus & cōpositiore. Color  
*πεπταλμύη.* pili totius corporis flauus, iuba prolixa, & ad oculos usque demissa & fre-  
quens: colore inter cinereum & rufum, non qualis equorum, sed uillo su-  
pra squalidior, subter lanario. Nigri aut admodum rufi nulli sunt, uocem  
similem boui emittunt. Cornua adunca in se flexa, orbemque inter se colli-  
gentia, & pugnae inutilia: magnitudine dodrantali aut paulo maiora: am- 12  
plitudine non multo arctiore quàm ut singula sex sextarios capiant: nigritie  
pulchra & splendescente. Ancia (περίμωρ uocant Græci) ad oculos uf- G  
que demissa. Cæret superiore dentium ordine, ut bos & reliqua cornigera  
omnia. crura hirsuta atque bifulca habet. Caudam minorem quàm pro cor-  
poris sui magnitudine similem bubulæ, interiora omnia bubus familia con-  
tinet. Carnem habet gustu suauem: quam obrem in usu uenandi est. Cum  
percutissus est, fugit, & defatigatus consistit: repugnat calcitrans, & proluuiē  
alui, uel ad quatuor passus proiciens: quo præsidio facile utitur, & plerun- 13  
que ita adurit, ut pili insectantium canum tanquam ab igne absumantur:  
sed tunc ea uis est in fimo cum belua excitatur & metuit: nam si quiescit,  
nihil urere potest. Tempore pariendi uniuersi simul in montibus enituntur:  
sed prius quàm fœtum edant, excremento alui circiter cum locum, in quo  
pariant, se quasi uallo circundant & muniunt: largam enim quandam eius H  
excrementi copiam hæc belua gerit. Paucissima Scythia gignit: pauca cō-  
termina illi Germania, insignia tamen boum ferarū genera: iubatos bison-  
*Bisontes.* tes, excellentique uir & uelocitate uros: quibus imperitum uulgus bubalo- 14  
*Vri.* rum nomen imponit. Sunt uero uri magnitudine paulo infra elephantos:  
*Bubali.* specie, & colore, & figura tauri. Neque homini, neque fœminæ quam con-  
spexere parcunt. hos studiose foueis captos interficiunt. Hoc se labore du-  
rant adolescentes: atque hoc genere uenationis exercent: & qui plurimos  
ex iis interfecerunt, relatis in publicum cornibus, quæ sint testimonio, ma-  
gnam ferunt laudem. Sed assuescere ad homines & mansueti fieri, ne par-  
uuli quidem excepti possunt. Amplitudo cornuū & figura & species mul-  
tum no-



A tum nostrorum boum cornibus differt. Hæc Cæsar. Cornua iis taurina, inquit Solinus, in tantum modum protenduntur, ut dempta, ob insignem capacitatem, inter regias menfas potuum gerula fiant: urnasque binas capit unus cornua implcant. Hæc studiose conquisita, ab labijs argento circumcludunt, atque in amplissimis epulis pro poculis utuntur. In Hercynia sylua gignuntur: rhinocerotæ uocant, & taurum Æthiopicum. Huic in capite non sunt cornua: sed in naribus unicum est, & repandum quouis ossè durius: quod subitè ad saxa limatum in mucronem excitat, eoque aduersus elephantos utitur in dimicatione, aluū maxime petens, quam scit esse molliorem: par ipsi prope corporis longitudine, sed cruribus multo brevioribus: magnitudo tauri est: forma uero apri, præterquā quòd in summis naribus, ut iam diximus, cornu est. Color illi buxeus, uel eburneus potius: uel ut Oppiano placet, fuluus, raris inspersis maculis nigricantibus. Habet autem duo ueluti cingula, figura serpentis flexibus haud dissimilia, quæ à dorsu spina ad uentrem usque pertenduntur: quorum alterum prope iubam oritur, alterum ad lumbos. In hoc genere nullæ conspiciuntur fœminæ, sed mares omnes. Author est Iphicrates, in Africa gigni qui rhizes uocantur, forma tauris proxima: at uictu magnitudinēque ac uiribus ad pugnam, elephantis similiores.

*Alias, urnasque binas capit unus cornua implcant. Rhinoceros. Taurus Æthiopicus.*

*Ut Oppianus prodidit, non multo maior est quam oxus.*

*Rhizes, ρίζες.*

1 Vitulus, *μῦθος*, qui adhuc sub matre est & lactet. *δάμαλις* ἢ *δαμόλη*, & *πέρπες*, quæ necdum coiuuerit, nec ad iugum idonea est. Hæc ex Theocriti interprete. 2 Etythrai boues, inquit Ælianus, mobilia similiter cornua ut aures habent. 3 Pelleus bos, à Pella, ut arbitror, Macedoniæ oppido. 4 Bistones, à Bistone Thraciæ palude & regione. 5 Gibberi spina leniter remissa. Varro. 6 Cruribus solidis, nervosis ac breuibus. Palladius. 7 Pedibus, inquit Varro, non latis, neque ingredientibus, qui displodantur, nec cuius ungulæ diuariescunt, & cuius ungues sint leues & pares. 8 Aliis, ut Plinio & Dioseorid. bubulum, alinumum, & equinum magis aluum soluunt, *ἀνελιδόπρως*. 9 Indicos tauros uocat Solinus. Taurum ferum hunc uocat Gillius ex Oppiano, quem apud Troglodytas nasci ait. & aliū quoque huic haud dissimilem habet taurum ferum Æthiopicum. 10 Volueris pernicitas. Solinus. 11 Hiatus omne quod caput. Solinus. 12 Dodrantali, *αὐτοδαμάλιος*, id est, unciarum nouem, magnitudine palmari, ut interpretatur Theodorus, aut paulo maiore: amplitudine non multo auctiore quàm ut singula semisextarij capiant: *ἑμῖς*, id est, congi dimidium, id est sex sextarios, nisi fortasse mēdosus sit codex. 13 *ἑτεράκωντος ὄρνυς*, ad quatuor passus, uel trium iugerum longitudine, ut refert Plinius: ut uero hæc coherere possint ostendit Claymondus in scholiis in Plin. 14 Martial. lib. i. iungit bubulum cum bisonte, hoc uersu: Illi cessit atrox bubalus atque bison. Biso (uti fertur) cerui speciem habet: cuius à media fronte inter aures unum cornu in excelsum magis dirigitur, quàm ea quæ nobis nota sunt cornua. Ab eius summo, sicut palmæ, sic ramil late diffunduntur. Eadem natura fœmina quæ mas prædita est: eadem etiam forma, eademque magnitudine cornuum. Hæc Gillius, ex autore quodam, sed incerto. 15 Pausanias uero scribit, in extrema nare unicum esse cornu, & paulo supra alterum, sed quod minus sit.

*δάμαλις, δαμόλη, πέρπες. Etythrai boues.*

*Taurus Indicus.*

De ouibus.

Cap. XCIII.

VT boues sumptum hominum excolunt, ita corporum tutela pecori debetur. Itaque post boues ouilli pecoris secunda ratio est: ut quod præcipue nos contra frigoris uiolentiam protegit, corporibusque nostris libera-

*Ovis, ὄvis, ῥιγίαντος.*

liora præbet uelamina. In hoc quoque genere cornua uel fœminis natura E  
tribuit, sed ea conuoluta in anfractum arietum generi, ceu cestus daret.  
Dentes quoque plures maribus quàm fœminis dati. Ouis binas gerit inter  
fœmina mammas. Ouium pars maxima fel habet: & quidem terris quibus  
dam adeo large, ut exuperantia prodigij loco habeatur, ut in Naxo: sed alijs  
quibusdam locis omnino caret, ut apud Chalcidem Euboicâ parte quadâ  
agri. In renibus sebo opimandis maxime omnium luxuriant: quippe quæ  
renibus pingui undique obductis intereant, quod ubertate pabuli fit: quo  
fit ut quanquam pingues admodum sint, tamen aliquid desit oportet, si nō  
utrique reni, at dextro saltem. Aries ad utrumq; æquinoctiū cubādī rationē  
mutat: quippe qui sex hybernīs mensibus in læuū latus iacens quietē ca-  
pit: contrāque ab æquinoctio uerno in dextrū incubans dormit. Oues an- F  
niculæ coeunt atque utero ferunt: mares quoque eodem illo tempore in-  
eunt, sed proles differt, quatenus præstantior ea est, quam senescentes ma-  
res & fœminæ procrearint. Neque pati oportet, ut præcipit Varro, mino-  
res quàm bimas saliri: quòd neque natum ex his idoneum est, necnon ipsæ  
fiunt etiā deteriores quàm trimæ admixtæ. Arietes primū uetustiores fœmi-  
nas ineunt: agnas enim fastidiunt. Coitus omnibus ab arcturi occasu, id est  
à tercio idus Maias, ad aquilæ occasum, id est xiii Cal. Augusti: quòd que  
postea concipiunt, fiunt uegrandes atq; imbecillæ, ut ait Varro. Oues terno  
aut quaterno coitu implentur: & si à coitu imber accessit, abortum infert.  
Pariunt maxima ex parte singulos, sed aliquādo & binos & ternos & qua-  
ternos. pariunt geminos tum pabuli beneficio, tum si pater aut mater uim G  
eam geminandi per naturam obtineat. Mares autem aut fœminæ generā-  
tur ui tum aquarum, tum etiam propter admissionis tempus: nam & aquæ  
faciunt ut fœminæ marēs cōcipiantur. Ad hæc aquilonis flatu mares po-  
tius concipiuntur, austri fœminæ. Vis tanta est aquilonis, ut uel eas quæ  
non nisi fœminas pariāt, immutet ad proles masculæ procreationem. Spe-  
ctare ad aquilonē oportet cum coeant fœminæ. Dextro teste maribus præ-  
ligato, fœminas generari aiunt, lœuo, mares. Ferunt uterum quinque mensi-  
bus (diebus CL inquit Plinius:) & cordos aut chordos uocabāt antiqui post  
id tempus natos agnos. Itaque fit ut partus exitu autumnali fiat: contingit  
tamen ut locis nonnullis, quibus cæli clementia & pabuli copia est, bis pa-  
riant. Pariunt iuniores pauciores, quàm uetustiores. Oues parere usque ad H  
annum octauum possunt: & si bene curentur, uel in undecimū faculas pa-  
riendi protrahitur. Et quidem fieri potest, ut etiam per totam fere uitā co-  
eant tam mares quàm fœminæ. Multi hybernos agnos præferunt uernis:  
quoniam magis interfit ante solstitium quàm ante brumā, firmos esse: so-  
lumque hoc animal utiliter bruma nasci: castrari agnos, nisi quinque me-  
stres, præmaturum existimant. Vita ouibus ad denos annos: sed magna ex  
parte ad pauciores: duces pecoris tamen, uel ad quin denos protrahunt ui-  
tam. Singulis ouilibus singuli mares duces constituuntur. Oues Æthiopie  
uel ad duodecim & tredecim annos uitā agunt: quæ mane iniri solent, ma-  
rem si sero dici admiseris, non patiuntur. Candidi nigræ efficiuntur fœtus,  
si sub

*Et cōcepti in-  
ualidi. Plinius.*

*Cordi.  
Chordi.*

A si sub lingua arietis uenæ nigræ aut candidæ habentur: cuius enim coloris sunt uenæ, eiusdem & uellus est: uarium etiam, si plures uenarum colores sunt: & rufum, si uenæ rubræ fuerint: si palatu in quoq; nigrum fuerit, aut maculosum uel lingua ipsa, pulla, uel etiam uaria nascitur ptoles. Quâdiu admissura sit, eadem aqua uti oportet: quod cōmutatio & lanam facit uariam, & uterum corrumpit. Oues herba uescuntur: & pascere sedulæ atque stabiles solent. Pinguescunt potissimum ex potu: quamobrem estate falem dare die quinto soliti sunt, singulis centenis singulos modios, ut sitibundæ plus aquæ hauriant: sic enim pecus incolume atque pinguius redditur. Opimat pecus olea, oleaster, aphaca, palea, herba: quæ omnia efficaciora sunt ex falsugine resperfa. Oues si grauidæ glandem copiosius ederint, abortum

*De omni mor-  
bis Columella  
lib. 7, & Ver-  
gil. 3 Georgic.*

B faciunt. Homines usu periti totidē fere morbis ouem infestari, quot hominem referunt: & frequentius quàm ullum aliud animal infestatur scabie. Mollissimū pecus est: & quanuis ex omnibus animalibus sit uestitissimū, frigoris tamen impatientissimū est, nec minus æstiuu uaporis. Genus ouile amēs est, moribūque (ut dici solet) inter omnia animalia stultissimis. Repit in deserta sine causa: & hyeme obstante ipsum sæpe egreditur stabulo: occupatum à niue, nisi pastor compulerit, abire non uult: sed perit desistens, nisi mares à pastore ducantur: ita enim reliquus grex consequitur, adeo ut etiam quâ timuere ingredi, unum cornu raptū sequantur. Pecora exultantia & indecora lasciuia ludentia pluuiam præfagiunt. Pro loci natura differunt oues, non magnitudine solū, sed & aliis discriminibus. Pinguis & cā-

C pestris situs, proceras oues tolerat: gracilis & collinus, quadratas: syluestris & mōtosus, exiguas: pratis planisque noualibus tectum pecus commodissime pascitur: idq; nō solum generibus, sed etiam coloribus plurimum refert. Magnæ oues circa Meotim paludem gignuntur: generis eximij Milesias, Calabras, Apulæque nostri existimabant, inquit Columella, earūmq; optimas Tarētinæ: nunc Gallicæ pretiosiores habentur: earūque præcipue Alcinates: item quæ circa Parmam & Mutinam macris stabulantur cāpis. Color albus quanuis sit optimus, sunt tamen suapte natura pretio cōmendabiles pullus atque fuscus: quos præbent in Italia, Pollentia: in Betica, Corduba: nec minus Asia rutilos quos uocāt *ἐρυθροί*. Sed & alias uarietates in hoc pecoris genere docuit usus exprimere: ut cū uarij coloris syluestres

*ἐρυθροί, Spæ, oues.*

D ac feros arietes māsuefactos tectis ouibus quispiam admisisset, eæ primum hirtæ, sed paterni coloris agnos ediderunt: qui & ipsi deinde Tarētinis ouibus impositi, tenuioris uelleris arietes progenerauerūt. Ex his rursus quicquid conceptum est, maternam mollitiem, paternum & auitum retulit colorem: itaque oues quas pascimus, ortæ sunt ab ouibus feris. Ouium alia sunt uillaticæ, alia in saltibus pascūtur: itaque ouium summa genera duo, 3 tectum & colonicum: uel uti Columella nominat molle, & hirsutum: illud mollius, hoc in pascuo elegantius. Mollissimum genus ouium quod Græcū pecus, & plerique Tarentinum uocant, nisi cum domini præsentia est, uix expedit haberi: siquidem & curam & cibum maiorem desiderat: nec ullam domini aut magistrorum inertiam sustinet, multoque minus auaritiā: nec

*Ouis uillatica.  
Ouis tecta.  
Ouis colonica.  
Ouis mollis.  
Ouis hirsuta.  
Græcū pecus.  
Tarētina oues.*

æstus nec frigoris patiens. Raro foris, plerunque domi alitur: & est audissi-  
 mum cibi: cui si detrahitur fraude uillici, clades sequitur gregē. Plures autē  
 in eiusmodi gregibus, quā in hirtis, masculos enutrire oportet: nā prius  
 quā fœminas inire possint mares, castrati cum bimaū expleuerint ene-  
 cantur: & pelles eorum propter pulchritudinem lanæ maiore pretio quā  
 alia uellera mercantibus traduntur. Hirsutum uero ouium genus (quod  
 colonicum appellauimus) in saltibus pascuntur, & à tectis absunt longe: &  
 quod late longēque in diuersis locis pasci solent, idcirco portant secum cra-  
 res aut retia pastores, quibus cohortes septāque secreta in solitudine faciāt.  
 Ego (inquit M. Varro) in octogenas hirtas oues singulos pastores constitui:  
 Atticus in centenas. In gregibus ouium magnis, quos miliarios faciūt qui-  
 dam, facilius de summa hominum detrahere possunt. Pascua ouillo generi  
 utilia sunt, quæ uel in noualibus, uel in pratis siccioribus excitātur: palus-  
 tria uero noxia sunt, syluestria damnosa lanis. Per hyemem si penuria est, scēnū  
 uel palea, uel uicia, uel facilius uictus ulmi seruatīs frōdibus præbeatur, aut  
 fraxini. In ouium gregibus comparandis in primis uidendum, ut boni se-  
 minis pecus habeas: id fere ex duabus rebus potest animaduerti, ex forma  
 & ex progenie: si uidelicet agnos procreent formosos. de forma, ouem esse  
 oportet corpore amplo, quæ lana multa sit & molli, uillis altis & densis to-  
 to corpore, maxime circum ceruicem & collum. uentrem quoque ut ha-  
 beat pilosum: itaque quæ id non haberēt, maiores nostri apricas aut apicas  
 appellabant ac reiciiebāt. Esse oportet cruribus humilibus. caudis obserua-  
 re, ut sint aliubi, ut in Italia prolixis, in Syria breuibus, ut tradit Varro. at  
 Plinio, Syria cubitales ouium caudæ, plurimūmq; in ea parte lanicij. Sint  
 præterea uellere candido: uariam autem & canam cornā improbabis. Ari-  
 etis uero habitus maxime probatur, cum est altus atque procerus, uentre  
 promisso atque lauato: cauda longissima densiq; uelleris atq; candidi: frō-  
 te lata, testibus amplis, intortis cornibus potius quā surrectis, patulisque  
 & pronis ad rostrū, ravis oculis, auribus amplis, pectore & scapulis & clu-  
 nibus latis. Aduertendūmq; lingua ne nigra aut uaria sit: quod fere qui ta-  
 lem habent, nigros aut uarios, ut dictum est, procreant agnos. Atq; hæc cō-  
 munia sunt in comparandis ouibus quas pascimus. Præstantissima est ouiu  
 caro primo ac medio uere. Melior item quæ est unius anni quā uetu-  
 stior: quæ & difficulter concoquitur, & malum procreat succum: nocētque  
 iis qui stomacho sunt humido & pituitosis. Est enim caro ipsa ouium frigi-  
 da ac humida, excrementosaq; & mali succi. Iuuenibus quidē nō omnino  
 malus est cibus: senibus uero nec ea est commoda: atque etiam hac multo  
 minus agnina: quippe quæ humida, & mucosa, & glutinosa, & pituitosa  
 est. Ouilla caro, præsertim arietina post solstitium elixa, grauiter olet: gra-  
 uius etiam si asseuer: quo circa dum coquitur, operculum olæ auferre, a-  
 quam copiosam iufundere, & condimēta quoque addere præcepit Rufus.  
 Lac ouillum caprino crassius est pinguiusque, & dulcius, ac magis alit: sto-  
 mocho tamen minus utile. priuatim tonsillas & fauces lactis ouilli garga-  
 rizatio adiuuat. Dysentericos recreat cæcus ouillus uetus. Coagulū agninū  
 aduersus

*Hirsute oues.*  
*Hirtæ oues.*  
*Colonicæ oues.*

*Aprica, aliàs*  
*Apricæ oues.*

*Arietis forma*

*Ouilla caro.*

*Agnina caro.*

- A aduersus omnia mala medicamēta pollet. Phreneticis prodesse uidetur & le-  
thargicis pulmo pecudū caliduse circa caput alligatus. Pulmo agnus inter-  
trigines quæ à calciamētis fiunt sanare creditur. Dysentericos recreat seuū *Sanare. Dio-*  
ouillū decoctum in uino austero: hoc & ileo medetur & tussi ueteri. Aures *scorides, ab in-*  
purgat fel pecudis cum melle. Verberū uulnera & uibices pellibus ouium *flammatione*  
receptibus impositis obliterātur, idq; nocte ac die una, uti Galenus prodidit. *tueri.*  
Lanæ præter cultum & tutelam contra frigora, succida plurima præstant *Lana, & con-*  
remedia ex oleo uinōque aut aceto, prout quæque mulceri morderique o-  
pus sit, & astringi laxariue. Succida lana mollis ē collo fœminibūsq; lau-  
datissima habetur. Hæc succos quibus fiant irrigationes facile combibit: &  
ob pinguitudinē illam, quam ælypum uocant, emolliēdi uim habet. Con-  
B tulus imponitur & quoquo modo percussis: luxatis membris dolentibū-  
que neruis ac ossibus fractis inter initia crebrōque suffunditur, ex oleo ui-  
nōque aut aceto. Facit & ad capitis, stomachi, aliarūque omnium par-  
tium dolores cum aceto & rosaceo imposita. Succida lana imposita subdi-  
tāque mortuos partus euocat. Eadem nitro, sulphure, oleo, aceto, pice liqui-  
da feruentibus tincta, quā calidissima imposita bis die lumborum dolo-  
res sedat. Cum uero lota fuerit lana, nec amplius ælypum in se habeat, suc-  
cis ad irrigationes excipiendis, idoneum habetur. Arietis uellera lota frigi-  
dāque ex oleo madefacta in muliebribus malis inflammationes uulua se-  
dant: & si procidant, suffitu reprimunt. Cremata lanæ cinis uim habet cali-  
dam & acrem: crustas ulceribus obducit, excrecentias in carne cohibet, &  
C cicatricem inducit. Illinitur attritis, uulneratis, amбуstis: & in oculorum  
medicamenta additur, in fistulas aurēsq; suppuratas. Vis eius septica est,  
inquit Plinius, efficacissimēque genas purgat. Quin & ipsæ sordes pec-  
dum sudorūque fœminum & alarum adhærētes lanis (ælypum uocant) in-  
numeros prope usus habet. In Atticis ouibus genito palma. exalfacit, ex-  
plet ulcera & emollit: præsertim quæ circa sedem aut uuluam contingunt  
cum meliloto & butyro. Menses & fœtum euocat cum lana inditum. ulce-  
ribus aurium genitaliūque atque oris etiam imponitur cū anserino adi-  
pe. Contra cerosos oculorum angulos scabiososq; & palpebras quæ callū  
contraxere, & ciliorum defluuia efficax est. Oelypum cum melle Corsico,  
quod asperrimum est, maculas in facie extenuat: item scobem cutis in fa-  
cie cum rosaceo impositum uellere: quidam & butyrum addunt. Sordes  
quoque caudarum cōcretæ in pilulas, ac siccatae per se, tusaq; in farinam,  
D & illita, dentibus mire profunt etiam labentibus, gingiuisq; si carcinoma  
serpat. Iam uero pura uellera aut per se imposita cæcis doloribus, aut acce-  
pto sulphure & cinis eorum genitalium uitiiis: tantūque pollent, ut medi-  
camentis quoque superponantur. Medentur ante omnia & pecori ipsi, si fa-  
stidio non pascatur. Cauda enim quā arctissime præligata, euulsa inde la-  
na, statim uescuntur: tradūntque quod extra nodum sit è cauda præmori.  
Epinyctidas sanat & clauos, thymos, uerrucas penfiles: & ambusta igni ro-  
sacco cerato exceptum fimum. Pecudum fimi cinis illitus ex aceto contra  
omnium phalangiorum morsus remedium est: alopecias replet cum oleo

Quonam mo-  
do cremari de-  
beat, docet Ga-  
lenus, Diosco-  
rides & Plin.  
Oelypum,  
εὐλύπιον.  
Oelypum.  
Quibus modis  
colligi debeat,  
explicat Dio-  
scorides & Pl-  
nius.

cyprino & melle. Inuenio nasci, inquit Plinius, & arietis cornibus tufis atq; E  
 defossis syluestrem asparagum, quem Græci ormynam aut myacantham  
*Oues fera.* uocant, aliisue nominibus. Oues quas pascimus, primum ortas esse ab o-  
 uibus feris iam diximus. Sunt autem oues feræ nostris hæc non multo ma-  
 iores, sed cursu uelociiores, atque in dimicando aciores: ut nonnunquam  
 uel apros ictibus prosternant cornuum, quæ etiam in anfractum contorta  
*Ovis Gorty-  
nenfis.* gerunt. Est in Creta Gortynæ agro ouium genus, quod cornu gerit quadru-  
 plex: colore fuluo, uillo potius quàm lana duro atque aspero, caprino ma-  
 gis quàm ouillo simili. Non dissimili huic colore, fuluo scilicet, conspicitur  
*Subus, οὐβός.* & subus: lana tamen non adeo hirsuta, & cornibus binis non quaternis. Na-  
 tat quandoque hoc animal (ambigit nâque & terra & aqua:) ipsûmque in-  
 ter natandum comitatur plura tum piscium, tum aliorum aquatilium ge- F  
 nera, cuiusque societate gaudent plurimum: in primis uero phagri, melanu-  
 ri, acus, nulli atque astaci. Est in Hispania & maxime in Corsica non absi-  
*Musimon, a-  
liâsmusimone.  
Umbri.  
Oues Arabica.* mile pecori genus musimonum, caprino uillo quàm pecoris uelleri pro-  
 pius: quorum è genere & ouibus natos, prisca umbros uocauerunt. Sunt in  
 Arabia duo ouium genera admiratione digna, neque alibi usquam uisa: al-  
 terum caudam gerit longam adeo, ut non sit tribus cubitis breuior: alterû  
 cubitali latitudine caudam habet. Gorgona uocant Nomades Africæ (ut  
*Gorgon, γοργών.* author est Alexander Myndius) animal oui feræ simile: uel, ut aliis placet, 8  
*Iuba uillûsue,  
χελύτη.* uitulo. caput gerit semper in terram deiectum. à fronte ad oculos usque iu-  
 ba uillûsue dependet: hac si quando ab oculis excussa (id quod ægre ob ca-  
 pitis grauitatem facere potest) hominem quèquam aspexerit, protinus in- G  
 terficit.

*Aries, αῖριος.* 1 Ovis nonnunquam feminam tantum significat, ut aries marem. Agni, ἄγνῆς.  
*Agni, ἄγνῆς.* 2 Ouis nonnunquam feminam tantum significat, ut aries marem. Agni, ἄγνῆς.  
*Αῖριος ἄγνῆς.* 3 Ouis nonnunquam feminam tantum significat, ut aries marem. Agni, ἄγνῆς.  
*Veruex.* 4 Ouis nonnunquam feminam tantum significat, ut aries marem. Agni, ἄγνῆς.

*Vellera.* 5 Ouis nonnunquam feminam tantum significat, ut aries marem. Agni, ἄγνῆς.  
*Vellamina.* 6 Ouis nonnunquam feminam tantum significat, ut aries marem. Agni, ἄγνῆς.

*Capra.* 7 Ouis nonnunquam feminam tantum significat, ut aries marem. Agni, ἄγνῆς.  
*Usum in castro-  
rum & mise-  
ris uelamina  
nautis. Vergil.* 8 Ouis nonnunquam feminam tantum significat, ut aries marem. Agni, ἄγνῆς.

*Caspia capra.* 9 Ouis nonnunquam feminam tantum significat, ut aries marem. Agni, ἄγνῆς.

## De capris.

## Cap. XCIIII.

*Capra.* VT fructum ouis è lana ad uestimentum, sic capra pilos ministrat ad u-  
*Usum in castro-  
rum & mise-  
ris uelamina  
nautis. Vergil.* sum nauticum, & ad bellica tormenta, & fabrilia uasa. Tondentur ca-  
 præ, quod magnis uillis sunt, in magna parte Phrygiæ, unde Cilicia ferri so-  
 lent: sed quod primum ea tonsura in Cilicia sit instituta, nomen id Cilicas  
 adieciisse dicunt. Neque non quædam nationes harum pellibus sunt uesti-  
 tæ, ut in Getulia & Sardinia. Caspiæ capræ, inquit Ælianus, & albiissimæ  
 sunt, cornibus mutiæ, & ad maximorum equorum magnitudinem acce-  
 dunt.



A dunt. Earum uilli adeo molles, cum Milesiis lanis ut mollitudine comparari possint. Capris non omnibus cornua: sed quibus sunt, in his & indicia annorum per incrementa nodorum. Mutilis, lactis maior ubertas. Mutillum in utroque sexu utilius, inquit Plinius. Et Columella quoque: In omni, inquit, regione maritos gregum mutilos esse oportebit: quoniam cornuti fere perniciosi sunt propter petulantiam. Et fœminam quoque mutilam parabimus quieto cœli statu: nã procelloso atque imbrifero, cornutam semper. Capræ superiores dentes non sunt, præter primores geminos. Dependet omnium mento uillus, quẽ aruncum uocant: hoc si quis apprehensam unam ex grege trahat, cæteræ stupentes spectant. Caprarum sanguis non spissatur, inquit Plinius. Capræ herba uescuntur ut oues, sed loca crebro permutant, summâque tantum contingunt. Dumeta potius quàm campestrum situm desiderat hoc animalis genus: asperis quoque etiam locis ac syluestribus optime pascitur: nam nec rubos auersatur, nec uepribus offenditur, & arbusculis frutetisque maxime gaudet, nec minus ilignis quernisque fruticibus, qui in altitudine nõ profiliunt: uerum morsus earum arbori exitialis est. oliuam lambendo quoque sterilem faciunt. Odoratorum uero fruticum expetentius hoc animal est: cumque cisthi fronde pascitur, pinguedinem barbæ cruribusque uillosis adhaerentem reportat, ex qua ladanum in offas cogunt pastores. Capras in occasum decliui sole, in pascuis negant contueri inter sese, sed auersas iacere: reliquis autem horis, inter se aduersas. Tradunt & noctu non minus cernere quàm interdiu: & ideo caprinũ C iecur, si uescantur, restituit uespertinam aciem iis quos nyctilopas uocant. Capræ anniculæ aliquando coeunt, atque utero ferũt: mares quoque illo eodem tempore incunt. Est autem mas uel mensium septem satis habilis ad procreandum: quoniam immodicus libidinis, dum adhuc uberibus alitur, matrem stupro superuenit: & ideo celeriter & ante sex annos consensescit, quod immatura ueneris cupidine primis pueritiæ temporibus exhaustus est. Itaque quinquennis parum idoneus habetur fœminis implendis. Et tri mi quoque minus utiliter generant: & in senectâ ultra quadriennium. Capellæ bimæ, aliquando & anniculæ, ut diximus, partum edunt: sed in trimatu gregi augendo utiles sunt: neque enim educare nisi trima debet. neque tamen ultra octo annos matres seruandæ sunt: quod assiduo partu fatigatae steriles existant. Parit autẽ capra, si est generosa proles, frequenter duos, nonnunquam trigeminos: parit & quaternos, sed raro admodum: at Ægyptias capras quinque parere ferunt. Tempus admissuræ per autumnum ferre ante mensem Decembrem præcipiunt: ut propinquante uere pariât turgescentibus uirgultis: ferunt enim quinque mensibus ut oues. Vita earum longissima, annis in Æthiopia x1, in reliquo orbe plurimum octo. Nunquam sanæ degunt capræ: nunquam enim febri eas carere Archelaus auctor est. Alia pecorum genera cum pestilentia uexantur, prius morbo & languoribus macescunt: solæ capellæ quanuis optimæ atque hilares, subito cõcidunt: id accidere maxime solet ubertate pabuli. Pinguedine etiam sterilescent capræ. Qui caprinum gregem cõstituere uult, in eligendo animad-

Arucus, xpuñs  
Caprarũ, alias  
caprearum, sed  
utrunque for-  
tasse nascen-  
sum.

Ladanum.

Non tribi men-  
se Plin.



*Caper.*  
*Hircus.*  
*Ætiol.*  
*Ætiol.*

*Capella.*

uertat oportet. Caper cui sub maxillis duæ uerriculæ collo dependent, optimus habetur: amplissimi corporis, cruribus crassis, plena & breui ceruice, flaccidis & prægrauantibus auribus longisque, exiguo capite, quàm maxime simus, nitido, nigro, densoque atque longissimo pilo: ut autem Varro ni placet, hircus molliore sit pilo & potissimū albo. Capella præcipue probatur, simillima hirco quæ descripsimus: si etiā est uberis maximi & lactis abundantissimi. Tondetur capra, ut dictū est, nisi si glabræ sunt: duo enim genera earū. Capra tēperamento est longe sicciore quā sus, minus tamē siccō quā bos. Caprina caro æstate prima ac media (cum scilicet fruticum germina, quibus caprae auidius uelci solent, sunt frequentissima) optima est: sed post solstitium æstiuum uirus olet, præsertim hircorum: tum uero maxime assa. Quo circa etiam dum elixatur, ut in ouilla dictum est, ollæ operculum auferre, copiosamque infundere aquam, & condimenta cocturæ addere, præcepit Rufus. Succum præstat caro caprina uitiosum acremque: sed hircina omnium est deterrima tum ad concoctionem, tum etiam ad succi probitatem: quæ minime quidem pituitosa lentæue est, sed nocet maxime ob duritiem & in alterādo difficultatem. Hæcina caro concoctu facilis est, neque mucosa: sed probum generat succum, & secundū suillam optimum. Inter cetera lactis genera caprinum mediocritatem obtinet: ut quod nec pingue admodum nec crassum sit: estque eo bubulū caseo fertilius pene altero tanto. Stomacho accommodatissimum est lac caprinum, aluūmque minus cæteris tentat: quoniā pecus hoc astringentibus pabulis maxima ex parte uescitur: nempe fronde magis quàm herba. Caprino lacte lienes sanantur, post bidui in ediam tertia die hædera pastis capris, poto sine alio cibo. Iecoris caprini assū, sunt qui distillantem saniem accipiunt, qua ad nyctalopas utuntur: elixi autem uaporem oculis apertis accipiendū præcipiūt. aslum quoque si edatur, ad eōdem affectus accommodatum aiunt: & præterea comitiales morbū ostendere. Sanguis hædi antidotis miscetur. Caprae & hirci sanguis sartagine inassatus, dysenterias & cæliacos fluxus sistit: in uino potus contra toxica efficax est. Sunt qui sanguinem hirci arefactum calculosis propinent præsentissimo remedio. Cornu caprinum ustum, tum ad dētium candorem, tum ad contrahēdas gingiuas mollitie fluidas utiliter adfricatur. Caprarū cornu uel pilis accensis, fugari serpētes dicuntur. Caprarum ungulas crematas, mōxque aceto perfusas alopeciiis illinunt quidā: est itaque cinis hic facultatis extenuantis. Fimum caprinum lienis aliarūque partium duritiem soluit: ustū, tenuius efficitur. alopecii medetur aliisque quæ absterione indigent affectionibus, ut lepræ, psoræ, licheni, & hoc genus aliis. Miscetur & cataplasmatibus, quæ parotidas diuturnioresque bubonas digerunt. Imponitur in aceto decoctum serpētum moribus, ulceribusque serpunt, & crisipelati: uim nanque habet & abstergendi digerendique: cum axungia impositum iis qui podagra tentantur, auxilio est. Ex uino potum caprarum finum, præsertim in montibus degentium, regium morbū emendat: menses ciet cum aromatibus haustum, partusque euocat: siccum uero in farinam tritum, & cum thure in lana inditum, profluuium mulie-

*Quomodo præparari debeat hirci sanguis, docet Aëtius lib. 11.*

Abre sistit: cæteras sanguinis fluxiones ex aceto cohibet. Capræ quas alimus à capris feris sunt ortæ: à quibus propter Italiâ capraria insula est nominata: sunt autē capræ sylvestres, his nostris haud multo maiores, sed uelociores atque in pugna acriores. In Samothrace habentur greges caprarum sylvestrium, quas rotas uocant. Sunt etiā in Italia circa Fiscellum & Tetricam multæ. Capræ feræ in plurimas similitudines transfigurantur: sunt capræ, sunt rupicapræ, sunt ibyces: quæ genera omnia alpes nobis transmittunt: sunt & oryges, soli à quibusdam dicti: sunt & damæ & pygargi & strepsicerotes, multaque alia haud dissimilia: sed hæc transmarini situs mittunt. Ibyces prærupta & inaccessa montiū incolunt, pernicitatis mirandæ quantum onerato capite uastis cornibus, gladiorumque uaginis. In hæc se librant, ut tormento aliquo rotati, in petras potissimum è monte aliquo in alium transilire cupientes, atque recursum pernici quo libuerit exultant. Capreis ramosa cornua dedit natura, sed parua, nec fecit, ut ceruis, decidua. In Africa capræ non sunt: rupicapris cornua in dorsum adunca, damis in aduersum: sunt etenim & damæ in caprarum genere, sicuti & qui pygargi dicuntur. Damas mittunt transmarini situs: hæc mansuecunt raro, cum feræ iure dici non possint: ita nec placidæ nec feræ, sed mediæ inter utrunque naturæ, ut in mari delphini. Transmarini sunt & strepsicerotes, quibus cornua erecta rugarumque ambitu cōtorta sunt, & in leue fastigium exacuta, ad dæcem Africa appellat. Orygem perpetuo sitiētē Africa generat, solum à quibusdam dictum, contrario pilo uestitum, & ad caput uerso. Color illi in facie niger, cætera cādīdus: cornua nigra, caua, erecta, in mucrone acuto & præduro: dorsum latum & obesum. Velox animal est & ferox: ut quod neque canem timet, aut sylvestrem aprum taurumque, aut pantheram: sed neque leonem, nec hominem uenatorem: elephatum unum animalium metuit. Orygem, ut diximus, Africa generat, ex natura loci potu carētē, cum mirabili modo ad remedia sitientem. nanque Getuli latrones eo durant auxilio, repertis in corpore eorum saluberrimi liquoris uescis. Orygem appellat Ægyptus feram, quam in caniculæ exortu contrastare & contueri tradit, & uelut adorare cum sternuerit.

Capra Sylvestris.  
Fera.

*Rotæ.*  
*Alias fuscællæ*  
*Plin.*

Mythen

Capræ.  
Rupicapra.  
Dama.  
Pygæol.

*Strepsicevates*.

Addax.  
Oryx.  
Solus.

Duz uerruculae. Duas ueluti mamillas penfiles appellat Varro: & Plinius, ni fallor, lacinias binas depeodeotes: sed in feminis modo. 2. *ἑμφῶμα* dicitur usque ad tertium aut quartum meosm, *χίμαρος* in genere femineo usque ad ætatem unius anni. Theocris: *-ἐπὶ κατὰ τὴν Ἀχιμαρος, χίμαρος δ' ἡ καλὸν καὶ ὕπαι καμίζει.* 3. Rotas. Suor qui apud Varronem legi malint platycerotas: ego uero nusquam memini legisse platycerotas esse caprioi generis, sed ceruioi. An idem forsan geous rota est cum ibice: de quo mox dicitur. 4. Capreolos uocat hos Columella, opinor lib. 9. 5. Noo me later hunc Plinij locum aliter à quibusdam legi: uerùm satis placet hæc uetus lectio. 6. Aliàs, Perpetuo ficticia Astice georant. 7. Oryx, ut Aristoteli placet, animal est bisuleū & uoicornē, quod scilicet medio sui capitis unum cornu fixum habet: an idem sit cum oryge Plinij & Oppiaoi consideret studiosus lector. Oryx item apud Columellā inter eas numeratur feras, quæ uiuariis inclusæ feruantur.

Κίτ.  
 Χίμαιρα.  
 Χίμαρος, ἡ  
 ἰεφθ.

*Capreoli.*

*Cervus, ἄρκυρος.*

*Subulones, παταλίας.*

*Adminicula, ἀμινικύλα.*

*Numero circiter viginti. Plinius et Arist.*

*Achainæ ceruæ.*

Inter feras quæ cornua gestant, reliqua facile superat ceruinum genus, si-  
ue formæ pulchritudinem, siue cornuum amplitudinem, ramorumue in  
iisdem uarietatem species. Hæc anniculis nondum nascuntur, nisi quoad  
indicij gratia sit initium quoddam prætuberans, quod breue hirtumque est.  
Bimis primum cornua oriuntur simplicia & recta ad subularum similitu-  
dinem: quamobrem subulones per id tempus eos uocât. Trimis bifida ex-  
eunt, quadrimis trifida: atque deinceps ad hunc modum procedit nume-  
rus usque ad annum sextum: ab hoc similia semper prodeunt, ita ne sit dino-  
scere ætatem ramorum numero: sed senes cognoscimus maxime indicio  
duplici illo, quod scilicet dentes aut nullos aut paucos habent: atque admi-  
niculis carent: uocantur adminicula rami, qui imis cornibus prominent **F**  
ante frontem, quibus in pugna utuntur iuniores: senes autem carent. Soli  
animalium cerui cornua tota solida habent (cum cæteris cornigeris omni-  
bus caua sint): atque ea omnibus annis statuto ueris tempore, mense scili-  
cet Aprili fere amittunt: quæ cum amiserint, occultant sese interdiu uelut  
inermes: idque asperis opacisque faciunt locis, ut muscarum tædio uacent.  
Et quandiu carent iis, nocte procedunt ad pabula, donec recipiant cornua:  
quæ primum quasi cute uestita, & molli lanugine hirtiuscula emittunt: sed  
cum creuerint, soli exponunt, ut excoquantur & sicceant: ubi iam nihil at-  
ritu arborum, cum ea scalpunt, indolent, tunc ea relinquunt loca, confisi  
habere iam quo repugnare possint, cum res exigit: contra nonnulla enim  
animalia quandoque resistunt & cornibus se defendunt, quanquam fero- **G**  
ces beluas fugiunt. Sunt etenim & cornuum mucrones hebetiores: & cor-  
nua ipsa præ nimio excessu fere superuacua sunt: grandis enim illa & mul-  
tifida cornuum magnitudo, in pugna sæpe obest potius quam prodest. Fœ-  
mina in hoc genere cornuum inops mutilaque est. Cerui si cum per ætate  
nondum cornua gerunt castrentur, non edunt cornua: sed si cornigeri ex-  
ciduntur, non decidunt cornua, & magnitudine eadem seruantur. Corpus  
ceruo obesum est, & maculoso uellere tectum, fuluum aliàs: fuit aliquan-  
do & candido colore. Collum gerit procerum atque erectum: summasque  
cacuminat aures. In monte Asia Elapho nomine apud Arginusam, ceruæ  
omnes scissa ac uelut diuisa aure sunt: qua nota uel alibi, si loca mutarint, di-  
noscentur. & quidem fœtus iam inde à primo ortu in utero idem contra- **H**  
hit signum. Crura habet ceruus gracilia. dentium ordine superiore caret a-  
liorum ritu cornigerorum, & ruminat. Nares ita diuise apparent, ut qua-  
druplices uideantur. Genitale mari neruosum est: ubera fœminis quaterna  
ut uaccis. Vermes cerui continere produntur suo in capite plurimos uiuos:  
magnitudine haud minores iis uermibus quos maximos carnes putres edi-  
derint, qui gigni uniuersi atque contigui solent sub linguæ inanitate. Cor  
habet ceruus, pro ratione magnum. felle uacat: quâquam eius intestinum  
amarum adeo est, ut ne à canibus quidem attingatur, nisi ceruus præpin-  
guis sit. Ceruis Achainis cognominatis, fel contineri in cauda creditur. Est **2**  
uero quod ibi contineri aiunt, colore quidem simile felli: sed non ita ut fel  
humidum,

- A** humidum, sed lieni simile parte interiore. Sunt, inquit Plinius, qui ceruo fel in cauda inesse putent, aut intestinis: ideo tantam habet amaritudinem ut à canibus non attingatur. in Brileto & Therne quaterni renes ceruis. *Cer. Alius Tharne.* uorum sanguis fibras non habet: quocirca non concreuit, coitu scilicet firmiore, ut ceterorum: sed perinde ut leporum sanguis spissari aliquantulum solet, eodem fere modo quo lac, quod iniecto coagulo coiuerit. Ceruæ in coitu mares suos non patiuntur, nisi raro, propter rigorem genitalis: atque ea de causa gradiuntur in coitu, subductisque clunibus semen recipiunt genitale. Mas non uni feminæ iungitur adhæretque, sed mutat, breuique interposito tempore aliam atque aliam supergreditur: quo fit, ut ab eodem multæ implantur. Coitus plurimum & conceptus earum post æsturi syds
- B** mense Augusto & Septembri. uterum ferunt octo menses. At mares telicti, rabie sæuiunt, fodiunt serobes: tunc quoque rostra eorum nigrescunt. Pariunt feminæ magna ex parte unum, & interdum geminos. parere autem iuxta uias maxime solent, quod scilicet propter homines beluæ minus accedunt. Incrementum hinnuli celer. Editos partus studiose occulunt, & absconditos inter profunda fruticum uel herbarum, pedum uerberibus castigant ad latendum. Cum maturuerit ad fugam robur, exercent cursu, & fugam menditari docent: ad prærupta ducunt, & per ea salire assuescunt. Vita esse perquam longa hoc animal fertur: quanquam nihil certi eorum quæ narrantur uidemus, inquit Aristoteles. Ad dignoscendam autem eorum uiuacitatem Alexâder Magnus torqucis aureos plurimis ceruis innexuit: qui post
- C** annum centesimum capti, ad opertis iam cute torquibus, nec dum senij indicium præ se ferebant. Pinguescunt cerui ætate supra modum: quam obrem nec currere quidem possunt: secundo aut tertio cursu capiuntur ab iis, qui pedibus insectantur. Fugiunt etiam in aquas propter æstum & anhelitum: quin & latebras quærunt, ubi se præpingues sensere, fatentes incommodum pondus. Caro eorum libidinis tempore uitatur & fœtet: cum itaque mares impleuerint feminas, separantur, ut modo diximus, per se ipsos, propter graucolentiam: fœtent enim ut hirci: & facies quoque eorum nigrescit ut hircorum. Degunt ita quousque imber accedat: tum pascua repetunt. Hyme extenuantur debilitanturque: uere autem uigent maxime ad cursum. Cum fugiunt, etiam in fuga acquiescunt: stantesque respiciunt at-
- D** que manent, dum qui insequitur appropinquet: tum fugæ præsidia repetunt: quod ideo facere uidentur, quia interiora laborant: intestinum enim tam tenuè imbecillèque habet, ut etiam si leuiter percusseris, possit rumpi, cute adhuc integra. Vocem mares grauiorem quam feminæ mittunt. uox autem maribus in hoc genere est, cum tempus cocundi est: feminis autem cum nictuerint. breuis uox feminæ est, maris productior. Fugiunt cerui latratu canum audito, aurâ semper secunda, ut odor cum ipsis recedat. Mulcentur sibili & canu uenantium: itaque alter uenantium palam aut sibilat, alter clam ferit à tergo, ubi socius tempus iam esse significarit. Sed cum crescere aures, acerrimi sunt auditus, nec latere insidiæ possunt: cum remissere, surdi, & facile interimuntur. Animal simplex est, & omnium rerum miracu-

*Mulcentur sibili & canu uenantium: itaque alter uenantium palam aut sibilat, alter clam ferit à tergo, ubi socius tempus iam esse significarit. Sed cum crescere aures, acerrimi sunt auditus, nec latere insidiæ possunt: cum remissere, surdi, & facile interimuntur. Animal simplex est, & omnium rerum miracu-*

lo stupens: intantum ut equo aut bucula accedente propius, hominem iux- E  
tā uenantem non cernant, arcum ipsum sagittasque mirentur. Serpnetibus  
inimicus ceruus est, anhelitu nanque, si quæ sint, extractas cauernis, man-  
dit. Febrium morbos non sentit hoc animal: quin & medetur huic timori,  
ut fertur: legimus enim plurimos matutinis diebus ceruiam carnem de-  
gustare solitos, sine febribus longæuos fuisse: quod ita demum existimant,  
si uulnere uno fuerint interempti. Quanquā alioqui succum procreat cer-  
uina caro (uti Galenus prodidit) non minus uitiosum concoctūque diffici-  
lem quàm sit bubula aut ouilla: imo asinæ carni proxima esse censetur, ut  
fere nullum (quod ad alimenti rationem attineat) usum præstet. Cerninus  
sanguis fartagine inassatus dysenterias fluxionésque cœliacas sistit. in ui-  
no potus cōtra toxica efficax est. Aduersus uenena serpentiumque morsus F  
mirificū est hinnuli coagulum occisi in matris utero. Ceruina medulla ute-  
rum emollit tum in pello, tum etiā extrinsecus imposita. Ceruina medulla  
perunctos uenenata fugiunt, inquit Dioscorides. Cornus ceruini cinis cad-  
miæ in morem clotus, ulceribus oculorum & distillationibus utilis est: in-  
frictus dentes expurgat, fluidasque ginginas contrahit: binis cochleariis  
epotus prodest dysentericis: sanguine excreantibus, cœliacis, morbo regio.  
Datur & in uesciæ doloribus cum tragacātha: in muliebribus fluxionibus  
cum liquore quopiam illi rei accommodato. Accēsi cornus odore serpen-  
tes fugantur, & comitiales morbi deprehenduntur. Cornu in aceto coctum,  
si eo gingiæ colluantur, dolores ex molariū dentitione factos adimit. Ge-  
nitale cerui tritum & in uino potum, uiperarum morsibus auxiliatur. Cer- G  
uini generis sunt, & cerui quoque dicuntur, qui platycerotes & eurycero- 4  
tes appellantur, à summorū cornuum latitudine, quæ in palmas finxit na-  
tura, digitosque emisit ex iis. Corporis forma cerui est: sed tergus omne nō  
minus quàm sit pantherarū uarium: uerum in his albicant maculæ, quæ in  
pantheris nigræ sunt: & huius quoque sanguis fibris caret, quocirca neque  
spissatur. Bubali pene ad ceruinam faciem in Africa procreantur: corporis  
magnitudine bubalus eurycerote minor est, at dorcade maior, oculis splen-  
didis, aspectu pulchro atque alacri. Cornuum exortus statim à capite recti,  
superiores uero eorum partes retro ad dorsum flectuntur. Bubalis cornua  
interdum inutilia sunt: nam etsi contra nonnulla sese defendunt, feroces ta-  
men pugnacesque beluas fugiunt. Cum uero leonē metuat bubalus, caput H  
tantum abscondit, reliquo corpore neglecto: itaque totū corpus latere pu-  
tat. Sanguis quoque eorū fibras non habet: ideo neque concreuit. Patrij soli  
amantissimū animale est: nam si forsā à uenatoribus captus, in alienū solū  
quanuis longinquum abducatur, solutus ad loca consuecta reuertetur. Inter  
cornigera, omnium quæ explorata habemus, minimum dorcæ est, in cer-  
uino quoque genere numerandus, ut qui cornua habeat omnibus annis de-  
cidua, quæ & iis quoque interdum inutilia sunt: nam etsi contra nonnulla  
resistunt, & cornibus se defendunt, tamen feroces pugnacesque beluas fu-  
giunt. Timidum animal dorcæ est, & cursus uelocissimi: noctū atque cer-  
nere, atque interdū creditur. In uenatione interdum, uel in media fuga  
consistit:

Quoniam mo-  
do uirur cor-  
nu ceruinum,  
monstrat Dio-  
scorides.

Platyceros.  
Euryceros.

Bubalus,  
Βύβαλος.  
Βυβαλίς.

Dorcæ.  
Dorcælis.  
Dorcæ.  
2. ff.  
Dorcus.

A confistit: quòd si tunc temporis otium detur reddendæ urinæ, adeo recreantur illi uires, ut denuo ad cursum reddatur alacrior. Dorcades in Hispania sunt frequentes: in Lycia non transeunt montes Syriæ uicinos.

*Cilicia forsetan  
pro Lycia, ex  
Claymond.*

1 Hinnulus cerui *κέρως* dicitur & *κινυλός*: quâquam *κινυλός* nondum progreditur in pascua. Hæc Hermolaus. 2 Aristoteles achainas uocat: Græci genus ceruorum in Echeineas ab oppido cognominant. Hæc ex Hermolao. 3 Vitam esse ceruis longiorē quàm elephantis ostendit Pausanias in Areadicis. Ex Hesiodo, Ter tria secula Echeineæ ceru hominis transmittit garrula cornix. Quatuor & peragit cornicis tempora ceruus. *κέρως*.

*Hinnulus.*

*κέρως.*

*κινυλός.*

*Echeineæ cer-*

*uus.*

4 *κέρως*, quem felle earete scribit Aristoteles, damâ interpretantur & Theodorus *κέρως* & Hermolaus, cæterique quos uidisse memini, recentiores omnes. Verû dama, ut antequam

*κέρως.*

*κέρως.*

*κέρως.*

*κέρως.*

*κέρως.*

*κέρως.*

*κέρως.*

*κέρως.*

*κέρως.*

*κέρως.*

*κέρως.*

*κέρως.*

*κέρως.*

*κέρως.*

*κέρως.*

*κέρως.*

*κέρως.*

*κέρως.*

*κέρως.*

*κέρως.*

*κέρως.*

*κέρως.*

*κέρως.*

*κέρως.*

*κέρως.*

*κέρως.*

*κέρως.*

*κέρως.*

*κέρως.*

*κέρως.*

*κέρως.*

*κέρως.*

*κέρως.*

*κέρως.*

*κέρως.*

*κέρως.*

*κέρως.*

*κέρως.*

*κέρως.*

*κέρως.*

*κέρως.*

*κέρως.*

*κέρως.*

*κέρως.*

*κέρως.*

*κέρως.*

*κέρως.*

*κέρως.*

*κέρως.*

*κέρως.*

*κέρως.*

*κέρως.*

*κέρως.*

B connessus ab animalium eorum copia, eadem & Elaphonnessus nominatur: de qua Plinius lib. 5. Præterea paucos reperias authores, uel nullos potius, qui simul *κέρως* meminerint, & platycerotis & eurycerotis. Atque inde conicimus idem esse animal, quòd dianis.

*Cervi palmati*

*forte à Julio*

*Capitolino di-*

*nius in Gor-*

*dianis.*

*κέρως*

*κέρως*

*κέρως*

*κέρως*

*κέρως*

*κέρως*

*κέρως*

*κέρως*

*κέρως*

*κέρως*

*κέρως*

*κέρως*

*κέρως*

*κέρως*

*κέρως*

*κέρως*

*κέρως*

*κέρως*

*κέρως*

*κέρως*

*κέρως*

*κέρως*

*κέρως*

*κέρως*

*κέρως*

*κέρως*

*κέρως*

*κέρως*

*κέρως*

*κέρως*

*κέρως*

*κέρως*

*κέρως*

*κέρως*

*κέρως*

*κέρως*

*κέρως*

*κέρως*

*κέρως*

*κέρως*

*κέρως*

*κέρως*

*κέρως*

*κέρως*

*κέρως*

*κέρως*

*κέρως* ab Aristotele uocatur, & platyceros siue euryceros ab aliis. 5 Doreada, capream uertit Theodorus: at nos Plinium secuti capream in caprarum syluestrium genere locauimus. Doreus apud Oppianum idem cum doreade est: Dioscorides tãquam diuersum enumerat. Doreades Lybicæ (ut ex Eliano narrat Gillius) quanquam uelocitate sunt mirabili, tamen inferiores sunt in eurrendo equis Lybicis. Earum alius nigris uictris distinguitur, reliqui corporis color rubet, & pedes quidẽ eis longi sunt. Cornibus caput ornatur, oculi nigri, longissimæ aures habentur. *κινυλός* à poetis nũcupata (ut aliud sit animal à doreade Lybicæ) turbinis instar celerrime fertur: flauis pilis spectatur: cauda est tum pilosissima, tum exalbentis: eius oculi cyaneo colore tincti uidentur, aures præ altis pilis refertæ: neque modo in terra pedum celeritatem ostendit, sed etiam eum in fluuij confluentem inciderit, ungulis pedum remigans, fluctus pererrum. Cap. & uero in lacubus natare gaudet, unde sibi uictum cõparat: uirides iuncos, & cyperum depascitur.

*Dorcades Ly-*

*bicæ.*

*κινυλός*

*κινυλός*

*κινυλός*

*κινυλός*

*κινυλός*

*κινυλός*

*κινυλός*

*κινυλός*

*κινυλός*

*κινυλός*

*κινυλός*

*κινυλός*

*κινυλός*

*κινυλός*

*κινυλός*

*κινυλός*

*κινυλός*

*κινυλός*

*κινυλός*

*κινυλός*

*κινυλός*

*κινυλός*

*κινυλός*

*κινυλός*

*κινυλός*

*κινυλός*

*κινυλός*

*κινυλός*

*κινυλός*

*κινυλός*

*κινυλός*

*κινυλός*

*κινυλός*

*κινυλός*

*κινυλός*

*κινυλός*

*κινυλός*

*κινυλός*

*κινυλός*

*κινυλός*

De tragelapho, tarando, ophio, leucocrota & colo. Cap. XCVI.

E Adem pene cum ceruo specie sunt, quos tragelaphos dicunt: sed non a Libi quàm circa Phasidem amnem nascuntur. Distât tantum, quòd uillosos habent armos, & menta promissis hirta barbis. Tarando magnitudo quæ boui: caput maius ceruino, nec absimile, cornua ramosa, ungula bifida, uillus profundus magnitudine urforum: tergori tanta duritia, ut thoraces ex eo faciant. Hunc tarandũ affirmant habitũ metu uertere, & cum delitescat fieri assimilem cuicunque rei proximauerit: colorẽque omnium arborum, fruticum, florum, locorũque reddere metuentem in quibus latet: ideoque raro capitur, sed cũ libuit sui coloris esse, asino similis. Scythia hunc mittit. Ophion Sardinia quondam ferebat, nec alibi nascebatur: animal ceruo minus, sed pilo demum ac dente simile ceruo. Hoc interuisse arbitror, inquit Plinius: & ideo medicinas ex eo omitto. Cruribus ceruinis & ungula quoq; bifidula apud Æthiops leucocrota est perniciosissima fera, asini fere magnitudine, collo, cauda, pectore leonis, capite melium, ore ad aures usque rescisso, dentium locis osse perpetuo. hanc ferã tradunt humanas uoces imitari. Gignitur apud Scythas quæ circa Meotim paludẽ sunt Colos, candido colore, magnitudine inter ceruum & arietem, sed qui uelocitate utrũque facile superat. Potat naribus ad caput usque immersis: cõque potu diebus pluribus contentus, siccioribus locis pascitur.

*Tragelaphus.*

*κινυλός*

*κινυλός*

*κινυλός*

*κινυλός*

*κινυλός*

*κινυλός*

*κινυλός*

*κινυλός*

*κινυλός*

*κινυλός*

*κινυλός*

*κινυλός*

*κινυλός*

*κινυλός*

*κινυλός*

*κινυλός*

*κινυλός*

*κινυλός*

*κινυλός*

*κινυλός*

*κινυλός*

*κινυλός*

*κινυλός*

*κινυλός*

*κινυλός*

*κινυλός*

*κινυλός*

*κινυλός*

*κινυλός*

De hippelapho, hippardio, hippagro, hippopotamo, &amp; eale.

E

Cap. XC VII.

*Hippelaphus.**Hippardium.*

**M**agnitudo hippelaphi ceruo comparatur. cornua dorcadi similia. iu-  
bani summis continet armis. nec non & feta quæ hippardium no-  
minata est, parte etiam eadem: sed utrunque hoc genus tenuissimo iuba  
ordine à capite ad summos armos crinescit. Gerit cornua utrūque, excepta  
fœmina hippelapho, & pedes habet bifulcos. Proprium hippelapho uilius  
qui ab eius gutture modo barbæ dependet. Gignitur apud Arachotas. Vn-  
gulas quoque bifulcas habet hippagros, ceruinis similes. dentes exertos  
binos. spina tota ad caudam usque perpulchra ornatur iuba. Viuit in præ-  
ruptis Æthiopix Indiæque locis. seruitutem non tolerat: nam si forte cap-  
tus seruetur, fame sese cruciat, sponteque moritur. Bifulcum animal & F

*Hippagros.*  
*Equus sylue-*  
*stris.**Hippopotam<sup>o</sup>*  
*Equus flumi-*  
*tilis.*

hippopotamus est, sed quod ambigat terræ, mari, atque amni cômune: na-  
tura enim hippopotami ita constat, ut uiuere nisi in humore diu non pos-  
sit. Hunc gignit Ægyptus, malum hominibus non minus infestum quàm  
sit crocodilus. Plurimi sunt super Saiticam, inter Ægypti præfecturas. Iuba  
illi equina, ungula qualis bubus, rostrum resimum, dentes exerti & aprorū  
more adunci, sed leuiter & minus noxij. Cauda etiam apri, tortuosa. Talus 2  
quoque inest bifulcorum modo: magnitudo asini, hinnitus equi: Tergus 3  
ad scuta galeasque impenetrabilis, præterquam si humore madeat. Inte-  
riora omnia equi & asini similia. Noctibus segetes depascitur, ad quas per-  
git auersus altu doloso, ut fallente uestigio, reuerteti nullæ ei insidiæ præ-  
parentur. Carnem habet hippopotamus durissimam, & concoctu difficil- G  
limam. Hippopotami testes exsiccati ac triti, contra serpentium morsus bi-  
buntur. Cinis corij cum aqua illitus panos sanat: adeps, frigidas febres. item  
simum suffitu. Pellis eius è sinistra parte frontis in inguina adalligata uene-  
rem inibet: eiusdem cinis alopecias explet. Est apud Æthiopas Indosq;  
eale, aliàs ut equus fluuiatilis, cauda uero elephati, colore nigro uel fuluo,  
maxillis aprinis, maiora cubitalibus cornua habēs mobilia, & ad obsequiū  
cuius uelit motus accommodata: neque enim rigēt, sed deflectuntur, ut u-  
sus exigit præliandi: quorum alterum cum pugnat protendit, alterum re-  
plicat, ut si ictu aliquo alterius acumen obtusum fuerit, acies succedat alte-  
rius. Hippopotamis comparatur, & ipsa sane aquis fluminum gaudet.

*Pergit auersus.*  
*alter hoc ex-*  
*plicat Gillius,*  
*ut uidetur ex*  
*Aeliano.**Plin. Testiculi*  
*drachma ex a-*  
*qua cœtra ser-*  
*pentes bibitur.*  
*Eale.**Equiceruus.*

1 Hippelaphum Theodorus equiceruum uocat, à forma equi & cerui quam ha-  
bet, compositum nomen acceperit. 2 Cauda, ut refert Herodotus, equina & magni-  
tudo eius est bouis maximi. 3 Tergoris erassitudo tanta, inquit Herodotus, ut ex-  
co cum aridum fuerit, uenabula fiant: &, ut Plinius refert, hastæ torquentur.

H

De camelo, &amp; camelo pardali.

Cap. XC VIII.

*Camelus, κα-*  
*μηλος.*

**I**nter quadrupedes quæ animal generant, post elephatum maxima mole  
camelus est, idemque bifulcum: cornu tamen uacat. Bactri camelos for-  
tissimos mittunt, licet Arabia plurimos gignat. inde duo camelorum gene-  
ra, Bactrianum atque Arabicum. Differūt, quòd illi bina habent tubera in  
dorso, hi singula: camelus enim proprium inter ceteras quadrupedes habet  
in dor-



**A** in dorso, quod tuber appellant. Sūt & omnibus camelis singula parte ima: in pectore scilicet, quale in dorso tubera, quibus incumbat reliquū corpus, & firmetur quoties in genua inclinantur. Dentium superiore ordine ut boves carent in utroque genere. Caudam habent asino similem. Genitale maribus neruo ita cōstat, ut uel ex eo cōfici possit, quo arcus fidissime intendatur: iidēque in auersum mingunt: genitale enim inter crura posteriora caudam uersus spectat. Fœminæ in uentre mammas binas cū papillis quaternis habent, ut boues. Clunes habet camelus proportionē magnitudinis paruos. Camelo tali similes bubulis, sed minores paulo: est enim bisulcum uti modo diximus: sed bisulcum sic est, ut pes parte posteriore scissus paululum sit ad flexum digiti secundum: parte autem priore summa, quadr-

**B** partito findatur discrimine paruo, quantum scilicet ad primum digiti inflexum. Et inter fissuras quiddam perinde ut in anserum pedibus continetur: cōq; sit ut alij minime bisulcum animal esse uoluerint. Pes uestigio est carnosus ursæ modo: qua de causā in lōgiore itinere sine calciatu fatiscunt. Pedatim incedit camelus, hoc est, ut sinister pes non transeat dextrum, sed subsequatur. Ventres habet camelus plures: & ruminat quemadmodū cor nigra. Fel non uase aliquo discretum, sed uenulis quibusdam conclusum habet. Coeunt cameli sedente fœmina, nec auersi, ut sentit Aristoteles: (quanquam auersis, inquit Plinius, camelis coitus) sed complectente mare, ut cæteræ quadrupedes agunt, & coitum toto die exercent. Petunt recessuū solitudines cum libet coire: nec aliquis eò potest tuto accedere, præterquā

**C** pastor armenti: scit enim mas tempore coitus, siue homo accedat, siue camelus: nam odium aduersus equos gerunt naturale. Tēpus coeundi in terra Arabia mense Septembri. fert uentrem menses duodecim, uel ut aliis uidetur, menses decem. parit singulos: uniparum nanque est. Incipit & mas & fœmina coire in trimatu: fœmina post partū uno interposito anno coit. Cameli, matres nunquam superueniunt suas: sed etiā si quis cogat, ipsi non patiuntur. Camelus lac suum usque eò seruat, quò iam cōceperit: atque eo tempore, tum lac, tum caro cameli suauissima omniū est. Prolem à parente separant anniculam. Viuunt cameli magna quidem ex parte annos triginta: sed nonnulli quinquagenis annis: quidam & centenis. utcunque & rabiæ quandoque sentiunt. Castrandi genus etiam fœminas quæ bello

**D** præparentur, inuentum est: castratæ nanque auctiores & fortiores fiunt, coitu negato. Habentur in duplex ministerium: sunt alij oneri ferendo accommodati: alij leues ad pernicitatem: uelocitas enim illis inter equos, sed sua cuique mensura sicuti uires: nec ultra assuetum procedit spatium, nec plus instituto onere recipit. Sitim quatrduo tolerant: uerum cum occasio bibendi data est, tantum implentur, quantum satiet desideria præterita, & in futurum diu profit. lutulentas aquas captant, puras refugiant: demique nisi cœnosior liquor fuerit, ipsi assidua conculcatione limum excitant, ut turbetur. Cameli tum caro, ut modo diximus, tum lac ab hominis dulcissimum est: suauissimum autem hoc existimatur, ad unam mēsuram duabus aut tribus aquæ additis. Cameli cerebrum arefactum potūque ex aceto

comitialibus morbis aiunt mederi : item fel cū melle potū: hoc & angina. E cauda arefacta solui aluum .fimi cinere crispari capillum cum oleo. Et dy-  
 sentericis prodest illitus cinis, potūsque quantum tribus digitis capitur, et-  
 tiam comitialibus morbis. Vrinam fullonibus utilissimam esse tradunt:  
 itēque ulceribus manantibus. Barbaros eam seruare quinquennio, & he-  
 minis potam ciere aluum. Camelino capite est quam nabim Æthiopes  
 uocant, nos camelopardalim dicimus. Collo equis similis, pedibus & cru-  
 ribus boui, colore rutilo, candidis maculis in hinnulorū morem superspar-  
 sa. Posteriora corporis anterioribus humiliora: adeo ut iis partibus humi  
 sedere uideatur, quæ bouis altitudinem non superant: cum partes priores  
 camelorum crura proceritate æquent, simul & quæ circa armos sunt atque  
 pectus ipsum proceriora uideantur, quàm pro reliqua corporis ratione: ut F  
 uero Heliodorus prodidit, caput cameli simile, maius duplo aut paulo am-  
 plius quàm Lybici struthij: collum, ut oloris longum. Animal aspectu ma-  
 gis quàm feritate conspicuum: nullam enim præ se fert sæuitiam, tracta-  
 tūque tam facile, ut funiculo eius capiti alligato, ubiuis ducatur à præfecto:  
 ut non inter feras, sed inter pecora potius numerari debeat: quare etiam o-  
 uis feræ nomen inuenit, Æthiopia hanc gignit. Nullam habet cum parda-  
 le similitudinem.

*Nabis.*  
*Cameloparda-*  
*lis.*

*Ovis fera.*

*Dromades.*  
*Dromedarij.*  
*Ouifera.*

1 Currunt cameli, inquit Aristoteles, celerius quàm equi Nissani. Veloces istos  
 camelos dromadas uocauit Liuius Decade quarta: & dromedarios Efaiz, ut arbitror,  
 interpret Latinus. 2 Ovis fera, alias ouifera.

#### De suisibus.

#### Cap. XCIX.

G

*Suis, v.*

S Villum genus cum sit aliàs bisulcum, in Illyrico quibusdam locis &  
 Præonia, atque nonnullis aliis regionibus, solidas habent ungulas sues:  
 quo fit ut ex utroque genere existimentur, solipedum scilicet & bisulco-  
 rum. Dentem nullum mutat sus: & mas plures habet dentes quàm fœmi-  
 na. Mas item dentes habet exertos, quibus fœmina uacat. Rostrum habet  
 sus repandum, collum crassum, & setis horret. Testes maribus hærent re-  
 tro, nec tremuli pendent. Mammæ gerit fœmina, nec in pectore nec in fœ-  
 minibus, sed in uentre, generosa duodenas, uulgaris binas minus. genitale  
 uero ea continet parte qua pecoris ubera habentur: & cum per libidinem  
 turget ac prurit ad coitum, sursum tantisper hoc retrahitur, uertitque fo- H  
 ras, ut inde mari coitus sit facilius. Cauda sui intorta: id etiam notatum, fa-  
 cilis iacere in dextrum quàm laeuum intortam. Lienem habet angustum  
 & oblongum: uentrem ampliorem, in quo rugæ cancelliue (quas *πλέγες* uo-  
 cant) insunt nonnullæ leues: hunc intestinum excipit longissimum & mul-  
 tis conuolutum anfractibus. Vulua porcina anfractuosa sinuosaque est:  
 quandoquidem animal multiparum sus est, & in sinibus fœtum gerit.  
 Suum ossa medullæ parum in se continent. aprorum sanguis non spissa-  
 tur. Coire incipiunt sues tam mares quàm fœminæ mense suæ ætatis o-  
 ctauo: quanquam mas antequam sit anniculus prolem generat uitiosam:  
 fœmina annicula parit: sed non omnibus locis eadem ætatis ratio est.  
 iam

- A iam enim sues nonnusquā tam mares quā fœminæ quarto cocunt mense: sexto tamen ita ut uel progenerate & educare possint. Nonnusquam apri mense decimo inire incipiunt. Valent ij coitu ad triennium, uetustioribus proles deterior gignitur: nullus enim profectus accedit, nulla uirium recreatio. Paucissima edit sus prima partione, uiget secunda: nec senescens copia fœtus deficitur, quāquam lentius coit. Vt autem Varro prodidit, sus ad fœturam quā sit fœcunda, animaduertunt fere ex primo partu, quod non multū à reliquis mutat. Sunt è serofis aliæ statim prolis fœcundæ laudabilis: aliæ increscentes melius generant. Vbi uero quintūdecimum annū nata serofa est, non præterea generat: aliquibus tamen uita prope ad uicenos annos: plurimis uero ad quindecim. Si pinguet ocyus, & iuuenis, & senescens mouetur ad coitum: si grauida admodum pinguescat, efficitur ut fœta minus habeat lactis. Sues cieures bis pariunt anno: natura enim diuisus est suis annus bisariam: quaternis mēsis fert uentrem: binis nutrit. Parere tot potest serofa quot mamas habet: si minus pariat, fructuaria non erit idonea. Numerus partus plurimum ad uicenos: si tamen multos pepererint, educare omnes nō queunt. Nutricare octonos porcos paruulos primo possunt, ut Varro placet: incremento facto, à peritis dimidia pars remoueri solet, quod neq; mater sola potest sufferre lac, neq; cōgenerati alenscendo roborari. Mihi uero utilius probatur experto, inquit Palladius, porcam cui pabula suppetunt, ut plurimum sex nutrire debere: quia licet plures possit educare, tamen frequentiore numero sucta deficiet. Porci qui nati sunt hyeme, fiunt exiles propter frigora, & quod matres aspernantur propter exiguitatem lactis. Cum serofa peperit, primam mammam porco, qui primus in lucem prodiit præbet: & suam nouit quisque in fœtu quo genitus est ordine, eaque alitur, nec alia. Detracto illa alumno suo, sterilesceit illico ac resilit: uno uero ex omni turba relicto, sola munifex, quæ genito fuerat attributa, descendit. penuriam lactis præpingues sentiunt. qui in utero lēsus minutusque fuerit fœtus, metaehæros dicitur. Omnem porro situm ruris pecus hoc usurpat: nam & montibus & campis cōmode pascitur: melius tamen palustribus agris quā sitientibus. Nemota sunt conuenientissima, quæ glandium pomorumque syluestrium feracia sunt. at ubi penuria est arborum, terrenum pabulum consecrabimur: & sicco limosum præferemus, ut paludem rimentur, effodiāntque lumbricos, atque in luto uolentur, quod est huic pecori gratissimum. Herbarum frugūque minime appetens est (imo uiridia pabula suisbus plerunq; nocēt) sed radicum maxime ex omnibus animalibus: rictūque aptissimo ad id negotij est. Facillime etiā omnium ad quoduis pabulum assuescit: & celerrime quoque in pinguedinem proficit, pro sui corporis magnitudine: sexaginta enim diebus pinguescit: quantum autem profecerit, ij cognoscūt quibus ea res curæ est. Alitur hoc pecus pinguescitque maxime glāde: deinde faba, & hordeo, & cætero frumento. quæ res non modo pinguitudinem efficit, sed etiā carnis iucundum saporem: sed maxime pecus hoc, ut etiam cætera quibus uentticulus optime concoquit, quiete immotionēque pinguescit: magis autem inedia

*Vsq; ad quartum annum, Varro: Plin<sup>9</sup>, non ultra triennium,*

*Varro, Sus Aenea Laui ni triginta porcos peperit: sed portentū erat. Porca.*

*Metachærus, μὲν 21697.*

*Alias, sex diebus.*

faginatione orsa. Cæterum sues pinguiore redduntur etiam cum in luto se uolutant. Sues ex omnibus pecudibus impatientissimæ famis sunt, ita ut aliquando si indigeant pabuli, non tantum alienam (si liceat) sobolem, sed etiam suam consumant. Sues tantum coitu spumam ore fundere inuenimus. uerrem subantis audita uoce, nisi admittatur, cibum non capere usque ad maciem. In Africa suillum genus non uiuit. Apud Indos quoque nullum suem neque ferum neque cicurem nasci Ctesias Cnidius ait. In Macedonia sues muti esse dicuntur. Agatharides ait sues in Æthiopia cornua habere. Cum cætera animalia, nisi nouella castrantur, intereant, aper unus qua ætate castratur non refert. Postquam enim salire desierit, ita ut id recte facere possit, castratur saginatúrque, quoad perueniat ad lanium: uerum castrantur uerres commodissime anniculi, utique ac minores quàm semestres: quo facto nomen mutant, atque è uerribus dicuntur maiales. Castratur & fœminæ post bidui in ediam suspensæ pernis posterioribus, uulua rescissa, celerius ita pinguescunt. Variis morborum generibus laborant sues, ut raucedine, angina, struma, febribus: & unum ex omnibus quæ nouimus animalibus, sus grandinæ concipit. Grandinosi autem fiunt sues, quorum crura, & collum, & armi carne constant humidiores: quibus partibus uel grandines plurimæ innascuntur. Caro dulcior est si grâdines habet paucas: sed si multas, humida ualde & insipida est. Facile qui grandem concipere cognoscuntur: parte enim linguæ inferiore grandines habentur: & si fœtas dorso euellas, sanguinolentæ in radice uidentur. pedibus etiam posterioribus constare non possunt qui grandent: & caput obliquum in incessu est: grandinem uero non habent cum adhuc solum lactent. Suem oculo amisso putant cito extingui. Porci alienos sibi manipulos scæni lacerantes, pluuiam præfagiunt. Qui suum gregem uult habere idoneum, eligere oportet tum bona ætate, tum bona etiam forma. Verres itaque legedi sunt, totius quidem corporis amplitudine eximij: sed quadrati potius quàm qui longi aut rotundi sunt, uetere promisso, clunibus uastis: cruribus uero & ungulis haud perinde proceris, rostris breuibus & resupinis, amplæ & glandulosæ ceruicis: maximèque quod ad rem pertinet, quàm salacissimos oportet esse uerres: qui & ab annicula ætate commode progenerant dum quadratum agant. Scrofæ probantur longissimi status, & quibus ad sustinendum fœturæ onus, magnus se uenter effundat: cætera uerribus similes. Fœmina sus habetur ad partus edendos idonea fere usque in annos septem, ut dictum est. Annicula non improbe concipit. Si regio frigida & pruinosa est, quàm durissimæ densæque & nigre fœtæ dux eligendus est. Si temperata atque aprica, glabrum pecus, aut qualecûque prouenerit, potest pasci. Sues fœræ semel anno gignunt: principio hyemis coeunt, uere pariunt, petentes maxime inuia, prærupta, angusta & opaca loca. Mas cum fœminis dies triginta magna ex parte conuersari solet. maribus non nisi anniculis generatio est. In coitu plurima asperitas: tunc inter se dimicant indurantes attritu arborum costas, lutoque se tergorantes. Pugnant adeo acri certamine, grege relicto, ut sæpenumero mortem uterque aduersarius obeat. Fœminæ in partu

Verres.  
Maiales.

Insipida, πικ-  
λος.

Sus fœræ.  
ἡσυχία.  
πύμαρος.  
καὶ πύμαρος  
ἡσυχία.

- A partu asperiores, quæ & nonnunquam cum libidine excitantur, uel homines aggrediuntur: idque candida maxime ueste indutos. Numerus partus & tempus ferendi, idem atque in urbanis suis est. uox etiã similis: sed semina uocalior est, mas raro uocem emittit. Mares castrati, maiores ferocioresque euadunt: castrantur autem, quod iunioribus adhuc morbus pruriens incumbit in testes: quo fit ut atterentes eam partem ad arbores, testes exstringant. Inter omnia edulia, suilla caro ualentissime nutrit, & ex quadrupedibus facillime concoquitur: & si in uentriculo & in iecinore probe concoquatur, optimum procreat succum, sed qui glutinosi nonnihil in se habeat: quo fit ut iecur obstruat, & renes iis quibus hæc à natura meatus habent angustiores: atque uberior frequentiorque eius usus in his membris
- B** uel grauitatem uel dolorem nonnunquã creat: cõque senibus inutilis est. Optimum autem succum gignit eorum caro qui ætate sunt mediocri: nam porcellorum recens natorum caro mucosa est, & excrementis abundat. Viscera suilla omnia, cæterorum quadrupedum uisceribus sua natura multo sunt suauiora: quæ tamen etiam seipsis meliora euadunt, cum animal ipsum caricas abunde comederit. Adhibetur & ars iecori seminarum sicut anserum. Neque alio ex animali numerosior materia ganeæ: quinquaginta prope sapes, inquit Plinius, cum cæteris singuli. *Vulua, ut diximus, eie-*  
*Vulua porcaria.*
- cto partu melior quàm edito: eiectitia uocatur illa, hæc porcaria primiparæ suis optima: contra effectis. A partu, præterquam eodem die suis occisa, liuida ac macra. Nec nouellarum suum præterquam primipararum probantur: potiùsque ueterum necdum effectarum, & biduo ante partum, aut post partum, aut quo eiecerint die. proxima eiectitiæ est occisa uno die post partum. Huius & fumen optimum, si modo fetus non hauserit: eiectitiæ deterrimum, antiqui abdomen uocabant. Præpinguium suum cutis, ubi probe elixa sit, glutinosum quidem pinguemque succum gignit, sed non admodum crassum: nec tam facile concoctionem admittit quàm extremæ partes, (crura inquam ac labra:) neque succum præstat tam bonum, sed qui excrementis magis abundet. Pulmo suillus intertrigines, quæ à calciamentis fiunt, ab inflammatione tueri sanareque creditur. Aprinum iecur recens si arefactum teratur, ex uino potum contra serpentium morsus auxilio est. Suillum lac sunt qui arbitrentur utilissimum tenasmo, dysenterici, necnon phthisicis.
- D** Adipem suillum (axungiam Græci appellauere) antiqui maxime axibus uehiculorum perungendis ad faciliorem circuectum rotarum utebantur: unde & nomen: sic quoque utili medicina cum illa ferrugine rotarum ad sedis uitia uirilitatisque. Adeps suillus omnium liquidissimus est, instatque olei diffuit: emollit atque concoquit magis quam oleum: idemque cataplasmatibus quæ ad phlegmonas imponuntur, apte commisceri solet. Humorum acrimoniam impositus maxime obtundit, ac proinde medicamentis ulcera curantibus miscetur: quale est quod parygon uocant. Et per se axungiam medici antiqui maxime probabant renibus detractam: & exoptis uenis aqua cælesti fricabant crebro, decoquebantque, fictili nouo sapius, tum demum asseruantes. syncera axungia medetur igne ambullis uel niue: pernionibus autem cum hordei cinere: & galla pari mo

*Vulua eiectitia**Vulua porcaria**Sumen.**Abdomen.**Axungia**ἀξὺν γῆλον*

*Alias, contra  
phthisim.*

*Quomodo cu-  
ram seruariq;  
debeat, mon-  
strat Dioscori  
des lib. 2.*

do. Ad tussim ueteré recens decoquitur quadrátis pondere in uini cyathis **E** tribus, addito melle: uetus etiã phthisin in pillulis sumpta sanat, quę sine sale inueterata est: omnino enim nõ nisi ad ea quę purgãda sint, aut quę non sint exulcerata, falsa recipitur. Quidam quadrátes axungię & mulsi in uini cyathis tribus decoquunt contra tussim, quinto die picem liquidam in ouo sumi iubent, circunligatis lateribus & pectoribus, & scapulis eorũ qui phthisin sentiunt: tantãque est uis, ut genibus etiam adalligata, redeat in os sapor, eãque expuere uideantur. E sue quę nõ peperit, apertissime utuntur ad cutem mulieres: contra scabiem uero quiuis, admixto iumentorum seuo, pro parte tertia & pice, paritérque subseruēfactis. Medicorum aliqui admixto anseris adipe taurorũq; seuo & cypso, ad podagras uti iubent: si uero permanet dolor, cum cera, myrto, resina, pice. Vfus igitur axungię ad **F** mollienda, excalfacienda, discutiēda, purgandãque. Inueteratur autē duobus modis: aut cum sale aut syncera: tanto utilior, quanto sit uetustior: conuenitque falsam magis emollire, excalfacere, discutere: utiliorẽque esse uino lotam. Elota uino pleuriticis prodest: cinere aut calce excepta, inflammationibus, fistulis, ac tumoribus succurrit. Talum suillũ ustum atq; epotum, quidam colli inflammationes atque tormina diuturna sanare produnt. Atque hæc de bisulcorum genere fatis præcepimus.

*Sus, ūs. ὕψος.  
Porcus, χοῖρος  
Delici.  
Sacres.  
Nefrendes.  
Scrofa.  
Verres,  
Aper, ἀπέρ  
Sus, χοῖρος.*

**1** Sus, ūs: olim ὕψος. Porcus, ut Varro tradit, Græcum nomen est antiquum, sed obscuratum, quodd nunc cum uocant χοῖρος. Cum porci depulsi sunt à māmā, à quibusdam delici appellantur: neque iam lactentes dicuntur: qui à partu decimo die, uel (ut alij) die quinto habēt puri, ab eo appellantur sacres: quodd tũ ad sacrificia idonei **G** dicuntur primum. Amisso nomine lactentes dicuntur nefrendes, ab eo quodd nondum fabam frendere possint, id est frangere. Sus fœmina, scrofa: mas, uerres dicitur, & nõnunquam aper, græce ἀπέρ: quanquam aper fere pro syluestri accipitur, qui Græcis χοῖρος appellatur. **2** Quomodo saginātur sues, docet Aristot. lib. 8. hist. anim. **3** Aristoteles. Pernis posterioribus, recisa cute inter fœmina, quã maribus testes maxime continentur. &c. ubi Plinius, pernis prioribus habet: quem & Theodorus secutus est. **4** De suum morbis, & eorum curatione Aristoteles lib. 8. hist. & Columel. lib. 7. **5** Sumen interpretantur suillas cum lacte suo densato mammas, ut Martial. lib. 13. Essẽ putes nondum sumen: sic ubere largo Effluit, & uiuo lacte papilla tumet.

## De quadrupedibus solipedibus.

Cap. C.

*Solipedes,  
Solidipedes.  
Μόνυξ.*

**R**Elíquum iam est solipedum genus: earum scilicet quadrupedum, quę **H** Rungulas in pedibus gerunt solidas. Porro solidas habent ungulas fere, quę non sunt cornigera, igitur pro iis, telum ungula est illis: nec talos habent eadem. Solipedũ crura statim iusta nascuntur mensura: postea exportigentia se uerius quàm crescentia: itaque in infantia scabunt aures posterioribus, quodd addita ætate non queunt: quia longitudo superficiem corporum solum ampliāt. Hac de causã inter initia palci, nisi submissis genibus non possunt, nec usque dum ceruix ad iusta incrementa perueniat.

## De equo.

Cap. C1.

*Equus, ἵππος.*

**I**N hoc genere primas partes iure uendicabit equus: homini enim fidelissimi ante omnia, quę uel in consortiũ operum nobis paramus, sunt equi: &

**A** & omnium quoque generosissimi. Iudicium quoque ac uoluptatem, affectusque alios nonnullos humanis similes iis inesse, præstantissimo saltem eorum generi, in exemplis habetur. Cum cæteris fere animalibus in suo singulis genere oculorum color sit idem, equus, secundum hominem, omnium cæterorum animalium maxime uersicolor est: & aliqui cæsi altero oculo nascuntur, quod nulli fere ex cæteris bestiis euenit manifeste. Ceruix iuba ornatur: & pili in iuba largi. Dentes habet equus cõtinuos numero quadraginta: quorum primores quatuor mense tricesimo amittit, binos utrinque, supra dico & subter. Tum ubi præterea annum compleuerit, incipiãtque quartum agere annum: quatuor item eodem modo mittuntur, duo superius, totidẽmque inferius: & incipiunt nasci quos uocant columellares.

**B** Rursus anno altero peracto, quinto scilicet anno incipiente, & omnino intra sextum annum, simili modo quatuor alij cadunt. Quibus iam peractis annis quatuor & mensibus sex, nullus præterea mittitur: quanquam euenisse in aliquo certum est, ut cum primis omnes amitterentur: atque etiam in alio, ut cum ultimis omnes: sed raro. Sexto deinde anno quos primos mutauit, exæquat. Septimo omnes expleantur æqualiter, & ex eo cauatos gerit. Nec postea quot annorum sit ex dentium mutatione comprehendi potest: sed prouectioribus, decimo anno (ut nonnullis placet: ut uero aliis sexto decimo) tempora cauari incipiunt, & supercilia nonnunquam canescere, & dentes prominere. Agitur certe in equis contra atque cæteris animalibus: cum enim cæteris senectute dentes nigrescant, equo candidiores redcuntur. Equus in pedibus solidas gerit ungulas. felle omnino caret. Salacissimus omnium tum fœminarum tum marium equus est, excepto homine. Coire incipit bimus tam mas quàm fœmina: sed hoc in paucis fit. pullique eorum minores imbecillioresque sunt. Quod autem plurimum, trimatu tam mares quàm fœminæ coeunt, & proficiunt subinde in generando, ut proles præstantior ad annos usque uiginti procreetur. Iuniorum coitus præter ætatem contingit, pabuli bonitate & copia. Seniores equi fœcundiores sunt tam mares quàm fœminæ: quo fit ut à circo post uicesimũ annum mittantur equi ad sobolem reparandam. Matrem autem post decennium non esse utilem iudicant Columella & Palladius: quod ex annosa matre tarda sit atque iners proles. Coeunt mares ad annos tricenos ternos: fœmina ad quadragenos: ita ut per totam fere uitam coitum equis seruari eueniat: uiuit enim magna ex parte mas annos circiter quinque & triginta, fœmina plus quàm quadraginta. iam & quinque & sexaginta annos uiuisset equum proditum est. Fœmina quinquennio finem crescendi capit, mas anno addito. Ad generandum paucis animalium minor fertilitas: qua de causa per interualla admissuræ datur. Equæ tricenæ, inquit Aristoteles, aut paulo plures singulis dantur admissariis. Neque tamẽ æqualem numerum omnibus debemus adhibere, sed æstimatis uiribus uniuersuiusque admissarij, submittenda sunt pauca uel numerosa coniugia. Iuueni equo & uiribus formæque constanti (ut Palladius præcipit) non amplius quàm duodecim uel quindecim debemus admittere: cæteris pro qualitate uirium suarum,

*Cenios hos uocant Columella & Palladius. Columellares dentes.*

*Equa.*



Nec unus admissarius, ut Plinius author est, quindecim initus eiusdem anni E  
 ualet tolerare: quanquam (ut Columella placet) nec minus quàm quindecim, nec rursus plures quàm uiginti unus debet implere. Equus non certo  
 dierum numero implet, sed aliquando uno aut duobus tribusue, aliquan-  
 do pluribus: serius certe quàm asinus equam superueniens implet. Coitus  
 uerno fit æquinoctio: atque hoc tēpore horum sceturæ initium admissio-  
 nis facere oportet ad solstitium, ut partus idoneo tempore fiat: duodecimo  
 enim mense, die decimo aiunt nasci. Qui uero post solstitium partus edun-  
 tur, uitiosi & inutiles existunt, ut Apſyrus docuit. Equos autem pretiosos,  
 reliquo tempore anni remouere oportet à sceminis, ne aut eum uolent in-  
 cant, aut si id facere prohibeantur, cupidine sollicitati noxam contrahant.  
 Equas autem domitas LX diebus equire ante quàm gregales inuenimus. F  
 Coitus tempore equi equos mordent, & prosternunt equitem quoque. In-  
 cenduntur libidine sceminarum equæ potissimum, uti diximus: quæ tem-  
 pore coitus colligunt sese, & societate magis quàm antea gaudent. Caudâ  
 mouent erebrius, uocemque immutant. mingunt etiam pluries, atque in-  
 ter se ludunt. Nec dubium, quin aliquot regionibus tanto flagrent ardore  
 coeundi scemina, ut etiam si marem non habeant, assidua & nimia cupi-  
 ditate figurantes sibi ipsæ uenerem (cohortalium more auium) uento con-  
 cipiant. Fert uterum equa menses undecim: parit duodecimo mense, ut di-  
 ctum est. Pariunt equæ magna ex parte singulos: sed gemellos quoque ali-  
 quando, cum plurimum, procreant. Abortum etiam facit equa odorē sen-  
 tiens ellychnij lucernę extinctę, quod & mulierum nonnullis accidit. In hoc G  
 genere grauida stans parit: præterque cæteras scetum diligit. Quod hippo- 3  
 manes uocant, ueluti caruncula est, & hæret quidem fronti nascentis pulli,  
 ut narratur, caricæ magnitudine, colore nigro: sed equæ perlambentes abs-  
 tergentesque id abrodunt: alioqui partum ad ubera non admittunt. Non  
 statim à partu equa impleri debet, sed intermisso tempore: & melius quar-  
 to aut quinto anno interposito procreat, ut Aristoteli uisum est. Omnino  
 si nihil plus detur, unum tamen interponere annum, & quasi nouale face-  
 re necesse est. Alternis, inquit Varro, qui admittunt, diuturniores equos &  
 meliores pullos fieri dicunt: itaque ut restibiles segetes essent exuctiores, sic  
 quotannis quæ prægnans fiat. Et Columella, uulgarī inquit, sceminę solen-  
 ne est omnibus annis parere: generosam conuenit alternis continere, quo H  
 firmior pullus lacte materno laboribus certaminum præparetur: mammas  
 nanque pullis equæ anno prope toto præbent. Fruge herbæque uescuntur  
 equi, sed maxime potu pinguescunt: ut alia enim iumenta, ita & equi pro  
 aquæ quam bibunt usu, suo fruuntur pabulo: & qui minus potum asperna-  
 tur, is appetentior pabuli est. Gaudent pratis & paludibus. Aquam quoque  
 turbulentam & crassam suauius bibunt: quod si clara est, pede eam intur-  
 bant. Bibunt autem equi sorbendo: & quo quis acrior, in bibendo profun-  
 dius nares mergit. Equos castrare quibusdam in more est, ut Scythicis Sar-  
 maticisque gentibus: quibus equi parui sunt, acresque ualde, neque adeo tra-  
 ctabiles: demptis enim testiculis, hunt quietiores: & canterij appellantur,  
 ut in

*Hippomanes.*

*Canterij.*

- Aut in suibus, maiales, & in gallis gallinaceis, capi. Equorum gregales morbo immunes sunt, excepta podagra: hoc enim uno laborant, & pierunque ob id ungues amittunt: sed amissis alij statim renascuntur: fit enim ut altero subnascente ungue, alter amittatur. At uero equi domestici morbis plurimis obnoxij sunt: adeo ut homines usu periti totidem fere morbis equum infestari, quot hominem referant. Equinum pecus tripartito diuiditur, uti Columella prodidit: est enim generosa materies, quæ circo sacrifq; certaminibus equos præbet: est mularis, quæ pretio fœtus sui comparatur generoso: est & uulgaris, quæ mediocres fœminas marisq; prognerat. At Varro ita distinguit: equi, quod alij sunt idonei ad rem militarem, alij ad uenturam, alij ad admissuram, alij ad cursuram, alij ad prædam: itaque peritus belli alios eligit, atque alit ac docet: aliter quadrigarius ac defultor: neque idem qui uectarios facere uult, neque eodem modo paratur ad ephippium ut ad prædam: quo ut ad rem militarem, quod ibi ad castra habere uolunt acres: sic contra in uitiis habere malunt placidos: propter quod discrimen, maxime institutum, ut castrentur equi. Quales autem equos maxime legi oporteat, his præcipue signis intelligitur. Cum natus est pullus, confestim licet indolem æstimare, si hilaris, si intrepidus, si neque conspectu, nouæque rei auditu terretur, si ante gregem procurrit, si lasciuiæ & alacritate, interdum & cursu certans, æquales exuperat, si fossam sine cunctatione transilit, pontemque flumenque transcendit. Hæc erunt honesti animi documenta. Corporis uero forma constabit exiguo capite, nigris oculis, naribus patulis, breuib; auriculis & arrectis, ceruice molli latæque nec longa: præterea quæ non porrecta sit, ut suis, sed intro flectatur gallinaceorum more, densa iuba & per dextram partem profusa, lato & musculorum toris numero pectore, grandibus armis & rectis, lateribus proceris & ad uentrē inflexis: spina duplici, uentre substricto, testibus patibus & exiguis, latis lumbis & decursum uersum pressis, cauda longa & letosa crispâq; mollibus atque altis rectisque cruribus, tereti genu paruoque, neque introitus spectati, rotundis clunibus, fœminibus torosis, tibiis excarnibus, duris ungulis, & altis, & concauis rotundisque, quibus coronæ mediocres superpositæ sunt. Sic uniuersum corpus compositum, ut sit græde, sublime, erectum, ab aspectu quoque agile, & ex longo, quantum figura permittit, rotundum, & toto corpore uenas habeat, quæ animaduerti possint: quod qui huiusmodi sit, & cum est æger, ad medendum est appositus. Quod ad colores attinet, hæc tradit Vergilius, -Honesti
- Spadices glaucique: color deterrimus albis  
Et giluo.
- Hæc eadem in equabus consideranda sunt: & maxime, ut sint longi & magni uentris & corporis. De stirpe magni intetrest, qua sint: quod genera sunt multa. Itaque ad hoc nobiles à regionibus dicuntur, ut in Græcia Thesalici equi, in Italia, Apuli. Sed Cappadocia ante alias alitrix equorum, & prouentui equino accommodatissima est. In Hispania Galetica gens est, & Asturica. Equini generis hic sunt, quos thieldones uocamus. minori for-

*Gregales, & æp  
Bædæ*

*Equum gene-  
rosus.*

*Equus mularis.*

*Equus uulgaris.*

*De coloris uari-  
etate in equis  
plura legas a-  
pud Palladium.*

*Thieldontes*

*Alías, minori fama.* ma appellatos asturcones gignunt, quibus non vulgaris in cursu gradus, **E**  
*Asturcones.* sed mollis alterno crurū explicatu glomeratio: unde equis tolutum capere  
*Equi Celtiberie.* incurfus traditur arte. Celtiberorum equi corporis agilitate pernicitatē-  
*Vario cinerōne, & Jolpo.* que reliquos facile superāt, Parthicorum maxime similes. Hi in Celtiberia  
*Equi Maotici.* quidem colore spectantur uario cinerōue: in alieno uero solo colorē mu-  
*Equi Indici.* tare solent, ut Possidonius author est. Circa Maotim paludem pusilli gi-  
 gnuntur equi: sunt enim loca hæc impense frigida. Apud Indos Pyllos arie  
 tibus non maiores equi gignuntur. Terram quoque Indiā equos uno cor-  
 nu præditos procreare ferunt: quorum è cornibus pocula conficiuntur, in  
 quæ mortiferum uenenum coniectū si quis biberit, nihil graue, quòd cor-  
 nu repellat malum, perpetietur. De Lybicus equis hæc feruntur: equorum  
 uelocissimos esse, nullo laboris sensu affici, ex habitus gracilitate macilen- **F**  
 tos esse, totōsque ex sese aptos ad fortissime sustinendam dominorum ne-  
 gligentiam: pabulum enim dominos eis nec largiri, nec eos cum laboraue-  
 rint strigile perfricare, nec eis cubilia substernere, nec ungulas expurgare:  
 sed simul atque iter institutum confecerunt, ex equis dissilientes, hos ad pa-  
 stiones dimittere. Lac equinum, cum à camelino discesseris, liquidissimū  
*Hippacē.* omnium est, minimūque in se pingue habet. Caseum equinū, hippacem  
 uocant alij: Sextius eisdē effectus equino, quos bubulo tradit. Hippacē a-  
 lij coagululum equinum dixere: hæc dysentericis celiacisque prodesse scri-  
 psere nonnulli. Lichenēs uocantur in equorum genibus & prope ungulas  
 indurati calli, in earum partium flexu nati: hi triti & ex aceto poti comi- **G**  
 talibus morbis mederi traduntur. Sunt qui eos & ad cuiusvis feræ mor-  
 tum exhiberi cōsulant. Damnatur equinum fel inter uenena, ut Plinius re-  
*Equū felle o-* fert. Quin & sanguis eorum septicam uim habere traditur: item equarum  
*minimo carere* præterquam uirginū, erodere, emarginare ulcera. De equis feris pauca sci-  
*tradit Aristo.* pserunt Graci, quoniā tetræ illæ non gignebāt: Hispania multos. Ad Hip-  
*Equi feri.* panim fluuium sunt equi feri candidi. In Æthiopū terris ultimis & deuīs,  
 ferorum equorum non parua natio duobus dentibus acutis & uenenatis  
 prædita uersatur: quibus non perpetua pedum ungula, sed similiter ut cer-  
 uorum bifida est. iuba per mediam spinam ad extremam usque caudā per-  
 tinet. Ac si quando eos positis laqueorum insidiis Indi cōprehensos in ser-  
 uitutem redigere uelint, abstinent se cibo & potione, quòd seruiendi indi-  
*Paphagus.* gnitatē acerbissime ferant. Dimidio quàm equus maior paphagus est, ani- **H**  
 mal Indicū, spississima cauda & nigerissima: humani pili subtilitatē eius sete  
 uincunt. Ad bina cubita singula ipsius setæ longitudine procedunt: ex una  
 radice triginta simul exoriuntur. Omnium animalium timidissimus est pæ-  
*Alces.* phagus. Septentrio fert & equorum greges ferorum: præterea alcem iumē-  
 to similem, ni proceritas auriū & ceruicis distinguat: quibus in rebus mu-  
 lo comparanda est: adeo propenso labro superiore, ut nisi recedens in poste-  
 riora uestigia pasci non queat, ne in priora tendens labrū inuoluatur. Scan-  
*Machlis.* dinania insula è regione Germaniæ mittit animal quale alces, in hoc orbe  
 nunquam uisum, multis tamen narratum, machlin nomine. Huic suffragi-  
 nes ut elephantis flecti nequeunt: propterea non cubat cum dormiendum  
 est:

A est: tamē somnolentū arbor sustinet, quæ prope casura secatur, ut fera, dum assuetis fulcimentis innititur, faciat ruinam: ita capitur, alioqui difficile est eam manu capi: nam in illo rigore poplitum, incomprehensibili fuga pollet. Sunt in Hercynia sylva, ut Cæsar author est, quæ appellantur alces. Harum est consimilis capris figura, & uarietas pellium: sed magnitudine paulo antecedunt: mutilæque sunt cornibus: & crura sine nodis articulisque habent. Neque quietis causa procumbunt: neque si quo afflicta casu cōciderint, erigere sese aut subleuare possunt. His sunt arbores pro cubilibus: ad eas se applicant: atque ita paulum modo reclinatæ quietem capiunt: quarū ex uestigiis cum est animaduersum à uenatoribus, quod se recipere consueuerint, omnes eo loco aut ab radicibus subruunt, aut incidunt arbores, tantum ut summa species earum stantium relinquatur. huc cum se consuetudine reclinauerint, infirmas arbores pondere affligunt, atque unà ipsæ cōcidunt. Equos pennatos & cornibus armatos, quos pegafos uocant, Æthiopia generat. ut uero alij referūt, ales est pegafus: & hæc ales equinum nihil præter aures habet.

*Alces.  
An eadem sit  
cū machl, an  
diuersa:*

*Pegafus.*

1 Intra sextum annum molares superiores cadunt, inquit Columella: Aristoteles uero, Maxillares nullum animal mutat. 2 Viuunt equi, inquit Plinius, annis quidem quinquagenis: fœminæ minore spatio. 3 Ut Theocritus scribit, *ἵπποι μάλιστα φέρειν ἔτι πέντε ἀνέτην, τὴν δὲ ὡς ἑπτὰ τοῖς ἀνδράσι, καὶ πέντε τοῖς μάστιγι τοῖς ἀνδράσι καὶ πέντε τοῖς ἵπποις*: ut uero Cratenas, fructum fert planta ficui similē, sed nigriorem, folium papaueris, sed spinosum. Sed φέρει forsan dixit Theocritus quasi φέρμα, id est tuberculū quod in pulli frōte nascatur, uti sentit etiam Aristoteles. 4 Morborum signa & curationum genera C à medicinarum ueterinararum scriptoribus perquirenda sunt: nonnulla quidē ab Aristotele: plura uero à Columella, Vegetio & aliis qui medicinam tradidere ueterinariam. 5 Quæ sint in equo maxime uituperanda docet Pollux lib. 1. ubi & notæ etiam habentur generosi equi. 6 Regiones in quibus nobilissimi procreantur equi, ostendūtur præcipue ab Oppiano De uenatione lib. 1. & Gratio atque Strabone. 7 Equos pennatos. Monstro simile, uel monstrum potius hoc uocauit Plinius: & fabulosum arbitrat. Apuleius lib. 8 De asin. Meū ipse reputabam pegasum inclytum, illū morum magis uolaticum fuisse, ac per hoc merito pennatum proditum, dum in altum & adusque cælum subfilit ac refultat, formidans scilicet igniferæ morsum chimæræ.

De asino.

Cap. CII.

D Vilem uulgarēque asellum rus omne tanquam maxime necessarium desiderat: nec sane iniuria: nam etiam eo rure quod pascuo caret, contineri potest, exiguo & qualicunque pabulo contentus: quippe cum non fruge solum & herba uescatur, sed uel foliis spinisque, uel perticis salignis alitur, uel obiecto fasce sarmentorum: paleis uero, quibus pene omnes regiones abundant, etiam gliscit, sed potu maxime: tum imprudentis custodis negligētiam fortissime sustinet, plagarum & penuriæ tolerantissimus: laboris etiam & famis maxime patiens, raro morbis afficitur. Huius animalis tam exigua tutela, plurima & necessaria opera supra portionē respondent: cum & facilem terram leuibus aratris poscindat, & nō nimio pōdere uehicula trahat: & pleraque utēilia & uehere in urbem, & reportare collo uel dorso commode possit. Iam uero molarum & conficiendi frumenti pe-

*Asinus,  
Asellus, onos.*

ne solennis est huius pecoris labor. Frigidum animal asinus est, inquit Ari- E  
 stoteles: quamobrem locis frigidis gigni non potest, utpote sua natura ma-  
 xime impatiens frigoris: quapropter Pontica & Scythica terra asinus caret.  
 Dentes priores, ut equus, tricesimo mense amittit asinus: proximos autem  
 sexto postea mense, atque etiam tertios quartósque eodem modo. In asini  
 cauda, caulis longior est quàm in equis. Cor habet pro corporis ratione ma-  
 gnum: & selle caret: sanguinem habet nigerrimum & crassissimū. Asinus  
 tam mas quàm femina tricesimo mense coire incipit: sed magna ex parte  
 nequeunt generare. Partus tamen à trimatu legitimus est: quanquam iam  
 uel anniculam uetrem gessisse asellam aiunt, ita ut quod pepererat educari  
 ac perfici potuerit. Mulis tamē procreandis minor trimo, aut maior decēni  
 non debet admitti. Reiciit semen à coitu, nisi si interpellatur asina: quāob- F  
 rem ne id faciat, statim post coitum uerberant insectanturq;. Totidem pa-  
 riunt quot equæ, & eisdem mensibus, & simili modo. Parit nanque asina  
 duodecimo mense: & singularē magna ex parte gignit prolem: nonnunquā  
 etiā, sed raro, gemellos edit. Paritura lucē fugit, & tenebras querit, ne cōspi-  
 ciatur ab homine. Cum uel equus cū asina uel asinus cū equa coierit, multo  
 magis abortus cōsequitur, q̃ cū unigenæ inter se iūgūtur: uerbi gratia, equa  
 cum equo, aut asina cum asino. Euenit etiam tempus gerendi uteri maris  
 norma: id est ut quanto spatio temporis mas perficitur suo in genere, tanto  
 etiam fœtus, quē ipse procreat absoluitur. At magnitudine, corporis spe-  
 cie & uiribus magis feminæ quàm mari simile euadit quod nascitur. Si  
 frequenter coeant, neque ullo interposito tempore cessent, quæ ita iungun- G  
 tur, breui femina sterilefcit: alioqui uero parere tota uita potest asina. uita  
 autem asinis amplior annis triginta: & femina uiuacior mare est. Asinæ  
 pręgnantes, continuo lactescunt. Pullis earum, ubi pingue pabulū, biduo  
 à partu maternum lac gustasse, lethale est: genus mali uocatur colostratio.  
 Mammæ asinis à fœtu dolent: ideo sexto mense arcent partus, cum equæ  
 anno prope toto præbeant. Partus charitas summa, sed aquarum tædium  
 magis. Per ignes ad fœtus tendunt: eadem si riuus minimus intersit, hor-  
 rent, ita ut pedes omnino caueant tingere: nec nisi assuetos petant fontes,  
 qui sunt in pecuariis: atque ita ut sicco tramite ad potum eant: nec pontes  
 transcant, per raritatem earum translucentibus fluuiis. Mirūmq; dictū, si-  
 tiunt: & si immutentur aquæ, ut bibant cogendæ exorandęue sunt. Minor H  
 asellus maxime agro necessarius est, qui & laborem tolerat, (ut modo dixi-  
 mus) & custodis negligentiam propemodum non recusat. In hoc fere mu-  
 rinus color vulgaris est. Admissarius uero asinus & qui mularum generi  
 seminando destinatur, speciosior esse debet: ut scilicet amplioris sit corpo-  
 ris, ceruice ualida, robustis ac latis costis, pectore musculofo & uasto, fœ-  
 minibus lacertosis, cruribus cōpactis, coloris nigri uel maculosi: nā muri-  
 nus non optime respōdet in mula, ut Columellā uidetur: uerum Palladius  
 admissarium nigri uel murini maxime coloris aut rubei uult: qui tamen si  
 discolors pilos in palpebris aut auribus geret, colorem sobolis plerunque  
 uariabit. Sunt qui a minorum, ubi iam senuerint, carnibus uescantur: quæ  
 succum

*Etiā à bimatu  
 & semisse tra-  
 dit Aristote-  
 les.*

*Alias, exone-  
 randæ sunt.  
 Minor asellus*

*Admissarius  
 asellus.*

- A succum procreant deterrimum. concoctu sunt difficillimæ, stomachoque  
 3 noxiæ, & gustui quoque insuaues. Lac asininum serosi humoris plus habet quàm caleosi: estque consistentia tenui: & secundum camelinum equinumque liquidissimum ac minime pingue. In ventre minime omnium coagulatur, & quoquo uersus ocyslime in corpus digeritur: ac proinde sicca uentriculi toriulque corporis intemperie laborantibus utile est. & bibitur ab imbecillitate uires colligētibus, quos atrophos uocāt: & ut nōnullis placet, in febris etiam, quæ careat dolore capitis. Pueris ante cibum lactis asinini heminam dari, aut si in exitu cibi rosiones sentirent, antiqui in arcanis habuerunt: si hoc non esset, habuerunt è caprino. Asinino lacte poto uenena restinguuntur, peculiariter si hyoscyanum potum sit, aut lepus marinus, aut opocarpalum, aut pharicon, aut dorycnium: & si coagulum aliqui nocuerit: nam id quoque uenenum est in prima lactis coagulatione. Sunt inter exempla qui lac asininum bibendo liberati sunt podagra chiragraue. Sed meminisse oportebit recenti utendum, aut nō multo postea tepelactō: nullum enim celerius euanescit. gargarizatur quoq; faucibus exulceratis utilissime. dentes collutos & gingiuas firmat. Cutem in facie erugari & tenerescere lacte asinino putant. Conferre aliquid & candori in mulierum cute existimatur. Poppea certe Domitij Neronis cōiunx quingētas per omnia secum fœtas trahens, balnearum etiam folio totum corpus illo lacte macerabat, extendi quoque cutem credens. Asini iecur assum comitialibus prodest: iciunis autem edendum est. Ossa asini contracta & decocta cōtra leporis marini uenenum dantur. Asinorum ungulas combustas, sunt qui comitalem curare morbum dicant, si assidue binis cochleariis bibantur: si oleo misceantur, strumas discutere: & ipsum cinerem aridum inspersum perniones sanare. Quæ ex asinis utilia esse diximus, eadē omnia
- C Onagris efficaciora: asinorum enim genera duo: unum mansuetum, ut sunt optimi ex Arcadia, & in Italia ex agro Reatino: alterum ferum quos uocāt onagros. In Phrygia & Lycaonia, in Asia quoq; & Africa sunt greges multi: nam similitudine quadam nomen urbanorum acceperunt. Est uero onager corpore ampliore, pulchriore specie, colore albicante, auribus proceris, nigra linea ueluti uitta per mediam spinam protensa. animal cursus uelocissimi: quod tamen ferocioribus beluis prædæ esse solet. Mares in hoc genere singuli fœminarum gregibus imperitant: quos & sua sponte sequuntur ad pascua, ad fontes, denique quocunque duxerint. Timent mares libidininos æmulos: & ideo grauidas custodiunt, & fœtum si fœmina sit fouent, morsuque natos mares castrant. Contrà grauidæ latebras petunt, & parere furto cupiunt, gaudētque copia libidinis. Onagri nō transeunt montem, qui Cappadociam à Cilicia diuidit. Onagri in Phrygia & Lycaonia præcipui: pullis eorum, ceu præstātibus sapore, Africa gloriatur, quos lalisiones appellant. Asinorum tylostestrium caro (quod ad alimenti bonitatem attinet) bouillæ, caprinæ & ouillæ comparatur, si ætate sint adhuc mediocres, ac bono corporis habitu. In solidipedum genere, unicorne asinus tantum
- 4 Indicus est. gerit sane medio sui capitis cornu fixum, quo taurorum more

Alia, furunculos, & γλυστρίαι.

Onagrus.  
Onagrus.  
ὄναγρος.  
ὄναγρος ἄγριος.  
Asinus tylostestris.

Lalisiones.

Asinus Indicus, ἰνδικὸς ὄνος.

generosissime pugnat: & talos quoque unus solipedū habet. Ex huius cornu pocula conficere Indos aiunt: nec ullis morbis eo die affici, quo ex huius generis poculo hauerint, neque ullis uenenis lædi, quæcunque nocendi gratia in potu dantur. Syluestrem asinum hunc uocat Philostratus, quem in Hyphasidis fluuij paludibus degere refert: alij uero syluestres asinos, equis magnitudine nihilo inferiores apud Indos in locis desertissimis nasci degerēque referunt, eosque reliquo corpore albos, capite uero purpureo, oculisque nigris esse: cornūque in fronte gerere, cuius superius puniceū, inferius album, mediū uero nigrum sit: atque non omnes quidem Indos, sed potentiores, cum tāquam armillis quibusdā brachia, sic cornua auro certis spatiiis ornantur, ex his ipsos bibere solere. Ex hoc cornu bibentem ab insaniabilibus morbis tutum fieri: neque cum conuulsionibus corripi, neque si faero morbo tentari, neque uenenis ullis ferunt: quinetiam si quid pestilens prius biberit, tum id euomere, tumque ad sanitatem redire. Asinos Indicos cornigeros Ctesias inquit, talis præditos esse, quos si quis confregerit, interiora quoque nigra deprehensurum esse. Horum fœminæ postquam pepererunt, patres circū pullos à partu recētes summa custodia uersantur. Cum à uenatoribus Indis inuaduntur, pullos suos adhuc ætate infirmos à tergo suo pascentes habent, atque pro iis pugnant: ac contra equites audēt uenire, eosque ferire. Tanto sane hi robore existunt, nihil iis ut obistere queat, quin statim & concidat & perdat: equorumque incurfu latera disceperūt ac lacerant, & uiscera dirūpunt: quo fit ut ad eos equi appropinquare ualde metuant. Carnes eorum, quod amarissimæ sint, haudquaquā esculentæ. G

1 Minor asellus, Hunc degerē & uulgarem asellum uocat Columella: dosuarium asellum Varro. 2 Quæ forma maxime probāda est in asino, qui ad mularum procreationem destinatur, ostendit Apſyrus in lib. ueterinario. 3 Crassissimum, inquit Plinius, lac asinæ est, ut coaguli uice utatur. 4 An idē sit cum eo, qui Æonius bos dictus est, aut bos Indicus: hunc Aelianus, ni fallor, etiam equum Indicū uocat.

*Equus Indicus.*

## De mulis.

## Cap. CIII.

*Mula.  
Mulus.  
Mulores.  
Opus.*

**M**uli nō suo pte genere ab radicibus, sed bigeneri & insititiij sunt: creatur enim ex equa & asino, uel onagro & equa. Neque ullū est in hoc pecore aut animo aut forma præstātius, quā quod seminat asinus: quāquam possit huic aliquatenus cōparari, quod progenerat onager: nisi quod indomitum & seruitio contumax syluestri more, strigosum patris proferret habitum: generantur enim ex equa & onagris mansuefactis. mule ueloces in cursu, duritia eximia pedum, uerum strigoso corpore, indomito animo, sed generoso. Vtiles etiam admissarij nascētur ex onagro & asina, & qui reliquos omnes antecellit. nam ubi asina & onagro natus, admittitur equæ per gradus infracta feritate, quicquid ex eo prouenit, paternam formam & modestiam, fortitudinem celeritatēq; auitam refert. Ad mularum generationem equas neque quadrimis minores, neque decēnibus maiores legunt. Mulorum genus totum sterile est, neque omnino fœcundum, sed infœcundum ad perfectam fœrtificationem. Concipere uero aliquando mula potest (quod iam factū est) sed enutrire atque in finem perducere non potest: H



A potest: mas generare interdum potest: quod autē procreat ginnus est, quod  
 1 scilicet mulus oblatus est: (nam ex equo & ex asino ginni proueniunt, cum conceptus in utero ægrotauit:) est enim ginnus idem quod metachærus in porcis, aut in homine pomilio. Mulus superuenire coiréque incipit, missis  
 primum dentibus: sed septennis implere potest: & cum equa coniunctus ginnum procreauit: post deinde superuenire non solet. Mula quoque iam  
 grauida facta est, uti modo diximus: sed non quoad perficeret atque ederet prolem. Quidam uero non dissimulandi authores, ut M. Varro, & ante cum Dionysius & Mago prodiderunt mularum sætus regionibus Africæ adeo  
 non prodigiosos haberi, ut tam familiares sint incolis partus earum, quam sint nobis equarum. Theophrastus quoque uulgo parere mulas in Cappadocia  
 B tradit: sed esse id animal sui generis. Vita mulis ad annos multos. Iam  
 scit quàm mas. Gignitur autem mula & ex equo & asina: sed effrenis & tar  
 2 ditatis indomitæ. Qui ex equo & asina concepti generantur mares, hinni  
 uocantur & hinnuli. Est autem Hinnus matri quidem per omnia simili-  
 or, minor quàm mulus corpore, plerunque rubicundior. Iubam & caudam  
 habet similem asini, aures tamen gerit equinas. Item in uentre est (ut equus)  
 menses duodecim. Hosce item ut equulos & educant & alunt: & ætatem  
 eorum ex dentibus cognoscunt. Ungularum muli uel mulæ cinis ex oleo  
 myrteo alopecias replet. Mulæ quas terra Syria fert, similitudine quadam  
 nomen accepere: quanquã non eadem qua mulæ specie continentur. Cocū  
 C enim & mutua generatione progenerant, & celeritate mulis præstant. In  
 India equarum & asinorum greges sunt: & asinos equæ facillime admit-  
 tunt, & rufos mulos pariunt, ad currendum præstantissimos: quos pedibus  
 captos ad Prasiorum regem adducunt. Ex iis, qui bimi capiuntur, domari  
 possunt: contra uetuli ab immanissimis & carniuoris feris nihil differunt.  
 Hæc de uniuerso quadrupedum uiui parorum genere satis dicta sunt.

- 1 Hinnum hunc uocat Plinius, id est paruulum mulum, nisi deprauatus sit codex.
- 2 Bardones etiam à nonnullis uocari hos scribit Hermolaus.

Ginnus.

Mulus, ἐγνός.

Mula, ὁ ὄν-  
λος ἐγνός.Mula Afri-  
cana.Mula Cappa-  
doces.

Hinnus.

Hinnulus.

Mula Syriaca

Mulus Indi-  
cus.

Hinnus.

Bardones.

# DE ANIMALIVM DIF- E

## FERENTIIS LIBER VI.

Continet ea quæ cortice integuntur, *φελιδωτα* à Græcis dicta, quadrupedes scilicet ouiparas & serpentes.

De quadrupedibus ouiparis. Cap. CIIII.

*Ouipara, ζο-  
τεια.*



Vadrupedes quæ sanguinem habent, eedém-  
que oua pariunt, (unde & ouiparæ dictæ  
sunt) omnes caput, collum, dorsum, prona F  
atque supina corporis possident: crura etiam  
priora posterioraque, & quod pectori pro-  
portionetur, modo uiuari generis. Sed cru-  
ra iis ex obliquo habentur annexa, & humi  
extensa: retróque flectuntur tum priora tum  
posteriora, paulo in latus uergentia. Et pedes  
hæc omnia in plures digitos habent discre-  
tos. Caudam quoque habent longiorem, exceptis paucis. Ad hæc omnibus  
iis sensus totidem quot cæteris quadrupedibus sunt. Oculos habent, &  
conniuent palpebra inferiore (nam superiorem non mouent) quemadmo-  
dum & aues: quanquam non more auium niçantur: sunt enim oculis du- G  
rioribus quàm aues. auriculis tamen hæc omnia carent, meatúsque tantū  
habent audiendi. Foramina item iis ante os sunt, sed non ita explanata, ut  
nares appellari possint, nisi spirandi officio. Et lingua quoque omnibus cō-  
spicua data est, (excepto quem Ægyptus fert crocodilo): sed quæ in parte  
maiore adhæret, & dura est atque inutilis ad uocis officium: quanquam ad  
saporum gustatum usui illis sit. Lacertis inter hæc lingua bifida est, sicuti  
serpentibus. Dētibz etiam serratis sunt omnia more piscium. Lingulam,  
quam *ωδονοστίδα* Græci uocant, superimpositam asperæ arteriæ non habēt,  
sed dum alimentum in gulam admittunt, meatum ipsum constringunt:  
atque ita efficitur, ut in pulmonem nihil delabatur. Māmis carent hæc: nec  
genitale aut testes foris obtinēt manifestos, sed intus conditos habent: nec H  
pilo, sed cortice, prope dixerim omnia, tecta sunt: sed alia præduro & testa-  
ceo, alia molliori. Pulmo in iis exiguus quidem & fungosus, & tamen bi-  
partitus est: & pars altera multum ab altera discissa est, ita ut binos habere  
pulmones uideantur. atque à singulari arteria partes in utrunque pulmo-  
nis latus duæ dependent, quemadmodum & in auibz conspiciamus. Qua-  
drupedum ouiparorum iecinora pallidiuscula sunt: nonnullorū etiam ui-  
tiata omnino, ut corpora quoque eorum prauum tēperamentum sortian-  
tur, ut rubetæ, & testudinis, & similia. Lien iis exiguus, ut propemodum  
sensum effugiat: rigidus quoque est & reni similis. Fellis etiam habent aut  
plus aut minus omnia. Renes autem & uesicam eorum nullū possidet, præ-  
ter te-

- A**ter testudinem. Testes iis dati sunt, non tamen qui foris pendeant, ut modo diximus, sed qui intus adhæreant lumbis, (quomodo etiam auibus habentur) uenulis admodum tenuibus circumdati. Meatus de singulis singuli pertinent, eodémque coeunt supra ostium excrementi, sicuti & in aliis ouiparis omnibus. isque meatus qui ex coitu amborum consistit, genitale est. Vuluæ ratio in iis eadem quæ in auibus est: enim uero ceruix una in imo & carnulentiore est: fissura autem & oua proxima septo tranuerso continentur. Ventris intestinorumque eadem ratio est, quæ in uiuiparis quadrupedibus utrinque dentatis: simplicem enim unumque habent ventrem aut canino aut suillo similem. Os aut saltem spinam pro suæ magnitudinis modo sortiuntur: maiora enim ossis naturam potius obtinet: minora spina potius in ossis uicem fulciuntur. Quadrupedes quæ oua pariunt eodem coeunt modo, quo ea quæ animal generant, mare scilicet superueniente, ut testudo tam aquatilis quàm terrestris. habent uero in quod meatus illi genitales contingant, & quo per coitum adhæreant: quibus autem uesica deest, (carent autem uesica præter testudinem omnes, ut dictum est) iis idem meatus sicco excremento, qui & semini pertinet foris: intusque iuxta alter habetur. Atque hæc quidem similiter tam in fœminis eorum quàm in maribus sunt. Fœminæ in iis (sicuti in cæteris ouiparis) maribus sunt maiores. Ortus iis uero quidem tempore agitur, sed coitus non tempore eodem: alia enim uerne, alia æstate, alia circa autumnum coeunt, utcunque singulis tempus sequens ad prolem commodius est. Oua edunt, maxima ex parte perfecta: quæ ut seruari possint, duro iam consent putamine oportet: sunt enim oua quandiu increscunt molliora. Eodem igitur modo sunt quadrupedum oua fere, quo auium, crusta dura intacta, & bicolora: & supra iuxta cinctum consistunt ut auium: & reliqua eadem tum intus tum extra eueniunt. Sed quadrupedum oua, ut ualidiora, tempore cōcoquantur: auium imbecilliora sunt, atque ob eam rem parentem incubantem desiderant, cū quadrupedum oua uel sine parentis incubitu tepore terræ cōcoquantur ac perficiantur: (hæc nanque fere omnia in terra pariunt.) nam si quæ quadrupedes ouiparæ frequentantes fouent, quæ ediderint oua, custodiæ gratia potius id faciunt. Huius generis omnia & pariunt in terra, & dormiunt uel in terra, uel si in aqua, rostrum ex humore extollentia spirandi causa.
- D**Vocem quidem emittunt, sed alia exilem & imbecillem, alia perexiguum sibilum. Ranis sua uox quædam est. Omniuorū hoc genus est: nam & carnem edit & herbam. Conduntur hæc hyeme fere, & mensibus quatuor frigidissimis latent, nec per id tempus quicquam comedunt. Ex iis uero quæ cortice molliori (non præduro & testaceo, qualis est testudinum) intacta sunt, senectutem exuunt secessus sui tempore. Varia horum genera: in his maximum est crocodilus.

De crocodilis &amp; scinco.

Cap. CV.

**C**Rocodilus fluuiatilis (duo enim genera eorum) maximum animal ex parua origine euadit: ouum enim non maius quàm anseris, & fœ-

*Crocodylus* *ῥοκκοδῖλος*  
*κροκοδῖλος*  
*ῥοκκοδῖλος*

tus inde exclusus proportione est. Accrescit deinde, & magnitudine excedit duodeviginti cubita. Sunt qui cum tandiu augeri quandiu uiuat confirmant: uiuit autem diu. uitam habet terræ æmque communem. Oculi sunt illi suis, & uisus in aqua hebes, extra acerrimus. Vnum hoc animal superiori mobili maxilla imprimit morsum, (inferiorem enim habet immobilem:) aliàs terribile, peccinatim stipente se dentium serie. Sunt præterea dentes exerti magnique pro corporis ratione. Lingua tota inferiori annectitur maxillæ, quæ uix sentiri potest, parua adeo, ut non linguam, sed locum tantummodo linguæ habere putaueris. Crura habet à latere adiuncta, & in summa humo expansa: pedes admodum paruos, atque ad capiendum retinendumque inutiles. unguibus armatur robustis. cutis in tergo corticea contra omnes ictus inuicta, in uentre mollis tenuisque est. Parit F oua, quanta anseres, candida, circiter sexaginta, quæ terræ gremio committit, & sexaginta diebus incubat. Dies in terra agit, noctes aqua, teporis utrunque ratione: quatuorque menses hyemis, inedia semper transmittit in specu: uti uero alij narrant, sexaginta dies uentrem gerunt crocodili, sexaginta oua totidem diebus pariunt: totidemque dies hæc fouent. Sexaginta uertebras in spina habent, quam totidem neruis alligatam esse ferunt. Curatio partus ab eisdem sexaginta diebus peragitur. Annos uiuunt sexaginta: totidem dentes possident, totidem quotannis dies sine ullo cibo in latibulis quiescunt. Alij uero crocodilos dicunt cum in terra partum ediderint, obruere oua, deinde discedere: ita per se nascuntur & educantur. Crocodilum habent Nilus & Indus, quadrupes malum & humani corporis auidissimū. G Terribilis hæc contra fugaces belua est, fugax contra insequentes. Crocodilus in litore somno datus atque hiantibus, trochili aues inuolantes repurgant dentes, & intus fauces quoque: quo munere & ipsi aluntur, & crocodilus sentiens secum commode agi, nihil nocet: sed cum egredi auem uult, ceruices mouet ne comprimat. In hac quoque uoluptate nonnūquam crocodilum sorano pressum conspicatus ichneumō, per easdem fauces ut telū aliquod immissum, erodit aluum. Fluuiatiliū crocodilorum duo genera Ganges fluuius generat: horum alteri nihil nocent, alteri inexorabili atque immisericoꝛdi in quidlibet uoragine carniuori sunt: in eorum summo rostro quiddam tanquam cornu eminet. Crocodilus alter priori illi similis est, multum infra magnitudinem (qua chameleonti æquatur) in terra tantum, odoratissimisque floribus uiuit: ob id intestina eius diligenter exquiruntur iucundo nidore farta, crocodileam uocant: alij terrestres crocodili fimum crocodileam appellant. Crocodilum terrestrem sola fert Africa, ut auctor est Pausanias, qui & bicubitalem habet magnitudinem. Herodotus uero apud Ionas nasci crocodilos in sepibus murisue, à quorum similitudine Niloticos illos crocodilos nominari: quos & halitus odorésue multos uariósque edere prodidit. Crocodilea oculorū uitiiis utilissima fertur cū porri succo inuncta, & cōtra suffusiones & caligines. illita quoque ex oleo cyprino molestias in facie enascentes tollit: ex aqua uero morbos omnes quorum natura serpit in facie, nitorémque reddit. Lentigines tollit ac uaros,

*Crocodilus terrestris.*

*Crocodilea.*

H

**A**ros, omnésque maculas. & cōtra comitiales morbos bibitur ex aceto mulso binis obolis. appōita menses ciet. Optima est, quæ candidissima, & friabilis, & amyli modo minime ponderosa, in humore statim eliquefcens: cū teratur inter digitos, odore fermentescens. Felle inūctis oculis ex melle, cōtra suffusiones nihil utilius prædicāt. Intestinis & reliquo corpore eius suffiri uulua laborātes, salutare tradūt. Corij utriusq; crocodili cinis ex aceto illitus, iis partibus quas secari opus sit, aut nidor cremati, sensum omnem scalpelli aufert. Sanguis utriusque claritatem uisus inūctis donat, & cicatrices oculorū emendat. Corpus ipsum excepto capite pedibúsque elixum manditur ischiadicis. tussim ueterem emendat, præcipue in pueris: item lūborum dolores. Et adipem habent, quo tactus pilus defluit: hic perunctos

*Quibus modis  
adulteratur,  
explicat &  
Dioscorides,  
& Plinius.*

**B**à crocodilis tuetur, intillatúrque morsibus. Ex eadē similitudine est scincus, quem quidam terrestrem crocodilum sui generis esse dixerunt, candidiore autem & tenuiore cute: præcipua tamen differentia dinoscitur à crocodilo aquatico, squamarum seta à cauda ad caput uersa. Apud Nilum gignitur in Indiáque, & ad mare rubrum, atque in Lybiæ quoq; Mauritania. Maximus Indicus, deinde Arabicus: afferūtur falsi. Minor ichneumone est in Nilo natus scincus contra uenena præcipuum antidotum: item ad inflāmandam uirorum uenem: nam quæ circa renes sunt partes, ad pudendi erectionem bibuntur: ueneremque accendere ferunt, si drachmæ pondere ex uino bibantur. Et rostrum quoque eius & pedes in uino albo poti, cupiditates ueneris accendunt, utique cum sátyrio & erucæ semine singulis

*Scincus, ouly-  
xes.*

*Sale adseruā-  
tur cum na-  
sturtio. Diosco-  
rid.*

**C**drachmis omnium, ac piperis duabus admixtis: ita ut pastilli singularum drachmarum bibantur. per se laterum carnes obolis binis, cum myrrha & pipere pari modo potæ, efficaciores ad idem creduntur. Prodest & contra sagittas uenenatas, ut Apelles tradit, postea sumptus: in antidota quoq; nobilia additur. Sestius plusquam drachmæ pondere in uini hemina potum, perniciem asferre tradit: præterea eiusdem decoctum cum melle sumptum uenerem inhibere. Apelles author est, si ex melle uenonato syncero fastidiū cruditasque, quæ sit grauissima, incidat, scincum circuncisis pedibus, capite, cauda, decoctum, antidotū esse. Apud Indos nascitur bestia crocodili terrestri specie, magnitudine Melitenis canis: cuius pellis squamis adeo aspersis scætet, ut more ferræ æs dissecet, & ferrum excedat atque conficiat:

*Alias, prodest  
& contra sa-  
gittarū uene-  
na ante & po-  
stea sumptus.*

**D**Indi phartagen uocant.

*Phattage.*

1 Aristoteles & Herodotus, Accrescit ad decem & septem cubita: uel ut alij legunt apud Aristotelem, ad quindecim cubita. 2 Crocodilum. Herodot. Apud Nomadas Africae trium cubitorum magnitudine lacertis similitum.

De testudinum generibus.

Cap. CVI.

1 **G**eminus similiger uictus in aquis terræque & testudinum. Sunt autem testudinum genera, terrestres, marinæ, lutariæ, & quæ in dulci aqua uiuūt. Aristoteles tria prodidit genera: marinā terrestre & hæmyda, quam Plinius (opinor) lutariam uocat & murem marinum. Testudinum genera omnia à latere adiuncta habent, eadēque in obliquum flectūt, quemad-

*Testudo, ἡ-  
λύν.*

modum crocodili & lacertæ, & cortice integuntur duro rigidoque, & qui E  
 osse firmior sit. Testudinis iecur omnino uitiatum est, & totū corpus pra- 3  
 uum temperamentum sortitur, quemadmodum & ranæ rubetæ. Testudi-  
 ni marinæ lingua nulla manifesta nec dentes, sed rostri acie comminuit  
 omnia. Sunt enim rostri margines acuti, superna parte inferiorem claudē-  
 te pyxidum modo: & os habent robustissimum: quicquid nanque in os ce-  
 perint, siue lapidem siue quoduis aliud, perfringunt ac deuorant. Pulmonē 4  
 habet testudo marina carnosum & sanguineum, similem bubulo, sed mi-  
 norem quàm sit testudinis terrestris pro corporis ratione: at contrā, uescā  
 ampliorem. Renes etiam habet similes bubulis. Corde eius exempto, mo-  
 uetur tamen. In mari uiuunt conchiliis: habēt enim os robustissimum, uti  
 dictum est. Exeunt in terram, & pascunt herbam, & in herba pariunt oua F  
 auium cortalium ouis similia, ad centena numero: eāque defossa extra a-  
 quas & cooperta terra, ac pauca pectore & complanata incubāt noctibus:  
 & educant fœtus annuo spatio: quidam oculis spectando quoq; oua foue-  
 ri ab ijs putant. Fœminę coitum fugiunt, ob rigore asperitatēmq; genitalis  
 masculi: quocirca non aliter coire creduntur, quàm coactæ, & pugna à  
 maribus superatæ. Testudines tantæ magnitudinis Indicū mare emittere  
 fertur, ut singularum superficies habitabiles casas integant, & numerosam  
 familiam non arcte recepent, ut Solinus testatur, atque inter insulas rubri  
 maris his nauigēt cymbis. Troglodytæ cornigeras habēt, ut in lyra annexis  
 cornibus latis, sed immobilibus: quorū in natando remigio se adiuuāt: cel-  
 tinū genus id uocatur, eximia testudinis, sed raræ. Testudinis marinæ san- G  
 guis cum uino & leporino coagulo cuminoque cōtra serpentium morsus,  
 & hausta rubetæ uenena utiliter bibitur. Sanguine, alopeciarum inanitas,  
 & porrigi, omniāque capitis ulcera curantur: inarescere autem cum opor-  
 tet, lentēque ablui. Instillatur & dolori aurium cum lacte mulierum: co-  
 mitialibus instillatur ori, diductis labris, iis qui modice corripiantur: spa-  
 ssmo cum castoreo clystere infunditur. Quod si dētes per annum colluun-  
 tur testudinum sanguine, immunes à dolore fiunt. Marinæ testudinis fel  
 oculorum suffusionibus, albuginibus, & hebetudini medetur, claritatēmq;  
 oculorum facit, & cicatrices extenuat. Oculorum quoque uitia omnia fel  
 inunctum cum melle emendat: tōsillas sedat, & anginas, & omnia oris ui-  
 tia: priuatim nomas ibi: item ardentium testium. naribus illitum comi- H  
 tiales erigit attollitque. Marinarum testudinum carnes admixtæ ranarum  
 carnibus, contra salamandras præclare auxiliantur: neq; est testudine aliud  
 salamandræ aduersus. Terrestris testudo pulmonē habet pro corporis ra-  
 tione maiorem quàm marina: uescicam autem admodum exiguam: adeo  
 ut urinam earum (quæ ad remedia nonnunquā perquiritur) aliter quàm in  
 uescica dissecaruni inuenire difficile sit. Oua durioris testē & bicolora edit,  
 quale ouum auium est: eāque defossa & cooperta terra & cōplanata supra  
 incubat, crebrius repetens: fœtūque sequente anno excludit. Sunt testu-  
 dines tetrestres, quæ ob id in operibus chersinæ uocantur, in Africæ deser-  
 tis plurimæ, quæ parte maxime siccantibus arenis squalent, roscido, ut cre-  
 ditur,

*Testudo ma-  
rina.  
χιλὼν θη-  
λαυσία.*

*Testudines  
Indicæ.*

*Testudines  
cornigeræ.  
Alias, celtinū,  
nel celtinum,  
uel, ut Hermo-  
lao placet ce-  
letum.*

*Testudo ter-  
restris.  
χιλὼν χερ-  
σινία.*

*Chersinæ.*

A datur, humore uiuentes: neque ibi aliud animal prouenit. Testudinum putamina secare in laminas, lectosq; & repositoria his uestire Carbilius Polio instituit. Terrestrium testudinum carnes suffusionibus proprie, & contra uenena salutare produntur. Testudinis terrestris sanguinem epotum comitialibus prodesse tradunt plurima: in Africa uti modo diximus.

6 Hę ibi amputato capite pedibusque pro antidoto dari dicuntur: & ex iure in cibo sumptæ strumas discutere, ac lienes tollere: item comitiales morbos. Sanguis earum claritatem uisus facit, suffusionésque oculorum tollit: et contra serpentium omnium & araneorum, & similium, & ranarum uenena auxiliatur. sanguine seruato, & in farina pilulis factis, & cum opus sit in uino datis. Felle testudinum cum Attico melle glaucomata inungi pro-

B dest: & scorpionum plagę instillari. Tegumenti cinis uino & oleo subactus pedum rimas ulceraque sanat. Squamæ à summa parte derasæ, & in potu datæ, uenerem cohibent: eo magis hoc niurum, quoniam totius tegumenti farina accēdere traditur libidinem. Oua durata illinuntur strumis & ulceribus frigore aut adustione factis: sorbentur in stomachi doloribus. Aliqui sanguinem testudinum lethargicis illinunt. hydropicis medetur testudo, decisis pedibus, capite, cauda, & intestinis exemptis: reliqua carne ita cōdita, ut citra fastidium sumi possit. Testudinum est tertium genus in cœno & paludibus uiuentium, lutarium uocant: latitudo his in dorso pectori similis, nec conuexo incurua calice, ingrata uisu. Ex hac quoque aliqua contingunt auxilia: tres nanque in succensa sarmenta coniectæ diuidētibus se-

*Lethargicis illinunt. An hæc de altero testudinū genere dicantur. Testudo lutea.*

C tegumentis, rapiuntur: tum euulsæ carnes earum cōquuntur in aquæ congio, sale modice addito: ita decoctarū ad tertias partes succus paralyisin, & articulares morbos sentiētibus bibitur. Detrahit item fel pituitas, sanguinemque uitiatum: sistitur ab eo remedio alius aquæ frigidæ potu. Aristoteles *αἰμυδα* uocat, Plinius murem marinum. Hæc corticē (licet duriusculū) molliorem tamen habet quàm marina aut terrestris testudo: uelica & renibus uacat. Egressa hæc in terram, serobe effossa dolij forma, parit oua, quę deferit obruta terra, die tricesimo repetit: refoffa breui excludit, fertumq; continuo ducit in aquam. Cutē replet in alopeciis muris marini cinis cum oleo. Quartum testudinum genus est earum, quę sunt in amnis: has quidam è Græcis hæmydas appellant, longitudinis in India trium cubitorum.

*Mus marinus αἰμυς. Mus aquaticus.*

D Harum diuulsarum pinguium cum aizōo herba tusa, admixto unguento & semine lilij ante accessiones perunguntur ægri præter caput: mox cōuoluiti, calidam aquam bibunt, quartanis liberari dicuntur. Hanc testudinem quintadecima luna capi oportere, ut plus pinguium reperiat, uerum ægrum sextadecima luna perungi tradūt. Ex eodem genere testudinum sanguis instillatus crebro capitis dolores sedat, item strumas. Sunt qui testudinum sanguinem cultro arceo supinarum capitibus præcis excipi nouo fœteli iubeant: ignem sacrum cuiuscunque generis testudinum sanguine illini: item capitis ulcera manantia, & uerrucas. Idem promittunt testudinum omnium fimo pauos discuti.

*Testudo sinensis, χαλόν οστρακία. Hæmyda.*

*Testudines. Alias, crebos.*

1 Arrianus in rubri maris navigatione aliter enumerat quatuor testudinum ge-



λίμνη.  
Testudo.  
χιλών.

nera, ἀλυσανών: (hæc opinor marinā intelligit,) terrestrē albā & montanā, quæ maxima est, & cortice crassissimo. 2 Hæmyda, αἰμύδα: Aristoteles nūquā, quod meminerim, nomine testudinis appellat, imò porius distinguit, αἰμύδης πικρὴ χιλών: sed fere cum ipsis cōnumerat. 3 Hoc forsitan verū est de testudine marina: nā terrestrīū carnes ad remedia mādūrur. Testudinis etenim nomē apud Latinos, sicuti & χιλώνες apud Græcos, absq; ullo addido, quādoq; marinā, quādoq; terrestrē significat: ut apud Plin. lib. 11. cap. 17: & Aristorelē lib. 5 hist. animal. ca. 33. 4 Plinius (modo absit mēda) inquit: Testudo pulmonem quāvis prægrandē, & sub roto tegumento habeat, sine sanguine tamen habet: ut uero de terrestrī testudine intelligatur (ut mihi quidē uidetur) nō patitur contexus. 5 Vtriusque generis testudinū putamina in laminas secari ad opera, ut ad pocula aliāque uasa, perspicuum est ex Martiale in Apophoretis, de Gustatorio, Fœmineū nobis Cherſon si credis inesse, Deciperis: pelagi mascula præda sumus. Sunt apud Arrianū in rubri maris nauigatione (quæ ut opinor ad huiusmodi opera exquiruntur) testudines quædam quæ albæ dicuntur, maioribus corricibus: & aureæ, quæ reliquas facile superant. Sunt & ὀφθαί, id est montanæ testudines prægrandes & corrie crassissimo, cuius pars inferna, quæ & subrufa est, sectionem uix patitur. 6 Hæc ibi, Plinius: Si ex melle syncero fastidium cruditasque, quæ sit grauissima, incidat, testudinem circūcis pedibus, capite, cauda, decoctā, antidotū esse, author est Pelops.

Testudines  
albæ.  
Aureæ.  
ὀφθαί.  
Montanæ.

## De ranarum generibus.

## Cap. CVII.

Rana.  
Βατραχες.

Rana. Quadrupes est ex ouiparorum genere. Lingua ranis sui generis est: pars enim prior, quæ cæteris absoluta est, iis coheret eo modo quo piscium: intima uero absoluta ad guttur applicatur, qua suam uocem solent emit-tere. Et quidem genus illud ululatus, quam ololiginem nominant, mares intra aquam reddunt, ut cicant ad coitum fœminas: & flagrant tantisper oculi modo lucernæ, dum uociferantur. Coitum uero noctu magna ex parte agere uisuntur. Coitu superueniunt ranæ, prioribus pedibus alas fœminæ mare apprehendente, posterioribus clunes. fœtum emittunt suum continuo filo sibi coherentem. Pariunt minimas ueluti carnes nigras, quas gy- rinos uocant: oculis tamen & cauda insignes: mox pedes figurantur, cauda findente se in posteriores. Mirūmque, semestri uita resoluuntur in limum nullo cernente: & rursus uernis aquis renascuntur. Cyrenis mutæ fuere ranæ, illatis è continente uocalibus. durat genus earum. Mutæ sunt etiā nunc in Scripho insula: eadem aliò translata canunt: quod & accidere in lacu Thesaliæ Sicendo tradunt. Ranarum uaria sunt genera. Rana fluuiatilis 2 circa stagna riuosque uersatur. hæc sunt quæ apibus, ubi aequatum accessit: H- rint, insidiantur, & eas rapiunt. Iubent aliqui nascētium in aqua ranarum, quibus adhuc cauda est, in calice nouo combustarum cinerem, si per nares fluat sanguis, iniiciendum. Contra omnium reptilium uenena pro antidoto sunt ranæ, si ex sale & oleo decoctæ carnes earum edantur, iusue decoctarum sorbeat: profunt & contra inueteratos tendinū rigores. Hydro- picis quoque medentur ranæ aquaticæ in uino uetere & farre decoctæ, ac pro cibo sumptæ. Ignes sacros restinguunt ranarum uiuentium uentres impositi: pedibusque posterioribus adalligari iubent, ut crebriore anheliu profint. Ranæ uero in triuio decoctæ oleo, abiectis carnibus perunctos liberant quartanis. Decoquuntur ranæ singulæ in aceti heminis, ut dētes eo colluātur,

Ololigo, ὀλα-  
λίπη.

Cyreni.

Rana fluuiati.  
Rana aquatic.  
Rana uariata.  
Βατραχες πλ-  
ματιαι.  
Βατραχες λι-  
ματιαι.

Accolluantur, contineaturque in ore succus, dentium dolores sedat. Si fastidium obstaret, suspendebat pedibus posterioribus eas Salustius Dionysius, ut ex ore uirus deflueret in acetum feruens, idque è pluribus ranis. Fortioribus stomachis ex iure edendas dabat: maxillaresque; ita sanari dentes præcipue putant: mobiles uero supradicto aceto stabiliri. Ad hæc quidam ranarum corpora binarum præcis pedibus, in uini hemina macerant: & ita colui dentes labentes iubent: aliqui totas adalligari maxillis: alij denas in acceti sextariis tribus decoxere ad tertias partes, ut mobiles dentium stabilirent: alij iecur ranæ decoctum & tritum cum melle imposuere dentibus. Si carioli & fœtidi sunt, centum in furno arefieri per noctem præcipiunt: postea tantundem salis addi atque fricari. Pforas tollit rana decocta in heminis quinque aquæ marinæ: excoqui debet donec sit crassitudo mellis. Ranarum decoctarum ex aceto succus anginas illitus abolet: hic & contra tonsillas prodest. Insperpus earum cinis profluentis sanguinis impetum sistere fertur: cum liquida picce illitus sanare alopecias. Tussim sanare dicuntur piscium modo in iure decocta in patinis ranæ. Suspensæ autem pedibus, cum distillauerit in patinam salua earum, exenterari iubentur, abiectionisque interaneis cõdiri. Vermes ulceribus innati, ranarum felle tolluntur. Iecur ranæ geminum esse dicunt, obiciique formicis oportere: eam partem quam appetant contra omnia uenena esse pro antidoto. Ranarum adeps instillatus, statim dolores aurium tollit. Quæ βαρυνος ἔλκος à Græcis uocatur, & ἑλκος βαρυνος (quasi ranam palustrem dixcris) quibusdam aut idẽ cum phryno aut certe non dissimilis uidetur: atque ex utriusque ueneno eadem procreari symptomata feruntur: nempe corporis tumor cum colore admodum pallido, ut buxo similis appareat: spiritus angustia, oris fœtor, singultus: nõ nunquam & sua sponte inuitoque effluit semen. facile autem sanatur qui post uomitionem meraci uini plurimum ingesserit. Nicander uero & Aëtius hæc omnia fere ranæ mutæ tribuunt. At βαρυνος ἔλκος fumentibus, appetitus deiectionem, oris nimiam humectationem, nausæamque & frequentem uomitum, ac præterea affectionem quam ἑρυνός uocant: curari uero, ingesta uini copia unã cum aliis quæ uehemētius calfaciant. Phrynos, ut Aëtius prodidit, ranarum genus est, quod cum palustris uitæ conditionem in terrestrem mutauerit, ἑρυνός appellatur. Magnitudine testudinem parua æquat. Dorsum exasperat instatque; se irata & intumescit: adeo proterue audax ut in quodcunque aduersum ierit, insultet & quasi uindictet. Raro quidem mordet: uerum adeo uenenosum exsufflat, ut uel solo anhelitu officiat: hoc malum sequitur totius corporis tumor, ut quandoque rūpatur, ac breui intercat læsus. Phrynon Latini ranam rubetam uocant. Ranæ rubetæ, inquit Plinius, quarum & in terra & in humore est uita, plurimis refertæ medicaminibus, deponere ea quotidie ac resumere à passu dicuntur, uenena tantum sibi reseruantes. Sunt quæ in uepribus tantum uiuunt, ob id rubetarum nomine, quas Græci phrynos uocant, grandissimæ cunctarum, geminis ueluti cornibus, plenę ueneficiorum. Ranæ rubetæ hostis est buteo triorchisue: rapit nanque cum & exedit. Apes hoc modo in-

βαρυνος ἔλκος.  
ἑλκος βαρυνος.  
Rana palustris  
ἑρυνός.

ἑρυνός.

ἑρυνός.  
Rana rubetæ.

Rubetæ.  
ἑρυνός.

terimit rana rubeta: adrepens nāque foribus aluei insufflat, & deinde auo- E  
lantes obseruat ac deuorat. Nec sentire ictus apum ranæ traduntur. Rana  
rubetæ iecur omnino uitiatum est, & corpus denique totum prauum for-  
titur temperamentum, uenenosumque est. Ranarum rubetarum iecoris al-  
tera fibra à formicis non attingitur, propter uenenum, ut arbitrantur. Ti-  
maxus & Neocles medici rubetas dicūt bina iecora habere: & alterum qui-  
dem occidere, alterum alteri aduersantem salutem afferre. Ex iis ranis quæ  
in uepribustantum uiuunt, lien contra uenena quæ sūt ex ipsis, auxiliatur.  
cor uero etiam efficacius est. Mira de his alia certatim tradūt authores. Est  
phryni genus alterum φρύνης κωφός, id est rubeta muta, sine uoce est. Exitiosa 8  
hæc, in arundinetis roris linctū uicitat: ex qua uenenum quoque appa- 9  
tur. Huic eadem fere tribuunt Nicander & Aëtius, quæ alij ranæ palustri. F  
Est parua rana, inquit Plinius, in arundinetis & herbis maxime uiuēs, mu-  
ta ac sine uoce uiridis, si forte hauriatur, uentres boum distendens. Huius  
corporis humorem penicillis derafum claritatem oculis inunctis narrant  
afferre: ipsasque carnes doloribus oculorum superponunt. Huius ranæ par-  
uæ sanies efficacissime psilothrum est, si recens illinatur: & ipsa arefacta ac  
tusa, mox decocta tribus heminis ad tertias, uel in oleo decocta æreis ua-  
sis. Ranarum uiridium sanguine, inquit Dioscorides, palpebræ pili auulsi  
renasci prohibentur. Est rana parua arborem scandens, & ex ea uociferans,  
in huius os si quis expuat, ipsamque dimittat, tussi liberari dicitur. Pilos in-  
utiles in palpebris euulsos cohibent, quas dryphytas & calamitas uocant: 10  
sanguis earum cum lachryma uitæ si euulso pilo palpebris illinatur. uene- G  
rem concitat iecur ranæ dryophytes & calamitæ adalligatum. 3

φρύνης κωφός.

Rubeta muta.

Rana uiridis.

Penicillis, a-  
liàs specillis.Rana ex ar-  
bore uociferans.

Dryphytes.

Dryophytes.

Calamitas.

Geryni.

φρύνη λι-  
μναία.

Rana leuis.

Bufo.

φρύνης ἀσπί-  
δωνος, ἀσπίδων.

Diopetes.

1 Gyrinos, Gerynos uocat Nicander in Alexiphar. nisi menda subsit. 2 Ra-  
na fluuiatilis, φρύνη λιμναία uocat Nicander, quæ multum uociferatur, uerque ipsum  
iam aduentare primum denuntiat. 3 Βάτραχος λαός ex mendoso codice forsitan le-  
gerat Hermolaus, cum miratus ranam leuem inuenisse diceret apud Dioscoridem.

4 Si ingesto uino copioso euomat, inquit Nicander. 5 Quod os bilioso hu-  
more humectum sit refert Nicander de muta rubeta. 6 κερδογμία, & morsum o-  
ris uentriculi significat, & crebrum uelocemque cordis motum ac ueluti palpitationē:  
sed ex Nicandro uidetur hoc in loco stomachi affectionem significari. 7 Rubeta-  
rum, Bufo (ut opinor) huius est generis: de quo Vergil. Inuentusque e cauis bufo: hoc  
est rubeta terrestris maxima, ut interpretatur Seruius. 8 Nicander, φρύνης κωφός ἢ  
ἀσπίδωνος ἢ ἀσπίδωνος. 9 Roris linctū inter fruteta uiuere attribuit Nican-  
der alteri rubetarum generi, quod ἀσπίδωνος & ἀσπίδωνος cognominat, quasi æstiuam H  
dixeris: & quod colorem corpori uiridiorem inducit, qualis est thapsia: corpusque ip-  
sum calore incendit, cum anhelitus angustia orisque fetore: quæ fere Dioscorides &  
Paulus, illi quam ranam palustrem uocauimus, tribuunt. 10 Si quis, Hæc Diosco-  
rid. de ranis uiridibus. 11 Diophytes, Aliàs dyophytas diopetes.

De lacertis.

Cap. CVIII.

Lacerta.

Lacertina.

λαύρος.

λαύρος.

Q Vadrupes ouipara lacerta est, & crura gerit à latere adiuncta. Cortice  
quoque integitur, sed molliori, serpentum more. Linguam præterea  
ut serpentes longam habet & bifidam, & parte extrema, capil-  
lamenti tenuitate. Omnia denique habet membra serpētibus similia, si pes-  
des

**A**des iis demas, longitudinem addas. Complexu etiam simili serpētibz coit lacertarum genus: in iis marem intelligi dicunt, quod sub cauda unam cauernam habeat. Lacertā ore parere creditur uulgo: Aristoteles negat. Neque incubant, oblitæ quo sint in loco enixæ: quoniam huic animali nulla memoria. Itaque lacertarum oua sua sponte in terra aperiuntur: & catuli per se erumpunt. uitam eorum annum non complere, sed semestrem finire aiunt. Mensibus certe quatuor frigidissimis latent. Renasci lacertis caudas haud falsum est. Lacerti Arabiæ cubitales: in Lybiæ desertis binum cubitorum: in India uero in Nisa monte xxi in longitudine pedum, colore fului aut punicei aut cærulei. Lacertæ combustæ cum radice recentis arundinis (quæ, ut una cremari possit, findenda est:) itēque myrteo oleo permixto cineres, capillorum profluuiā continent. Efficacius uirides lacertæ omnia eadem præstant. Quidam denas uirides in x sextariis olei ueteris discoquunt, contenti semel in mēse ungere. Lacerti inueterati in os pēdentiū, addito sale confusi, & ab ictu læsas aures sanant: efficacissimæ autē ferrugineas maculas habentes, lineis etiam per caudā distinctæ. Lacertæ caput tritum & appositum prodidere nonnulli spicula extrahere: uertucas quoque, quas myrmecyæ & acrochordonas dicūt, clauōsque tollere. Iecur uero erosus dentibus impositum, eos à dolore liberare. Si dissecta apponatur, ictis à serpente prodeit.

*Lacerta uirides.*

*Ferrugineas maculas habentes lacertæ.*

1 *Χλωροσαῦρες* uocat Theocriti interpretes.

*Χλωροσαῦρες*

De salamandra & sepe quadrupede. Cap CIX.

**C****L**acerti species (ut Dioscoridi placet) salamādra est: lacerti quidem figura, sed aspera magis atque scabra: animal ignauū, & punctis ueluti stellis uariegatum: nunquam nisi magnis imbris proueniens, & serenitate deficiens. Nihil gignit: neque est in iis genus masculinū sœmineūmue, sicut neque in anguillis. Huic tantus rigor, ut ignem illæsus pertransire possit: ignemque tactum, ut aiunt, extinguere, nō alio modo quā glacies. Et omnino ad certum usque terminum ab igni nihil patitur: uritur autem, si longiore spatio igni sit admota: si nanque diutius in igne immoretur, effluētē absumptoque ex ea mucoso quodam frigido humore, exurit. Eius sanie saluāue, quæ lactea ore uomitur, quacunque parte corporis humani, uel in pede imo contacta, omnis in toto corpore defluit pilus: id quod contactum est colorem in utiliginem mutat. At si quem salamandra momorderit, dolor uehēmēs sequitur, & in uulnere ipso crusta. Inter omnia uenenata salamandræ scelus maximum est: cætera enim singulos feriunt, nec plures pariter interimunt: salamandra populos pariter necare improuidos potest. Nam si arbori irrepserit, omnia poma inficit ueneno: & eos qui ede rint, necat frigida ui, nihil aconito distans, inquit Plinius: quinimo si contacto ab ea ligno uel pede, crusta panis incoquatur, idem ueneficiū est: uel si in puteum cadat: tamen talis ac tanta uis ueneni, à quibusdā animalium, ut suis, manditur. Venenum eius extingui primum omnium ab iis quæ uescantur illa uerisimile est. Sestius uenere accendi cibo earum, si de-

*Salamandra.*

tractis interancis & pedibus & capite in melle seruentur, tradit: negatque E  
restingui ignem ab iis. Vim habet (ut Dioscorides author est) calfaciendi,  
exulcerandi & exedendi: additurque non aliter atque cātharis, in medica-  
menta quorum uis est erodere, & lepras abolere. Pilos euellit oleo lique-  
facta: exenterata, detractis pedibus & capite, in melle seruat ad eundem  
usum. Er combustæ quoq; salamandræ cinerem nonnulli septicis & lepri-  
cis pforicisque medicamentis admiscunt. Lacertæ quoque paræ similis est  
seps, quem alij chalcidem uocant, alij zignida, alij *σαῦρος χαλκιδικὴ*, id est la-  
certam chalcidicam.

*Seps.*  
*χάλ.*  
*Chalcis.*  
*Zignis.*  
*σαῦρος χαλ-*  
*κιδικὴ.*  
*Lacerta chal-*  
*cidica.*

Parua quidem serpens, sed qua non ulla eruentæ

Tantum mortis habet. Color illi serpentis quàm *πυλινος* ceci-

liámue dicunt. Si equum momorderit, aur interimit, aur uehementem do-  
lorem mouet: si hominem, rumor primum pellucidus ac ueluti splende-  
scens, & cum nigritia circa uulnus undique: sequitur postea membri pri-  
mum affecti, & rotius deinde corporis putrefactio. Lacerta chalcidica in ui  
no epota morsus suos sanare traditur.

1 Chalcis dicta est à uirgulis, quas in dorso habet xxi coloris: longitudinem habet  
octo palmorum: gignitur in Syria, Lybia & Cypro. Hæc Nicædri interpres: uetū quod  
de eius longitudine affertur, uerius fortasse est de sepe serpente, de quo infra.

De stellione.

Cap. CX.

*Stellio.*  
*Ascalabus.*  
*Ascalabotes.*  
*καλὶς τος.*  
*Galeotes.*

Lacertæ figura & stellio est, quem Græci ascalabum & ascalaboten uo-  
cant: alij coloten, alij galcoten:

Combibit os illi maculas: aptumque colori

Nomen habet, uariis stellatus corpore guttis:

Inque breuem formam, ne sit uis magna nocendi,

Contrahitur: paruâque minor mensura lacerta est.

Chamelconū stelliones quodammodo naturam habent, rore tantum ui-  
uentes, præterquam arancis: cum quibus pugnât, eosque deuorant. Cubile  
habet stellio in locis ostiorum fenestrarumque, aut cameris sepulchræ.  
Temporibus stasis se condunt stelliones: mensibus enim quatuor frigidis-  
simis latet in cauernis. Senectutem quoq; exuunt, ut angues: cāmque, protinus  
deuorant, ut Theophrastus author est, præripientes comitiali morbo  
remedia. Operæpretium est scire, quomodo præripiatur, cum exiit mē-  
brana hyberna, aliâs deuoranti eam: quoniam nullum animal fraudulētius  
inuidere homini tradunt. Obseruant cubile eius æstatibus: est autem in lo-  
cis ostiorum fenestrarumque, aut cameris sepulchræ, ut dictum est. Ibi  
uere incipiente fissis arundinibus rextas, opponunt casus, quarum angu-  
stia etiam gaudet, eò facilius exuens circumdatum torporem: sed eo dereli-  
cto non potest remeare. nihil ei remedio in commitialibus morbis præ-  
fertur epoto. Arbores scandit stellio, uel resupinus ingrediens. Coloris si-  
cuti & lacertis caudas renasci haud falsum. Colorē hostis asinus est: dormit  
enim colota in eius præsepi: & narē subiens asini, ne comedat impedit. In  
insulis Thraciæ uicinis frequens est. Pestiferos ferunt stelliones in Græcia:  
at in-

G

H

A at innocuos in Sicilia: Italiae tamen quibusdam locis morsus eorum exitiales sunt. Duo eorum genera: alterum stellionem transmarinum nominant: hunc Graeci coloten uocant; & ascaloboten, & galeoten. In Italia non nascitur: est enim hic plenus lentigine, & stridoris acerbi, & uescitur: quæ omnia à nostris stellionibus aliena sunt. Si quem stellio momorderit, locus affectus cum dolore assiduo liuescit. Stellionē dissectum scorpionum plagis nonnulli imposuere: & scorpio tritus stellionum ueneno aduersatur: fit enim & è stellionibus malum medicamentum: nam cum immortuus est in uino, faciem eorum qui biberint lentigine obducit: ob hoc in unguento necant eum insidiates pellicum formæ: remedium est oui luteū, & mel ac nitrum. & scorpionibus contrarius maxime inuicem stellio traditur, ut

B uisu quoque pauorem iis afferat, & torporem frigidi sudoris. Itaque in oleo putrefaciunt eum, & ita uulnera eo perungunt: quidam oleo eo spumā argenti decoquunt ad emplastri genus, arque illinunt. Hydroceticis stelliones mire prodesse traduntur, capite, pedibus interaneisque demptis: reliquum corpus inassatum, in cibo id sæpius datur. Comitialibus morbis stellionis transmarini cinis potus in aceto prodest; & tunica stellionis, quam, ut dictum est, eodem modo ut anguis exuit, pota: quidam & ipsum arundine exenteratum inueteratumque bibendum dedere: alij in cibo in ligneis uerubus inassatum. Mirum de stellionis cinere (si uerum est) in linamento inuolutum, in sinistra manu uenerem stimulare: si transferatur in dextrā, inhibere. Fel stellionum tritum in aqua mustelas congregare dicitur.

C

De chamæleone.

Cap. CXI.

C Hamæleo quoque & magnitudine & figura totius corporis lacertam plane representat: uel ut alij referunt, similis est magnitudine crocodilo terrestri, spinæ tantum acutiore curuatura, & caudæ amplitudine distans. Latera dorsum ducta uentri iunguntur, ut piscibus: & spina modo piscium eminet. Rostrum, ut in paruo sit, haud ablimile suillo: uel ut depinxit Aristoteles, rostrum simia: porcarie simillimum. Cauda prælonga in tenuitatem definens, & permultis implicata in se orbibus, lori modo. Elatior à terra est quàm lacerta: inflexus crurum perinde ut lacertæ, sed crura habet recta. Pedes singuli bipartito secantur: partemque talem inter se habent

D situm, qualem pollex ad manus reliquam partem obiectam: sed ipsæ etiā reliquæ partes paulotenus in digitos quosdam finduntur: uidelicet primores triplici fissura interius, duplici exterius: posteriores interius duplici, exterius triplici. Unguiculi iis adunci. Corpus asperum totum, ut cocodilo, oculi in recessu cauo intus recepti, prægrandes, rotundi, cute simili atque reliquum corpus obducti, media sui parte per quā exigua detecti quæ uideantur: quæ uidendi sedes nunquam cute operitur, nec pupillæ motu: sed totius oculi uersatione in orbem, mutationeque quoquò uersus aspiciunt quæ uelut. Color uariis, & in momento mutabilis: mutat namque suum colorem inflatus. Habet autem & nigrum colorem non longe dissimilem crocodilo, & pallidum, ut lacertæ, & maculis distinctum nigris, ut panthera. Et muta-

Stellio transmarinus.  
Colotes.  
Ascalabotes.  
Galeotes.

Chamæleo.  
Χαμαιλέων.

Paulotenus,  
ὡς ἡ εὐρυ.  
Solinus.  
Hamati unguis subtili aduncitate.

Pallidum,  
ὡς ὁ γ.



tur color subinde toto in corpore: redditque semper quencunque attingit, E  
 præter rubrum candidumque. Et oculi quoque concolores reliquo corpo-  
 ri redduntur: & cauda eundem colorem accipit. pallefcit cum moritur: de-  
 functusque eundem colorem feruat. Motus illi piger admodum ut testudi-  
 ni est. Gulam atque arteriam situ eodem continet, quo lacertæ. pulmonem  
 habet portione maximū. Carnem nusquam nisi in capite & maxillis, & ad  
 commissuram caudæ admodum exiguam possidet. Nec alibi sanguinem  
 quàm in corde & oculis, & loco à corde superiore, & uenulis hinc tenden-  
 tibus: uerū nec in iis quidem ulla copia, sed paucillum habetur sanguinis:  
 & omnium ouiparorum pedestrium maxime inopia sanguinis riget cha-  
 mæleo. Cerebrum paulo superius oculis positum est, & prope iis contiguū.  
 Cute autem exteriore detracta oculis, quiddam lucens, ueluti annulus æ-  
 neus tenuis, nullo palo interceptus cingit. Membranz in omnis fere corpo-  
 ris partes multæ ac ualidæ, longeq; firmiores, quàm in cæteris tēdunt. Dif-  
 fectus hic totus spirare præterea diu potest, motu admodum exiguo adhuc  
 circa cordis sedem extare. Et cum omnes corporis partes contrahit, tum  
 uel maxime costas cogere atque adducere potest: lienem conspicuum nus-  
 quam continet. Subit cauernas & latitat hyeme more lacertorum. Nullum  
 animal pauidius esse existimatur, & ideo uersicoloris esse demutationis.  
 Ipse celsus hianti semper ore, solus animalium nec cibo nec potu alitur: nec  
 alio quàm aëris alimento. Circa caprificos ferus, innoxius alioquin. Cha-  
 mæleontem gignit Africa, quanquam frequentiore India: per omnem  
 quoque Asiam plurimus est. Impetibilis est coraci: à quo cum interfectus  
 est, uictorem suum perimit interemptus. Nam si uel modicum ales ex eo  
 ederit, ilico moritur. Sed corax habet præsidium ad medelam, natura ma-  
 num porrigente. Nam cum afflictum se intelligit, sumpta frōde laurea, re-  
 cuperat sanitatem. Vis eius maxima contra accipitrum genus: detrudere e-  
 nim supra uolantem ad se traditur: & uoluntarium præbere lacerandū cæ-  
 teris animalibus. Sanguine chamæleontis palpebras nudari pilis creditum  
 est. Hæc de quadrupedibus quarum generatio ex ouo est.

*Circa capri-  
 ficos id est mē-  
 se Iulio: uide  
 Claymōdi scho-  
 liam Plin.*

G

## De serpentibus.

## Cap. CXII.

Serpentum quoque genus, omnia fere corporis membra habet lacertis  
 proxima, si pedes iis demas, longitudinem addas: quippe quod intectū  
 cortice sit, & prona supināque perinde ut lacerti habeat. Serpentum itaque  
 genus animal est terrestre, sanguine præditum, quod pedibus ex natura ca-  
 ret, idēque intectum cortice est. Terrestris inquam: nam exigua serpen-  
 tum pars aquatilis est, scilicet fluminum incolæ, & quæ maris indigenæ ser-  
 pentes sunt terrestribus similes. Sensoria omnia simili modo hæc atque cæ-  
 tera etiam animalia habent: uerbi gratia, nares olfaciendi, oculos uidendi,  
 aures, audiendi sensorium: non tamen hæc eminent, quo modo ne auibus  
 quidem, sed foramina tantum habentur. Nec palpebram superiorem mo-  
 uent hæc animalia, ut ne aues quidem, sed inferiore coniuuent: quanquam  
 non auium more nictantur: sunt enim oculis durioribus quàm aues. De  
 anguibz

*Serpens.  
 Anguis,  
 Ovis.*



- A anguibz Thebanis perhibent Ægyptii, quòd cornua habent: extuberat enim ueluti uestigium cornus. Lingua serpentum tenuis, longa & atri coloris est: atque si extrahas, porrigi longius potest. Peculiare hoc præter cæterorum linguas, serpentibus & lacertis est, ut eorū lingua bifida sit, sed præcipue serpentium: quippe quæ tenuissimis quibusdam quasi capillamentis discreta uibretur. Dentes omnibus serrati sunt: sed duo in superna parte dextera leuāque longissimi, tenui fistula perforati, ut scorpionū aculei, uicenum infundentes. Quidam unum esse eum tradunt: & quia sit aduncus, resupinari cum momorderit: aliqui tunc decidere eum, rursusque recrescere, facilem decussu, & sine eo esse quos tractari cernamus. Lingula, quā *ἰσχυρὸς* uocant, arteriæ superpositam nō habent: sed meatum ipsum modo contrahunt, modo laxant pro sui commodi desiderio: atque ita efficitur ne quid ponderis in pulmonem delabatur. Serpentis collum proportionale potius colli uideri potest: siquidem capite & armis humerisue pars hæc describenda est. Proprium serpentibus præ cæteris cortice intectis est, ut caput uertere in auersum reliquo quiescente corpore ualeant. Angues circa Æthiopiam uolare narrantur, pennas habentes cutaneas & sine pedibus. Omnia etiam interna fere eadem serpentibus sunt, quæ lacertis: uerum omnia earum uiscera propter longitudinem & angustiam corporis longa arcuataque habentur: ita ut inter se dignosci præ suæ figuræ dissimilitudine uix queant: arteria nanque longa admodum est, atque etiam gula longior. Arteriæ origo ori proxima est: adeo ut sub ea lingua esse uideatur: & quidē C uidetur linguæ præminere, quoniam lingua contrahitur, neque eodem loco ut cæteris animalibus permanet. Speciem quoque uiscerū habent prolixiā, & cæteris animalibus dissimilem: cor enim arteriæ postremæ adhæret exiguum, sed longum & renum speciem referens. Pulmo deinde adnectitur simplex, fibrosis fistulis diuisus, prælongus, exiguus, fungosus, multumque à corde sepositus. Iecur item longum & simplex: sed lien exiguus rotundusque ut lacertis. Fel similiter atque in piscibus habetur: nam præter natricem, in omnibus fere intestino adnexus hæret. Neque uescicam habent neque renes, sicuti neque alia, quæ ouum pariunt. Ventriculum habent serpentes uelut intestinum amplius, canino similem: tum intestinum longum, tenue, & ad exitum usque uniforme. Serpētibz ueluti piscibus testes desunt & penis: sed meatus continent binos, qui de septo exorti, latus spinæ utrinque perrepent, coeantque superne iuxta spinam in unum: atque ita ad ostium excrementi finiunt. Pleni meatus ij humoris sætifici (*Σφοδρὸς* uocant Græci) redduntur tempore coitus: attritusque mutuo semen effluit genitale: candidum eodem modo quo de piscibus dicitur. Vulua bifida serpētibz omnibus fere tendit prolixior, modo corporis, exorsa inferius ab uno continua meatu, diducta utrinque in latus spinæ, quasi duplex meatus usque ad septum: in qua oua ordinatim gignuntur, & edi inde solēt. At uiperæ uni (quandoquidē animal edit, postquam intra se oua pepererit) uulua similis ut cartilagineis est. Serpentibus dorso spinam piscium more compleri apertum est: spinam enim in ossium loco continent. Costæ singulis tri

Arteria postrema, uelut in  
*ἰσχυρὸς*.

cenæ. Cauda serpentibus similiter atque lacertis amputatæ renascuntur. E  
 Vocem quidem emittunt serpentes, sed exilem, & ueluti longum sibilum.  
 Megasthenes scribit in India serpentes in tantam magnitudinem adolese-  
 re, ut solidos hauriant ceruos taurósque. Nota est in Punicis bellis ad flumē  
 Bagradam à Regulo imperatore, balistis tormētisq̃ue, ut oppidū aliquod,  
 expugnata serpens, cxx pedum longitudinis: pellis eius maxillæq̃ue usq;  
 ad bellum Numātinum durauere Romæ in templo. Mas serpens fœmina  
 minor est, uti in cæteris etiam ouiparis. Serpētum coitus complexu mutuo  
 supinarum partium agitur: & quidē serpentes ita conuolutē sibi cohærent,  
 ut unus serpētis bicipitis caput totum esse uideatur. Pariunt oua foris, ex-  
 cepta uipera omnes: non singulatim, sed ad monilis muliebris quod collū  
 ambit similitudinem: incubant, quæ pepererint in terra, & fœtum sequen- F  
 te excludunt anno. Anguem ex medulla hominis spinæ gigni accepimus à  
 multis, inquit Plinius. Serpentes cum natant, eodem modo natant quo re- 4  
 punt, hoc est flexuosis impulsibus. Serpētum genus omniuorum est: nam  
 & carnem edunt & herbam. Serpētes omnium maxime animalium cupe-  
 diæ deditæ sunt: sed desiderium iis bibendi exiguum, sicuti & reliquis, qui-  
 bus pulmo fungosus est. Vini incontinētes sunt serpentes: proinde uiperas  
 aliqui uino in fœtibus uasis ad sepes disposito uenātur: ebriæ enim capiū-  
 tur, cum alioqui exiguo indigeāt potu, ut diximus. eēdem minimo & pene  
 nullo cibo cū adseruantur inclusæ: sed cum serpentes carniuoræ sint, quic-  
 quid ceperint, succo exucto intus in uentre (non foris quemadmodum a-  
 ranei) reliquum totum per meatum sui secessus emittunt. Accipit serpens G  
 undelibet quod datur, siue auis siue belua est. oua etiam deuorat: sed cū ac-  
 cepit, reducit, & usque eo retractat, quoad partem nactus extremam ē dire-  
 cto constituat: tum colligit se, in breuēque contrahit, ut quod ori inditum  
 supra est, in imum extento corpore facilius deducatur: quod propterea ita  
 facit, quia gulam angustam habet & longā. Diu etiam serpentes uiuere pos-  
 sunt sine cibo. Condūtur serpentes hyeme sub terra aut saxis aut in arborū  
 saxorumue cauis: & omnes secessus tempore, ueneno orbē dormiunt. Se-  
 neſcitutem exuunt serpentes, tum uere post latibula cum egrediuntur, tum  
 etiā autumno. Cum serpens exuere incipit, ab oculis primum detrahi aiūt,  
 ita ut obſcari uideatur iis, qui rem non intelligunt. tū caput exiit: gla-  
 brum enim hoc omnium, antequā reliquum corpus apparet: atq; una fere H  
 nocte & die senectus tota exiit, à capite orſa ad caudam: ciuſque quod  
 exiit, quod internum erat fit externum. Serpētum frigori hedera gra-  
 tiſſima est, ut mirū sit illā in honore habitā: contrā, fraxinus adeo serpētē  
 fugat, ut ne matutinas quidē occidentēsue umbras, quanuis sint longiſſi-  
 mæ, serpens arboris eius attingat. Experta prodimus, inquit Plinius, si frō-  
 de ea gyro claudatur ignis & serpens, in ignes potius quā in fraxinum su-  
 gere serpētem. Serpētes omnes natura frigidæ sunt: ac proinde in æſtuo-  
 ris locis sunt grandiores: ubi & aliquanto magis pestiferæ gignūtur. at Ita-  
 lia frigidiorēque regiones, hac quoque parte salubritatem habēt, quod mi-  
 nus terribiles angues edunt. uenenorum similiter maxima pars frigore in-  
 terimit,

Aterimit, tam ictu quàm potu. Sunt tamen & uenenata nonnulla, quæ su-  
ardorem inferant. nec aliud uenenum esse quàm fel serpentium diligen-  
tissimi quidam authores scribunt. Venenum autem anguium magis mi-  
núsue perniciosum ex eorum pastu cuadit: id quod maxime manifestũ est  
ex uiperis, quæ in Arabia inter balsami frutices, & ex earundem lachryma  
uiuunt: morsum nanque eorum minime timent ij qui balsamum colligunt:  
nullum etenim ueneni periculum affert. Quibusdam in locis serpentes in-  
digenis innoxij sunt, aduenas interimunt. In Syria nanque angues circa Eu-  
phratis maxime ripas dormientes, Syros non attingunt: aut etiam si calca-  
ti momordere, non sentiunt maleficia: alios cuiusque gētis infesti auide &  
cum cruciatu exanimantes. In serpentum genere omnia magis exitialia, si  
B suum genus edere, antequam noceant. Illud præterea ignorare non oportet,  
omnis serpentis ictum, & iciuni & iciuno magis nocere: idè quod perni-  
ciosissimæ sunt cum incubant: utilissimũque est, ubi ex anguibz metus  
est, non ante progredi, quàm quis aliquid assumpsit. Venenum serpētis (ut  
quædam item uenatoria uenenata quibus Galli præcipue utuntur) nõ gu-  
stu sed uulnere nocet. nam seps, quæ & lacerta Chalcidica dicitur, in uino  
pota, morsus suos sanat. Quidam & uiperis utuntur in cibis. Et homini-  
bus contra serpentes inest uenenum: feruntque ictas salua ut feruentis a-  
quæ contactum fugere: quod si in fauces penetrauerit, etiã mori: idq; ma-  
xime humani iciuni oris. Nihil autem æque aduersari serpentibus ferunt,  
quàm cancos: suæque percussas, hoc pabulo sibi mederi: cum sol sit in can-  
C cro, torqueri serpentes. Anguibz in cibo sumptis anguillarũ modo len-  
des tolluntur: aut uernatione earũ quam exuunt pota. Anguis inueterati  
sufficit menstrua adiuuant. Membrana siue senectus anguium uernatione  
exuta in uino decocta, dolores aurium sanat infusa: & dentium dolores,  
si colluantur. Additur & in ocularia medicamēta, præsertim uiperina. Se-  
nectus serpentium feruente testa usta instillatur, rosaceo admixto contra  
omnia quidem aurium uitia efficax, sed contra graucolentiam præcipue:  
aut si purulentæ sunt, ex aceto: melius cum felle caprino uel bubulo aut te-  
studinis marinæ. uetustior anno eadem membrana non prodest, nec imbre  
perfusa, ut aliqui putant. Dentium dolores sedat anguinæ uernationis mē-  
brana cum oleo tædæque resina calefacta, & auri alterutri infusa. adiiciunt  
D aliqui thus & rosaceum: eadẽque cauis indita, ut sine molestia cadant,  
præstat. Phthiria sin à toto corpore pota membrana senectutis anguium tri-  
duo inhibet. Anguium senectus adalligata lumbis faciliores partus facit:  
protinus à puerperio remouenda. Dant & in uino bibendam cum thure:  
aliter sumpta abortum facit. ad canis rabidi morsum cum cancro maseu-  
lo trita illinitur: nam etiam per se reposita in arcis armariisq; tineas ne-  
cat. claritatem oculorum facit, si affricetur. Anguium adeps erugini mix-  
tus, ruptas oculorum partes sanat. Quoddam est ouorum genus in ma-  
gna Galliarum fama omissum à Græcis: angues innumeri ætate conuolu-  
ti saluiis faucibus, corporũque spumis artifice complexu glomerantur,  
anguium appellatur. Vidi equidem ouum, inquit Plinius, mali orbiculati

*Venenum an-  
guium.*

*Anguin, alias  
anonymum.*

modici magnitudine. ad uictorias litium, ac regum aditus mire laudatur E  
à magis.

1 Serpentis nomen Latinis (nifallor) nonnunquam significat terrestre animalcu  
lum omne, quod se non attollit ingressu, sed humi repit, etiam si quadrupes est, ut seps,  
salamandra uel etiā multipes, ut scorpio, scolopendra: præsertim si aut morsu aut ictu  
uenenum inferat. Plinius enim salamandram serpentem uocat: & sepa quoque, id est  
lacertam Chalcidicam. Cornelius Celsus scorpionem, araneum & phalangium inter  
serpentes numerat: (quanquam, ut Solino placet, scorpiones, scinci, lacertique, uer-  
mibus, non serpentibus adscribuntur.) Lucanus de sepe, patua modo serpens, dixit.

Vis iam etiā ser-  
pentes, inquit Plin-  
nius, asferunt pe-  
dibus.

Non cortice, sed  
cutē purā habere  
serpentes tra-  
dit Plin.

ἔρπονται.

ἔρπονται.

ἔρπονται.

Βασίλειον.

Serpens.

ὄφις, anguis.

ἔρπονται & ἔρπονται quoque, non ea solum quæ serpentum more repunt, significant, sed  
& alia quoque: ut quadrupedes paruas, quæ apud Aristotelem unguibus numerosio-  
ribus apprehendendo (quod fit quinis digitis, quos in posterioribus pedibus obtinēt)  
facilius obrepunt ad superiora. ἔρπονται καὶ βασίλειον distinxit Galenus: nam ἔρπονται pro-  
prie de serpentibus dicitur & uermibus, quibus pedes desunt: improprie etiam de pede-  
stribus omnibus quæ tardius repunt. Hæc Theocriti interpretes. Et diuus Basiliius ἔρ-  
πονται natatilia omnia uocauit, ut pisces, & alia quæ in aquis uiuant. Serpens nonnun-  
quam unam speciem significat. Plin. lib. 29 serpentis oculorum dextrum adalligatum  
contra epiphoras prodesse, si serpens uiua dimittatur. Nec aliter apud Græcos οὐρεῖς pro  
una specie, scilicet uisera accipitur: ut apud Oppianum de murenæ & serpentis coitu,  
id est uiperæ. Anguis generale non minus est, quàm serpens, ut apud Celsum lib. 5. Ser-  
pentium quoque morsus nō nimium distantem curationem desiderant, quanuis in ea  
multum antiqui uariarunt, ut in singula genera anguium singula medēdi genera præ-  
ciperent: atque aliis alia. Item illud ignorari non oportet, omnis serpentis ieiunium & ie-  
iunium magis nocere: utilissimumque est, ubi ex anguibus metus est, non ante  
progredi, quàm quis aliquid assumpserit. Et aliàs frequenter anguis unā etiam speciem  
significat, ut apud Plin. lib. 29 cap. 4. 2 Tenuissima serpentibus lingua, inquit  
Plinius, & trifurca, uibrans, atricoloris, & si extrahas, prælonga. 3 Serrati καὶ ὀφει-  
δοντες, uerus interpretes acuti, diuisi, coniuncti secundum serram. 4 Anguem, Plu-  
tarchus in Cleomene: & Ouid. lib. 15 metamorph. eadem tradunt. Ouid.

F

G

Sunt qui cum clauso putrefacta est spina sepulchro,  
Mutari credant humanas angue medullas.

De hydro, & aliis quibusdam serpentibus aquatilibus. Cap. CXIII.

Hydrys.  
Natrix.  
Chersydrus.

IN orbe terrarum pulcherrimū anguium genus est, quod in aqua uiuit:  
Hydri uocantur, nullis serpentium inferiores ueneno. Genus hoc nomen  
etiam chersydrni compositum inde sortitum est, quod primū in aquosis lo-  
cis degit, postea aridiora petit: quo etiam tempore uenenum illi nocentius  
inest: ut quod syncerius iam uenenum sit, minúsque alienis admixtum suc-  
cis, ac proinde atrocius redditur magisq; noxium: uerum in humore dum  
uiuit, non adeo purum habet uenenum: ex humidiorē nanque uictu alieni  
us temperatur luccis. Calabria chersydris frequentissima est: uti & Vergi-  
lius explicat:

H

Est etiam ille malus Calabris in saltibus anguis  
Squamea conuoluens sublato pectore terga,  
Atque notis longam maculosus grandibus aluum:  
Qui dum amnes ulli rumpuntur fontibus, & dum  
Vere madunt udo terræ ac pluuiatilibus austris,  
Stagna colit: ripisque habitans hic piscibus atram

Impro-

*In paludibus,  
Nicaner in  
Ther.*

*Ex Nicand:*

*Hydra.*

*Enhydri.  
Coluber.*

*Alia, sedit  
humum.*

*Hydri marini*

*Serpens ma-  
rinus.  
ὄφις θαλάτ-  
τος.*

*Myron.*

*Vetus Aristo-  
telis interpre-  
tis habet, Nisi  
quod caput  
eis asperum atq;  
durissimum.  
Dryinus.  
Chelydrus:  
Hydrus.*

- A** Improbis ingluuiem, rarisque loquacibus explet.  
Postquam exhausta palus, terręq; ardore dehiscunt,  
Exilic in siccum & flammantia lumina torquens,  
Sequit agris, aspérque siti, atque exterritus æstu.
- 1** Forma similis est alpidi chersæ parvæ, nisi quod cervicem non ita latâ ha-  
bet: qua in re maxime ab iis differre videntur aspides. Huius iccori fel ad-  
nexum est, cum in cæteris serpentibus intestino magna ex parte adhæreat.  
Ex hydri morsu factum ulcus dilatatur, liuescensque subinde augetur: ni-  
grâque ex eo sanies copiosa malęque olens, ceu ex ulcere depascēte manar.  
Hydri iecur feruatum, aduersus percussos ab iis auxilium est: quod & bibi
- 2** iubent ad calculos pellendos. Enhydriis uocatur à Græcis coluber in aquis
- B** uiuens: est autē serpens masculus albus. De colubro uero ita cecinit Vergil.

Est tecto assuetus coluber succedere & umbræ.  
Pestis acerba bouum, pecorique aspergere uirus.  
Fouet humum: cape saxa manu, cape robora pastor:  
Tollentemque minas, & sibila colla tumentem  
Deice. iamque fuga timidum caput addidit alte:  
Cum medi j nexus, extremęque agniina caudæ  
Soluuntur, tardosque trahit sinus ultimus orbes.

- Coluber, inquit Plinius, est in aqua uiuens. huius adipem & fel habētes qui  
crocodilos uenentur, mire adiuuari produntur, nihil contrā belua audēte.  
Enterocelæ iecur aquatici colubri illinitur enhydriis (qui ut dictū iam est,  
Cuocatur Græcis coluber in aquis uiuens.) Huius, inquam quatuor dentium  
superioribus in dolore superiorum gingiuas scarificat, inferiorum inferio-  
3 ribus: aliqui canino tantum contenti sunt. Sunt & hydri marini, qui circa  
insulas quasdam Indiæ egrediuntur in terram, uicenum cubitorum longi-  
tudine. Sed serpentum marinorum genera cōplura sunt, colore numerosę  
uarietatis. nasci eos non in altissimis gurgitibus certum est. Est serpens ma-  
4 rina colore & corpore congruo proxima, sed obscurior & acrior. Hec si ti-  
5 meat atque piscatores euadat, in arenam rostro quamprimum adacto te-  
rebrat subitque tota. Est ore acutiore hæc quàm terrestres. Myronē piscem  
eundē esse cum marino serpente uolūt nonnulli: cuius alteruter oculus eru-  
tus pro amuleto gestatur aduersus oculorum uitia, quem oportet uiuum  
Dimittere: alioqui frustra geritur amuletum: atque tū deinde pisci alterum  
renasci oculum loco eruti aiunt. Sunt etiā maris indigenæ serpentes terre-  
stribus similes, nisi quod caput habeant congrui. Inter aquatiles numeratur  
& serpens quidam paruus, colore atro, oculis sanguineis, cuius caput draco-  
nis formam imitatur. circa mare rubrum nascitur, ut refert Arrianus. Hy-  
dri quoque nomine à nōnullis appellatur dryinus: ab aliis chelydrus. In hu-  
midis paludosisq; locis, in quercuum ac fagorū radicibus fere latibula ha-  
bet: & in pratis ranas uenatur & molaridas, in Hellesponto frequens. Est  
autem dryinus serpens duorum circiter cubitorum longitudine, corpore  
obeso, asperimis squamis undique munito: in quibus latitant muscæ quę-  
dam paruulæ quæ serpentem conficiunt. colore in tergo subatro est: capi-

*Lucan<sup>o</sup> lib. 9.* te minime acuto: sed æqualiter latiusculo, hydro similiter: odore tetro, a- **E**  
*Tractique uia* deo ut fœtor latentem prodat. Est autem odor, qualem reddere solent præ-  
*fumante che-* segmina tergorum equinorum humentia, cum à coriariis abraduntur. Est  
*lydri. Virgil.* uero dryinus serpens permiciosus adeo, ut refert Galenus, ut si quis eam cal-  
*3. Georg. Agri-* cauerit (ut aiunt) cutis illi à pedibus excorietur, tota crura maiorem in mo-  
*tare graues ni-* dum intumescant: & quod magis mirum est, manus quoque curantium  
*dore chely-* medicorum excorientur. Si quis autem aggrediatur dryinum interficere,  
*dros.* olfactum adeo illi corrumpi aiunt, ut quemlibet odorem quanuis etiam  
 gratissimū, prauum esse existimet: nec aliud præterea olfactu sentire que-  
 at. Sequuntur dryini morsum graues dolores: & in ipso morsus loco in-  
 surgunt pustulæ: nonnunquam & aquosus effluit humor: cordis dolor,  
 qui *καρδιαγῆς* uocatur, atque tormina. In flumine nomine Arcade, quod ad **F**  
 Persicam Psittacen est, bicipites serpentes Cresias narrat binis pedibus ad  
 caudam præditas esse: eisdemque capite albas, reliquo corpore nigras: qua-  
 tuor cubitorum longitudinem habere: & quos percusserint interimere: in-  
 terdiu eas haud quamquam natare solere, sed noctu uel aquantibus, uel lin-  
 tea lauantibus perniciem inferre.

*Hydra.*

1 Forma, Huius generis, sed ingenti magnitudine erat hydra ab Hercule in Lerna  
 confecta: quam primus omnium Periadæ, & hunc securi poetarum turba monstrum  
 multorum capitum effinxerūt. Ex Pausania. 2 Colubri nomine etiam pro genere  
 abutuntur: formina colubra dicitur. 3 Hydri aquatiles sunt & quæ *ῥαία* dicun-  
 tur apud Arrianum in rubri maris navigatione. 4 Ophidion Plinio pisciculus est  
 congro similis, uel, ut alia habet litera, sembro similis: urinx incontinentiā cum lilij  
 radice emendat. 5 Hæc si, Theodorus: Hæc si capta dimittatur foris, &c. Hæc fere **G**  
 de dracone marion pisce à Plinio narrantur.

*Γράει.*

*Ophidion.*

De serpentibus terrestribus, & primo de aspidum generibus.

Cap. CXIIII.

*Aspis.*

**A** Spis in Africa gignitur: cherfydro non dissimilis est: hoc enim insigne  
 solum præ illis possident aspides, quod ceruicem latam tumidamue  
 habent: similis alioqui cherfydrus est aspidi chersææ parua, ut modo dixi-  
 mus. Est uero aspidum color uarius: sunt aliæ flauæ aut subuirides, aliæ co-  
 lor cinerei, aliæ subatri fuliginosæ. In fronte circa supercilia extant duo  
 ueluti callosa tubercula cornuum instar, quibus efficitur ut oculi caui ap-  
 pareant: quos & hebetes huic malo dedit natura: eosque non in fronte, aut **H**  
 ex aduerso cernere, sed in temporibus: eisdemque semper ferè quasi somno  
 conuiuentes: & excitatur sæpius auditu quàm uisu. Dentes fœminis pro-  
 minent quaterni incurui: maribus bini. Sub lingua cuticula inuenitur, quæ  
 dentes etiam operit. Non obliquo ut cerastes, sed recto incessu serpit. Con-  
 iuga ferine uagantur, nec nisi cum compare uita est. Itaque alterutra inter-  
 emptæ, incredibilis alteri ultionis cura: persequitur interfectorem, unū-  
 que cum in quantolibet populi agmine notitia quadam infestat. Perrumpit  
 omnes difficultates, permeat spacia: nec nisi amnibus arcetur, aut præ-  
 celeri fuga. Longitudo quibusdam orgiæ est, id est pedum senum: magni-  
 tudo uero, quanta est uenabuli, quo ad tauros leonisque conficiendis uti  
 solent.

*Subatri fuligi-  
nosæ, αἰθρα-  
λίονα.*

*Alias con-  
ingæ.*



A solent. Alterum genus (quidam enim duo statuunt aspidum genera) *aspis maior*, id est dodrantale est. hoc celerius interficit. Verum, ut alius placet, aspidum tres sunt species: quædam chelidoniæ uocatur, aliæ chersææ, id est terrestres, aliæ pyades. Chelidoniæ circa fluuiorum ripas, præcipue Nili, latent: unius cubiti longitudinem paulo superant, & colorem habent hiru-  
dini similem. Chersææ maiores sunt: inueniuntur enim nonnunquam quæ  
quinque cubitorum longitudinem æquent, colore fere cinereo: quâquam  
& subuirides aliquando reperiuntur. Pyades omnium maximæ sunt, co-  
lore & ipsæ cinereo subuiridante, & qui aurum imitetur. omnium pernicio-  
sissima pyas est: quæ collo exporrecto, ueluti ratione quadam loci in-  
teruallum coniectans, uenenum expuit uel in hominum oculos, & aliorum

B quorumlibet animalium corpora. Aspidis morsus (signa enim fere com-  
munia sunt iis quos aspis momorderit) nullum affert dolorē, neque phlegmo-  
nem excitat: sed animal quodcumque momorderit (uno ichneumone exce-

2 pto) torpore & somno interficit, omnium serpentium ictu minime sana-  
bili. Mors autem intra tertiam diei partem accidit: ex chersææ quidē mor-  
su, tribus ad summum horis: ex chelidoniæ uero ictu, præsentissima mors  
& ad manum est. At iis qui à pyade conspuuntur, tardius paulo: præcedit  
nanque uisus hebetudo, faciei tumor, surditas, & deinde sequitur mors.

3 Quin & aliæ sunt aspidum species, uerum disparis effectus ad nocendum:  
aliarum uirus quoniam medelas facilius admittit, minus famæ meretur.  
Cunctarer in proferendo ex his remedia, inquit Plinius, nisi M. Varronem

C scirem LXXXVIII uitæ anno prodidisse, aspidum ictus efficacissime cura-  
ri hausta à percussis ipsorum urina. Venenum earum, si sanguinem attingit,  
aut recens uulnus, statim interimit: inueteratum ulcus tardius. De cæ-  
tero potum, quantalibet copia non nocet: non enim est tabifica uis. Ita-  
que occisa morsu eorum animalia cibis innoxia sunt. Membrana aspidis  
quam exuerit cum adipe eiusdem, iumentorum oculis claritatem inun-  
ctis facit.

1 Ægyptij aspides quatuor cubitorum longitudine nonnunquam apparuisse se-  
runt. Ælianus. 2 Aspida forniferam, dixit Lueanus. Solinus uni aspidis speciei  
hoc tribuit, hypnale scilicet, quod somno necat, recte etiam Cleopatra. emittit ad mor-  
tem: quanquam Cleopatræ mors, si aliis credimus, pyadi potius debetur: nisi fortasse  
eadem sit pyas, quæ hypnale: aut hypnale genus sit ad hæc tria: quod lectoris iudicio  
relinquimus. 3 Aspis anguis, inquit Aristoteles, ex quo medicamentum putrificum  
illud componunt, in Africa gignitur, cuius ictui nullum remedium est.

*Hypnale.*

D relinquitur. 3 Aspis anguis, inquit Aristoteles, ex quo medicamentum putrificum  
illud componunt, in Africa gignitur, cuius ictui nullum remedium est.

De uipera, dipside, cæraste, & hammodyte.

Cap. CXV.

1 V ipera mas echis, fœmina echidna uocatur: colore est subflauo, pluri-  
bus ornata maculis rotundis, longitudine cubitali: nonnunquam ue-  
ro trium dodrantium. In Asia certe orgiæ longitudinem æquant, id est se-  
num pedum. Sunt in India, authore Strabone, quæ nouem cubitos superent.  
Caudam habet fœmina ex carne, & squamis duriusculis asperam, non pau-  
latim gracilescens ut mas, sed simul uniuersim acruatimue. Caput ge-  
rit latiusculum, oculos subrufos, collum quàm sit mari angustius, aluum

*Vipera:*

*Echis.*

*Echidna.*

*Dodrantium.*

*Strabon.*

*Strabon.*



prominulam, meatum ad caudæ extrema propius accedentem. Incessus il- E  
 li quietus & tardior. Dentes uiperæ gingiuis conduntur: sed qui canini uo-  
 cantur dentes, scæminis quaterni, & uulnera ex illius morfu infliguntur  
 quaterna. At contra mari caput angustius, collū crassius, dentes canini tan-  
 tum bini, & uulnera ex plaga, bina. Oculi, cum irritatur, rubicundi. paula-  
 tim huic gracilescit cauda, aliorum more serpentium, non acruatim, ut in  
 uipera scæmina. Meatus ille, superne magis, & uentri propinquior est. Cor-  
 pus illi uniuersum tenuius, & modo quodā procerius, & incessus alacrior.  
 Color idem qui scæminæ. uiperæ uulua similis, ut in piscibus cartilagineis  
 est. Cum cætera serpentum omnia genera oua edant in lucem, uipera è ser-  
 pentibus una foras animal uiuum in lucem edit, cum intra se ouum prius  
 peperit piscium ouis simile, hoc est unius coloris, nec cortice ullo, sed mol- F  
 li cuticula opertum: parit inquam catulos, in utero antea exclusos, & parit  
 eos obuolutos membranis, quæ tertia die rumpantur. Euenit interdum, ut  
 qui in utero adhuc sunt, abrosis membranis erumpant. Parit autem sigil- 3  
 latim uno die plures quàm uiginti. Nec nos lateat quosdam de uiperarum  
 coitu ac partu aliter sentire. Vipera, inquiunt, mas in coitu caput inferit in  
 os scæminæ, quod illa abrodit uoluptatis dulcedine: appetente deinde par-  
 tus tempore, scetus tarditatis impatientes, erodunt latera, occisa parente.  
 Cum cætera serpentes cauernas subeant terræ, uiperæ tamen sub saxis con-  
 duntur hyeme. Ita Aristoteles: contra Plinius. Serpentium uipera sola ter-  
 ra dicitur condi, cætera arborum aut saxorum cauis. Vipera senectutem  
 exuit (ut alij serpentes) tam uere quàm autumnō. Ex uiperæ morfu à uul- G  
 nere sanies primum effluit subpinguis oleosæ, deinde cruenta: insurgūt  
 & pustulæ, ambustis similes: sequitur postea ulcus quod uicinas omnes par-  
 tes depascitur, non in summa cute solum, sed altius in carnem descendit.  
 Sanguinolentæ fiunt & gingiue: & iecur phlegmone tentatur. Tormina  
 præterea accedunt, & uomitiones biliolæ. Ad hæc tremor, & sopor, & uri-  
 næ difficultates, sudorque frigidus: mors postremo intra horas septem im-  
 minet, aut cum diutissime (in iis qui non euadunt) die tertia. Quidam ta 4  
 men uiperis utuntur in cibis, ut modo diximus. Primum omnium occisæ  
 statim salem in os addi iubent, donec liqueat humor: quatuor digitorum  
 mensura (si prægrandis fuerit) utrinque præcisâ, exemptisque interancis  
 discoquunt in aqua, condientes sicuti anguillas, oleo, sale, anetho, & porro: H  
 & omnibus aut statim uescuntur, aut pane colligunt, ut sæpius utantur. Vi-  
 perarum carnes, inquit Galenus, cum in anguillarum morentur cōdiuntur,  
 excalfaciunt palam, desiccantque, & corpus totum per cutim euacuant. Vi-  
 perinæ carnes, ait Dioscorides, si coctæ edantur, claritatem oculis afferunt:  
 neruorum uitii auxiliantur: crescentes reprimunt strumas. Adiiciunt nō-  
 nulli longam fore senectutem iis qui earum carne in cibo utuntur. Carni-  
 bus hisce uescentibus, pediculos procreari tradunt quidā, quod plane à ue-  
 ritate abhorret, inquit Dioscorides. Sal ex iis ad eadem conficitur, sed inef-  
 ficacior. Antonius Musa medicus cum incidisset in insanabilia ulcera, ui-  
 peras edendas dabat, miræque celeritate perfanabat. Viperam uiuam in fi-  
 cili

*Hæc & à Ga-  
 leno referuntur  
 ex Nicandro in  
 lib. De Theri-  
 aca ad Pisonē.*

*Vide ne mēdo-  
 sa sunt exēpla-  
 ria Pliniana in  
 hoc loco.*

*Hæc fere ex  
 Dioscoride,  
 Aliæ ex Pau-  
 lo colligat licet  
 & Aetio.*

- A Etili nouo comburere addito sceniculi succo ad cyathum unum & thuris manna una, atque ita suffusionem oculorum, & caligines inungere utilissimum est: echion uocatur hoc medicamentum. Fiunt & ex uipera pastilli qui theriaci uocantur, quibus ad multa medicamenta utuntur. Vipera caput ari  
 5 dum asseruatum & combustum, igni sacro medetur. pellium uiperinarum cinis alopecias celerrime explet. Dipsas (ut quibusdā placet) species uiperæ *Echion. Dipsas. Solinus aspidis specie esse uult.* est in maritimis locis, aut aliàs salsuginosis reperta: ut aliis uero, non eiusdem omnino generis, sed specie similis est uiperæ parua. Est enim quàm mas uipera, minor, cauda gracili & nigra: at reliquo corpore albicante, maculis partim rufescentibus, partim nigris uariiegato. Et in cauda quoque lineas habet duas nigras: magnitudine cubitali, inquit Aësius, ex crassa in te-  
 B nuem definens, capite quàm uipera angustiore. Morsum eius sequitur internarum partium ardor intolerabilis, sitis inexplibilis & interficiens: adeo ut quantumuis potus exhibeatur, nihilo magis sedetur sitis: cum tamen neque urina aut uomitu, aut sudore quicquam excernatur: prester à nonnullis uocatur: ab aliis causos aut melanurus, aut ammoatis, aut  
 7 centris dicitur uel centrine. Est uero prester serpens (ut uidetur) alius. Hic si quem percusserit, distenditur, enormique corpulentia necatur extuberatus. Cerastes quoque ex agnita uipera facile cognoscitur: corpore enim non admodum dissimili est: sed cornua habet (unde illi nomen) bina: uel, ut alij tradunt, quadrigemina: id est extantia quædam corniculis similia, quæ uiperis desunt. Longitudo illi cubitalis, nonnunquam & cubitorum  
 C binum. Color arenæ similis: cauda squamis hirta: squamæ uero & sub aluo in ordinem quendam conditæ: quo fit ut sonitum libilo non dissimilem serpendo edat. non recta incedit, sed oblique, & in alterum potius latus inclinata, in nauiculæ modum quæ uenti uiolentia in alterum latus inclinatur. in arena aut rotarum orbitis fere delitescit. Corniculorum illorum ostentatione ueluti esca ilice, sollicitas aues perimit. Nam reliqua corporis de industria arenis tegit: nec ullum indicium sui præbet, nisi ex ea parte qua inuitatis dolo pastibus, necem præperum aucupetur. In iis quos cerastes mordit, tumescit locus una cum duritie & pustulis: uaria è uulnere effluit sanies, quandoque atra, quandoque uero subpallida. Genitale tenditur: accedit ad hæc delirium: caligant oculi, & à conuulsione tandem sequitur  
 D mors. Hammodytes uiperæ fere similis est, serpens cubitalis longitudinis. Color illi non sufflauus, ut uiperæ, sed arenæ concolor est, & maculis quibusdā nigris insignitus. Maxillæ item quàm sint uiperæ latiores. Cauda superiore sui parte fissâ & prædura, unde & cercias illi nomen. Serpētis huius ictum maxima ex parte festina sequitur mors. Qui uero non statim pereunt, iis à uulnere sanguis primum effluit: deinde sanies, sequitur postea epitis grauitas & animi deliquium. Qui autem uehementius ueneno instantur, triduo moriuntur: quanquam aliqui uel ad diem usque septimum perdurauerint. Citius pereunt, quos scæmina momorderit.

1 Εχρ Oppianus in scæminio quoque genere protulit, aspidem significans: & Εχρ pro scæmina dixit Aristoteles. 2 Rotundis, ροχελῆας potius quàm ροχελῆας legit

hic Hermolaus apud Aëtium. 3 Sigillatim, id est non binos aut ternos, sed unū E post alterum. & si Plinius, & illum secutus Theodorus hunc Aristotelis locum aliter reddant, quod singulos diebus singulis parit. Ex Leonicensio De serpentibus. 4 Viperæ quomodo condiantur ad esum, docent Plin. lib. 29, & Galen. lib. 11 de simp. medic. & Dioscotid. lib. 1. 5 Theriaci, Horum compositionem uideas apud Galenum lib. 1 antidot. & Plinium lib. 29 cap. 4 & 6, & Aëtium & Paulum. 6 Nicandri interpretis caput latum esse dipfadi ait, & collū amplū. Exemplo est Aulus Iuuenis apud Lucanum, quem dipfas momorderat. 7 Centris uel cenchine uocatur, quod rostrum eius in acurum tendat, ut centro, id est stimulo non sit dissimile. Huius exemplū prælatum est apud Lucanum, Narfidius à pretere percussus.

## De hæmorrhoe, sepedone, sepe, cenchri &amp; cenchrite. Cap. CXVI.

*Hæmorrhoe.  
Hæmorrhoeis.*

**H**æmorrhoe quoque color arene similis est, quandoque obscurior: non-<sup>F</sup>nunquam uero splendescens magis. Et incessus cerasæ similiter obli-<sup>I</sup>quus. Longitudo pedalis: crassitudo uero eius à capite ad extremam usque caudam paulatim in tenuitatem descendit. Caput habet asperum horridumque: oculus similes locustarum generi, quæ ~~nigra~~ dicuntur. Supra oculos bina ueluti cornua: collum angustum, caudam aut umbilico gracilescens. Meatum excrementi mas habet superne ad uentrem: femina inferne ad caudam. corpus uniuersum maculis ornatum, partim candidis, partim uero nigris. dum serpit, ob squamarum asperitatem strepitum edit haud magnum, quasi per arundinum acruum transiret. in petrarum cauernis fere degit. Hæmorrhoe mas est, hæmorrhoeis femina. Ab effectu nomen habet: à morfu nanque eius interit homo præ copioso sanguinis pro-<sup>G</sup>fluuiio, tum ex ore tum è naribus, tum etiam ex uniuerso corpore. Si qua uero corporis parte obducta iam olim cicatrix aliqua fuerit, sanguis ex ea denuo erumpit. Alui quoque excrementa sanguinolenta egeruntur. Quin & ex pulmone sanguis tussi expuitur, & mors certa cum uomitu sequitur. Hæmorrhoe simili forma est sepedon, sed gressu celeriori: neque cornua habet ulla. Color illi coccineus: caput prægrauæ: cauda quamuis sit prolixior, <sup>2</sup>breuis tamen apparet, eo quod dum serpit tætopere per anfractus torquetur. A sepedone percussio, undique defluunt pili, & ex capite & superciliis palpebrisque. Sequitur deinde per totum corpus uutiligo atque leuce. Seps anguis longitudinem habet cubitorum binum, capite lato, ore exacuto, toto corpore ex crasso in tenuius descendente, multis albis maculis uariega-<sup>H</sup>to, incessu recto tardoque. Seps colorem in eorum quæ contingit similitudinem immutat. Eius imos quatuor dentes tuniculæ quædam occultant. Si quem seps momorderit, ex uulnere (quod manifesto apparet) sanguis primum excernitur, sanies deinde fortens: intumescit autem locus cum dolore quodam mitiore. Et membrum putrescit iam, & colorem recipit album: toti denique corpori & color inest qualis uutiligine affectis: & pili undique defluunt: biduoque aut certe triduo sequitur mors. Seps, ut Pausanias scribit, anguis est minimæ uiperæ magnitudine æqualis: maculis ex interuallis quibusdam uariis, capite lato, ceruice angusta, uentre maiori, cauda breui, incessu obliquo, cancri in morem: id quod illi cum cerasæ

*Alia quoque signa legitur apud Aëtium. In multis.*

*Seps, 164.  
Amid sit sepe-  
pens cū sepe-  
dome confide-  
raletor.*

*Seps.*

A raste commune est. At contrā in obliquum non nisi tardissime mouetur, cum aliās uelocissime:

Sed semper recto lapsurus limite cenchris:

Pluribus ille notis uariatam tingitur aluoni

Κίχρυς,  
Cenchris, uel  
Cenchrine.

5 Quā paruis tinctus maculis Thebanus ophites.

Leo, Λίον.

Hunc & leonem uocauere quidam, ferocissimum anguem, & qui sese cauda uerberet, atque ad ferocitatem irriter. Corpus illi longum & crassum: æstate media petit montes, pecorūque insidias tendit, sanguinis auidissimus. In insulis Thraciæ uicinis frequens est. morsum eius sequitur aquæ in uentre collectio, & corporis tumor, qualis in hydrope euenire solet: necnō carnis tanta cum dolore putredo, ut uel spōte diffuat. Veternum præterea in-

B fert & soporem: atque, ut Erasistratus testis est, iecur, uesica, & crassius intestinum in iis corrumpitur, quos cenchris momorderit. Cenchrites, qui & acontias, serpens esse traditur, cubitorum binū longitudine, corpore toto à crassitudine in exilitatē desinente: colore, præsertim circa uentrē, uiridi, ut uideatur milio (cum adhuc recēs seges est) persimilis: unde nomē illi cēthrites: quem & fortiozem seipso fieri aiunt, cum milium floret. Cēthrites cum se infestum alicui reddere uoluerit, in iaculi uibrati modum inuolat, atque ita ferit. Ab huius morsu grauiora quā ab aliis sequuntur pericula, ut simul & putrescant & defluant carnes. Iaculum ex arborum ramis uibrari uulgatū est, inquit Plinius, & missili uolare tormento. Subeunt enim iaculi arbores, è quibus ui maxima turbinati, penetrant animal quodcunq; C fortuna obuuium fecerit. Adeo ualeat saltu iaculus, ut uiginti cubitorum spatium transilire queat: protinūque ad ea quæ saltu appetit, inhærescat.

Cenchrites:  
Acontias.  
Acontias a-  
pud Nicandrum  
aliud gen<sup>o</sup> ser-  
pentis est: de  
quo infra.

Iaculus.  
Iaculique no-  
mē, inquit  
Lucanus.

1 Longitudo, ita Nicāder: Aëtius uero hoc modo, Recta & tarde prorepat. Longitudo illi tritium palmorum, uel trium dodrancium: nam utrunque significat πάλαισις. Sed uide ne sint exēplaria mendosa. 2 Coccineus, Nicāder: Color illi, qualis est hirsuti rapetis, id est (ut uult interpret) coccineus.

De basilisco, & aliis quibusdam serpentibus, quorum uenenum remedio caret. Cap. CXVII.

Basiliscum Cyrenaica generat prouincia, malum in terris singulare: qui B uel conspectus solum, ut aiunt, & sibilo auditus, interimit: uel ut referunt alij, qui hominem, uel si aspiciat tantum, dicitur interimere. Et quic- D quid morsu eius occidit, non depascitur fera, nō attrectat ales: si uero at- tigerit, statim interit. Alios quoque serpētes olfactu necat: nec hominis tā- tum, uel aliorum animātium exitiis datur, sed terræ quoque ipsius, quam polluit & exurit: necat enim frutices arborēsque non contactas modo, ue- rum & afflatas. Extinguit herbas, rumpit saxa: ipsas etiam corrūpit auras: ita ut in aëra nulla alitum impune transuolet infectum spiritu pestilenti. ta- 1 lis uis malo est. Basiliscus parua serpens est trium palmorum longitudine, Basi- colore flauo fuluōue, capite acuminato, & candida in eo macula, ut quo- dam diademate insigni. uiribus reliquos serpentes longe superat. Nec fle- xu multiplici, ut ceteræ corpus impellit: sed cum mouetur, media corporis parte serpit, media celsus & erectus incedit. Vulnus ab eius morsu factum

Basiliscus.

Basiliscus:  
videtur.

(ut inquit Erasistratus) aureo colore obducitur: statimque à uulnere sequitur mors. Sibilum eius etiam serpentes alij perhorrescunt: & cum acceperint, fugam quæque quoquò possunt, properant. Huic tali monstro multelarum uis exitio est. adeo naturæ nihil placuit esse sine pari. interficiunt eos in cauernis, in quibus delitescunt: uis tamen ne defuncto quidè deest. Basilisci reliquias amplo festertio pergameni compararunt: & ut eodem Apollinis manu insignem, nec aranæ intexerēt, nec alites inuolarent, cadauer eius reticulo aureo suspensum, ibidem lotarunt. Sanguinem magi miris laudibus celebrant cœuntem picis modo, & colore dilutum cinnabari clariorem fieri: quidam id Saturni sanguinem appellarūt. Est in Indica regione serpens paruus, inquit Aristoteles, cuius unius remedio carent incolæ. In regionibus ultra Indum fluuium, ut author est Diodorus, serpentum F uis est, qui haud magni sunt, & corporum uarietate distincti. Aliqui æneis uirgis sunt similes: alij densam & hirsutam cristam gestāt. atque omnium ea est morsus uis, ut mortem citissimā inferant. Est & Indicus serpens porphyrus nomine, palmi magnitudine, colore ad purpuræ similitudinem accedente, capite albissimo. locis Indiæ calidissimis reperitur. Dentiū expers est: idcirco mordendi potestas illi nulla. At eius uomitio, si quod uel hominis, uel alterius animalis attigerit membrum tabescat necesse est.

*Serpentes Indici.*

*Porphyrus.*

1 Basiliscus, Plinius: Duodecim non amplius digitorum magnitudine. Solinus: Pene ad semipedem longitudinis. 2 Candida, Solinus: Alba quasi mitreola lineatus caput. (An igitur in Plinio legendum potius mitrula pro macula.) Aëtius: *καρποειδής*, id est tubercula tria habet: & Galenus ad Pison.

G

De dracone, amphibæna, & aliis quibusdam serpentibus, quorum morsus minus affert periculi. Cap. CXVIII.

*Draco,*

*αεγλιων.*

*Draco uernus.*

DRACO nō habet uenena. Porro ueris draconibus ora parua, & ad morsus non dehiscencia: sed arctæ fistulae, per quas & trahūt spiritus, & linguas exerunt. Proinde neque draconis morsus dolorē ullum uehementem excitat, etiam si pro uiribus maxime nitatur morsum infligere: sed qualem mus mordēdo efficiet: quippe non in dentibus uim, sed in caudis dracones habēt: & uerberare potius quàm rictu nocent. Speciosa draconis forma est. dentes quoque habet utrinque duplici ordine: frontem & supercilia crassa. sub mento ueluti palcaria dependent subflaua subuiridiæ, quæ barbæ H speciem referunt. Id modo mirum, unde cristatos luba crediderit: draconū enim cristas qui uiderit, non reperitur. Non admodum dissimile huic uidetur esse genus quoddam draconum, quod sola fert Epidaurus, mansuetū & colore subflauum, quod Æsculapio sacrum erat: author Pausanias. Qui Æsculapio dicatus est, anguis à Plinio uocatur: neque anguis hic uenenatus est, nisi per mensem luna instigatus: sed prodest uiuus comprehēsus, & in aqua contusus, si foueatur ita morsus. quin & inesse ei remedia multa creduntur, & ideo Æsculapio dicatur. Atqui anguis Æsculapius Epidauro Romam aduectus est, uulgoque pascitur, & in domibus: ac nisi incediis femina exurerentur, non esset fecunditati eorum resistere. Draconum genus est

*Subflaua subuiridiæ, χαλκίφρα.*

*Draco Epidaurius.*

*Anguis Æsculapius.*

*Anguis Æsculapius.*

*Draco.*

A est magnitudine quinque aut decē cubitorum:reperiūtur autem & uiginti  
 2 aut triginta cubitorum longitudine:& ut aiunt, nonnunquā maiores. Ge-  
 nerat Æthiopia dracones Indicis pares,uicēnū cubitorum.Artemidorus  
 3 elephantosque perimant:moderatus sane in his: nam Indici ac Lybici dra-  
 cones fabulosiores sunt,super quibus herba etiam nasci dicitur.Draconum  
 ingens hoc genus squamis tegitur toto corpore asperrimis. oculis est præ-  
 grandibus:supràque oculos extantibus quibusdam ceu umbraculis: in mē-  
 to uero,quam barbam uocant,ore uasto,lingua longius exporrecta,denti-  
 bus magnis,quales sunt suis syluestris,quibus mordēdo ossa frangunt. Nō

*Umbraculis,  
 ὑδρακάλους.*

4 enim nili in locis æstuosis uenēnū habet draco: sed morſu uiolēto perniciē  
 B quādoq; affert. Color illis uarius:sunt enim alij nigri,alij rufi flauie, alij ci-  
 nerei coloris. In Phrygia dracones ad magnitudinē quadragenū pedū na-  
 ſci ferunt:qui quotidie media æſtate ex cauernis prodeūt,cauda ad terram  
 adnidentes,religio erecto corpore,& toto gutture eminente:& paulatim  
 laxato ore hiant,uoLucres super uolantes (tameſi ſublimis & perniciter  
 ferātur)ſua aſpiratione ad ſe pertrahere atque allicere:eas autem ex horum  
 ſpiritus ductibus detractas in illorum uētreſ decidere atque illabi:& hæc  
 quidem maxime ad occidentem ſolem agere.ſpectanda quidē draconū  
 ars in deuorandis ouis:aut enim ſolida hauriunt,ſi iam fauces capiunt:quæ  
 deinde in ſemet conuoluti frangunt intus, atque ita putamina excutiant:  
 aut ſi tenerior eſt & catuli adhuc ætas,orbe apprehēſa ſpiræ, ita ſenſim ue-

*Rufi flauie,  
 κίττοι.*

C hementēque perſtringūt,ut amputata parte ceu ferro,religiam quæ am-  
 plexu tenetur,lorbeant. Draconis adipe & melle cum oleo uetere incipie-  
 tes caligines diſcuti tradunt. draconum quoque adipem uenenata fugiūt.  
 Draconum maguitudini fidem faciūt in Italia appellatæ boæ, quas gignit  
 Calabria.Hunc anguem ad immenſam moleſ ferunt coaleſcere. captat  
 primo greges bubulos:& ſi quæ plurimo lacte rigua bos eſt, eius ſe uberi-  
 bus innectit,ſuctūque continuo ſaginata,longo ſeculo ita funebri ſatieta-  
 te ultimo extubetur,ut obſiſtere magnitudini eius nulla uis queat. poſtre-  
 mo depopulatis animatibus,regiones quas obſederit,ob ualtitatem cogit.  
 Deniq; D.Claudio principe, in loco ubi Vaticanus ager eſt, in aluo occiſæ  
 boæ ſpectatus eſt ſolidus infans. Amphibæna aut ſcytale etiam ſi mor-

*Bod.*

*Amphibæna.  
 ſcytale.*

D deant, non enecant: ſed horum ſerpentium morſus & obſcuri ſunt,& in-  
 flāmationes tantū inferunt, quales fere ex apum ueſparūm ue iētibus cōtin-  
 gunt:ſcytales tamē chalcidicæ morſum aiunt eadē fere ſequi ſymptomata,  
 ac ſi quæ uipera momorderit. Animalcula hæc inter ſe ſimilia ſunt, niſi q  
 magnitudine diſferunt. Neque ut alij ſerpentes ex craſſiore corpulentia in  
 caudam tenuem deſinunt: ſed terete corporis figura utrinque æque craſſa  
 exiſtunt:ut aſpectu diſcernere neſcias, utra in parte caput utra caudam eſſe  
 dixeris. Diſferunt,quòd amphibæna in utranque partem,in caput ſcilicet  
 5 & in auerſum ſerpit:quo fit ut à nōnullis biceps eſſe dicatur, & αὐροειδής.  
 parua ſerpens,lumbrici terreſtris magnitudine,colore terreo maculis par-  
 uis diſtincto:ob maxillarum craſſitiem modo quodam excutiens. Sola ſer

*ſcytale Chal-  
 cidica.*



pentium frigori se committit, prima omnium procedens, & ante cuculi cantum. Amphibianam mulier prægnans si transcenderit, abortum faciet, mortuam duntaxat: nam uiuam habentes in pyxide impune transeunt, etiam si mortua sit atque adseruata: partus faciles præstat uel mortua. Mirum, si non adseruatam transcenderit grauida, innoxiam fieri, si protinus transcedat adseruatam. Scytale grandior est: quippe cuius longitudo ligonis aut securis manubrium æquat. Tanta præfulget scytale tergi uarietate, ut notarum gratia uidentes retardet: & quoniam reptando pigrior est, quos assequi nequit, miraculo sui capiat stupentes: in hoc tamen squamarum nitore, hyemales exuiuis prima ponit. Phlegmonem quoque excitat, neque 6 aliàs mortis periculum affert ullum spathiuri morsus aut paroi. Est uero spathiurus serpens capite lato, è crassitudine in tenuitatem ad caudam usque 7 definens. Nascitur in locis Chalcidi uicinis. muribus uescitur. Parous aut 8 pareas anguis est in locis Syriæ proximis natus. In hoc genere alij colore æris simili, alij uero nigro conspiciuntur. Ælianus parian uocat: uel, ut uult Apollodorus, parian: igneo colore, & acerrimo oculorum sensu: largo ore, morsu nihil nocet. Sed mitis cum sit Æsculapio dicatus est. Elapis uel elopis notæ non sunt à ueteribus authoribus explicatæ: sicuti neque peliadis: relictis enim uidentur tanquam serpentes nulli non cogniti. Mordent quidem, sed nullo cum periculo mortis: uerum elapis morsus tormina excitat, qualia uoluulosis accidunt: iisdemque remediis curantur. iis uero quos pelias momorderit, dolor circa locum uulneratum cum putredine quadam prouenit: sed absque omni mortis periculo: oculorum præterea dolor cum 9 caligine: nimirum ex ueneni ui ad ipsos pertingente. Typhline, qui & typhlopes à Nicandro dicuntur, colore similes sunt Chalcidi siue zignidi. Riam quandam sub imo uentre habent, qua dehiscente aut disrupta, oua pariunt: à partu autem uiuunt, & uulnus coalescit. Hæ si etiam calcetur non inordere feruntur. Circa Thebas Ægypti serpentes quidam sunt hominibus minime noxij, ideoque sacri dicti: corpore pusillo, binis corniculis è summo uertice extantibus. Sacer item appellatur à nonnullis alius serpens quidam minutus, quem serpentes alij permagni fugiunt. Magnitudo huic ad cubitum, species hirsuta: quicquid momorderit, continuo circiter putrescit. Gignitur in Africa agro, in quo laser, serpens quidam pusillus, 10 cuius remedium lapis est, quem ex sepulchro cuiusdam regis antiqui accipiunt: eoque infuso in uino bibunt. Innocui & alij notantur quidam à Nicandro, ut ij qui moluri dicuntur, & qui acontia uocantur. Volat serpent 11 genus quoddam, ut fertur, uere ineunte ex Arabia in Ægyptum, forma hydris simile. Alas autem habet hoc genus non pennas, sed cutecas uespertilionibus similes. Genus serpentis est spondile, inquit Plinius. Hæc nullam 12 radicem, quanuis acrem intactam reliquit carum, quæ diutius sicca manserint: cum è bestioliis externis nulla alia radicem aliquam tangit. Hoc ergo naturæ animalis istius deputandum sit. Et de serpentibus aliisque quæcunque cortice intacta sunt, dictum ad hunc modum est. Sequitur natura auium.



- A** 1 Draconum, Hæc Plinius: Philostratus autem, palustribus draconibus, inquit, crista non est: montanis uero, iuuenibus quidem adnascitur crista mediocriter prominens, prouectis uero ætate, grandior. 2 Hos Epidaunci, ut refert Pausanias, non dracones, sed angues potius uocari dicunt. 3 Draconum cum elephantis pugnam depinxit egregie Plin. lib. 8. 4 Draco. Lucan. Vos quoque qui cunctis innoxia numina teris. Serpitis aurato nitidi fulgore dracones. Pestiferos ardens facit Africa. 5 Et *ἄμφικύφαλος*, Solin. Quæ causa efficit, ut caput utrinque, secus nitibudo serpat tractibus orbicularis. 6 Lucanus, Et scythale sparsis etiam nunc sola pruinis Exuias positura suas. 7 Aut idem cum sparhiuro, aut certe non dissimilis serpens esse uidetur, qui à Nicandro *μύκρος* uocatur, *πλυνφός*, id est pluribus insignitus coronis lineæ sue, ut exponit eius interpres. Est & Aristotelicus quidam serpens, de quo lib. 9 histor. animal. Serpentem quoque impugnat mustela, cum præcipue qui mures uenatur: uidelicet ea causa, quia ipsa etiã mures prosequitur. 8 Pareas apud Lucanum, Et contentus iter cauda fulcare pareas. 9 Typhlinæ, Nomen hoc sortitæ sunt, quia cæcæ sunt. Hermol. Cæci serpentes etiam à Plinio uocantur. Cophiæ etiam nomen idcirco habet, quod hebetes illi aures sint: adeo item dura est pelle, uix ut tandem secari queat. 10 Læser, Aristoteles, *ἡ δ' αὖ λείψ*, id est in læsere, uetus interpres habet, in loco quid dicitur silphiar. 11 Moluri dicti sunt, quasi cauda ingredientibus. 12 Sphondyle apud Aristotelem è genere est insectorum, quæ & coit more eorundem. Theodorus uerticilla interpretatur. Et alio loco uerticillos dixit pro *σφονδύλαις*: uerum apud Theophrastum nihil aliud reddidit latine quàm sphondylas: ut uideatur sentire etiam Theodorus diuersa hæc esse animalia.

*Anguis, & draco.**Μύκρος.**Ceci serpentes.  
Cophias.**Verticillus.  
Verticillum.*

## DE ANIMALIVM DIFFERENTIIS LIBER VII

### DE AVIBVS.

De partibus auium exterioribus.

Cap. CXIX.



In genere animalium, quod bipes est & aligerum, pennisque opertum, auem appellamus. In auibus partes nonnullæ similiter atque in iis quæ expositi animalibus, habentur: omnibus enim caput inest, & collum, & dorsum: & supina corporis pars, & quod pectori proportionetur. Crura quoque bina, hominis modo: sed manibus pedibusque prioribus carent. Auium nonnullis in capite crista addita est: quam cum cæteræ pennarum eminentia quadam extructam gerunt, gallinaceus unus peculiarem sibi sortitus est: sic enim institutam, ut nec caro sit, nec à natura carnis omnino aliena. Oculi omnibus sicut cæteris animalibus bini, sine cilij. & grauiore palpebra inferiore conniuent: columbæ autem & similia utraque: quæ uero speciem nocturæ gerunt (*χρυσωιδες* uocant) superiore etiam palpebra conniuent. Niçantur omnes ab angulo obcunte membrana. Volucris usus cer-

*Auis, & avis.*

nendi ex longinquo est: unde fit, ut quæ unguibus sunt aduncis, clarissime E  
cernant: cibus enim de sublimi conspiciendus iis est: & quidem uolare in  
excelsum omnium maxime auium genus id ob eam rem affolet: terrestres  
autem parùmque uolátiles aues, ut gallinacci & similes, nō acie oculorum  
adeo ualent. Auriculis carent omnes & naribus, meatúsque odorandi in ro  
stro continent, audiendi in capite. foramina bina ante os habent, sed nō ita  
explanata ut nares appellari possent. Os sibi propriū aues possident: non  
enim labra, non dentes, sed pro maxillis rostrum habent (*ῥύξ* Græci uo  
cant & *ῥάμφος*), quod in senectute maius redditur. Rostrū hoc uarie pro ut  
ctus ratione & auxilio datum auibus est: quæ enim adūcis unguibus sunt,  
quoniam carne uiuunt, & nullo fructu uescuntur, rostrum habent omnia  
aduncum: cæterarum rectum. Sed aliis prædurū est, ut coruino generi: mi  
nutis auibus lautum subtilēue, ad terræ fruges colligendos, & ad bestiolas  
capandas idoneum. Quæ autem herbis uiuunt, & quæ ad paludes uicētat,  
(ut palmipedes, & quæ collum habēt longum) partim alio quodam modo  
rostri commoditatem obtinēt, (nonnullis enim rostrum longum est ut &  
collum) partim latitudine rostri sibi sufficiunt: quippe quæ rostro eiusmodi  
infodere possint. Quinetiam aues quæ latius habent rostrum, & quæ ra  
dices esitant, & reliquæ quarū uictus similis, nonnullæ serratū rostri extre  
mum habent: ita enim herbarū carptus quo uiuunt facilius agitur. Lingua  
omnibus est, sed uarie: aliis enim longa, aliis breuis, aliis lata, aliis angusta.  
Quæ aduncis sunt unguibus, latiore fere linguā habent. Collū auibus por  
rectum est: sed hoc aliis breuius, aliis longius: quibus enim longa sunt cru  
ra, iis collum longum: quibus breuia, contrā, collum breue, præterquā pal  
mipedibus. Carniuoris uolucris longitudo colli incommoda est: quam  
obrem nulli collum longum quibus ungues adunci. Palmipedes uero, &  
quæ diuisis quidem, sed parum diductis digitis sunt, (ut quæ eodem genere  
cum palmipedibus contineantur) collum longius habēt: tale enim collum  
ad cibum ex humore petēdum commodius est: sed crura iis breuia, ut me  
lius natare possint. Omnes aues uncæ breui sunt collo (uti modo diximus)  
& lingua lata, aptæque ad imitandū. Pectus in auibus integrum est, & sibi  
continuum carinatumque, & acutum atque carnosum. Et inter eas aqua  
ticis maxime carinatū. Pectori uenter subiaceret ad ostium usque extremēti  
& suffraginem crurum. Umbilicus auibus iam adultis delitelcit incertūsq;  
est, intestini enim coalitu consistit non uenarum pars ulla est, ut in uiuipa  
ro genere. Carent aues manibus pedibusque prioribus, ut dictū est: sed pe  
culiare inter cætera animalia alas possident: alæ enim iis pro brachiis & pe  
dibus prioribus dependent: quamobrem pro scoptulis extrema alarū dor  
so adherent. Clunem habent fœmori similem, longiorem, uentrēque me  
dio tenus porrectū cohæsiōne perpetua, ita ut ipsū diuulsum fœmur esse  
uideatur: sed enim parte alia iunctum tibiæ est. Sūt fœmora sane maxima  
iis auibus, quæ ungues habent aduncos, & pectus quā cæteris robustius.  
Crura auibus omnibus ut in homine bina, sed intro flectenda, ut quadrupe  
dum suffragines, nō ut hominis poplites foras. Crura quibusdam breuior  
ra, ut

Rostrum.  
ῥύξ.  
ῥάμφος.

Parū diductis.  
ομπροσθεν.

Pluribus expli  
catur hæc lib.  
6 hist. anima.  
Ala, πτερυξ.  
Scoptulis.

Ara, ut palmipedibus. Sunt uero quæ longis cruribus innitantur: harum uita palustris est: nantes tamen non sunt, idco neq; palmipedes: sed quod in solo præmolli degunt, hinc digiti illis productiores, & flexus plures in digitis magna ex parte. Multifidæ etiam omnes quodammodo sunt: quippe cum pars maxima digitata sit: & nantes quauis palmipedes, tamē & ipsæ digitos perfectos distinctosque habeant. Iis autem natura aut pedum interualla penitus cōpleuit, omninoq; palmipedes reddidit: aut discretos quidem fecit digitos, sed singulis digitis annexa est ductu perpetuo latiuscula cutis, ut pedes etiam ad nandum utiles habeant. Omnibus tam multifido quàm palmipedi generi quaterni digiti dati sunt, (nec fere est quod plures habeat digitos) terni in priore parte, singuli in posteriore maxima ex parte pro calce:

B hic tamen decst quibusdam longa crura habētibus: paucis quibuldā utrinque bini, ut auiculæ quam iungem uocant: & qui in calce est digitus, minutus est, ut in crece maxime patet. Copia auibus omnibus unguium est: & quibusdam ungues adunci sunt, indeque unguines appellantur: quibusdam uero rectiores. Vncungues omnes difficulter ambulāt: nec in saxi cōsistunt, quoniam saxi durities impedimento curuaturæ unguium est. Sunt nonnulla grauiorū alitū genera, (ex maribus saltem, sed ferminæ omnino iis carcent) quibus natura calcar etiam dedit: sed nulli datum hoc est, cui ungues adunci sunt. Cauda tali, qualis data quadrupedibus est, uolucres ca-

Vncungues,  
ταμῶν γε.

Calcar,  
πλάκτρον.  
Cauda, ὄρεθ.  
ὀρεθῶν γε,  
Vropygium.

C quæ è contrario constant, quæ etiam contractis ad uentrē pedibus uolant: cum illæ, quæ scilicet caudam pusillam gerunt, porrectis in caudam cruribus ferūtur, ut porphyrio, ardea, & aquaticæ aues. Vropygium hoc auibus ad dirigendos uolatus affigitur, sicuti & piscibus suæ caudæ, & nauigiis gubernacula: quo fit, ut aues quæcūque caudā talem ad hunc usum inceptam habeant, ut pauones & gallinacæ, & quæ minime uolaces sunt, haud quam directe uolare possint, sed ueluti gubernaculo carens nauigiū agitur feranturque quocunq; fors tulerit: nisi si quæ caudæ loco protensis cruribus uolent modo quo iam dictum est. Aues item hoc proprium habent ad cetera animalia, quod non pilis, non squama, non corrice, sed pennis teguntur. Pennæ omnes caule constant, fissæq; omnibus sunt: nec simili spe-

Penna, πτερόν.

D cie sunt atque ea quæ ἰστίδες, id est rotipenna à pennæ continuitate appellantur: his enim fissæ, illis infissæ est penna: & altera excaulis est, altera caulem habet. Pennæ præfictæ non similiter ac cæterorum animalium pili aut ab radice aut superne ab incisura possunt reparari, sed cadant necesse est.

1 ὀρεθς autē fere significat, ἰστίς, gallinam: sed cōfunduntur nonnunquā. 2 In auibus proprie ἰστίς, in sue ἰστίς dicitur. 3 Lautum, ελαφρόν, uetus interpres, subtile: an potius elegans? nā & ita uertit Theodorus: ἡλαφρόν in purpurarū sautagine.

De partibus auium interioribus.

Cap. CXX.

Aves uero & inter seipfas differre, & à cæteris discrepare animalibus etiam interiorum partium ratione apertum est: lingula enim (quam

# DE DIFFERENTIIS

αἰνῶσις uocāt) auibus deest:uerū laringis constrictione idipsum prestat, E  
 quod lingua in aliis:dum enim alimentum capiunt alia, lingua arteriam  
 cooperiunt:aues arteriam ipsam contrahunt atque ita claudūt, sicuti qua-  
 drupedes ouiparæ & serpentes. Auium pulmo exiguus est, parum habens  
 sanguinis, fungosus mēbranæque similis, & aptus ampliari & extumescere  
 cum inflatur. Pulmonis partes adeo inter se discretæ sunt, ut binos habere  
 pulmones credideris. Auium iecur maxime simile est uiui parorū: puro  
 enim & sanguineo colore exhilaratur. Magnæ auium parti lien usque adeo  
 exiguus, ut propemodum sensum effugiat, ut in columbis, miluis, accipi-  
 tribus, noctuis experimur. capriceps auis liene omnino caret. Aues omnes  
 fel habent: sed aliis uentri, aliis intestino iungitur, ut colūbæ, coruio, cotur-  
 nici, hirundini, passeri: aliis iccori simul & uentri, ut capricipiti: aliis iccori F  
 similiter & intestino, ut accipitri, miluo. Renes uero non habent aues, ne-  
 que uesicam: quanquam in nonnullis auibus carunculæ quædam sint la-  
 tiusculæ speciem renum ostendentes. Auibus quibusdam ingluuius præpo-  
 sita uentriculo est, ut gallinaceo, palumbo, columbo, perdicis: (ingluuius cu-  
 tis in amplum sinuata est, qua primum cibus ingestus cōinetur incoctus:  
 hæc parte qua iungitur gulæ angustior est, mox amplior, tum qua desinit  
 in uentriculum arctior:) aliis ingluuius deest, sed eius uice gula pertinet la-  
 tior & patentior uel tota, uel quæ propius uētriculo adit, ut monedula, cor-  
 uo, cornici, coturnici, capricipiti, noctuæ: at anati, anseri, laro, cataracta, gu-  
 la tota ampla & lata est. Multis etiā aliis auibus gulæ huiusmodi esse perspe-  
 ctum est. Nec desunt quibus uētricus ipse similis sit ingluuiei, ut tinnun- G  
 culo. Sunt itē quibus neque gula neq; ingluuius amplior sit, sed uētricus  
 longior, scilicet auiculis omnibus, qualis passer aut hirūdo est. Sunt etiam,  
 quanuis pauca, quæ neque ingluuiem neque gulam amplam habeant, lon-  
 gitudine autem ingluuiei admodum proluxa utantur: uidelicet quæ longa  
 angustaque colla habent, ut porphyrio: quæ fere omnes excrementum hu-  
 midius quàm ceteræ solent, reiciunt. Distat ingluuius ab ea gulæ parte  
 quæ uentriculo propinqua est multum, magnitudinis proportionē. Vēn-  
 tricus auium parti plurimæ carnosus callosusque est, cutis intus robusta  
 & quæ facile à parte carnosâ detrahi potest: sunt tamen, ut modo diximus,  
 nonnullæ quibus uentriculus longior sit atque ingluuiei similis. intestinū  
 quoque parti plurimæ auium tenue est, solutūque simplex est. Appendi- H  
 ces pauca in auibus sunt, non supra & circa uentriculum, ut in piscibus, sed  
 infra quæ desinit intestinum. Habent eas non omnes, sed plurimæ, ut galli-  
 naceus, perdis, olor, anser & aliæ multæ. Minoris etiam generis nonnullæ  
 habent, sed perexiguas, ut passer. Auibus testes dati sunt omnibus: non ta-  
 men qui foris pendeant, sed qui intus adhæreant lumbis: quomodo de san-  
 guineis quæ pedes habent ouiparis omnibus dictum est. ij priusquam coi-  
 re incipiant aues, aliis exigui, aliis omnino obscuri sunt. at uero cum uene-  
 rem exercent, insigni tantisper magnitudine augentur, quod apertissime  
 palumbis & perdicibus euenit. Vbi uero id tēpus præterierit, adeo exiguos  
 habent, ut incertum fere an habeant, sit: cum tamen eo tempore quo coeūt  
 gerant,

Ingluuius,  
 αἰνῶσις.

Agerant prægrandes: itaque fit ut hybernis mensibus ne ullos quidem testes in iis haberi nonnulli arbitrentur. Salaciorum auium testes conspectiores sunt, ut gallinaccorum & perdicum: temperatiorum minus. Auium uulua iuxta septum annexa est. cervicem habet carnosam callosamque parte inferiore. at superne qua septo iungitur, membrana constat, & prætenuis adeo est, ut oua extra uuluam esse existimes. Auibis ergo auctioribus membrana conspectior est: & si per cervicem infletur, extollitur atque sinuatur. at in minoribus obscuriora hæc omnia habentur. Auium ossa paulo inter se differre videntur: aquilis enim densissima sunt ossa, ut dictum est, & durissima: deinde & accipitrum ferocioribus, circo, palumbario & similibus: gallinaceo uero, anatibus atque anseribus laxa simul ac caua leuisque. B ossium est substantia. Semen genitale omnium auium album ut cæterorum animalium est. Partes auium tum exteriores tum interiores ad hunc modum se habere constat.

De coitu auium, & aliis quæ ad earum generationem pertinent.

Cap. CXXI.

C Oitus uero differentias in auibis has annotamus, ut aliæ sæmina confidente humi, mare superueniente coeant, ut gallinaceum genus: aliæ non confidente sæmina, sed stante, ut grues: & quæ ita coeunt rem quantè celerrime peragunt: mas enim supersiliens, cito ut passeris perficit. Cocundi pariendiue tempus non idem omnibus auibis est: sed parte plurima uere ac ineunte æstate coeunt & pariunt, excepta halcyone, quæ circa brumam parere solita est. Sunt etiam quæ sæpius generant, ut columbæ & gallinæ. Auium syluestres semel, magna ex parte coeunt atque pariunt: uerum hirundo bis parit & merula. at uero quæ aut urbana sunt, aut traduci possunt ad mores mitiores, hæc sæpius generant, ut columbæ, quæ tota æstate fœtant. gallinæ etiam coeunt & pariunt, præterquam duobus mensibus brumalibus. Auio itaque aliis aliæ fœcundius pariunt: quod bifariam fit: aut enim quia crebrius, ut colubæ, aut quia numerosius, ut gallinæ. Omnes quibus ungues adunci, minus salaces sunt, & parcius generant, excepto tinniculo, qui plurima in adunco genere parit. Sed quæ graues sunt atque item ueloces, quarum scilicet corpus grandiusculum est, ut colubæ & similes, aut graues non duolaces, quarum corpus grande, ut gallina, coitu superant perfectècundæque sunt: quomodo interdum plantæ minores sunt fertiliores. Pariunt cæteræ in nidis: quæ autem grauiiores sunt & minus uolant, ut perdice, & coturnices, & reliqua generis eiusdem, non nidis, sed condenso frutice prolem muniunt: facta enim in aprico area (alibi enim nusquam pariunt) atque materia ut utribus quibusdam cõgestis, quoad accipitrum & aquilarum iniuriam deuotare possint, oua edunt & incubant: mox cum excluserint, protinus pullos educunt, propterea quod nequeunt suo uolatu iis cibum administrare. Aquaticæ omnes quæ in lacubus aut paludibus uiuant, iuxta paludes & locis herbam habentibus nidos faciunt: quem uero Bæotij meropem uocant, hic unus subiens terræ cauernas facit cunabula. Vpupa una in suo genere non

*Numerosius, uetus interpres, multa generat.*

nidificat: sed stipites arborum subiens parit sine ullo collecto stramento in E  
cauis. Oua pariunt aues omnes, sed quæ unicū pariat ouum, excepto cuculo,  
nulla est. Ouum æque omniū uolucrum duro putamine constat, si modo  
non deprauetur: gallinæ enim nonnulla pariunt mollia, uitio. Bicolor quoq;  
ouum intus est: luteum interius, albū exterius: mēbrana hæc inter se discer-  
nuntur. Sunt & quæ χαλαραι, id est grandines dicuntur, uitelli initio adhæ-  
rentes, quæ nil ad generationem cōferunt: quanquam aliqui ita non existi-  
mant: has duas esse certum est, alteram parti superiori iūctam, alteram in-  
feriori. Vmbilicus ouis ( inquit Plinius ) à cacumine inest, ceu gutta emi-  
nens in putamine. Fiunt & oua tota lutea quæ uocant schista, cum triduo  
incubata tolluntur. Differunt oua aquaticarum à terrestribus, quòd multo  
plus lutei quàm albi ex proportionē contineant. Differunt & colore inter F  
se oua auium: sunt enim alia cādida, ut columbarum & perdicum: alia pal-  
lida, ut palustriū: alia punctis distincta, ut phasianarum & meleagridum:  
rubrum tinnūculi est modo minij. Quin & ipsum ouum in se suum habet  
discrimen: quippe quod non plane rotundū sit, sed parte sui acutum, parte  
latius sit: qua quidem parte latiore exit, cum in lucem editur. Exit autem  
pars oui acuta post: ea nāque parte adhæret, in qua & principium pulli est.  
Itaque fit ut partus ouorum contra atque animalium euenit: animal enim  
uersum in caput suūque principium nascitur: at ouum quasi in pedes cō-  
uersum exit. Concipit fœmina cum coierit ouum superius ad septum trās-  
uersum: quod ouum primo minutum & candidum cernitur, mox rubrum  
cruentūque. Deinde increfcens luteum & flauum efficitur totum: iam G  
amplius auctum discernitur, ita ut intus pars lutea sit, foris candida am-  
biat. ubi perfectum est, absoluitur à corpore, & exit putamine dum pari-  
tur molli, sed protinus durefcēte, nisi uitio uulvæ defecerit. at postea oua  
ipsa aceto macerata in tantum emolliuntur, ut per annulos transeant.  
Sunt oua quibusdam gemina, quæ binis constant uitellis. Hi ne inuicem  
confundantur, facit in nonnullis prætenue quoddam septum albuminis  
medium: aliis uitelli contactu mutuo sine ullo discrimine iunguntur. Gal-  
linas aliquas & anserum iuuenas expertes adhuc coitus parere oua quæ  
& minora, ac minus iucundi saporis, & magis humida quàm ea quæ fœ-  
cunda gignuntur, sed plura numero. humor eorum crassefcere incubatio- H  
ne auis non potest: sed tam cādida quàm lutea pars similis sibi perseuerat.  
Pariunt genus id oui plures aues, & maxime quæ non uolaces sunt aut ad-  
unx, sed multiparæ ut gallinæ & perdices, colūbe, pauoues, anseres & uul-  
panferes. Redditur uero ouum subuentaneum illud fœcūdum, si prius co-  
eat auis, quæ subuentaneum ouum fert, quàm ouum ipsum à luteo in can-  
didam ambientē partem proficiat. Ita enim fit, ut subuentanea oua fœcun-  
da reddantur: at si iam candidū receperunt humorē, fieri non potest ut sub-  
uentanea in fœcunda mutentur. Sunt qui hypenemia illa oua, zephyria  
nominant, eo quòd uerno tempore aues statim illos fœcundos ex fauonio  
recipere uideantur. Celeriter magna pars auium, & impletur, & oua sub-  
uentanea

Ouum.

Intus omi.  
Tò ὄχρῳ.  
Vitellus.  
Χαλαραι.

Oua schista.  
Schista, aliās  
suscita.

Oua σπρω-  
μα, subuen-  
tanea.

Oua zephyria



A uentanea illa concipit: quod uel in perdice percipi potest, eo quòd ad libidinem incitatur tēpore. Generatio ex ouo omnibus uolucris euenit modo quidem eodem: sit enim ut incubante & concoquente aue, animal ex parte oui secernatur, ex albumine scilicet: augeatur uero ex reliqua parte & perficiatur, nempe uitello: origo nanque in albumine est, cibis per umbilicum ex luteo petitur. Itaque auium incubitu fœtum excludi naturæ ratio est: non tamen ita solum oua aperiuntur: sed si aut tempus sit bene temperatum, aut locus, in quo oua manent, tepidus, concoquuntur nonnunquam & auium oua, sicut & quadrupedum ouipararum, sine parentis incubitu, tepore terræ: ut in Ægypto oua obruta fimo pullitiam procreant. Nonnunquam uero & cum in uasis quibusdā tepidis essent coniecta, spōte

B oua pullos prompsere. Oui generatio ab initu, & pulli rursus ab ouo concocto prouentus, non pari temporis spatio euenit omnibus, sed pro magnitudine generantium interest. Ouum gallinæ consistit à coitu, & perficitur decem diebus maxima ex parte: columbæ paucioribus. Gallinis tertia die ac nocte postquam cœpere incubare, indicium præstare oua incipiunt. At maiorum auium generi plus prætereant temporis necesse est: minori autem minus sufficit. Effertur per id tempus luteus humor ad cacumē, à qua principium oui est, & cor quasi punctum sanguineum in candido liquore consistit: uel, ut Plinius tradidit, in medio uitelli. hoc punctum salit iam & mouetur ut animal. Tendūt ex eo meatus uenales sanguigeri duo tortuosi ad tunicam ambientem utranque, dum augetur. Membrana etiam fibris distincta sanguineis, iam album liquorem per id tempus circumdat, à meatibus illis uenarum oriēs: paulo autem post, & corpus iam pulli discernitur, exiguum admodum primum & candidum, conspicuum capite, & maxime oculis inflatis: quo modo diu permanet: sero enim decrescunt oculi, & se ad ratam contrahunt proportionem. pars autem inferior corporis, nullo membro à superiore distingui inter initia cernitur. Iam meatuum quos ex corde tendere diximus, alter ad ambientem album liquorem fertur, (ex quo pulli origo est) alter ad luteum uelut umbilicus. Die iam decimo pullus totus perspicuus est, & mēbra omnia patent: caput grādius toto corpore, oculi capite reliquo grandiores hērent: quippe qui fabis maiores per id tempus emineāt, nigri nondum cum pupilla: quibus si cutem detrahas, nihil solidi

D uideris, sed humorem candidum frigidūque admodum refulgentem ad lucem, nec quicquam aliud: ita oculi & caput. Iam uero & uiscera eo tempore patent: & alui intestinorumque natura perspicua est. uicesimo die iam pullus, si quis putamine secōto sollicitet, mouet intus sese, pipitque aliquantulum: & iam ab eodem die plumescit, quoties ultra uicesimum exclusio protelatur. Iam per id tempus pullum ipsum multum humoris lutei subit, atque in eius aluo aliquid subsidit luteum, quo uidelicet adhuc nutritur. Excrementum etiam album eodem tēpore pullus emittit, & in aluo quiddam album consistit. Demum uitellus paulatim absumitur totus mēbrorū hauſtu, ita ut si pullo decimo die post excluso rescindas aluum, nōnihil adhuc uitelli comperias. Initium nanque suæ generationis pullus à candido



sumit, cibum à luteo capit & incrementum, ut modo diximus: ita enim pul-  
 lum qui in ovo nascitur, uti luteo existimandum est, ut fœtus in uiuiparis 3  
 sua parente utitur quandiu intra parentem continetur. Incubat aquila tri-  
 cenis diebus: & cæteris quoque magnis alitibus tempus incubandi tantū-  
 dem à natura statutum est, ut anseri & tardæ: mediocribus uiceni perficiūt  
 incubationem, ut accipitri, miluo. Et auium quidem ortus ad hunc modū  
 ex ovo agitur. Sed euidentiora hæc in auctioribus auibus sunt: nam in mi-  
 noribus obscura præ sua exiguitate habentur. Excludunt celerius incubā-  
 tes æstate quàm hyeme: ideo æstate gallinæ duodeuigesimo die fœtum ex-  
 cludunt, hyeme aliquando uigesimo quinto. Discrimen tamen & auū est,  
 quòd aliæ magis aliis fungi officio incubandi possunt. Incubat magna auū  
 pars, fœminæ mare succedente: aliqui mares incubandi munus tantisper F  
 subeunt, dum fœminæ intermisso incubitu cibum quærunt. anserum &  
 cornicum fœminæ tantum incubant. Quæ in lacubus paludibusue uictum  
 sibi quærunt, omnes iuxta paludes ipsas, & locis herbam habentibus nidos  
 faciunt, ut dictum est: quo fit ut occupatæ negotio incubandi possint su-  
 mere cibum, nec omnino inedia laborent. Sunt quædam, ut in genere gal-  
 linarum, quæ pariant gemina omnia: ex iis quædam duodeuiginti peperit,  
 exclusitque gemina, præterquam si qua essent, ut fit, irrita: sed qui fœtus ge-  
 mini excluduntur, ita prodeunt, ut alter sit maior, alter minor: & tandem 4  
 in monstrum partus degenerat, qui minor nouissime provenit. Deprauan-  
 tur quādoque oua, & fiunt quæ urina & canicularia uocantur, uitello cor- 5  
 rupto, tēpore potius calido, ut æstate. Multiparis hoc accidit frequētius & G  
 uncunguibus: quanuis parū fœcundis, nihilominus tamen idē euenit: sæpe  
 enim uel alterum ex duobus urinum fit, uel tertium semper fere. Aues ma-  
 gna ex parte anniculæ nequeunt generare. Quibus partus numerosior est,  
 unū saltē ex pullis sæpe nido expellunt. & omnes fere alites quibus unguis  
 adunci, pullos cum primū prouolandi facultas fuerit, nido expellunt, per-  
 cutiētēsq; cogunt discedere: & cæterę quoq; aues maxima sui parte idē hoc  
 faciunt: cūmq; enutrierint, nihil præterea adhibent curæ, excepta corni-  
 ce, quę aliquandiu prouidet. Aues ad hunc modū coeunt, gestāt & pariunt.

1 Quo pacto perficiatur pullus in ovo, pluribus uerbis atque apertius ostendit A-  
 ristot. lib. 6. histor. animal. 2 Non cor, ut Aristoteles, sed iecur primum in anima-  
 lium generatione formari sentit Galenus: id quod in uiuiparis & in homine maxime  
 explicat aperte: sed in ouiparis minime. 3 Ipsum animal, inquit Plinius, ex albo li H  
 quore oui corporatur: cibis eius ex luteo. 4 Locus hic Aristotelis aliter fortasse  
 reddi potuerat, ut infra explicabitur in gallinaceo genere. 5 ουρετικὰ καὶ κοίτην, sunt  
 urina, ut Plinius uult, oua in incubatione derelicta.

De uictu auium & de loci mutatione earum. Cap. CXXII.

Carniuora,  
 σαρκεφάγα.

τελεινα φά-  
 γα.

ἀκαθάρτα.

**I**N auium genere, quibus unguis adūci, omnes carniore sunt: fruges au-  
 tem ipsæ etiam si in os indideris, nequeunt deuorare, ut genera aquilarū  
 omnia, milui, accipitres: sunt tamen etiam in genere nō aduncos, quæ carne  
 uescantur, ut hirundines: aliquæ uermiculis partim ex toto, partim magna  
 ex parte aluntur, ut fringillarum genera: aliæ spinā appetunt, & inter spi-

A nās uicitant: uermem autem & quoduis animal aspernantur, ut spinus & carduelis. item qui auriuinctis appellatur: atq; hæc omnia uicitant in spinis, & dormiunt pascunturque eodem in loco. Aliæ uermiculis formicisque in lignis degentibus gaudent, nec alio magis quàm eius generis animalculorum uenatu uiuunt: ut pipō tam maior quàm minor. Aliæ frugibus uiuunt: ut palumbes, columbus, turtur. Nōnullę etiam aues omniuorę sunt, ut cornix. Omnium fere auium alię uictum à terra petunt, alię à fluuiō & lacu, alię à mari: & harum, quę palmipedes sunt omnes in ipsa aqua partē maximā temporis uersantur. Multę etiam fidipedes prope aquas paludęque degunt: earumque nonnullę terra contēptis altilibus uescuntur, quę scilicet carnem non tangunt. Palmipedum grauiores circa lacus & amnes

Σχιπτοφάγας,  
ἢ κριπτοφάγας.  
Καρπεφάγας,  
ἢ καρπεφα-  
γιστῶν.  
Γαυφάγας.  
Palmipedes,  
αγανίπιδες.

B uersantur, ut olor, anas: omnes uero palmipedes apud mare, aut fluuios, aut lacus. Aues aduncę, tum cętera animalia, tum aues aggrediuntur: sed non sui generis carniorę sunt modo piscium, qui plerunque sibi cognatos rapiunt: nulla autem auis, quanuis etiam carniuora, sui generis aliam deuorare solet. Genus auium cum omne potu exiguo contentum sit, tum aduncis nullis omnino usus bibēdi est, pręterquam paucissimis quibusdam, quę & ipsę raro utuntur, qualis potissimum tinnunculus est: miluus etiam uisus est bibere, quanquam raro: cęterę aues bibunt quidem, sed parum. Auium alię sorptu bibunt: sed quibus collum est longum, intermittunt caputque resupinat. porphyrio unus morsu bibit. Loca uero in quibus degāt agrestes uolucres, aptissime ad uictum & prolis salutem moliantur. Colūt

Aues adunca.  
Ταμνόνχας.

C alię loca fragosa & saxa: alię cauernas, ut qui charadrias appellatur: sunt quę montes colāt & syluas, ut upupa, brentus: trochilus fruteta incolit & foramina. Viuunt apud mare, & flumina, & lacus palmipedes omnes, ut dictum est: sed multę etiam fidipedes circa aquas paludęque degunt. Loca mutare quandoque solent aues nonnullę: imbecilliores nanque hyberno & gelido tempore discedunt in campos, ut tepore potiantur: æstiuo autem repetunt montes, ut æstu careant. Sęper quę imbecilliores sunt, prius utrauis ratione discedunt: coturnices enim Augusto, grues uero Septembri mense incipiunt. Sunt profecto omnes pinguiorę, quę de locis discedunt frigidis, quàm quę de calidis: ut coturnices autumno quàm uere sunt pinguiorę. Itē autem ut simul de locis frigidis & tempore calido discedatur.

Loca fragosa,  
χαεγμῆς.  
Cauernas, χα-  
εγσπας.  
Fruteta,  
λοχμῆς.

D Auium complures conduntur, non ut aliqui putant, paucę: nec omnes ad loca tepidiora abeunt: sed quibus loca eiusmodi sunt uicina solitę sedis, iis eō secedere libet: ut miluos & hirūdines agere animaduersum est. Quę autem procul locis eiusmodi morantur, non mutant sedem, sed se ibidē condunt: iam enim uisę sunt multę hirundines in angustis conuallibus nude atque omnino deplumes: milui etiam de eiusmodi locis euolasse, cum primo apparerent, uisum est. quędam uero auium genēra semper apparent, nec loca mutant aut latent: & in iis pręcipue quę in urbibus solent uiuere, ut coruus, cornix. Itaque temporum magna est differētia auibus: perennes, ut columbę: semestres, ut hirūdines: trimestres, ut turdi & turtures: & quę cum sæctum eduxere abeunt, ut galguli, upupę.

De uocis discriminibus &amp; coloris in auibus. Cap. CXXIII. E

**G**enus auium uocem mittere potest: & pleræq; uocem copiose emittunt: & omnium maxime animalium post hominem conficiendæ locutionis nonnullis auium generibus datum est, ex iis uidelicet quibus lingua mediocriter lata uel tenuis. Quâuis autem latiore habeant linguam quæ unguibus sunt aduncis, tamen minores uocaliores sunt, magisq; garulæ ac linguaciores: & circa coitum maxime talem fieri unâquamque auctoris est. Et alii in pugna uox, ut coturnicibus: aliis ante pugnam, ut perdicibus, dum suos aduersarios prouocant: aliis cum uicere, ut gallinaceis. Cautum item nonnulli mares perinde ut suæ sceminæ: sicut in lusciniarum genere patet: scemina tamen cessat cantu, cum incubat, pullosq; educat. Sed in nonnullis generibus cantus maribus tantum datus est, ut gallinaceis & coturnicibus. Vox illa explanata, quam esse quasi locutionem dixeris, differt: quandoque etiam earum quæ eodem genere continentur: auicularum enim nonnullæ haud uocem eandem mittunt quam sui parentes, si præterea paterna caruerint educatione, moribusque & cæteris cæterarum auium infuerint. Lingua utuntur aues etiam ad sui sensus mutuam interpretationem: sed aliæ aliis amplius, ut in nonnullis uel usus docendi mutus esse uideatur. iam enim lusciniæ modulos suos pullos docere, uersusque quos imitantur, trader e uisa est. Immutantur aues nonnullæ per tempora & colore & uoce, ut merula, quæ ex nigra redditur rufa, & uocem mittit diuersam: turdus colorem mutat: palumbes hyeme non gemit. Denique tunc maxime plurimæque emittunt uoces, cum coeunt. Auium autem penè nullæ per ætates mutantur, ut aliorum animalium pili, præterquam gruum, quas nigrescere in senecta perspectum est. At uero per affectus temporarios, quoties frigora urgent acriora, pennæ uolucrum interdum è nigris aut nigriusculis in albas transeunt: ut corui, passeris, hirundinis. Temporum quoque uicissitudine bona pars auium ita colore immutatur, ut quænam sint latere possint, nisi rem penitus noueris.

Ex incessu auium & uolatu differentia, atque ex ualetudine moribusque. Cap. CXXIII.

**O**mnibus animalibus reliquis certus & unius modi in suo cuique genere incessus est: aues solæ uario meatu feruntur, & in terra & in aere. Ambulant aliquæ, ut cornices: saliant aliquæ, ut passeris, merulæ: currunt, H ut perdices, rutilicæ: ante se pedes iaciunt, ut ciconiæ & grues. Expandunt alas, pendentisque raro interuallo quatunt, aliæ crebrius, sed & primas duntaxat pennas: aliæ & tota latera pandunt. Quædam uero maiore ex parte compressis uolant percussioque semel, aliquæ & gemino ictu aere feruntur, uelut inclusum eum prementes. Iaculantur sese in sublime, in rectum, in pronum. Impingi putes aliquas: aut rursus ab alto cadere has, illas salire. Anates solæ, quæque sunt eiusdem generis, in sublime protinus sese tollunt, atque è uestigio cælum petunt, & hoc etiam ex aqua. Vultur & fere grauiores, nisi ex procursu aut altiore tumulo immixte non euolant. Sine

uoce

Alias pendentesque.

A uoce non uolant multæ, aut è contrario semper in uolatu silent, subreptæ, pronæ, obliquæ, in latera, in ora: quædam & resupinæ feruntur, ut si pariter cernantur, plura non in eadem natura meare uideantur. Iterum auium alia uolaces, quæ scilicet alis grandibus atque ualidis sunt, ut quæ ungues *Aues uolaces.* habent ad uncus & quæ carne uestiuntur: sed non modo quæ ad uncis sunt unguibus, uerum alia quoque uolucrum genera uolatu superant, uidelicet ea quæ pernicitate uolandi sese tuentur, uel loca mutare solent. Sunt quæ non uolaces sed graues sunt, quibus uita terrena est, & aut fruge uiuunt aut *Aues graues.* natant, & apud aquas immorantur. Quæ longis cruribus innituntur non admodum uolaces fere sunt, & in uolatu porrectis cruribus in auersum uolant: sicuti & alia omnes quæ caudam pusillam gerunt, ut palmipedes. At **B** alia, quibus scilicet (ex iis quæ pedes habent fissos) crura breuia sunt, hæ ad uentrem contractis cruribus uolant. Quæ longo sunt collo, si id crassius habent, uolant collo porrecto, ut olor, anser: si tenue, collo curuato feruntur, ut ardeola. Calcarigeræ præ sua grauitate sunt ad uolandum ineptiores. Corpora unguium exigua sunt exceptis alis: contra quæ uolaces non sunt, iis corpora euadunt in molem grandiore: atque ita efficitur, ut sint grandiores. Magnitudinem tamen auium minimam esse prope dixerim, si ad alia respicias animalia, necesse est. Quod uero ad ualitudinem attinet, auius profunt squalores, tum ad ceteram sanitatem, tum etiam ad partum, & præcipue palumbis: incommodi autem his anni pluuij sunt: quippe cum auium natura sit, ut ne bibere quidem largius possint sine detrimento. Cum **C** aues ægrotant, plumæ indicium præ se ferunt: turbantur enim, nec posituram eandem seruant quam habent cum recte ualent. Aduersus improbitatem alitum depascendum semina allium, inquit Plinius, quod in aruis sponte nascitur, (alium hoc uocant) costum ne renasci possit, abiicitur: statimque quæ deuorauere aues, stupentes manu capiuntur. Mores auium ita habent, ut alia sese in puluere uoluent, alia sese lauent, alia nec puluere neque balneo utantur. Sunt pulueratrices, quæ non altiuolæ sunt, sed in terra uersantur, ut gallina, perdix, phasianæ, lotrices nonnullæ rectungues, & quæ circa fluuios aut paludes, aut mare uersantur. Alia utrumque tum lauare tum puluerare solent, ut columbus, ut passer.

**D** Eorum quæ in auius alimenti medicamentum rationem ob-  
tinent, discrimina. Cap. CXXV.

**A**uium genus omne carnem habet, quæ si cum quadrupedibus conferas, & minus præstatimenti, & facilius concoquitur: maxime uero perdicis, attagenis, columbæ & gallinæ. Turdorum autem caro merulæ rûmque & auium minutarum (in quibus sunt qui *τρυγῆται* uocantur) *τρυγῆται.* durior est: quibus etiam durior, turturis, palumbi & anatis caro est. Phasianorum autem, quod adimenti rationem attinet, gallinacæ carni similis est: sed suauitate præstat. pauus durior, fibrosior, concoctusque difficilior est. Perdix tamen & turtur, atque aliæ id genus (si qua illis inest durities) cum uel uno die mortuæ assuerentur suspensæ, duritiem illam reijciunt, siuntque;

friabiles omnino: & sanguineum procreant crassitie tenuitatēq; mediocrē. E  
 Probum gignit succum auium fere omnium caro: earum tamen non par-  
 ua existit differentia, quod in montibus locisque siccis degant: aut in flumi-  
 nibus, stagnis, paludibus, lacustribusue locis uicentent: pro locorum nanque  
 ratione sicciores sunt carnes, excrementisque magis uacuae, & ad conco-  
 ctionem faciliores: aut contra, humidæ excrementosæq;, & concoctu dif-  
 ficiliores. Itaque probum succum faciunt, ut gallinaceum genus, ita & pha-  
 siani, perdices, atragenes, columbæ, merulæ, turdi, turtures, atque auicularū  
 genera. Excrementosa autem & deterrima earum caro quæ lacustribus pa-  
 lustribusque locis ac fluminibus immundis & turbidis degunt. Alarum  
 substantia in iis auibus quæ parua sunt & duræ fibrosa duraque est: at pin-  
 guium iuniorumque auium facile concoquuntur, & optimæ sunt: sicuti F  
 annosarum graciliorumque pessimæ. Viscera auium eandem habent ad  
 carnes proportionem, quā quadrupedibus diximus. Intestina omnium fe-  
 re ad cibum sunt inepta: at uentriculi & manduntur & corpus nostrum  
 alunt: sunt autem crassi durique & concoctu difficiles: qui tamen abunde  
 nutriunt, si probe fuerint concocti: nonnulli uero ex iis sapore sunt suauis,  
 ut anserum & altilium gallinarum. Cerebrum ex auibus longe præstantius  
 est quā ex quadrupedibus, ut quod siccius est, præsertim si montanæ a-  
 ues fuerint, quæ palustribus longe melius habent cerebrum. Oua cibos  
 quot modis iuuent notū est. Nullus est alius cibus, inquit Plinius, qui in æ-  
 gritudine alat neque oneret: simulq; uini usum & cibi habeat. Oua optima  
 sunt gallinarum & phasianarum: anserum uero & struthocamelorum de- G  
 teriora. Oua quo recentiora eo præstantiora, sicuti quæ uetustissima eadem  
 & pessima sunt: quæ uero ætate media sunt, proportionem recessus ab extre-  
 mis bonitate aut succi prauitate inter se differunt. & quæ oblonga sunt oua 2  
 gratiores saporis putat Horatius Flaccus. Ad concoctionem, digestionē,  
 nutritionem, bonique succi generationem præstant, quæ τρεμουτῖ, id est tre- 3  
 mula uocantur, quæ scilicet cocta quidē sunt, sed modice: quæ uero ποφουτῖ,  
 id est forbilia dicuntur, in aqua duntaxat excocta, liquida adhuc & mini-  
 me coacta densatæque, minus quidem nutriunt, sed aluum magis mouent,  
 ac gutturis asperitates, gulæque, nec minus uentriculi intestinorum atque  
 uelicæ leniunt: stomachum tamen languidum subuertere solent. Quæ au- 4  
 tem diutius cocta duriora euadunt, crassiorem ea procreant succum: diffi-  
 ciliusque concoquuntur, & tardius permeant: longē his duriora sunt ac tar H  
 dius permeant, quæ in seruenti cinere uehementer assantur. Omnium deterrima  
 sunt, quæ in lartagine spissantur: unde & τρυγαντῖ, id est frixa appellatur,  
 malum nanq; procreant succū, crassum atq; excrementosum nidorosumq;,  
 & qui reliquū quoque cibū in uentriculo corrūpat. Quæ τριχῖ uocantur,  
 hoc modo parari solent: oua ubi oleo, garo ac uino modico fuerint imbu-  
 ta, in duplici uase supra ignem modice crassescunt. Hæc & elixis & assis  
 meliora sunt, si ad mediocrem crassitiem peruenerint: nam & probum  
 generant succum, & facile concoquuntur. Hic cōsistētiae modus in iis etiā  
 ouis seruandus est, quæ superne caldariis infunduntur: ne scilicet nimium  
 crassescant,

Oua.

Τρεμουτῖ,

Tremula.

Oua forbilia,

ποφουτῖ.

Tardius per-

meant, τρυγαντῖ.

τριχῖ.

Oua frixa,

τρυγαντῖ.

τρίχῖ.

**A** crassescant, sed dum adhuc liquida sunt, uas ab igne summouendū. Ouum si edatur in aceto coctū alui fluxiones desiccant: quod si austeri quippiam ouis addideris (quale rhus est, aut galla, aut balaustium, aut id genus aliud) & super prunas frixeris, efficacius fit medicamentū: & ad dysentericos hoc modo celiacosq; affectus efficacissime datur. Maceratorum in aceto moliri diximus putamen: talibus cum farina in pane subactis, celiacī recreantur. Quidam ita resoluta in patinis torreri utilius putant: quo genere non aluos tantum, sed & menses ferminarum sistunt: aut si maior sit impetus, cruda cum farina ex aqua hauriuntur. Et per se lutea ex his decocta rursum in aceto, donec indurescant, iterūque cum trito pipere torrentur ad cohibendas aluos. Fit & dysentericis remediū singulate ouo effuso in fictili no-

**B**uo, eiusdemque oui mensura, ut paria sint omnia, melle, mox aceto, item oleo, confulis crebroque permixtis: quo fuerint excellentiora, hoc praesentius remedium erit. Alij eadem mensura pro oleo & aceto resinā adiciunt rubentem, uinumq;, & alio modo temperant, olei tantum mensura pari, pinicūque corticis duabus sexagesimis denariorum, unā eius quod rhus dicimus, mellis obolis quinque, simul decoctis, ita ut cibus alius post quatuor horas sumatur: ad puris & sanguinis excreationes ouum crudum cum porri sectiui succo parique mensura mellis Græci calefactū hauritur. Ouo quoque toto crudo utimur admixto rosaceo ad palpebrarum, aurium mamma-rumque phlegmonas, & quæ in partibus nervosis contingunt, ut cubito & digitorum tendinibus, siue in manibus siue pedibus existant. Et ambustio-

**C**nibus, si statim imponatur, prodest, siue cādidum oui solum molli lana exceptum, siue etiam cum utello quis imponat: mediocriter nanque refrigerat ouum, & citra erosionem desiccant. Cādidum oui ægre concoquitur: temperatura modice frigidum est, & mordacitatis experta atque emplasticum: ophthalmiis, sedisque ac pudendorum ulceribus medicamentum est idoneum: ambustionibus innasce pustulas non sinit, si quamprimū eo perungantur: faciem à solis uestione tuetur: frōti impositum, cum thure fluxiones arcet: inflammationes oculorum lana exceptū, addito rosaceo, melle & uino mitigat. Crudum contra hæmorrhoidis serpentis morsum: tepidū uero ad uesticæ rosiones renūmq; ulcerationes datur: ad asperæ quoque arteriæ scabritiem, sanguinis reiectionem, distillationes, thoracisq; fluxiones. Mi-

**D**iscet quoque medicamenti sanguinis profluuium ex cerebri membranis quas meningas uocant, suppressantibus: & ad ulcera malefica, cum iis quæ absque erosione exsiccant: qualia sunt pompholix et metallica, quædā elota. Vitellus quoque natura simili est: misceturque ceratis immordacibus, & cataplasmatibus quæ phlegmonas mitiget, ouis uidelicet aut elixis aut assis: sed paulo exsiccantiōr fit assatus: quantumque siccitatis hoc modo habeat, tantum mitigatoriæ facultatis amittit. Luteum oui, inquit Dioscorides, oculorum doloribus utile est. assūm sedis inflammationibus prodest cum croco & rosaceo: & condylomatibus cum meliloto: cum rhoe culinaria aut galla in sartagine frigitur: & in cibo aluum sistit: ad idem quoque per se offertur. Prodest tussientibus, inquit Plinius, per se luteum deuoratu li-



quidum, ita ut dentibus nō attingatur: thoracis distillationibus & faucium E  
 scabritie. Stomachum dissolutum cōfirmāt pulli ouorum, gallæ dimidio:  
 ita ut ne ante duas horas alius cibus sumatur. Dāt & dysentericis pullos in  
 ipso ouo decoctos, admixta uini austeri hemina, & pari modo olei polen-  
 tæq;. Membrana putaminis detracta siue crudo siue cocto, labiorum fissu-  
 ris medetur: putaminis cinis in uino potus, sanguinis eruptionibus. combu-  
 ri sine membrana oportet: sic fit & detisfricium. Firmitas putaminum tan-  
 ta esse traditur, ut nec ui nec pondere ullo frangatur, nec nisi paululum in-  
 flexa rotunditate. Et ne quid desit ouorū gratiæ, cādīdum ex his admixtum  
 calci uiuæ glutinat uitri fragmenta. Vis uero tanta est, ut lignum perfusum  
 ouo non ardeat: ac ne uestis quidē contacta aduratur. De gallinarum autē  
 ouis fere tantum locuti sumus, cum & reliquarum alitum restant magnæ F  
 utilitates, sicut suis dicemus locis. Adeps auium nonnullarū, ut anserinus  
 & gallinaceus, recēs & sine sale cōditus, uulæ uitiiis prodest: sale inuetera- 6  
 tus, & qui temporis diuturnitate acrimoniā contraxit, uulæ inimicus est.  
 Fel auium siccius atque acius est, quā sit quadrupedum.

1 Hoc in loco *πῆρῳ*, ni fallor, passeret uocant Galenus & Oribasius: nec secus  
 Aëtius in Galerita. 2 Horatius, Longa quibus facies ouis erit, illa memēto Vt succi  
 melioris, &c. 3 Hæc Dioscorides *ἐκ ἀπυλῶ*, id est oua mollia uocat. 4 *Ἀνζαυλί-  
 ηδ* hæc uocat Sethus, nisi mendosus sit codex. 5 Caldariis infunduntur, Hæc *ἰσφῶν*  
 uocat Sethus. 6 Auiū adeps quo pacto curari reponiq; debeat, docēt Diof. & Plin.

De auium generibus quæ fissos pedes habent: & primo,  
 de gallinaceo genere. Cap. CXXVI.

G

*Fidipedes.  
 Digitare.  
 ψηφισα.  
 Gallinarum  
 genera.  
 Gallina,  
 ἀλεκτορίς,  
 Gallus galli-  
 nacemus.  
 Gallinacemus.  
 Capus.*

V Olucrum prima distinctio pedibus maxime constat: aut enim digitos 1  
 habent fissos, dicūtūq; fidipedes, aut in palmipedum genere sunt, uti  
 modo diximus. Inter fidipedes uero, gallinarū plerunque agricolæ cura so-  
 lennis est. earum genera sunt, uel cohortalium, uel rusticarum, uel Africa- 2  
 narum: cohortalis est auis quæ uulgo per omnes fere uillas conspicitur: &  
 ex tribus hisce generibus, hæ propriæ appellantur gallinæ: mares autē gal- 3  
 li, semimares capi, qui hoc nomine uocantur cum sint castrati libidinis ab-  
 olendæ causa. Cum cæteræ aues cristam gerant pennarū eminētia quadam  
 extructam, gallinaceus unus peculiarem sibi sortitus est cristam: sic enim  
 institutam, ut nec caro sit, nec à natura carnis omnino aliena. Ingluū ē ha-  
 bet gallinacum genus præpositam uentriculo, & appendices quasdā pau-  
 cas infra, quā definit intestinum. Coeūt & pariunt gallinæ omni fere tem-  
 pore: toto enim anno præterquam duobus mensibus brumalibus pariunt. H  
 Inhorrescunt à coitu, & se excutunt: sæpe etiam festuca aliqua sese  
 lustrāt, quod edito ouo interdum faciunt. Magna est generosarum nonnullis fœ-  
 cunditas: quando oua uel sexaginta edunt ante incubitum: quanquam ge-  
 nerosæ minus fœcundæ quā ignobiles uulgares uel sunt. Nonnullæ enim  
 è corticalibus bis die pariunt. Iam aliquæ in tantum copię peruenerunt, ut  
 effectæ breui morentur. Hadrianis laus maxima. Hæ paruo quidem sunt  
 corpore, sed quotidie pariunt: ferociunt tamen, & pullos sæpe interimunt:  
 color his uariis. Ouum gallinæ cōsistit à coitu, & perficitur decem diebus  
 magna

*Gallina ha-  
 driana.*



Amagna ex parte. Gallinarum iuuenæ pariunt primæ, statim uere ineunte:  
 & plura quàm ueteres, sed minora. Sunt in genere gallinarum quæ parius  
 gemina omnia (gemina uoco, quæ binis cōstant uicellis): quædā enim duo-  
 deuiginti peperit, exclusitq; gemina: præterquam, si qua essent (ut sit) irrita.  
 4 Cæteris itaque geminis fœtus prodijt: sed ita gemini excluduntur, ut alter  
 sit maior, alter minor: & tandem in monstrum degeneret, qui minor no-  
 uissime prodijt: aliqui negant omnino geminos excludi. Pariunt autē gal-  
 linæ oua nonnulla infœcunda, uel eorū quæ conceperint coitu: nullus enim  
 prouenit ex eis fœtus, quanuis incubitu foueantur. Oua plena sint atq; uti-  
 lia nec ne, animaduerti aiunt posse, si demiseris in aquam: quòd inane, na-  
 tat: plenum, desidit. Qui (ut hoc intelligant) concutiunt, errare: quòd in eis  
 B uiales uenas confundunt: quo fit ut non gignant, cōfusus scilicet uitalibus  
 uenis. In iis idē aiunt, cum ad lumen sustuleris: quod perlucet, id esse inane.  
 Oua quæ incubantur, si habeant in se semen pulli, curator quatriduo post-  
 quam incubari cœperint, intelligere potest: si enim contra lumen cacumi-  
 ne ouorum apprehenso, purus & unius modi perluceat color, sterilia existi-  
 mantur esse, pròque eis alia substituēda. Gallinas quæ incubare uolūt (glo-  
 cientes uocant rustici) negant plus uiginti quinque oportere oua incubare.  
 5 Numerus autem ouorum quæ subiiciuntur (ut præcipit Columella) impar  
 obseruatur, nec semper idem: nam primo tempore, id est mense Ianuario  
 (fere enim cum primū partum consummauerint, gallinæ incubare cupiūt  
 ab idibus Ianuariis) quindecim, nec unquā plura subiici debēt: Martio de-  
 cem & nouem, nec his pauciora, unū & uiginti Aprili. Tota deinde æstate  
 usque in cal. Octobris, totidem: postea superuacua est huius rei cura, quòd  
 frigoribus exclusi pulli plerunque intereant. Plerique tamen etiam ab æsti-  
 uo solstitio non putant bonam pullationem, quòd ab eo tempore etiam si  
 facilem educationem habent, iustum tamen nō capiunt incrementū: tan-  
 tōque minus, quanto serius prouenire: uerum suburbanis locis, ubi à ma-  
 tre pulli non exiguis pretiis ueneunt, nec plerūque intereunt, probanda est  
 æstiuæ educatio. Diebus quibus animantur oua, & in speciem uolucrū cō-  
 formantur, ter septenis opus est gallinaceo generi. Verū celerius excludun-  
 tur calidis diebus: ideo æstate undeuicesimo die aut duodeuicesimo educūt  
 fœtus: hyeme uero aliquando uicessimo quinto. In gallinacco genere ma-  
 D ribus tantū datur cāuis. Hi, ut inquit Plinius, nostri uigiles sunt nocturni,  
 quos excitandis in opera mortalibus rumpendōque somno natura genuit.  
 norunt sydera, & ternas distinguunt horas interdiu cantu. Cum sole eunt  
 cubitum, quartæque castrensi uigilia, ad curas laborēque reuocāt: neque  
 solis ortum incautis patiuntur obrepere: diēmq; uenientem nuntiant can-  
 tu: ipsum uero cantum plausu laterum. Imperitat suo generi, & regnum in  
 quacunq; sunt domo, exercent: dimicatione paritur hoc quoq; inter ipsos,  
 nec finis sepe commorientibus. Quòd si palma cōtingit, statim in uictoria  
 canunt, seque ipsi principes testantur: uictus occultatur silens, agrēque ser-  
 uitium patitur: nec in pugna aut ante pugnam canūt, sed cum uicere. Gal-  
 linæ quoque cum marces uicere, cucuriunt: & præterea exéplo marium ten-

Glocientes,

Id est hora rei  
ria post medi-  
noctem: ex V.  
getio lib. 3.Cucuriunt,  
κακνήζουσι.

tant superuentu coire: crista etiam caudaque erigitur: ita ne facile præter-  
 ea sit an fœminæ sint cognoscere: nonnunquam etiam calcaria parua iis e-  
 nascuntur. Iam uero & mares uisi nonnulli sunt, qui cum forte fœmina in-  
 teriisset, ipsi matricis officio fungerentur in pullos ductando, fouendo, edu-  
 cando, ita ne de cætero uel cucurire uel coire appeterent. Quin & iam inde  
 à primo ortu naturæ ita nonnulli mares effœminati proueniunt, ut neque  
 cucuriant, neque per coitum agere uelint, ac uenerem eorum qui tentant  
 superuenire patiantur. Desinunt etiam canere castrati: gallos enim castrât,  
 ut sint capi libidinis abolédæ causa: quod duobus fit modis, lumbis adustis  
 candente ferro, aut imis cruribus, calcaribusue, mox ulcere, dum confane-  
 scant, oblito figlina creta: facilius ita pinguescunt. In hoc uillatico genere,  
 qui procera corpora & animos ad prælia pertinaces requirunt, iis præcipue F  
 Tanagricum genus & Rhodium probant: nec minus Chalcidicum & Me- 7  
 dicum (quod ab imperito uulgo litera mutata melicum appellatur) qui si-  
 ne dubio sunt pulchri, & ad præliandum inter se maxime idonei, sed ad  
 partus sunt steriliores: nam Rhodij generis aut Medici propter grauita-  
 tem neque patres nimis salaces, nec fœcundæ matres. & Rhodæ aues ne  
 suos quidem fœtus commode nutriunt, tantum abest ut alienos, ceu pa-  
 uoninos excludant. Tanagrici plerunque Rhodiis & Medicis amplitudi-  
 ne pares, non multum moribus à uernaculis distant, sicut & Chalcidici.  
 At quibus cordi est industrij patrisfamilias uectigal instituere, mercari cer-  
 te nisi fœcundissimas aues non expedit. Eæ sint rubicundæ uel fuscæ plumæ,  
 nigrisq; pennis, ac si fieri poterit, omnes huius & ab hoc proximi coloris G  
 eligantur: sin aliter, euitentur albæ, quæ fere cum sint molles ac minus ui-  
 uaces, tum ne fœcundæ quidem reperiuntur: atque etiam conspicuæ sunt,  
 propter quod insigne candoris ab accipitribus & aquilis sapius abripiun-  
 tur. Sint ergo matricis probi coloris, robusti corporis, quadratæ, pectorosæ,  
 magnis capitibus, rectis rutilisque cristulis, interdum geminis, albis cruri-  
 bus, ore rubicundo, & sub hac specie quàm amplissimæ, nec paribus ungu-  
 lis: generosissimæque creduntur quæ quinos habent digitos, sed ita ne cru-  
 ribus emineant transuersa calcaria: nam quæ hoc uirile gerit insigne, con-  
 tumax ad concubitum dedignatur admittere marem, raroque fœcunda, et-  
 tiam cum incubat calcis aculeis oua perfringit. Gallinaceos mares nisi fa-  
 lacissimos habere non expedit: atque in his quoque sicut in fœminis, idem H  
 color, idem numerus unguium, status altior queritur: sublimis sanguineæq;  
 nec obliquæ cristæ, raudi uel nigricantes oculi, breuia & aduoca rostra, ma-  
 ximæ candidissimæque aures, paleæ ex rutilo albicantes, quæ uelut incanæ  
 barbæ dependent: iubæ deinde uariæ, uel ex auro flauæ per colla ceruicisq;  
 in humeros diffusa: tum lata & musculosa pectora, lacertos æque similes  
 brachiis, alæ tum procerissimæ, caudæ duplici ordine, singulis utrinque  
 prominentibus pinnis inflexæ: quin etiam uasta fœmina & frequenter hor-  
 rentibus plumis hirta, robusta crura nec longa, sed infestis uelut sudibus no-  
 center armata. Mores autem quauis non ad pugnam neque ad uictoriæ  
 laudem præparentur, maxime tamen generosi probantur, ut sint elati, ala-  
 cres,

Capi.

Tanagrici galli.  
 Rhodij gallina-  
 cei.  
 Chalcidici galli.  
 Medici galli.  
 Melici galli.

Gallinæ fœ-  
 cundæ.

Plinius super  
 quatuor digi-  
 tos transuer-  
 so uno.

Gallinaceus.  
 Unguibus lō-  
 gis, inquit Var-  
 ro.

Varro. Caudis  
 magnis & fre-  
 quentibus pin-  
 nis.

Acres, uigilaces, & ad sæpius canendum prompti, nec qui facile terreantur: nam interdum resistere debent, & protegere coniugalem gregem: quin attollentem minas serpētem, uel aliud noxium animal interficere. Talibus autem maribus quinx singulis fœminę comparantur: cum Rhodij generis aut Medici ternę singulis maritentur. Tanagrici plerunq; Rhodiis & Medicis amplitudine pares non multum moribus à uernaculis distant, ut dictum est, sicut & Chalcidici: omnium tamen horum generum nothi sunt optimi pulli: nam & paternam speciem gerunt, & salacitatem fœcunditatēque uernaculam retinent. Pumiles aues, nisi quem humilitas earum delectat, nec propter fœcunditatem, nec propter alium redditum nimium probo, inquit Columella, tam hercule quàm nec pugnacem nec

**E**rixosę libidinis marem: nam plerunque ceteros infestat, & non patitur iniri fœminas, cum ipse pluribus sufficere non queat. Quod ad gallinacei generis morbos attinet, pituita iis nasci solet, quę alba pellicula Pituita. linguam uestit extremam. Id porro uitium maxime nascitur, cum frigore & penuria cibi laborant aues: item cum per æstatem consistens in cohortibus aqua potatur: item cum ficus & uua immatura, nec ad satietatem permissa est. Sub oculis etiam illis grana ipsa procedunt, quę nisi aculeuiter apertis pelliculis auferantur, extinguunt. Pediculis quoque infestantur & cruditate, & à suo læduntur stercore, quod cum pedibus uncis adhæsit, podagram creat. Caro gallinacea facile concoquitur, & probū gignit succum, neque crassum, neque tenuem, sed mediocrem: idq; tam ex mare

**C**quàm ex fœmina. Gallinacę carnis usum iis quibus ratione uictus tenui opus est, exercitatis quidem non prohibeo, inquit Galenus, præsertim earū quę in montibus fuerint educatę: at qui se non exercent, iis gallinacea carne minus utendum est: alis tamē gallinarum uel in tenui uictus ratione uesci licebit: quanquam neque uiscera neque gallinaceorum testes huic diartę sunt idonea. Dissectę gallinę & adhuc calentes appositę serpentū moribus auxiliantur, quas tamē subinde mutare oportet: ius quoque ex iis potum præclare medetur, & in multis aliis usibus mirabile. datur in stomachi ardoribus. Aluum soluit, inquit Plinius, ualidius è uetere gallinaceo.

**G**allinarum iuniorum ius simplex (uti docet Galenus) ad temperanda humorum uitia datur, sicuti ueterum gallinaceorum alui subducendę gratia.

**D**Coquere autem eos oportet cum sale diutissime: aliqui incoquunt brassicam marinam, mercurialem, cnicum aut polypodium: crudos humores, crassos, lentos, melancholicos educit. Prodest longis febribus, asthmatis, articulariis morbis, & stomachi inflationibus, (addit Plinius) torpētibus mēbris tremuliscq; & capitis doloribus, epiphoris, fastidiis, incipiēti tenasmo, iocineri, renibus, uescicę. ueneficiis ex mustela syluestri factis cōtrarium est ius gallinacę ueteris large haustum: peculiariter contra aconitum. Gallinarum gallinaceorū uel cerebrum in uino bibendum datur ad serpentū morsus. (Parthi gallinę malunt cerebrum plagis imponere): sanguinē quoque à cerebri membrana profluentem sistit. Contra phalangiorum oninū morsus remedium est gallinaceum cerebrum cum piperis exiguo potum

in posca. Gallinarum, saltem altitium, uentriculi alimenti bonitate sua-  
 uitatēque reliquarum auium omnium uentriculos superant, præterquam  
 anserum. Quæ in gallinæ maris uentriculi parte interiore cornus duri-  
 tiem habet membrana, eadem inter elixandum separatur. Hæc, inquit Dio-  
 scorides, membrana siccat, tritæque in uino stomachicis bibenda datur.  
 Ventrem gallinæ arefactum, inquit Galenus, si bibatur, stomachicos iuua-  
 re nonnulli prodidere: id quod nos uanum esse comperimus. Gallinaceo-  
 rum uentris membrana, ut Plinius docet, inueterata & inspersa potioni, di-  
 stillationes pectoris, & humidam tussim uel recens tosta lenit, & membra-  
 nam è uentriculo gallinæ aridam, uel, si recens sit, tostam conteri & po-  
 tioni inspergi iubent ad calculos pellendos. Gallinaceorum testes & sa-  
 pore sunt suauis, & optimum gignunt alimentum, eorum saltem, qui sagi-  
 nati fuerint: multoque maxime si ex lacte seroso alimenta illis præbeantur:  
 quippe qui & plurimum nutriunt, probumque generant succum, & conco-  
 ctu faciles sunt. Gallinaceorum testes subinde, si à cœceptu edat mulier, ma-  
 res in utero fieri dicuntur. Gallinæ dextrum testem arietina pelle adalli-  
 gatum, uentrem concitare: contrà inhiberi uentrem pugnatoris galli testi-  
 culis anserino adipe illitis adalligatisque, pelle arietina tradunt. Adeps gal-  
 linæ inter suillum & anserinum mediam obtinet naturam. recens &  
 sine sale conditus utri uitiis prodest: sale inueteratus, & qui temporis spa-  
 tio acrimoniam contraxit uulua inimicus est: conuenit & ad labiorum ri-  
 mas, & contra aurium dolores. laudant & gallinarum adipem contra pu-  
 stulas in papillis: has scilicet eius rei gratia saginant. Adiuuat mirifice & ru-  
 ptas oculorum tuniculas admixtis schisto & æmatite lapidibus. Fel ad me-  
 dicinæ usum præcipuum est gallinarum & perdicum. Gallinæ fel alliga-  
 tur ad argema & ad albugines ex aqua dilutum: item ad suffusiones oculo-  
 rum, maxime candidi gallinæ. Laudant & gallinæ fel contra pustulas in  
 papillis. Gallinaceum fimum ex aceto strumas discutit: carbunculos perru-  
 pit cum melle, lini semine & oleo subactum: igni quoque ambustis mede-  
 tur. Gallinaceum fimum duntaxat candidum in hyssopo decoctum aut mul-  
 so, uenena fungorum boletorumque adstringit: item inflammationes ac-  
 strangulatus, quod miremur, cum si aliud animal gustauerit id fimum, tor-  
 minibus & inflationibus afficiatur. Alopecias celerrime explet gallinarum  
 fimum recens illitum. Fimum quoque gallinæ duntaxat candidum  
 in oleo uetere corneisque pyxidibus adseruant ad pupillarum albugines.  
 Non præteribo miraculum, inquit Plinius, quanquam ad medicinam non  
 pertinens: si auro liquefcenti gallinarum membra misceantur, consumunt  
 illud in se, ita hoc uenenum auri est: at gallinæ ipsis circulo è sarmentis  
 addito collo, non canunt. De uillaticis gallinis, quoniam uel nimium dictum,  
 breuitate reliqua compensabo.

OEfipo puto  
 legendum apud  
 Plinium.

ἀλλυψύδα,  
 ἀλλυψύδα,  
 ὄρνις.  
 ἀλλυψύδα,

1 Fidipedes, χεῖρες: digitatas uocat Plinius. 2 Cohortales uillaticæ etiā di-  
 cuntur à M. Varrone. 3 Gallos gallinæ ἀλλυψύδα & ἀλλυψύδα Græci uocant:  
 gallinas uero ἀλλυψύδα & ἀλλυψύδα Aristophanes ludēs in comœ-  
 dia

A dia dixit & ἀλλὰ φέρεις utrunque continere: inuenias, & pro matibus ἀλλὰ θεῖσιν accipias. Hæc fere Hermolaus. 4 Cæteris itaque. Ita locū hunc reddidit nobis Theodotus, uulgatam Plinij literā, ut uidetur, secutus, quæ ita habet. Et geminos sæpe excludunt, ut Cornelius Celsus author est, alterum maiorē: alioqui negant omnino geminos excludi. Vetus quoque Aristotelis interpres ex Arabico ita uertit ad eundē sensum. Et in quolibet inueniuntur gemelli: & unus gemellorum paruus est, & alter magnus: & multoties est paruus monstrosus. Hæc ille: Græca uero Aristotelis exemplaria (nisi niendam fuisse iudicemus) ita habent: τὰ μὲν οὖν ἄλλα γήμια, πᾶσι δὲ ὅσα τὰ μὲν αἰῶνι, & ἀλλὰ φέρει γένετα ἢ διδύμια, τὰ δὲ πλεοντεῖον τέρματα &c: hoc est (ut ego arbitror.) E cæteris itaque gemina fecunda sunt, nisi quibus hoc cōtingit, ut alter maior fuerit, alter minor: in iis enim tandē in monstrem degenerat qui minor nouissime prouenit. Vtra autem sententia fuerit uerior, indicabit experientia. Videtur certe Plinius uel ex professo cum Aristotele hac in re minime conuenire: quando Celsus auctorem non Aristotelem citet. Obiter & illud admonuerim, in quibusdam exemplaribus Plinianis haberi (uti recte annotauit Claymundus) non alioqui, sed aliqui negant omnino geminos excludi. 5 Oua quo pacto gallinis subiicienda sunt & pulli educandi, docent Columella & Varro. 6 Varro adurentes calcaria ad infima crura usque dum rumpantur. Nec id patiuntur, inquit Columella, amissis genitalibus, sed ferro candēte calcanibus ustis. 7 Gallinæ Medicæ, inquit Varro, primo dicebātur, quia ex Mediciā propter magnitudinem erant allatæ, quæque ex his generatæ postea propter similitudinem. 8 Harum affectionum curationes ab iis perquirendæ, qui de uillaticis passionibus scripsere, ut à Columella & Palladio. 9 Quod Galenus dixit, ὡς ἀπερὶ πικρῆς ὕλης διαίτης, Dioscorides, ἀλλὰ ὡς ἀπερὶ σαρκὸς ἔχειν φανερόν τινος, alij aliter reddiderunt: iudicent lectores. 10 Gallinaceus quomodo coquendus est, ut iusculum efficiat ciendæ aluo idoneum, docent Dioscorides & Plinius.

Medicæ gal-  
lina.

C De gallinis rusticis, Africanis, meliagridèque & pauone.  
Cap. CXXVII.

1 Rustica gallina uocatur, quæ non dissimilis uillaticæ per aucupem decipitur: cæque plurima est in insula quam nauē in Ligustico mari sitam producto nomine alitis, gallinariam uocitauerunt. Gallinæ rusticæ, inquit Varro, sunt in urbe raræ, nec fere mansuetæ sine cauca uidentur Romæ, similes facie non his uillaticis gallinis nostris, sed Africanis aspectu, ac facie incontaminata. In ornatibus publicis solent poni cum psittacis ac merulis albis: item aliis id genus rebus inusitatis. Neque fere in uillis oua ac pullos 2 faciunt, (in seruitute enim non fœtant) sed in syluis. Africana est quam plerique Numidicam dicunt, meleagridi similis, ut sentit Columella, nisi D quod rutilam galeam & cristam capite gerit: quæ utraque sunt in meleagride cœrulea. Et gallinarum Numidicarum eadem est fere quæ pauonum educatio. M. autem Varro, Gallinæ, inquit, Africanæ sunt grandes, uariæ, gibberæ, quas meleagridas appellant Græci. Meleagrides in Bæotia pugnant, inquit Plinius, Africæ, hoc est gallinarum genus gibberū uariis sparsum plumis. Hæ nouissimæ sunt peregrinarum auium in mensas receptæ, propter ingratum uirum: uerum Meleagri tumulus nobiles eas fecit. Et ueniant propter pennariam magno. Porro meleagrides ita describit Clytus Aristotelis discipulus: magnitudine ut sint gallinæ generosæ, capite ad portionem corporis paruo ac glabro, in quo crista carnea rotunda & prædura, quæ paxilli in morem promineat, rostro ligneo. Ad malas ab ore ortam ca

Gallina rustica.

Gallina Africana Numidica.

Meleagrides.

Meleagrides.

runculam habent longam dependentem, rubicundiorē quā in genere E  
gallinaco. Quod autem in gallinis rostro adhæret (*πρόσρῖς* uocāt Græci, La  
tini paleam mentumue) meleagrides non habent. rostrum acutius & ma  
ius quā gallinæ, ceruix crassior breuiorq̃ue & nigra, corpus frequenti- 3  
bus uarium maculis in nigro candidis, maioribus lenticula: & alæ ipsæ ua  
riegatæ, serrata specie digestis in quendam uersum maculis. crura sine cal  
caribus, cætero similia gallinaceis. locis gaudent paludosis lacustribusq̃ue.  
Fœminæ maribus adeo similes sunt, ut uix dignoscere genera possis. Hæc  
Clytus. Histrus tradit meleagrides à nullis auibz quæ aduncis sunt ungui  
bus uiolari. Oua generant meleagrides punctis distincta. pullos suos uelut  
perosæ negligunt. At contrā pauones fœminæ suæ sponte studiosius pul  
los enutriunt. Hæ sine custode tuto uagantur: maiorēque pabuli partem F  
sibi & pullis acquirunt. Hoc genus auium cum trimatum expleuit, optime  
progenerat. siquidem tenerior ætas, aut sterilis aut parum fœcūda est. hoc  
tempore & colores pennarum uarios recipit. coitus uere & partus breui à  
coitu agitur: itaque post admissuræ tempus confestim matrices custodien  
dæ sunt, ne alibi quā in stabulo fœtus edant: maximēq̃; temporibus qui  
bus parturiunt pluribus stramentis exaggerandum præcipiunt auiarum,  
quo tutius integri fœtus excipiantur. Nam fere pauones cum ad nocturnā  
requiem uenerunt, perticis insistentes enutuntur oua: quæ quo propius ac  
mollius ceciderint, illibatam seruant integritatē. Excludit pao diebus tri  
cenis aut paulo tardius. semel tantummodo anno parit oua duodecim, aut  
paulo pauciora: nec continuatis diebus, sed binis ternisq̃ue interpositis. pri- G  
miparæ octona maxime edunt. Hæc Aristoteles. Pao, inquit Plinius, parit  
primo anno unum aut alterum ouum, sequenti quaterna quināq̃ue, cæteris  
duodena non amplius: uerum, ut alij tradunt, fœminæ quæ non incubant,  
ter anno fere partus edunt: at quæ fouent oua, totum tempus fœcunditatis  
aut excludendis aut etiam educandis pullis consumunt. Primus est partus  
quinque fere ouorum, secundus quatuor, tertius aut trium aut duorum ef  
se consuevit. Irrita & subuentanea illa pauones etiā pariunt. Mas dum fœ  
mina incubat aduolans oua frangit, desiderio incubatium: quapropter no  
ctu & in latebris pariunt: & earum curatores gallinis subiiciunt incubanda  
oua pauonina. Pullos præterea suos mares persequuntur uelut alienigenas  
priusquam illis cristarum nascatur insigne: crinitæ enim pauoni in capite  
excunt arbusculæ. Viuit pao annis uiginti quinque. Colores incipit fer- H  
re in trimatu. Amittit pennas cum primis arborum frondibus: recipit cum  
germine earundem. Cauda, quæ pauoni magna est, etiam decidua est, & u  
tranque ob causam nullius in uolatu usus. Huic uni natura formæ è uolu  
cribus dedit palmam: nec id quidem corporis specie, sed pēnarum pulchri  
tudine. Masculus pao gallinaccam salacitatem habet: atque ideo quinque  
fœminas desiderat. Porro signa sunt extimulatę libidinis, cum semetipsum  
(aduerso maxime sole, quia sic fulgentius radiat) ueluti mirantem, caudæ  
gemmantibus pinnis protegit, & singularum capita oculata pinnarum lo 4  
cis suis exerit, cum stridor e procurrens. Idē cauda, ut modo diximus, amif  
sa cum

Рано.  
Раним.  
Тидс.  
Тидс.  
Тидс.



A fa cum foliis arborum, donec renascatur iterum cum flore, pudibundus ac mœrens quærit latebram. Vicia quæ gallinaceo generi nocere solent, eadem has aues infestant. Sed nec alia remedia traduntur, quàm quæ gallinaceis adhibentur. Pauonina caro dura est fibrosâque, & concoctu difficilis. Pauones simum suum (cuius est ad oculorum vitia usus efficax) resorbere tradunt, inuidentes hominum utilitatibus. In India gallinacei nascuntur maximi, qui cristam habent non rubram ut nostri, sed ita uariam & floridam, quemadmodum coronam ex floribus cōtextam. Pennas posteriores minime inflexas habent, neque in orbem reuolutas, sed latas, quas cum nō erigunt, ut pauones trahunt, eorum pennæ smaragdi colorem gerunt.

Gallinacei Indici.

B 1 In mari Tusco, inquit Varro, secundum Italiam contra montes Ligusticos. 2 Numidicæ, inquit Plinius, in parte Africæ Numidia. 3 Corpus frequentibus, St cui contigerit emendatio Athenæi codex, hūc locum legat græce, quem nos ob exemplaria mendosa totidē uerbis exprimere non potuimus, coniectura nostra contenti, unā cum Hermolai interpretatione. 4 Hæc luculentissime expressit Lucretius lib. 2.

Caudâque paonis larga cum luce repleta est,  
Cōsimili mutat ratione obuersa colores:  
Qui quoniam quodam gignuntur luminis ictu,  
Scire licet sine eo fieri non posse purandum.

De columbaceo genere.

Cap. CXXVIII.

C Columborum possessio non abhorret à cura boni rustici: nam fecunditas quanuis longe minor sit, quàm est gallinarum, maiorem tamen refert quæstum: nā & octies anno pullos educat, si est bona matrix, & pretiis eorum domini complent arcam, sicut eximius auctor M. Varro nobis affirmat. Quæ proprie columba uocatur, (sunt enim columbacei generis species plures) duo continet genera: unū agreste, ut alij dicūt, saxatile, quod 1 habetur in turribus ac columinibus uillæ. Hæc propter timorem naturalem summa loca in tectis occupant: & in turres ex agro uolant suapte sponte ac remeant. Alterum genus columbarum est clementius, quod cibo domestico contentum, intra limina ianuæ solet pasci. hoc genus maxime est colore albo: illud agreste, sine albo, uario: quâquam in India luteas esse columbas ferunt. Ex his duabus stirpibus fit miscellum tertium genus fructus cau 2 dæ: atque incedunt in locum unum, quod aliqui uocant 3 in quo uno sæpe uel quinque millia sunt inclusæ. Columba utraque palpebra coniuuent. Lienem habent paruum, adeo ut propemodū sensum effugiat. uesica bilis in columbis non iecori adhæret, sed aut uentriculo aut intestino. Vētriculum habent calidum columbæ, & facultatem concoquendi maximam. Coeunt intra annum columbæ: quippe quæ semestres nosse incipiant uenerē: uel, uti Plinius tradit, quinque mestres fecundificant. Columba proprio ritu osculantur ante coitum: & nisi ante mutuos osculentur, mas non accendit: sed iunior sit an senior interest: senior enim primum coitum osculo exorditur, sequentem & sine osculo agit: at iunior quoties libet coire, toties osculatur. Igitur hic ritus columbarum proprius

Columbæ  
Columba.  
ἄγρος, ἄγρος.  
ἄγρος, ἄγρος.

Columba agreste  
saxatile.

Columba domestica.

Κατατοίχος  
ἄγρος, ἄγρος.

ἄγρος, ἄγρος  
ἄγρος, ἄγρος  
ἄγρος, ἄγρος  
Columbarum.



est: atque etiam ille, ut fœminæ saliant, ac supergressu mutuo agant, si mas E  
 non sit, & cum osculo ut mares: & quanuis nihil altera emittat in alteram,  
 tamen plura sic oua quàm ex maris coitu pariunt: uerum nullus ex his ena-  
 scitur pullus, sed sunt omnia irrita: quanquam & nonnunquam oua infœ-  
 cunda & irrita etiam ex maris coitu cum fœmina proueniunt. Columbe  
 ouum paucioribus quàm decem diebus à coitu consiluit & perficitur: & pa-  
 riunt, inquit Plinius, à coitu die quinto. Pariunt fere bina oua: ac marē sem-  
 per & fœminam pariunt, priorem marem, posteriorem fœminam: etenim  
 cum pepererint primum ouum, uno interposito die secundum pariunt. Pa-  
 riunt omnibus anni temporibus, pullōsque educant, si locum apicum ha-  
 beant & cibum: sin minus æstate tantum fœtant. Sed proles præstantissima  
 uere & autumno est: deterrima æstate & omni tempore calidiore. Facultas F  
 columbis retinendi oui, etiam tempore parturiendi est: nam si ab aliquo  
 uexetur, aut penna in nido euulsâ, uel quauis alia re infestetur, aut etiam  
 sponte morosius habeat, ouum per tristitiam retinet, partūmq; differt. Ni-  
 hil columbis fœcundus: pariunt enim decies anno, nonnullæ undecies:  
 Ægyptiæ uero & duodecies. Et æstate quidem interdum binis mensibus  
 terna edunt paria: nanque decimo octauo die excludunt, statimque concipi-  
 unt: quare inter pullos sæpe oua inueniuntur: & alij prouolant, alij erū- 3  
 punt: pulli autem cæci procreantur. Diebus circiter quadragenis concipi-  
 unt, & parit, & incubat columba: & hoc fere totum annum faciunt: tan- 4  
 tummodo interuallum faciunt à bruma ad æquinoctium uernum. Incu-  
 bant in hoc genere ambo uicissim, interdiu mas, noctu fœmina. Exclu- G  
 dunt uicesimo die, aut citra uicesimum diem ouum quod prius ediderint.  
 Perforant ouum pridie eius diei, quo pullum excludunt: & fouent prolem  
 ambo ad certū tēpus, eodem modo quo oua. Quin etiā fœminæ parturiēti  
 mas adest, & cultu omniq; officio fungitur. Sæpe etiam fœminam pigrius  
 euntem ad nidum propter partus laborem mas percutit, cogitque intra-  
 re. Excluis iam pullis, alimentum illis parat, quod præmanducatum, in eo-  
 rum os inferens suum, ingerit, atque ita præparat ad cibum recipiendum.  
 Pullis primo falsiorem terram collectam gutture in ora inspuunt, præpa-  
 rantes tempestiuitatem cibo. Ita magna ex parte columbæ mutuo degunt  
 amore, ut neque cum pluribus coire uelint, neque coniugium iam inde à  
 primo ortu initum deferant, nisi cœlebs aut uidua: sed interdū tamen nō-  
 nullæ etiam ex maritatis cum aliis coeunt. Pugnax hoc animal est: alter al- H  
 terum infestat, nidūque alter alterius subit, sed raro: nam etsi ex longin-  
 quo minus, tamen apud ipsum nidum summo certamine dimicatur. Co-  
 lumbacci generis proprium esse uidetur, ne collum cum bibunt resupinēt, 5  
 nisi satis hauserint: & ut large bibant iumentorum modo. Frugibus uictitāt  
 columbæ: uiuūt autem uel ad octauum annum. Fertur à columba quodq;  
 accipitrum genus cognosci: itaque cum accipiter prouolat, si sublimipeta  
 est, manent quo constiterint loco: sed si humipeta qui prouolat est, non ma-  
 nent, sed continuo auolant. Cum auium mos sit, ut aliæ sese in puluere uo-  
 luent, alię sese lauent, aliæ nec puluere nec balneo utantur: columbi utrūq;  
 tum

*Alias die 25.  
 Postridie fœmi-  
 na, inquit Pli.*

A tum lauare tum puluerare solét. Multiuaga auis columba: estq; ars illis inter se blandiri, & corrumpere alias furtóq; comitatioes reuerti: inducuntque alias in columbarium, si cumino pascantur assidue. Columbarum caro facile concoquitur: succum efficit crassitie tenuitateque mediocré. Præstantior autem est earum caro, quæ in turribus degunt quàm domesticarú: ex quibus nō nisi modice degustare expedit iis, qui exercitio minime utuntur, sicuti nec è gallinis. auxiliatur contra serpentum morsus columbarum caro recens cōcerpta. columbæ sanguis cruorem è membranis cerebri erumpentem cohibet. Columbinum fimum quod à colūbis agrestibus redditur, excalfacit & urit, misceturque uice napyos cum semine nasturtij siccū contusum cribratúmque ad ea quæ rubesceri desiderāt: quales sunt diuturniores B affectus, ceu coxendicis morbus, hemicraniæ, uertigines, scotomata, cephalæa, & laterum, scapularum, ceruicis, lumborum inueterati dolores: nephritides & cæliaci dolores, podagræque & arthritides, quæ nondum poros in articulis contraxerint. Columbinum fimum ex aceto strumas discutit: laudatur & ad agylosas, & albugines, & cicatrices: carbunculos perumpit cum melle, lini semine & oleo subactum: igni quoque ambustus medetur. Fimū columbinum cum oleo & uino potum uenerè inhiere: sed si lutea ex ouis quinq; columbarum, admixto adipis suilli denarij pondere ex melle forbeantur, uenere[m] concitare feruntur. columbarum syuestrium fimum priuatim contra argenti uiui potum ualeat. Genera columbarum quinque nu-  
merantur: quæ proprio nomine columba uocatur, palumbes, ænas quæ *Columbarum genera.*

Cuinago, pelias quæ liuia à nonnullis uocatur, & turtur: in his palumbi, turtur & columbæ sanguine utuntur medici ad recentia oculorum uulnera, ad oculos cruore suffusos atq; lusciosos. In columbis masculi sanguinem efficaciorē putant: uena autem sub ala ad hunc usum inciditur, quoniam suo calore utilior est. superimponere oportet splenium è melle decocto, lanámque succidam ex oleo & uino.

1 *ρυγμίτης*, nonnunquam à Galeno, arbitrator, uocatur & *πρὸς τὴν ἀρομὰς*. 2 De coloris uarietate in pennis ceruicis columbarum ita cecinit Lucretius lib. 1. *ρυγμίτης, τομὰς πρὸς τὴν ἀρομὰς.*

Pluma columbarum quo pacto in sole uidetur

Quæ sita ceruices circum, collumque coronat?

Nanque aliàs fit, uti clato sit tubra pyropa,

Interdum quædam sensu fit uti uideatur

D Inter cæruleum uirides miscere smaragdós. 3 Columba cum peperit, inquit Athenæus, postridie matrem repetit. 4 Colūba citra dies triginta, inquit Aristoteles, prole expedita superiore patit. 5 Nisi satis hauserint, *ἀλλ' οὐκ ἵκανόν τινα*. ita Theodorus: uetus interpres, quousque eis sufficiat. Suspecta mihi uidentur hoc in loco exemplaria Aristotelica. 6 Hæc Galeni est sententia: Sunt ex Arabum schola, qui tradant corpora pullorū columborum esse tardæ digestionis, & longæ moræ in stomacho: Rastus tamen, columbus, inquit, leuis est cibus, & subtilis. Et iterum, est cibus mirabilis ad caliditatem declinans.

De palumbo, ænade, peliade & turture. Cap. CXXIX.

I Nter columbarum genera maximo corpore est palumbes: quippe quæ nonnullis locis gallinaceum æquet magnitudine. Colorē habet cinereū: *Palumbes, Palumbus, φάλα. φάλα. τίτταρος.*

caput subcæruleum purpureum: & nigrum oculi rotundissimum. In-  
gluuiem habet præpositam uentriculo. Cantus in hoc genere omnibus si-  
milis atque idem terno conficitur uersu, præterquam in clausulæ gemitu,  
hyeme mutis, uere uocalibus: hyeme nanque non gemit palumbes, nisi quod  
aliquando ex asperrima hyeme, cum placidum tempus successisset, gemue-  
rit: id quod apud peritos in admiratione habitum est: ceterum incunte uere  
gemere incipit. Camporum incolæ palumbes est. Coitus tempore testes pa-  
lumbi magnitudine insignes, aliàs uero parui & omnino obscuri, ita ut hy-  
bernis mensibus ne ullos quidem testes in his haberi nonnulli arbitrentur.  
Palumbes & turtures trimestres coire fecundificaque aliqui referunt, argu-  
mento quod larga eorum copia est. Gerunt uterum decem & quatuor die-  
bus, ac totidem aliis incubant: & totidem aliis factus ita uolucer fit atque perfi-  
citur, ut uix possit apprehendi. Bina pariunt oua palumbes & turtur, & cum  
plurimum terna: sed nunquam plus duobus pullis educunt: nonnunquam  
etiam unum tantum: reliquum ouum semper irritum est. Pariunt autem ue-  
re, nec plus quam bis: atque ita si prior factus corruptus est: pullos procreant  
imperfectos. Incubatus tempore palumbium femina incubat à post meri-  
diano incipiens, totaque nocte & usque ad tempus ientaculi perseverans:  
in reliquo tempore munus idem mas subit. dignosci autem masne an fœ-  
mina sit, haud facile est, nisi interiorum aspectu. Collum cum bibit non re-  
supinat palumbus, nisi satis hauserit. Mare uno contenta & turtur & palu-  
bes uiuit, nec alterum recipit: nidulanturque & palumbes & turtures sem-  
per locis eisdem. & cum mares in aliis fere animalibus diuturniores quam  
feminae sint, in his marem prius quam feminam mori nonnulli aiunt. Vi-  
uere autem palumbes ad tricesimum annum, aliquos ad quadragesimum  
Aristoteles author est, uno tamen incommodo unguium, eodem & argu-  
mento senectæ, qui citra perniciem reciduntur. Prosumt squalores maxime  
palumbis. Horum aliqui latent, aliqui non latent, sed cum hirudinibus ab-  
eunt, nec hybernare apud nos patiuntur: aliqui tamē semper uiuantur. Vo-  
lant gregatim tum palumbes tum turtures cum accedunt, & cum suo tem-  
pore abeunt. Palumbium caro durior est, quam sit columborum, turturum,  
turdorum, merularum uero aut paruularum auium: estque concoctu difficilis  
excrementosaque. In contractione neruorum caro palumbina in cibis pro-  
dest & inueterata: in aceto decocta dysentericis & cæliacis medetur: è po-  
sca uero ileon & tormina sanat. Palumbi sanguine utuntur medici ad ocu-  
lorum uitia, uti in columbis indicauimus. De palumborum esu ita cecinit  
Martialis coquus,

*Palumbus  
torquatus.*

Inguina torquati tardant hebetantque palumbi.

Non edat hanc uolucem, qui cupit esse salax.

*Circus, uinago.*

*Autumno tan-  
tum conspicitur,  
inquit Athe-  
næus.*

Secundum magnitudinis locum in columbacco genere cœnas obtinet, id est  
uinago, paulo maior quam columbus, minor quam palumbes est. Autumno  
potissimum & conspicitur & capitur. Modus maxime capiendi eam, dum  
sic in aquam bibendo propendet. ueniunt ad nostra loca, cum iam fecerint  
prolem. Frugibus quoque uiuit ut columba: & bina parit oua. Diuersum  
certe

A certe genus à columba peleias est, id est liuia: quippe quæ minor quàm columba sit, & minus patiens mansuescere. liuet etiam plumis & pene nigricat: & pedibus rubidis scabrosisque est, paruaque adeo, ut nemo id genus alere uelit. In India liuiæ columbæ uirides pennas habet, ut primo aspectu, si quis in auium cognitione rudis sit, psitacum nō columbam dicat. Rostrū illis & cruor Græciæ perdicibus sunt similia. Discedunt hyeme liuiæ, nec apud nos hybernare patiuntur: plurimum curæ proli impendūt. Minimum in columbaceo genere turtur est, colore fere cinereo. Frugibus uiuunt turtures, bibunt, cocunt, gerunt uterum ac pariunt, nō aliter atque de palum-  
bis diximus. Degūt æstate locis frigidis, hyeme tepidis: ideoque æstate tantum apparet turtur: hyeme se cōdit aut discedit: nec enim hybernare apud nos patitur: nemo enim, prope dixerim, uidisse per hyemem uspiam turtur-rem dicitur. Latere autem incipit præpinguis: & quanquam pennas in latebra dimittit, tamen pinguedinem seruat. Volant gregatim cum accedūt, & cum suo tempore abeūt. Turturi cum uocem reddit, pars nouissima alui uehementer citatur: euenitque nonnunquam crepitus alui. Turturis caro difficilior quidem concoquitur quàm columbarum, turdorum, merularum aut paruuarum auium: succum tamen probum gignit, si recte concoquatur. & temperatura sicca turtur est, præsertim si in locis mōtanis uiuitar. neque recens nactata edēda eius caro est: sed ubi uno, minimum, die adseruata sit: sit enim hoc pacto, ut & minime dura euadat, sed frabilis iam, & omnino uitio careat. Turturis sanguine utuntur medici ad recētia Cocolorum uulnera, uti in columbis dictum est: simum turturis albugines extenuat. Turtur cum pyrali pugnat: locus enim pascendi uictusque idem eorum traditur. Turtur quoque & choreus pugnant: & occiditur à choreo turtur.

*Pyralis.*  
*Ignaria.*  
*Chlorcus,*  
*Luteus.*

1 Palumbes Italiam autumnō relicturæ, quonam pacto capiantur, explicat Blōdus in regione Latina. 2 Plurimum curæ: Vide an hoc intelligat Oppianus de columbis: nam id significat *πελάς*, nonnunquam apud poetas. 3 Turtur uerē occultatur, inquit Plinius, pennasque amittit. 4 Turtures quo pacto capiuntur cantu & saltatione, legas apud Ælianum.

De phasiana, tetrace, erithrotaone, otide, & oto. Cap. CXXX.

1 Gallinam phasianus alimēti bonitate cōcoctionis que facilitate æquat, sua uitate uincit. Auis est minime altiuola, sed terrena & pulueratrix. Phasianæ in Colchis geminas ex pluma aures summittunt subriguntque corniculis similes. Ouā pariunt punctis distincta. Phasianum Epænetus tatyran, Ptolemæus tetarton uocari dixit & tetraona: nam tetrax alia auis est, & tetrax itē alia. Tetrax, ut Alexander Myndius author est, auis est magnitudine spermologi: colore figlino, sordidis quibusdam maculis lineisq; magnis uaria: frugibus uescitur, & quando pepererit, quadruplicē emittit uocem. Tetrax altera gallinaceum maximum superat magnitudine, specie porphyryoni similis: ab auribus utrinque paleæ dependēt, ut in gallinaceo: uox illi grauis. Tetrax quam Athenienses uragem uocant, nec terræ nec at-

*Phasiana.*  
*Phasianum.*  
*Tatyras.*  
*Tetraos.*  
*Tetraos.*  
*Tetrax.*

*Tetrax altera.*  
*Tetrax.*  
*urax.*

bori suum nidum committit, sed frutici: & non aliter atque alauda nidum E  
*Erythrotaon.* patere aures cupit. Decet Erythrotaonas suus nitor, absolutaque nigritia, in 4  
supericillis cocci rubor. Alterum eorum genus uulturum magnitudinem ex- 5  
cedit, quorum & colorem reddit: nec ulla ales, excepto struthiocamelo, ma-  
ius corpore implens pondus, in tantum aueta, ut in terra quoque immobi-  
lisprehendatur. Gignunt eos Alpes & septentrionalis regio. In auariis sapo-  
rem perdunt: moriuntur cōrumacia spiritu reuocato. Proxime iis sunt (ter-  
tium scilicet genus) quas Hispania aues tardas appellat, Græci otidas, dāna-  
tas in cibis: emissā enim ossibus medulla odoris tedium extemplo sequitur.  
*Auis tarda.* Otides in Hispania frequētes, inquit Strabo. Otides, ut authores sunt Xeno-  
*Otis.* phon & Plutarchus, carnem habet suauem, & facile capiuntur. Sunt autem  
*ōtis.* otides (quos & *ōtis* uocant) aues parum uolaces, & quæ uolando cito defati- F  
gantur, non aliter atque perdices. Imitatrix hæc auis est, eorum præsertim  
quæ ab homine fieri uiderit, ut eadem quoque facere conetur. Aucupes in  
aduersum earum stantes, pharmaco quopiam oculos suos inungunt, un-  
guento alio quod oculorum palpebras cōglutinet, haud procul inde in ua-  
sculis apparato: quod aues conspiciat idem facere tentant, medicamento  
ex uasculis accepto: itaque facillime apprehenduntur. Ales magna oris otūs-  
us est: & tricenis diebus incubat. Gula eius tota ampla est & lata: ingluui-  
es nulla. appendices habet paucas quasdam infra quā definit intestinum. Fi-  
dipes tribus insistentis digitis, magnitudine gallinacæ grandioris, colore co-  
turnicis: capite oblongo, oculis amplis, rostro acuto, lingua ossæ, gracili col-  
lo. Equis mirum in modum delectari fertur, adeo ut si quis pellem equinā G  
sibi induat, eo pacto quot libuerit capere posse: nonnulli *λαπιδίας* uocant. Ut 6  
uero alij otus colūbæ est magnitudine. noctuæ similis, nō tamē auis noctur-  
na) pinnulis circiter aures eminentibus præditus, unde & nomen illi, quasi  
*Nycticorax.* auritum dicas: nonnulli nycticoraxa cum appellant: quidam latine & asio- 7  
*Asio.* nem uocant. Hominum hic imitator in omnibus est: saltantes quoque imi-  
tatur, & capitur haud difficulter, ut noctua, inter saltandū intentus ex imi-  
tandi uoluptate in alterum aucupem, altero circumeunte, aut clanculum a  
tergo stante. Ducem se præbet otus coturnicibus aliò migrantibus. *αἰδω* 8  
(quas & *αἰδω* uocari tradit Galenus) caro media est inter gruum carnem  
& anserum, non tam dura scilicet atque fibrosa quàm sit gruum caro. Ex-  
crementosa est, ac proinde uitanda iis qui salubri, id est tenui uictus ratio- H  
ne uti uolent.

*Phasianica*  
*auis, ὄρνις φαι-  
σιακή.*

1 Gallinā, ὄρνις φασιανή uocant nonnulli: ut Pollux & Athenæus. 2 Martial. lib. 13:

Aegia primum sum transportata carina:

Ante mihi notum nil nisi phasis erat.

3 τριτάτη πύφαρις, an quadri-

partitam. 4 Alij legunt apud Plinium tetragonas, alij tetrahonas, alij tetracōnas.

5 Alterum genus, Hæc forsitan otis est Galeno atque Aristoteli: & otus Athenæo:  
de quibus mox dicetur. 6 Otus, Plinius, Bubone minor est, noctuis maior. 7

Pennatorum animalium, inquit Plinius, buboni tantum & oro plumæ uelut aures.

8 Videtur ex Aristotele hoc loco quod uncos habeat ungues: statim enim a diuin-  
git: Omnes uero aues unex, &c. Considera.

De coturnice

A De coturnice, perdice, galerita; & aliis id genus quibusdam terrenis grauioribusue. Cap. CXXXI.

**C**oturnices ægre uolant, propter sui corporis pondus: sunt enim corpo- *Coturnix.*  
re grandiore, quàm ut suis pennis deferre possint, uociferantq; ob eam *Óttrif.*  
rem cum uolant: laborant enim quasi oppressa onere. Parua auis coturnix  
est: cui præ cæteris hæc propria habentur, ut & ingluuiem infra amplam, &  
gulam prope uentriculum amplam & latam habeat. Fel aliis earum uentri;  
aliis intestino adhæret. Fœmina coturnix, ut author est Alexander Myn-  
dius, collū habet gracilius: neq; sub mento nigra illa adsunt quæ maribus:  
& si disseccatur, ingluuiis inuenitur non adeo ampla, cot uero magnum;  
& fel intestinis adnexum. Testes maribus sub iecinore continentur, ut in  
**B** gallinaceis. Nunquam in arbore, sed humi consistit coturnix, & humi ni-  
dulatur, sicuti & perdix & reliqua generis eiusdem, quæ scilicet aues gra- *Perdix.*  
uiiores sunt, & non alte uolant. Nidos autem non faciunt, sed facta in apri- *In aprico, & si*  
co area, atque uepribus quibusdā & materia huiusmodi cōgestis, quoad *lup.*  
accipitrum & aquilarum iniuriam deuitare possint, oua edunt & incubāt.  
Mox cum excluserint, protinus pullos educunt, propterea quod nequeunt  
suo uolatu iis cibum administrare. Refouent suos pullos sub seipfas ducē-  
do more gallinarum & coturnices & perdices. nec eodem loco & pariunt  
& incubant, ne quis locum percipiat longioris temporis mora. Mares cum  
diffugerit fœmina ut incubet, tumultuant, clamitant, pugnamque inter se  
conferunt: (hos autem *χέως* uocant, id est cœlibes:) qui autem uictus fue-  
**C**rit, sequitur uictoris uenerem patiens. uerum hoc non ita fieri semper, sed  
certo tempore anni planum est: usque adeo tum perdices tum coturnices  
copia libidinis gaudent, ut in aucupantes corruant, & sæpenumero capiti-  
bus eorum residant. Coturnix uel in pugna ipsa garrula est, & ante pugna  
mares canunt. Coturnicibus ueratri semen gratissimus cibus: quam ob cau-  
sam eas damnauere in mensis, simulq; comitiales propter morbum desui-  
suetum, quem solæ animalium sentiunt præter hominem. Adeo tamen pa-  
latis uidentur gratæ, ut in auariis pastæ pinguesque ueneant cate, sicuti &  
**3** quæ miliaria dicuntur. Discedunt coturnices mense Augusto in calidiora *Miliaria.*  
loca, nisi pauca locis apricis remanserint, & pinguiore per id tempus ca-  
piuntur. Et cum ad nos redeunt, aduolant gregatim non sine periculo na-  
**D**uigatium, cum appropinquare terris: quippe uelis sæpe insidunt, & hoc  
semper noctu, merguntq; nauigia. Iter est his per hōspitia certa. Austro nō  
uolant, humido scilicet & grauiore uento: aura tamen uchi uolūt, propter  
pondus corporum uirēsque paruas. Aquilone ergo maxime uolant. Cum  
ad nos ueniunt, terrestres potius quàm sublimes, & sine ducibus pergunt:  
**4** at cum hinc abeunt, ducibus oto & lingulata & ortygometra proficiscun-  
tur, atque etiam cenchramo, qui eas noctu hortatur, excitat, admonētque  
itineris, perseuerantiórque festinat peruenire ad expetitas sibi terras. Hu-  
ius uocem cum senserint aucupes, intelligunt parari discessum. A cotur-  
nicibus magnitudine tantum differt lagopus, croceo tinctu, in cibis gratif-  
sima. Est & alia lagopus, pedes lepóriño uillo ei nomen hoc dedere, cætero

*Cenchramus.*  
*Cynchramus.*  
*Cychramus.*

*Lagopus.*

*Lagopus alia.*



candidæ, columbarum magnitudine. Non extra terram in qua nascitur ea uesci facile: quando nec uiua mâsuefcit, & corpus occisæ statim marcescit.

*Perdix.  
Cacabiu.*

Neque perdix altiuola est, sed terræ propinqua uolat, spatîisq; breuibus:

Nec facit in ramis altóque cacumine nidos.

Propter humum uolat, ponitque in sepibus oua.

Perdix ingluuiem habet præpositam uentriculo, & appendices quasdâ pauca infra quâ definit intestinû. In Paphlagonia bina perdicibus corda coitus tempore testes habet perdicis magnitudine insignes, aliâs uero omnino obscuros: ita ut hybernis mensibus ne ullos quidem testes in his haberi nonnulli arbitrentur. perdicæ non pinguescere tradunt. nidificât, pariunt & incubant oua fœminæ non aliter ac de coturnicibus diximus. Mares ite libidinis intemperantia similiter tumultuant, clamitant pugnamq; inter se conferunt. Pariunt fœminæ oua nōnunquam quindecim aut sexdecim.

*Videbitur forsitan Aristot. his in locis non satis sibi cōstare lib. 6. hist. animalium, & li. 9.*

Et bina ouorum receptacula faciunt nonnunquam perdices: in altero fœmina incubat, in altero mas: excluditque sua uterque & educat. Nonnunquam uero oua mares quæ cōpererint, peruoluunt & frangunt præ sua salacitate, ne fœmina incubet: quod ne accadat fœmina contra emolliens, clanculo diffugiens parit: sed fit sæpius, ut præ turgore parturiendi, quolibet loco edat, & mare præsentî: uerum ut oua seruentur, nunquam ad ea subito accedit. Plerunque uero fœminæ transuehunt partus, ut mares fallant. Et si quis hominum ubi incubent, propinquabit, egressæ matres uenientibus sese sponte efferunt: & simulata debilitate uel pedum uel alarum, quasi statim capi possint, gressus fingunt tardiores. Hoc mēdacio sollicitant obuios & elidunt, quoad prouecti lōgius à nidis auocentur. Coitus tempore uolant tam mas quàm fœmina ore hiant, exerrâque lingua: uel, ut Aristoteles refert, ore hiant exerrâque lingua & mares & fœminæ coeunt. Neque in alio animali par opus libidinis: si contra mares steterint fœminæ, eo quo ad libidinem excitantur tempore, aura ab his flante, prægnantes fiunt. Plerunque etiam uoce marium, utero ingrauescunt, si gestiunt ac libidine turgent. Quin & uolatu quoque superne marium effici idem potest: quasi uidelicet mas ipse in fœminam fertificum spiritum demittat. Puluere se uolutare solēt perdices. Earum uita amplius quàm ad sexdecim annos durare existimatur. In Italia alterum est perdicum genus, magnitudine minore, & uolatu incompósito: rostro minime rufo. Perdix uulture maior ex India ad Cæsarem missa est. Perdicis sane cum ubique liberæ sint, ut aues uniuerse, in Bæotia non sunt: nec cum uolant, sui sunt iuris: sed in ipso aere, quas transire non ualeant, metas habent, ut nec in Atticum solum transmeent. Syroperdix in Antiochia Pilsidiæ, perdice minor est, & niger excepto rostro, quod rufum spectatur. lapides deuorat atque conficit. Non mansuefcit, sed semper perseuerat ferus esse. Eius carnes & densiores sunt quàm ceterarum, & luauiore cibi usum præstant. Perdicis caro facile concoquitur, probumque generat succum: quæ tamen minime recens edēda est, sed ubi unum, quàm minime, diem suspensum adseruaueris: ita nanque eius durities facile amittitur. Quæ circa Cirrhā perdicis inueniuntur, earum

caro

*De causis horum pulcherrimā inuenies cōtēplationē lib. de generat. animalium.*

*Perdix altera.*

*Syroperdix.*



A caro ingrati saporis est, neque edendo sunt. Si sorbeantur oua perdicis, putantur fecunditatem facere, lactis quoque copiam. Perdicis fel atque gallinæ ad medicinæ usum aliis præstat. Fel perdicum cum mellis æquo pondere, contusis oculis inungitur: per se uero ad claritatem: Hippocratis (ut putant) autoritate adiicitur, quod in argentea pyxide obseruari iubent. Oua perdicum in uase æreo decocta cum melle, ulceribus oculorū & glaucomatis medentur. Sanguis perdicis oculorum ulceribus recētib⁹, & oculis cruore suffusus illinitur atque lusciosis. Currunt ut perdicēs rusticula: de qua Martialis,

*Rusticula.*

Rustica sum perdis: quid refert? si sapor idem est:

Carior est perdis, sic sapit illa magis.

*Rustica perdis.*

*Aliās, si sapit.*

B Terrena quoque & pulueratrix attagena est, neque uolax multum: corpore quàm sit perdis paulo grandiore, toto dorso punctis maculisue insignis: colore aliàs figlino ad subrufum magis tendente. Ob corporis grauitatem alarūque paruitatem, canibus facillime capitur à uenatoribus. Auis multipara est attagen, frugibusq; uiuit, & pulueratrix est. Quondam existimatus inter raras aues: iam & in Gallia & Hispania capitur, & in Alpibus etiam. Auis uocalis aliàs, captus uero obmutescens, adeo ut nullam edat uocem, tantum abest ut māsuecat. Tractu autem attagenes ad Pylas ex Ly-  
cia, (ut Socrates author est) coturnicum uocem aliquandiu edidere. Attagenæ caro facillime cōcoquitur, & probum creat succum. Attagen Ionius maxime celebratur, teste uel Coquo Martiale,

C Inter sapores fertur alitum primus

Ionicarum gustus attagenarum.

Attagas (tagenarium quoque uocari solet) pennas gestat maculis punctisue uariegatas. in locis uiuitat campestribus atque stagnantibus: ideoque in Marathone frequens. Humi quoque uersatur, nec unquam in arbore cōsistit, quæ scolopax dicitur uel ascalopax. Per sepes hortorum capitur. magnitudine quanta gallina est, rostro longo, colore attagenæ: currit celeriter, & hominem mire diligit. Quæ galerita, ab apice quem in capite gestat, quondam appellata est, postea alaunda gallico uocabulo dicta est, Græci corydon & corydalon uocant. Auicula hæc non in arbore consistit, sed humi, in uis & semitis ubique nobis occurrens, apicem in capite ueluti cristam ex pilis constantem gestans, pauonis in morem. Hæc & pulueratrix est. Alaudarum duo genera, alterum terrenum & cristatum, ut dictum est, galerita à crista appellatum: similis hæc est passerculis auiculisue, quos pyrgitas uocant, uerum maior est galerita. circa uias & semitas reperitur, ut diximus, hyemis præsertim tempore: alterum gregale, nec singulare more al-  
terius, uerum colore simile, quanquam magnitudine minus, & galero carens, cibo uero idoneum. Cōdenso frutice nidificat alaunda. Alaudæ cum auibus uariis dictis dissident: oua enim inuicem exedunt: ardeolarum quoque oua diripit alaunda. Quæ apicem gestat galerita, inquit Galenus, in simplici iure elixa, colicos iuuat, si unā cum suo iure sæpe atq; assidue edatur: assam scribit Dioscorides cœliacis prodesse. Et Plinius, coli uitium, in-

*Attagenæ.*

*Attagen.*

*Attagen.*

*Attagen.*

*Attagen.*

*Attagen.*

*Attagen.*

*Attagen.*

*Attagen.*

*Attagen.*

*Attagen.*

*Attagen.*

*Attagen.*

*Attagen.*

*Attagen.*

*Attagen.*

*Attagen.*

*Attagen.*

*Attagen.*

*Attagen.*

*Attagen.*

*Attagen.*

*Attagen.*

*Attagen.*

*Attagen.*

*Attagen.*

*Attagen.*

*Attagen.*

*Attagen.*

quit, sanatur ab aue galerita assa in cibo sumpta. Quidam in uase nouo cum E plumis exuri iubent, conteri que in cinerem, bibique ex aqua cochlearibus ternis per quatrimum: quidam cor eius adalligari foemini: alij recens tepensque adhuc deuorari. Cōsularis Asprenatum domus, inquit Plinius, in qua alter è fratribus colo liberatus est aue hac in cibo sumpta, & corde eius in armilla aurea incluso. Hæ fere suum nidum patere auræ cupiunt. Quem uero Bærotij meropa uocant, hic unus corporis grauitate prohibitus sublimē petere, subiens terræ cauernas, facit cunabula & parit, in specu scilicet sex pedum defossa altitudine. Et pēnæ huius auis intus pallidæ sunt, superne cœruleæ ut halcyonis: postremæ pinnulæ rubræ habentur. Parit sex aut septem æstate. Apibus inimica hæc auis est. Sunt qui meropas genitorum senectutem educare confirmant, educationis uicem reddere: ut parentes nō modo senescentes, uerū etiam statim cum iam datur facultas, alantur opera liberorum: nec matrem aut patrem exire, sed in cubili manentes pasci labore eorum.

Merops.  
Aspiaster.

ὄρνις.  
Χηνίος.

1 ὄρνις uoce diminutiuū dicitur: & χηνίος quoque parua uocatur coturnix.  
2 De coturnicis effrenata libidine leges apud Athenzum, lib. 9. 3 Miliaria à milio quo uescuntur, ut inquit Varro, de lingua Latina. Hæc an eadem sit auis cum cenchinamo, consideret lector. 4 Quanam aucupij ratione capiātur coturnices in Italiam primo uere aduentantes, explicat Blondus in regione Latina. 5 Theodorus lib. 5 hist. animalū, ad quinque & uiginti annos habet: sed errore, nī fallor, exemplaris Græci, aut scriptoris. 6 Minime rufō, ὅχι κίττα βέρμιος, ita legitur apud Athenzum: sed melius fortasse si expungatur ὅχι, ut sit rostro rufescente: sed nihil uolumus mutare. 7 Non ἀπὸ κίττω, sed ἀπὸ κίττα dicitur, si Athenzō credimus, & ἀπὸ κίττα lingua Græca Attica: punctis maculisque insignis, κατὰ γὰρ φθόνον. 8 Frugibus uiscitur: σπέρμιλος γὰρ ὄρνις. An potius? seminibus frugibusue erutis atque effossis uiscitur, uti in spermologo. 9 In alimenti ratione coniunguntur fere attagenæ cum perdicibus, & apud Galenum & Oribasium, & cæteros medicos. 10 Gallinaginem uocat Theod. uernaculā uocem secutus, ut scribit Hermolaus. Scolopax uel alcalopax, uide ne codex Aristotelicus mendosus sit in alterutro loco, an diuersæ sint aues. Hominē mire diligit, ἐλάνθραμι ὄρνις, uetus Aristotelis interpretes ita reddidit: & diligit appropinquare ad homines. 11 Lib. 8. histor. animalū. Galerita inter eas aues numeratur, quæ hyeme latent: ubi equidem mendosa esse exemplaria crediderim: tum quod Aëtius dicat hyemis maxime tempore galeritas inueniri, cum uero quod etiam uetus Aristotelis interpretes eo in loco, habet foredoz, cū aliis in locis pro galerita habeat corozar, aut coroneon pro corydon. 12 Alterum gregale, Hęc fortitan est, de qua Hermolaus: similis est alaуда terraneola uocata, nisi quod apice careat, in terra nidificans, unde nomen. Parcus (si Hermolaō credimus) auis est ab alaуда differens, (etiam si qui negant) palūbo minor aliquanto, subtrus cādida, cætero pauoni similis, & crista quoq. 13 Cœliacis, fortitan colicis legendum. 14 Postremæ pinnulæ. Ita Theodorus, τὰ δὲ ὑπὸ τοῖς πτέρυγας ἰσθμίοις, id est (ut mihi certe uidetur) in summis alis rubræ. Plinius hæc ita reddidit, colore pinnarum, superne cyaneo, priori subrutilo. 15 Æstate, τὰς τῶν ὀρνέων.

Gallinago.  
Scolopax.

De turdorum merularumque generibus, & aliis quibusdam, quæ cum iis similitudine quadā coniungūtur. Cap. CXXXII.

Turdus,  
Κίχλη.  
Κίχλη.  
Τειχίς.

I N omni certe rure, & intra uillarum septa pascebātur in auariis & turdi & merulæ. Turdorum tria sunt genera, unum uisciuorum, quod nisi uisco atque refina nō uescitur: & magnitudine picæ est: alterum τειχίς, id est pilare,

A pilare, quod sonat acute, & magnitudine merulae est: tertium quod *ἰλιάδου* *Turdus pilaris.*  
*ἰλιάδου* quidam uocant, alij *πυλάδου*: iliacum latine non inepte dixeris, minimum inter haec, minusque maculis distinctum. Turdi nidos ex luto, ut hirundines faciunt in secessu in excelsis arboribus. stragulum subiiciunt ex uillo & lana, interioraque nidi ex eisdem consternunt. Mutat turdus colorem: aestate nanque color circa collum uariis, hyeme cōcolor: uoce tamē eadem est. Aliquot diebus hyeme latet, in uicināque abit, quo hybernūm pabulum petat. itaque in Germania hyeme maxime turdi cernuntur. expetitur à turdis & fagi glans. Turdorum caro durior est quàm sit gallinarum, perdicum, attagenarum, & id genus aliarum auium: succum tamen, si probe concoquatur, & probum generat & minime excrementosum: estq; in-

B quit Martialis,

Inter aues turdus, si quis me iudice certet,

Inter quadrupedes gloria prima lepus.

Turdus inasatus cum myrti baccis dysentericis medetur: turdos quoque edisse cum baccis myrti prodest urinæ. Venere in Italiam Debra- censibus bellis ciuilibus trans Padum externæ & nouæ aues: ita enim adhuc uocantur, turdorum specie, paulum infra columbas magnitudine, sapore grata. Merularum duo sunt genera, alterū nigrum & uulgare, & rostrum illi rutilum: alterum candidum: magnitudine quidem compari, & uoce simili: sed circa Cyllenam Arcadiæ familiare, nec usquā alibi nascens. Prius illud genus immutatur per tempora & colore & uoce: ex nigro nanque ru-

C fescit, & per hyemem strepitat, cum per aestatem tumultuante cantet. rostrum quoque anniculis in ebur transfiguratur, duntaxat maribus. Merula postquam sibi nidū fecerit, stragulum subiicit ex uillo & lana, interioraq; nidi ex eisdem consternit, turdorum in horem: Bis parit merula, sed primi partus intereunt frigore hyerno: omnium nanque auium prima hæc parit: posteriorem partum educat, & feliciter ducit ad finem. saliendo incedit merula. Latet hyeme: hoc est in uicina abit, nō occultatur, quemadmodum & turdus. Eius caro quod ad ad alimēti rationem attinet, nō aliter atque turdorum durior est, sed probum generat succum, uti de turdis diximus: & merula inasata caro cum myrti baccis dysentericis medetur. Est & altera auis *κίανος*, id est merula à comicis uocata, nō cantans, sed muta.

D E merularum genere est bæos auis, merula nigra similis: sed magnitudine paulo minor. uersari hæc in saxis & tectis solita est: nec rostrum rutilum ut merula habet. Merulis affine genus quoddam est uenaticum, colore nigrū, splendide canorū, recte ex eo uenaticū appellatum, quod ex auibus multasui cantus permulsione ad se allicit & capit. quod si quādo captā illam concluseris in cauem, muta permanet atque elinguis. Quæ caprimulgum appellant, auis montana est, magnitudine paulo maior quàm merula (ut aspectu sit merula grandior,) minor quàm cuculus, moribus egnior molliorū. Parit oua duo aut tria cum plurima. intrat pastorum stabula, caprarūque uberibus aduolat, suctum propter lactis, unde nomē accepit: cum fluxerit, uber extingui capramque excecari aiunt. *κίς*, id est capella, alia auis

*Sturnus.*  
*στῦρνος.*  
*στῦρν.*

*Collurio.*  
*κολλῦριον.*

*Cæruleus.*  
*κύανος.*

*Chlorion.*  
*Vireo, uel*  
*uirio.*

*Molliceps.*  
*μιλλικεψ.*  
*ιψ.*

*Pardalus.*

est: circa amnes enim & lacus uersatur. Fur nocturnus est: parum clare nā. E  
 que interdiu uidet, sed noctu perspicax est. Sturnus quoque niger est, & s  
 merulæ magnitudine, sed colore uario est. Sturnorum generi proprium  
 cateruatim uolare, & quodam pilæ orbe circumagi, omnibus in medium  
 agmen tendentibus. Hyeme abeunt & sturni simili modo atque merulæ  
 in uicina, propter hybernum pabulum, sed non aliter occurrantur. Stur-  
 norum oryzam solum pascentium sterus simile est crocodileæ, quam uo-  
 cant, cuiusque loco uenditur. Collurio auicula similis est merulæ, nisi quod 6  
 magnitudine sit pardali, mollicipitis, atque aliarum huiusmodi. Ut in  
 merularum genere alia nigra tota est, alia uero candida: ita & suum ha-  
 bent colorem, cæruleus, chlorion, molliceps & pardalus. Cæruleus cya-  
 nōsue auicula est colore tota cæruleo, quæ maxime in Scyro colit, saxa a- F  
 mans, urbanas commorationes odio prosequitur: his locis ubi magna ho-  
 minum solitudo est, ut montium iugis, delectatur: magnitudine minor  
 quàm merula, maior paulo quàm fringilla. pede magno est, scanditque  
 saxa, rostro tenui & longo: crure breui similiter ut pipo est. Chlorion totus 7  
 est luteus. coloris minime grati. hyeme hic non uidetur: sed æstiuo solstitio 8  
 uenit in conspectu. Discedit exortu arcturi syderis: magnitudine turturis  
 est. docilis & ad uitæ munera ingeniosus notatur: sed male uolat. Molli-  
 ceptus colore totus cinereo, grandi & cartilagineo capite est: magnitudine 9  
 paulo maior quàm turdus. Ore firmo, paruo, rotundo: ualet pedibus, sed  
 pennæ inualens est. Eodem in loco semper sibi statuit sedem, atque ibidem  
 capitur: capitur autem maxime per noctuam. Pardalus auicula est colore G  
 tota cinereo, magnitudine proxima superioribus, sed pennis ac pedibus bo-  
 nis. magna ex parte gregatim uolat, nec singularem hanc uideris: uocē fre-  
 quentem nec grauem emittit. De fidipedibus quæ grauiores sunt, & quæ  
 in auariis aut fructus aut ganeæ causa pasci solebant, quæque iis quoquo  
 modo cognata sunt, hæc dicta sunt.

1 Quod uero sequitur in Aristotele, *ἡ φησὶς ἂν πικρὸν ἀλλὰ καὶ καὶ ἔχει δὲ καὶ*, &c. ut e-  
 quidem arbitror, de hirundinibus intelligitur, non de turdis: etiam si Plinius addit, pe-  
 ne contextim, scilicet hoc ipsum de turdis intelligens. 2 Non *βαίος* sed *φαίος* legit  
 Theodorus. 3 In textis, Græci *ὡς τῆς καρχηδόνος*, id est in siglinis. 4 Est apud Ari-  
 storelem & *αἰγροίφαλος*, id est capriceps, cui gula inferiore parte lata est. lienem nō ha-  
 bet: sed uero adhæret simul & uentri & iecinori. 5 Theodorus, Niger est, albis dis-  
 tinctus maculis. 6 Ita ex ueteri translatione Græca lectio Aldina, & Theodorus,  
 ita. Collurio eisdem quibus merula uestitur: magnitudo, &c. 7 Tenui, & uetus H  
 interpres, angusto habet. *χαλκίς*, fortasse *λατὴν* erat legendum. 8 Torus luteus,  
 Theodorus, totus uiridans ex obscuro, *χλωρὸς ἁλός*. Hunc nonnulli matem esse arbi-  
 trantur in luctarum genere. 9 Et cartilagineo, *χρῆστος* uide ne sit locus hic cor-  
 ruptus apud Aristot. uetus certe interpres non habet, sed solum, caput habet magnū.

De auibus carniuoris, & primo de aquilarum generibus.

Cap. CXXXIII.

*Aquila, αἰεὶς.* IN auium genere quibus unguis adunci, prope dixerim omnes, carniuo-  
 ræ sunt, ut dictum est, ut genera aquilarum omnia, milui, accipitres: ue-  
 scuntur tamen & glande in hoc genere pomis que nonnullæ. Ex his aquilæ  
 maximus

A maximus honos, maxima & uis quoque: quocirca ossa iis natura tribuit durissima crassissimæque, quibus & medullæ minimum inest. Nidificant aquilæ locis non planis, sed celsis: præcipue quidem arduis saxis & præcipiti-  
 bus, sed arboribus etiam. Incubant tricenis diebus: oua pariunt terna, sed pullos binos excludunt, ut ex uersu quem ad Musæum referunt authorem constet:

Excludit binos, edit terna, educat unum.

Sed quanuis magna ex parte sic fiat, tamen & tres uisi aliquando sunt pul-  
 li: alterum nido in educando expellunt tædio nutriendi: quippe eo tem-  
 pore ipsi cibum negauit natura, prospiciens ne omnium ferarum fœtus ra-  
 perentur. Vngues quoque earum inuertuntur diebus iis: albescunt inedia

B pennæ, ut merito suos oderint partus. Sed pullum eiec-  
 tum ossifraga exci-  
 pit & educat. Genera aquilarum non æque omnia prolem fastidiunt: sed dif-  
 ficilior in alendo una cui nomen pygargo: benignior quæ nigra est (melan-  
 aëtos dicta.) Alunt aquilæ suos pullos donec potestas uolandi fiat: tum ni-  
 do eos expellunt, post regione, quam ipsi genitores incolunt, tota exterminant,  
 æmulos scilicet rapinæ. Et alioqui unum par aquilarum magno ad po-  
 pulandum tractu ut satietur, indiget: unde fit ne suos pullos ullo pacto ui-  
 cinos habere patiantur. Prædantur locis non suo nido propinquis, sed lon-  
 ge distantibus. A meridiano autem tempore operantur & uolant: priori-  
 bus horis diei donec impleantur hominum conuentu fora, ignaue sedent.

2 Rapta non protinus ferunt, sed primo deponunt, expertæque pondus, tunc

C demum abeunt. Venatur aquila etiam lepores, hinnulos, uulpes & reliqua  
 quæ uincere ualeat. Condunt referuanteque aquilæ suo in nido quantum ci-  
 bi pullis superfit: quod enim die quaque facultas uenandi non datur, fit in-  
 terdum ne quod portent extrinsecus habeant. Viuit aquila tempore lon-  
 go, quod diuturnitate nidi eiusdem declaratur. Senescētibz aquilis rostri  
 superius accrescit, incuruatūque subinde magis magisque, ut demum fa-  
 me intereant, non senio nec ægritudine. Rhodus aquilam non habet. Aquila-  
 rum pennæ mixta reliquarum auium pennas deuorare feruntur. Dis-  
 fidet aquila cum dracone: uelcitur enim aquila anguibz: cum ardeola etiā  
 pugnat: unguibus enim ualens aquila aggreditur: ardeola autem repugnan-  
 do emoritur. Sitra & trochilus cum aquila pugnant: sitra enim oua aquilæ

D frangit: aquila tum ob eam rem, tum etiam quod carniuora est, aduersatur  
 omnibus. Cum aquila etiam pugnat uultur & olor: uincitque eam sapius  
 olor. Cymindis chalcisue cum aquila pugnat adeo acriter, ut sapius ambæ  
 implexæ deferantur in terram, & uiuæ a pastoribus capiantur. Aquilarum  
 fel acre admodum est, atque corpora exest: coloreque spectatur ærugi-  
 neo. Hoc, ut fertur, si unā cum Attico melle inungatur, cui hebescunt o-  
 culi, plane uisum recreabit, reddētque oculos acutissimos. Lapis acētēs  
 in aquilæ repertus nido custodit partus contra omnes abortuum insidias.

Aquilarum plura sunt genera: unum quod pygargus ab albicante cauda di-  
 citur, ac si albicillam nomines. Versatur hæc in capis, & lucis, & circa op-  
 pida, hinnularia à nonnullis uocata cognomine est: mōtes etiam syluamq;

*Pygargus.*

*Albicilla.*

*Hinnularia.*

*νεφεοφόρος.*

*Plangus, uel  
Plancus, uel  
Clangus.  
Ναυφῶς  
Anataria.  
Morphnos,  
uel morphna.  
Parnus.*

*In lacus, alia  
in lacus.*

*Μαλακῆντος,  
Pulla aquila,  
Fulua.  
Λαγοφῶς,  
Leporaria,  
Valeria.*

*Pernopterus,  
Περνιόδαρος,  
Ciconia mon-  
tana.  
Γυπαλῆς.*

*Haliæetus.  
Haliæetus.*

*Γυπαλῆς,  
Χρυσαῖος,  
Stellaris aui-  
la.  
Media magni-  
tudine, inquit  
Plinius.*

luis freta uiribus petit. Reliqua genera raro plana & lucos adeunt. Hæc ma-  
xime inter aquilas difficilem se præbet in fœtu alendo. Alterum genus se-  
cundum magnitudine & ui, plangos nomine, *ναυφῶς* etiam cognomi-  
natur, id est anataria, & morphnos: Homerus parnon uocauit. Huic ui-  
ta circa lacus stagnaue, & saltus quoque & conualles. Phomonoe Apollinis  
dicta filia dentes ei esse prodidit, mutæ alias carenti lingua: eadem nigerri-  
mam, prominentiore cauda: consensit & Boëthus. Ingenium est ei testudi-  
nes raptas frangere è sublimi iaciendo: quæ fors interemit poetam Æschy-  
lum. Aquaticas aues hæc appetit, mergetes sese subinde, donec sopitas la-  
fatæque rapiat. Spectanda dimicatio, aue ad perfugia litorum tendente, ma-  
xime si condensa arundo sit: aquila inde ictu abigente alæ, & cum appetat,  
in lacus cadente, umbramque suam nanti sub aqua à litore ostendente: rur-  
sus aue in diuersa, & ubi se minime credat spectari emergente. Hæc causa  
est gregatim auibz natandi, quia plures simul nō infestantur, resperfu pē-  
narum hostem obcæcantes. Sæpe & aquilæ ipsæ nō tolerantes pondus ap-  
prehensum unā merguntur. Tertium genus magnitudine minima, sed ui-  
ribz omnium præstantissima hæc est. Colit montes & syluas *μαλακῆντος* à  
Græcis dicta, id est pulla aut fulua: & *λαγοφῶς*, id est leporaria: eademque ua-  
leria. Sola aquilarum fœtus suos alit atque educit: ceteræ sugant. Pernix  
est & prompta ac pugnax intrepidæque liberalis non inuida est, modesta  
etiam nec petulans: quippe quæ non clangat neque murmuret. Quartum  
genus percnopterus, capite albicante, corpore maiore quàm ceteræ adhuc  
dictæ, sed alis breuioribus, cauda longiore, uulturina specie, *περνιόδαρος* co-  
gnominatur, id est ciconia montana, & *γυπαλῆς* imbecillis & degener est:  
quippe quæ à coruo ceterisque id genus alitibus uerberetur fugeturque: gra-  
uis est enim & uictu iners, famelica semper est & querulæ murmuratiois,  
ineolit lucos. Nec ceterarum aquilarum uitiiis caret: & bonorum quæ illa  
obtinere expers est. Sola aquilarum exanima fert corpora: cetera cum oc-  
cidere confidunt. Quintum genus quod haliæetus, hoc est marina aquila uo-  
catur, ceruice magna & crassa, alis curuantibus, cauda lata. Moratur hæc in lo-  
toribus & oris maritimis: & lacus quoque petit. Clarissima est oculorum  
acies, librans ex alto sese, uisumque in mari pisce præceps in eum ruens, & dis-  
cussis pectore aquis rapiens. Accidit huic sapius, ut eum ferre quod cepe-  
rit, nequeat, in gurgitem demergatur. Haliæetus tantum (inquit Plinius) im-  
plumes etiamnum pullos suos percuteiens subinde cogit aduersos intueri  
solis radios: & si conniuentem flentemque animaduertit, præcipitat è nido,  
uelut adulterinum & degenerem: illū cuius acies firma contra steterit, edu-  
cat. Haliæti (ut Plinius auctor est) suum genus non habent, sed ex diuerso  
aquilarum coitu nascuntur: & id quidem quod ex iis natum est, in ossifra-  
gis genus habet. Mixto huius aquilæ felle cū melle Attico, inunguntur nu-  
beculæ suffusionisque oculorum. Sextum genus *γυπαλῆς* appellant, id est ue-  
rum ac germanum, uelut solū incorruptæ originis: alij chrysaëton, alij stel-  
larem uocant. Maxima aquilarum omnium hæc est; maior etiam quàm ossi-  
fraga: sed ceteras aquilas uel sesquialtera proportionem excedit: colore sub-  
rutilo,



A rutilo, rara conspectu. Hoc genus aquilarum hinnulos, lepores, grues, aues  
 12 cortales uenatur: quin et tauros inuadit. Ex aquilarum genere una tantum  
 quæ Iouis appellatur carnes non attingit, sed ad uictum illi herba satis est.

13 Quod ex haliaetis natum est, in ossifragis genus habet, ut dictum est: è qui-  
 bus uultures progenerantur minores: & ex iis magni, qui omnino non ge-  
 nerant. Ossifragam Græci *φωλὼ* & *ελνί* dicunt: aquilis cognatum genus un-  
 cingue carnivorumque: eius magnitudo maior est quam aquile: color ex  
 cinere albicās. Parum hæc oculis ualeat: nubecula enim oculos habet læsos.  
 Probe & fortificat & uiuit: cœnægerula & benigna est. Nutricat bene &  
 suos pullos & aquilæ: cum enim aquila suos nido eiecerit, hæc recipit eos  
 ac educat. Eiicit nanque suos aquila antequam uolandi tempus sit, adhuc

B parentis operam desiderantes, nec uolandi adeptos facultatē. Deiecti pulli  
 uociferantur: sed ossifraga recipit eos benigne, & tuetur, & alit dum quan-  
 tum satis sit adolefcant. Ossifragi uenter paulatim epotus, calculos cum lo-  
 tio pellere proditur. Vnū est ossifrago intestinum mirabili natura, omnia  
 deuorata conficienti: huius partem extremam adalligatam prodesse cōtra  
 colum constat. Vultures minores ex haliaetis progenerantur, uti modo di-  
 ximus. Vulturum nanque duo genera: alterum paruum & albicantiū, al-  
 terum maius & coloris cinerei aut nigri. Vultur ut fere grauiores, nisi ex  
 procurfu aut altiore tumulo immissum non euolat. Nidificat in excelsissi-  
 mis rupibus: unde fit ut raro nidus & pulli uulturis cernantur: ideo etiam  
 fure qui putarent illos ex diuerso orbe nobis incognito aduolare falso:

C quanquam enim difficile nidum eius alitis uideris, tamen uisus aliquan-  
 do est: neque certe locorum pluriū incola auis hæc est. Edit non plus quam  
 unum ouum, aut duo cum plurimum: & sætus sæpe cernuntur fere bini.  
 Vmbricius aruspex author est triduo ante aut biduo uolare eos, ubi cada-  
 uera futura sunt: & multi exercitum sequētes repente apparent. Cū aquila  
 pugnat uultur: & inimici inter se sunt uultur & falco. Ex uolucris in  
 auxilio contra serpentes primum uultur est. Annotandum quoque minus  
 uirium esse nigris. Pennarū ex his nidore, si urantur, fugari eas dicunt: uul-  
 tures unguento fugantur, sed alios appetunt odores. Immissum aliqui

uulturis pullum arbitrantur: & sanqualem ossifragam: Massurius immissu-  
 lum dicit esse pullum aquilæ priusquam albicet cauda: quidā post Mutium  
 D augurem uisos non esse Romæ cōfirmare. Ego (quod ueri similibus est, in-  
 quit Plinius) in desidia rerum omnium non arbitror agnitos. Sunt in Arca-  
 dia circa paludem quæ Tantalū dicitur, aquilæ, quæ cyniæ uocantur, co-  
 lore candido æque atque olores.

1 Plinius: Eiectos ab ijs cognatum genus ossifragi excipiunt, & educant cum suis.

2 Hæc tribuit Ælianus præcipue generi illi, quod chrysaetos & stellatis appellatur. Quam caute lepores uenatur aquila ostendit Aristoteles: quo uero pacto educantur instituanturque ad uenationem apud Indos, explicat Ælianus. 3 Lucis, τὰ ἔλας.

4 Circa lacus, uetus interpret in desertis & montanis 5 Quæ fors, Lege Valeri. Max. lib. 9, & Gellium lib. 13, & lib. 7. Hæc de aquila in genere uel de haliaëtō dicitur, nisi codex sit mendosus apud Aristotelem. 6 Donec sopitas &c. Aristoteles ita, Donec uel strangulet in humore, uel per summa corripit. 7 Plinius, Sola sine clā-

*Iouis aquila.*

*Ossifraga.*

*Ossifragus.*

*φωλὼ.*

*ελνί.*

*un-*

*Vultur.*

*Nubecula et c.*

*πιπύρατος.*

*γὰρ.*

*Vultur, γὰρ.*

*αιγυπτίος.*

*Theophrast.*

*Vnguento nen-*

*cantur.*

*Immissum*

*sanquale.*

*Sanquale.*

*Cynia.*



ἄεας, ὅς,  
subaquila.

Nisus.

Barbata.

gore sine murmuratione. 8 Percnopterus, ab alarum notis, inquit Theodorus, uel E  
ab alarum nigritia. 9 τρυαλίς, Videtur Theodorus τρυαλίς hic legisse, id est sub-  
aquila. Alis minimis, Plinius: Corpore maiore, &c. αὐχί, ὁ ὕψος. uetus interpres, Quā-  
titas eius est, quasi medietas aliorū: ubi suspecta forsitan uideri poterent Græca exem-  
plaria, & legēdum esse corpore minore. 10 Nisus in haliaetum mutatus narratur.  
Ouid. lib. 8 Metamorph. 11 Quæ Plinius hoc in loco de haliaeto narrat, alij ad  
alia aquilarum genera referunt: ut Ambrosius lib. 5 Hexamer. & Aristoteles lib. 9 hi-  
stor. animalium, nisi forsitan torum illud caput sit mendosum: quod sane suspicor. 12  
Quoniam modo tauros inuadit hoc aquilarum genus, leges apud Ælium lib. 14.  
13 Genus aquilæ quam barbaram uocant, Thufci ossifragam dicūt. Ossifragam ab  
ossifrago distinguit Hermolaus, in Corr.

## De accipitrum generibus.

Cap. CXXXIII. F

Accipiter,  
negl.

ET accipitrum quoque generi natura  
Oraque adunca dedit, curuos dedit unguibus hamos.

Hi multo inter se magnitudine differunt. Color iis maculis distinguitur  
ceu lineis. Fel habet accipiter iccori simul & intestino adhærens. Lien illi us-  
que adeo exiguus, ut propemodum sensum effugiat: & uentriculus quoque  
feruentior: & quanuis uorax sit, auium tamen quas ceperit, cor nunquam  
comedit. Nidulatur locis arduis & saxosis: & uicenis diebus incubat. Acci-  
pitres tutius Massiliæ humi fœtificat, nec alibi nascuntur illis assueti genti-  
bus. In Thraciæ parte homines atque accipitres societate quadam aucupā-  
tur: hi ex syluis frutetisue & arundinetis excitant aues: illi superuolantes  
deprimunt: rursus captas, aucupes diuidunt cum illis. Accipiter Ægyptius G  
mansuetior est quàm sint alij. Accipiter decoctus in rosaceo efficacissimus  
ad inunctiones omnium oculi uitiorum putatur: item fimi eius cinis cum  
Attico melle. Genera non pauciora quàm decem esse accipitrum aliqui  
prodiderunt. Plinius accipitrum genera inquit, xvi inuenimus. Differunt  
autem, quòd alij columbam humi cōsidentem feriunt rapiuntque, uolan-  
tem non appetunt: alij super arborem aut tale quid conscendentem uenā-  
tur: sin humi est aut uolat, non inuadunt: alij neque humi neque in sublimi  
manentem aggrediuntur, sed uolantem capere conantur. Fertur etiā à co-  
lumbis quodq; accipitrum genus cognosci: itaque cum accipiter prouolat,  
si sublimipeta est, manent quo constiterint loco: sed si humipeta qui prouo-  
lat, est, non manent, sed continuo auolant contra naturam eius auxiliantes  
sibi. Accipitrum genus primum uiribusque ualentissimū triorchis à nu- 2  
mero testium nuncupatus: bureonem hunc appellāt Romani: miluo æqui- H  
paratur magnitudine, semp̄q; cernitur, uti Aristoteles author est. Bureo 3  
hostis est ranæ rubetæ & angui: rapit enim eos atque exedit. In Balearibus  
in honore mensarum est. Secundum genus æfalona Græci uocant, qui 4  
(si Plinio credimus) omni tempore apparet: ceteri hyeme abeūt. Æfalo &  
uulpi inuicem inimici sunt. Et uulpi quoque hostis æfalo est: ferit enim,  
pilósque eius euellit, occiditque catulos, ut qui uncos habeat ungues: con-  
tra coruus (ut qui uulpi amicus est) pugnat cum æfalone: unde fit ut uulpi,  
cum ab æfalone percutitur, auxilietur coruus. Tertium circus, claudum  
altero pede: cui cum uulpe quoq; inimicitia sunt, & propter communem  
uictum

Triorchis.  
Bureo.

Æfalom.  
Æfalo.

Circus, uigues.

Auictum: (carne enim uiuunt) uulpem inuadit & uulnerat. Ex ferociorum accipitrum numero circus est: & gallinarum domesticarum quoque pullis infidiatur. Et alia accipitrum genera sunt, asterias, id est stellaris, & pernes, & palumbarius siue *φασοφάρος φαβοτυπίου*, qui in ferociorum accipitrum numero censetur. Subutcones uel *εσπερίοι χαλ* appellantur accipitres, qui latiores sunt: alij perci, & *αυγίλας* uel fringillarij: alij *λῆος*, id est leues: & *φρυγί* *τελέρης*. Percus. *λῆος, uel leuis.* Chalcis. Cymindis.

B Chalcida diij perhibent, homines dixere cymindem.

6 Nocturnus accipiter est. Sunt qui hanc auem non aliā esse quā ptyngem uelint. Interdiu minus apparet, quia clare non uidet, sed noctu uenatur more aquilæ. Et pugnat uero cum aquila adeo acriter, ut sæpius ambæ implexæ deferantur in terram, & uiuæ a pastoribus capiātur. Parit hæc ova duo, & in saxis speluncisq; nidulatur. Genus accipitris tinnunculum uocāt rusticici, qui fere in ædificiis nidos facit. Columbas defendit hic, terrēque cæteros accipitres naturali potentia, in tantum ut uisum uocēque eius fugiant. Hac de causa præcipuus columbis amor eorum. Feruntque si in quatuor angulis defodiantur in ollis nouis oblitis, non mutare sedem columbas: uel uti narrat Columella, eius pulli singuli fictilibus ollis conduntur, Cstipantiāque opercula superponuntur, & gypso lita uasa in angulis columbarij suspenduntur: quæ res auibus amorem loci sic conciliat, ne unquā deferant, multiuaga alioquin aue. Sunt qui Cenchrin tinnunculum uocāt: & accipitrum quoque generis hanc Græci faciunt. Ventriculus illi minime carnosus, sed ingluuici similis. Plurima in adithco genere parit: cum omnes quibus unguis adunci, parcius generant. huius quatuor reperti sunt pulli, sed plures etiam posse procreari apertum est. Rubrum est eius ouini modo minij. sola fere aduncarum bibit. Cenchridis simum albugines extenuat. Milui ex accipitrum genere magnitudine differūt. Rapacissima & famelica semper ales atque carniuora. Ventriculum habet miluus calidū, & lienem exiguum. sed quoque habet icori simul & intestino adhærens.

D Videntur milui artem gubernandi docuisse caudæ flexibus, in cælo monstrante natura, quod opus esset in profundo. Oua pariunt milui bina magna ex parte, interdum terna: totidēque excludunt. uicenis diebus incubant. Hybernis mensibus latent paucis quibusdam diebus: non tamen ante hirundinem abeunt. Traduntur autem & solstitijs affici podagra. Miluus cum coruo pugnat: cripit enim miluus a coruo quicquid tenet, ut qui & unguibus sit præstator & uolatu. Piphex, harpa & miluus amici sunt. Laudatur milui iecur ad oculorum uitia: sed miluorum bilis actis admodū est, atque erodit. Colore quoque eruginoso spectatur, & nonnunquam atro. In Ægypto auem colunt incolæ, quem accipitrem uocant: qui nec nostris simile quicquam habet, nec Ægyptiis: sed & magnitudine excellit, & ua-

## DE DIFFERENTIIS

*Accipiter* *Aethiopicus*. *Aethiopicus* magis multo est. Hunc esse *Aethiopicum* dicunt, & illuc ex *Aethiopia* *E*  
*afferri*. *Mitis* hic *præ* cæteris est qui alibi reperiuntur.

1 *Φάλακτος* nomen & species accipitris est, authore Suida. 2 *Primum*, &c. *καρπύς*,  
*Accipiter*. id est præcipuum, dixit Theod. 3 *Buteo*, inquit Festus, ex eo se alit quod accipitri  
 eripuerit: uastitatisque causa est in iis locis quæ intrauerit. Vbi aduertendum quod Fe-  
 stus hoc in loco accipitem pro una specie accipit. 4 *Æfalon* (inquit Plinius) uo-  
 catur paru a uis qua corui frangens, cuius pulli infestantur a uulpibus: inuicem catu-  
 los eius ipsamque uellit: quod ubi uiderint corui, contra auxiliatur uelut aduersus cõ-  
 munem hostem. 5 *αετὴς* uel fringillarius, *φρωλόδερος*, uel rubetarius. 6 *Sunt*  
 qui, &c. Ita legit Theodorus apud Aristotelem Plinium secutus, qui hæc quæ in con-  
 textu sequuntur cymindi attribuit: uerum in Græco exẽplari aliter habetur, *ἡ δ' ὕψις*,  
*καὶ δὲ τῆς αἰῶνι αἰὼνι ἔχοντος οὐρα καὶ τῆς αἰῶνι, ἡ τῆς αἰῶνις μετὰ τὸ φαίνεσθαι*, &c. Et netus iis  
 interpretis ita reddidit. Et inuenitur etiam alia quæ dicitur, &c. ut ex iis alia uideatur  
 esse auis, cui hæc attribuit Aristoteles, quæ hybris dicatur, & non cymindis.

*Hybris.*

De cuculo.

Cap. CXXXV.

Сискум.  
Сотух.

Coccyx ex accipitre fieri, tempore anni immutata figura nonnullis putatur: quoniam quo tempore is apparet, accipiter ille cui similis est, non aspicitur: sed ita fere euenit, ut ne ceteri quidem accipitres item cernantur, cum primum uocem emisit cuculus, nisi perquam paucis diebus: ipsæque modico tempore aestatis uisus, hyeme non cernitur. Est hic neque ad uncis unguibus ut accipiter, neque capite accipitri similis: sed ea utraq; parte columbum potius quam accipitrem repræsentat: nec alio quam colore imitatur accipitrem, nisi quod accipiter maculis distinguitur ceu lineis, cuculus uelut punctis. Magnitudo atque uolatus similis accipitrum minimo, qui magna ex parte id temporis non cernitur, uti modo diximus, quo cuculus apparet: nam uel ambo uisi aliquando sunt. Quinetiam ab accipitre absumi uisus est, si quâdo una apparuere: quod nulla avis suo in genere solet facere. Pullos cuculi fere nemo se ait uidisse: parit tamen non in nido quem ipse fecerit, sed in nidis parit alienis: & interdum quidem in nidis minorum auium: præcipue autem in palumbium & curuæ, & alaudæ humi, atque etiam in nido chloridis super arborem. Parit maiore ex parte singula, raro bina, aut terna cum plurimum. nec ipse incubat, sed avis in cuius nido peperit, incubat, excludit atque educat: quo quidem præcipue tempore & pinguis & grati saporis pullus cuculi est. Atque adeo cum iam uolandi potens est cuculi pullus, nulla tum auium suauitate carnis comparatur illi. Illa uero quæ educat, cum alienigena pullus accreuerit, suos elicere dicitur, ita ut pereant. Sed de pullorum interitu non conuenit inter omnes: alij eos à genitrice occidi & dari in cibo cuculi pullo aiunt, uidelicet improbatos propter speciem cuculi elegantiores: ille enim nitidus in se nutricem conuertit, ut aiunt: illa gaudet eius specie, miraturque sese ipsam quod talem peperit: suos comparatione eius damnat, ut alienos: absumique etiâ se inspectante patitur, donec corripit ipsam quoque iam uolandi potens. Alij cuculum ipsum repetere nidum cui suum ouum mandarit, pullosque deuorare nutritici uolunt: alij pullum cuculi, quod magnitudine præstet, posse percipere cibum omnem oblarum, atque ita ceteros fame perire autumant: alij ipsum

A ipsum ut fortiorem, cæteros pastus consortes occidere auctores sunt. Sed prudenter sane prolis suæ procreationem moliri uidetur cuculus: cum enim se timidum minimèque opitulandi potentem nouerit, facit quasi supposititios suos pullos, quo seruari possint. Timiditate enim hæc avis excedit, quippe quæ ab auiculis uellatur, & præ metu earum fugiat. Cuculus immutatur colore, & uocem minus explanat cum se abditurus est, quod facere exortu caniculæ solet. Apparet autem ab incunte uere ad eius syderis ortum. Auem cuculum leporina pelle adalligatum, somnum allicere aiunt.

De nocturnis auibus, quæ unguibus sunt. Cap. CXXXVI.

**N**OCTURNARUM etiam auium nonnullæ aduncis unguibus sunt: hæc interdiu nequeunt cernere, & noctu uenando cibum sibi acquirunt. uerum non tota nocte id faciunt, sed uespertino & matutino. Venantur autem mures, lacertos, sphondilas, parnepas, & huiusmodi alias quasdam bestio-  
<sup>1</sup> las: *ἡλαυκάδες* græce dicuntur, id est noctuæ speciei habentes: quæ etiam superiore palpebra conniunt. Noctua cæteræ aues omnes die circunvolant, quod mirari uocatur, aduolantisque percutunt: quapropter aucupes ea constituta, auicularū genera multa & uaria capiunt. In genere aduncæ noctua est. Gulam habet parte inferiore paulo latiore: & appendices patas quasdam infra quæ definit intestinum. Lienem adeo exiguum, ut propemodum sensum effugiat. Diebus quibusdam paucis latitat hyeme. No-  
<sup>2</sup> ctuas sexagenis diebus hyemis cubare & nouem uoces habere tradit Nigidius. Harum genus in Creta insula nō est: etiam si qua inuecta sit, moritur. Dissidet cornix cum noctua: cornix enim meridie oua surripienti noctuæ absumit, cum non clare interdiu noctua uideat: noctua contra oua cornicis noctu exedit: estque altera interdiu, altera noctu potentior: item noctua cum orchilo: nam is quoque oua exedit noctuæ. Noctua apibus contraria, & uespis crabronibusque, & sanguisugis. Noctuarum contra aues solers dimicatio: maiore circumdante multitudine, resupinæ pedibus repugnant, collectæque in arcum, rostro & unguibus totæ teguntur. Auxiliatur accipiter collegio quodam naturæ, bellumque partitur. Noctuas ferunt à cauda de ouo exire, sicuti & bubonem & trogonem, quoniam pondere capitū  
<sup>3</sup> peruerfa oua posteriorem partem corporum fouendam matri applicent. Trogon.  
<sup>4</sup> Noctua imbre garrula serenitatem, sereno tempestatem enuntiat. Ebriosus  
<sup>5</sup> D oua noctuæ per triduum data in uino, tardium eius adducunt. Noctuarū genus maximum asio est, quibus pluma auriū modo micat. Huius felle re-  
<sup>6</sup> centi glaucomata emendari dicunt. Nocturna auis & bubo est, & uncos un-  
<sup>7</sup> guibus habet. Plumas habet uelut aures. deserta incolit, nec tantum desolata, sed dira etiam & inaccessa. Noctis monstrum, nec cantu aliquo uocali, sed gemitu. itaque in urbibus aut omnino in luce uisus, dirum ostensum est. Priuatorum domibus insidentem plurimis scio non fuisse feralem, inquit Plinius: uolat nunquam quod libet, sed transuersus aufertur. Bubonis pedes usti cum plumbagine herba, contra serpentes auxiliari feruntur. Eiusdem ouo ad capillos remedia demonstrant. Quis autem, quæso, ouum bu-  
<sup>8</sup>

*Ascalaphus.* bonis uidere potuit, cum tam ipsam auem uidisse prodigiū sit. Ascalaphū E fabulantur in bubonem uersum. De quo ita cecinit Ouidius,

Ingemuit regina Erebi, testemque prophanum  
Fecit auem: sparsumque caput phlegetontide lymphā  
In rostrum, & plumas, & grandia lumina uertit.  
Ille sibi ablatas fuluis amicitur ab alis:  
In caput crescit: longosque reflectitur ungues,  
Vixque mouet natas per inertia brachia pennas:  
Fædæque sit uolucris uenturi nuntia luctus  
Ignauus bubo, dirum mortalibus omen.

*Bubo.*

*Ascalaphus.*

*Byas.*

*Bubo.*

*Ἐλας, aluco.*

*Ἀγολίος,*

*Ulula.*

*Colaris.*

*Scops, ὁ σκῶψ,  
αἰετ.*

*Ἀποκῶπες.*

*Perennes sco-  
pes.*

*Nycticorax.*

*Apud nos, id  
est in Creta.*

Ascalaphus appendices quasdā paucas habet, ut noctua, adnatas infra quā definit intestinum. Byas græce dicitur (hunc & bubonem nonnulli uocāt): F speciei similis noctuæ est: sed magnitudine nō minor q̄ aquila. Nocturna auis & aduncis unguibus aluco est, maior gallinaceo: picas uenatur. Hæc tria simili specie constant, aluco, ægoliος, & scopos. Ægoliος quoque (quam ululam interpretantur) nocturna auis est, & unguis, speciei similis aluconi & scopi: aluconi compar: & picas quoque uenatur. Interdum raro apparet: sed noctu uagatur & pascitur: colit saxa & speluncas: pollet ingenio ac industria in uitæ muneribus. ægoliος quaternos nunquam edit pullos. Colarem ulula cæterique adunci exedūt, unde his oritur bellum. Ululæ fel prædicatur ad albugines, suffusiones, caligines: adeps similiter ad claritatē. 5 Aluconi & ululæ speciei similis est, qui scopos uenatur, & unguis quoque, & carne uescitur: uerum magnitudine minor quā noctua est: colore plu- 6 beo candidis quibusdam maculis distincto: in capite utrinque ad tempora emicant plumæ. Duo feruntur scopium genera: & hi quidem uocales, alij uero muti. Et aliqui omnibus anni temporibus apparent: & ob eam rem Ἀποκῶπες, id est perennes appellantur, qui esui non sunt propter uitū carnis. 6 colorem habent glaucum: alij autumnō interdum apparent, nec plus uno aut altero die immorantur, qui & esui sunt, & uā de probantur. Differunt hi nullo fere alio à perennibus illis, nisi corpulentia pingui, & quod uox 7 his deest, illis nō deest: & quod turturi aut palumbi æquales sunt. Imitatrix auis hæc est, non aliter atque otus: & eodem modo capitur (ut aiunt) saltādi imitatione: & ut nonnulli tradunt scopes aues omnes oris expressione & articulata uoce longe superant: & quemadmodum psittacus & pica, sic H scopes hominum & aliarum auium uoces exprimere fertur. Nominantur ab Homero, inquit Plinius, scopes auium genus: neque harum satyricos motus cum insident plerisque memoratos, facile conceperim mente: neque ipsæ iam aues nascuntur. Aduncis quoque unguibus est nycticorax, quæ & noctu uenando cibum sibi acquirit: habetque (quemadmodum & noctua) appendices paucas adnatas infra quā definit intestinum. Non est 8 ubique locorum similis nycticorax. Apud nos, inquit Strabo, aquilæ æqualis est, uocemque grauem edit: in Ægypto uero graculi habet magnitudinem, & uocem omnino diuersam. Nycticoracem nonnulli uocant otum, a uem scilicet illam quæ se coturnicibus hinc abeuntibus ducem præbet.

- A** 1 Ovidius de Nyctimene in noctuam mutata: Conspēctum lucēmq̃ fugit,  
 Et à cunctis expellitur æthere toto. 2 Vin' (inquit Penicatus in Plauti Menechmo)  
 afferri noctuam, quę tuu usque dicat tibi. Tutu noctuæ uox est. 3 Aliàs, Quibus  
 pluma auri modo micat: uel quibus pluma aurium emicat. 4 Aristoteles ita habet,  
 οὐλοῦται μάλιστα αἰκνέοντος, ὁ δὲ αἰκνέοντος, πικρὸς πλάσιος: ambiguo sane sensu. Quod  
 nec minus ambigue uertit Theodorus: Aluco maior gallinaceo est, ulula cōpar. Am-  
 biguum scilicet an ulula sit πικρὸς πλάσιος, id est specie similis, an magnitudine compar:  
 & an sit gallinaceo compar, an aluconi. Vetus interpretes ita habet, sensu paulo apertio-  
 re, Heleco autē gallo maior, & agolius assimilatur ei multum: cuius sensum & nos se-  
 cuti sumus. 5 Scops, Afionem uocat Theodorus: Tyrannio σκόπας esse nycticorā-  
 ces dixit: & σκόπας dici quasi σκιάπας τὸ δὲ ὄπας, id est uocem noctu edētes. 6 ἡ σέμ-  
 πασιος, Sempasiones uocat Theodorus. ἡ δὲ ἡ αὐτοῦ, inquit Athenæus, si uerum sit ex-  
 plar. 7 Corpulentia pingui, Ita legit Theodorus apud Aristotelem: τῶν πικρῶν: ue-  
 rum Athenæus τῶν πικρῶν habet, ut scilicet differat nō corpulentia, sed pernicitate. 8  
**B** Cicumam uocat Theodorus, aliàs, cicunia.

Afio.

Sempasiones.

Cicumā.

## De hirundinum generibus.

## Cap. CXXXVII.

- S** Vnt etiam in genere non adunco quæ carne uestuntur, ut hirundo: so-  
 lūque carne uestens auis, inquit Plinius, ex iis que aduncos ungues non  
 habent: una quoque ex iis quæ carne uestuntur, bis anno nidificat: quæ (uti  
 de ea cecinit Ouidius)

Hirundo,

χελιδόν.

Tecta subit: neque adhuc de pectore cædis

Excessere notæ, signatæque sanguine pluma est.

- Hirundinum pennæ quandoque è nigris fiunt albæ. Ventriculus hirundi-  
 ni longior: & neque gulam habet ampliorem, neq; ingluuiem. Fel earum  
**C** Calis uentri, aliis intellino adhæret, uel in eodem hirundinum genere. Vo-  
 lucrum soli hirundini flexuosi uolatus, uelox celeritas: quibus ex causis ne-  
 que rapinæ cæterarum alitum obnoxia est. Eadem demum sola auium nō  
 nisi in uolatu pascitur: uerū ut pennis præualere, sic pedibus degenerare ui-  
 2 detur. Hirundo nulla arte māuescit. Discedūt hirūdines hybernīs mēsis  
 in uicina: & quidem uisæ sunt hirundines in locis quibusdā angustis nudæ  
 atq; omnino deplumes. Discedunt ad arcturi ortū. Cōspiciuntur denuo ad  
 vii cal. Mart. itaque semestres apparent. Auerſæ hirundines coire ferūtur,  
 contra atque cætera auium genera. Bis anno nidificat hirūdo (ut diximus):  
 & pullos edit im̄perfectos & cæcos: quorum adhuc recentium oculi, si quis  
 stylo eos pupugerit, refanescunt, & cernendi uim postea plane recipiunt.  
 Indociles quidem sunt, sed intelligentiæ rationem quandam in effingēdo

Plinius lib. 8.

viii. calend.

Mart.

- D** constituendōque nido ostendunt hirundines: luto construunt, stramento  
 roborant. Si quando inopia est luti, madefactum multa aqua pennis pulve-  
 rem spargunt. Ipsum uero nidum plumis floccisq; consisternunt tepesa-  
 ciendis ouis: simul ne duros sit infantibus pullis. In enutrienda prole sum-  
 ma æquitate alternant cibum tam mas quā femina, obseruantes ne qui  
 pullus acceperit, bis accipiat. Notabili munditia egerūt parentēs extremē-  
 ta pullorum: adultiorēsque circumagi docent, & foras saturitatem emitte-  
 re. apibus iniuria hirundo est. Hirundo tam iuxta aquas uolitans ut penna  
 sæpe percutiat, imbrem prænuntiat. Dicuntur hirundines excluso pullo la-  
 pillum dare: itaque in uentre hirundinum pullis lapilli candido atque ru-

Alias, mado-  
facta.Lapis chelido-  
nium.



benti colore, qui chelidonij uocantur, magicis narrari artibus inueniuntur. E Hirundinum caro recens cōcerpta auxiliatur contra serpentes. Vua & fau-  
cium dolor anginaue mitigatur hirundinum cinere cum melle illito: sic & 3  
tonsillis succurritur & affectibus omnibus qui in gutture, aut columella,  
aut ore contigerint: nonnulli & ad uisus claritatem eo usi sunt. Anginis citif-  
sime succurritur cinere hirundinis ex aqua calida potu. Sed efficaciores ad  
omnia, quæ ex hirundinibus monstrantur, pulli syluestrium: figura nidorū  
eos deprehendit, multo tamen efficacissimi ripariarum pulli. Sunt multi  
qui cuiusunque hirundinis pullum edendum censent, ne toto anno me-  
tuatur id malum. Strangulatos cum sanguine comburunt in uase, & cinc- 4  
rem cum pane aut potu dant: quidam & mustelæ cineres pari modo admi-  
scent: sic & ad strumæ remedia. dant & comitialibus quotidie potu. In sale F  
quoque seruata hirundines ad anginam una drachma bibuntur: qui malo  
& nidus earum meredi dicitur potus. Hirundinis rostri cinerem cū myr-  
rha tritum, & in uino quod bibitur inspersum securos præstare à temulen-  
tia tradunt. Inuenit hæc Horus Assyriorum rex. Alterum genus hiru- 5  
dinum rusticarum & agrestium, quæ raro in domibus diuersos figura, sed  
eadem materia confingunt nidos, totos supinos, faucibus porrectis in an-  
gustum, utero capaci: mirum qua peritia occultandis habiles pullis, & sub-  
sternendis molles. In Ægypti Heracleotico ostio molem continuatione ni-  
dorum cuaganti Nilo inexpugnabilem opponunt, stadij fere unius spatio,  
quod humano opere perfici non posset. In eadem Ægypto iuxta oppidum G  
Copton insula est sacra Isidi, quam ne laceret amnis idem, muniant opere, in-  
cipientibus uernis diebus palea & stramēto, rostro firmantes, continua-  
tis per triduum noctibus, tanto labore, ut multas in opere emori constet:  
eaque militia in illis cum anno redit semper. Tercium est earum genus  
quæ ripas excauant, atque ita in terra scetificat: non faciunt hæc nidos. ri-  
pariam uocant Latini, drepanis à Græcis dicitur. rara auicula est, apparet æ-  
state tantum cum imber incessit: tunc enim & apparet & capitur. Riparia-  
rum pulli ad cinerem ambusti omnium hirundinum efficacissimæ morti-  
fero faucium morbo, multisque aliis morbis humani corporis medentur. 6

In genere item ripariarum est, cui nidus ex musco arido ita absoluta perfici-  
tur pila, ut inueniri non possit aditus. Sūt qui & argathilis in ripariarum  
genere numerent. Solerti porro ingenio argathilis suum instituit nidum: H  
intexit enim specie pilæ lineæ aditu arcto. Ut pennis præualere, sic pedibus 7  
degenerare uidentur hirundo, drepanis, & qui apodes dicuntur: hæc enim  
omnia & moribus, & uolatu, & specie proxima inter se conspiciuntur. Sunt  
uero apodes, quos aliqui cypsellos appellant, hirundinum adeo similes, ut  
haud facile discerni ab hirundine possint, nisi quod tibiis sunt hirsutis. Ni-  
dum specie cistellæ productæ longius longius hætæ ex luto, uno aditu dato  
arctissimo faciunt: idq; locis angustis intra saxa & specus, ut & beluas deui-  
tare possint & homines. Apparent apodes omnibus anni temporibus. Plu-  
rimum uolant quæ apodes uocantur, quia carent usu pedum. hæc sunt quæ  
toto mari cernuntur: nec unquam tam longo naues tamque continuo  
cur-

*Hirundo,  
Rustica.  
Agrestis.  
Syluestris.*

*Riparia.  
Drepanis,  
Falcula. Theo-  
dor.*

*Riparia altera  
Argathilis.*

*Apodes.  
Cypsellos.*

*Intra saxa u-  
na, infra. Plu-  
uium, Nidificat  
in scopulis.*



A cursu recedunt à terra, ut non circumuolent eas apodes. Cetera genera residunt & sistunt: his quies nisi in nido nulla: aut pendent, aut iacent. Tormina sanant apodes ex uino decocti.

1 Hirundo, Theocrit. *ἠδὲλ. 7, 6 ἡ ὀλελυγία τὰ λάλον πικρὰν βοτάνην φέρει καὶ ἀκί- ολελυγία.*  
*Δας.* Sunt qui putent ὀλελυγία apud Theocritum hirundinem significare. Interpres Theocriti, ex Aristotele (ut scribit) ὀλελυγία animal esse tradit, quod in locis nersatur palustribus: esse uero gemebundum, indeque ὀλελυγία dici, noctūque præcipue laborare. Hæc ille. Ego uero apud Aristotelem non memini legisse ὀλελυγία animalis genus esse: sed uocem quam edunt tanz masculz, cum ad coitum fœminas eicant: coire uero noctu maxime. Aratus, ubi imbrum signa describit, ita habet,

ἢ τελεῖν ὀρεῖται ἡμιόλιον ὀλελυγία. Vbi scholiastes, ὀλελυγία aus est turturis in mo-  
 tem in desertis locis syluestribusue uisitans: uel, ut alij: animal est palustre articulis  
 B membrisue minime distinctum: oblongum terreno uerim simile, sed gracilius. Hoc (in-  
 quit) non nouit Aristoteles. 2. Discedant, inquit Plinius, Africos secutæ montiū  
 recessus (uel ut quidam legere malunt) apricos montium recessus. 3. Pullorum ci-  
 nerem Asclepiades & Andromachus anginis illinunt: at Dioscorides tam matrum  
 quam pullorum cinere uritur. 4. Modum quo comburi debeant hirundinum pulli  
 docuit Asclepiades, uti ex eo refert Galenus. 5. Hæc non genera hirundinum dixit  
 Aristoteles, sed familia hirundinibus. 6. In genere, ita legendum censet Hermolaus  
 hunc locum apud Plinium, uescio quo pacto (ut scribit) ex Aristotele, Theodori for-  
 tasse uersionem secutus ex lib. 9. histor. animalium: alij legere malunt, In genere par-  
 tharum. 7. Specie pilæ lineæ: *ἄσπερ σπέρμα λίνου.* Plinius Ex lino intexens.

De coruino genere, scilicet coruū & cornix, & de monedula.

Cap. CXXXVIII.

C

1 Corui non tantum carne aluntur, sed & alio pabulo. Circaurbes præci-  
 pue uiuere solent: nec loca mutant aut latent, sed semper apparet. Cor-  
 uorum pennæ interdum à nigris in albas transeunt. Rostrum coruino ge-  
 neri robustum ac prædurum est. Ingluuiem non habet: coruus, sed eius ui-  
 ce gulam amplam & patentem: in coruis ipsi fœtaliis uentri, aliis intestino  
 hæret. Coruinum genus, coruus, inquam; cornix; monedula, coniugium  
 nunquam deserit, neque mas scilicet fœminam aut fœmina marem relin-  
 quit: minime quoque salax libidinosisue est; & raro coit. Generat cor-  
 uus ante solstitium: oua uero non modo bina, ut aliqui uolunt, parit, uerū  
 etiam plura, quaterna scilicet quināue. Incubat autē uiginti diebus, & pul-  
 D los cum iam potestas uolādi est, primum nido eiicit: deinde robustos iam  
 regione tota expellit fugatque longius. Itaque paruis in uicis locisque ar-  
 ctioribus, & ubi non satis cibi pluribus sit, non plus bina coniugia sunt.  
 Circa Cranonem quidem Thesalia singula perpetuo, authores sunt Calli-  
 machus & Theopompus. Genitores etenim abeunt ipsi, & compares ibi  
 relinquentes, soboli loco cedunt. Coruus tauro & alino aduersarius est:  
 quippe qui aduolans feriat, & eorum oculos lateret. Miluus cum coruo pu-  
 gnat: eripit enim miluus à coruo quicquid tenet. Coruus uulpi amicus est:  
 pugnat enim cum æsalone: unde sit ut huic, cum ab illo percutitur, auxilie-  
 2 tur. Aggrediuntur corui sexagenis diebus, sicut maxime antequam fici coquan-  
 tur autumno. Prædicunt corui singultu quodam latrantes seque concutē-

tes, si continuabunt, uentosissimi uero carptim uocem reforescent, uentosum E  
imbrem. Et ut Lucretius cecinit,

-Mutant cum tempestatibus unā  
Raucifonos cantus cornicum secla uetusta  
Coruorumque greges, ubi aquam dicuntur & imbres  
Poscere, & interdum uentos aurāque uocare.

Corui ouum in arceo uase permixtum illitumque derafo capite, nigritiam capillis affert: sed donec inarescat, oleum in ore habendum est, ne & dentes simul nigrescant: idque in umbra faciendum est, neque ante triduum abluendum. Alij sanguine & cerebro eius utuntur cum uino nigro: alij excoquant ipsum, & nocte concubia in plumbum uas condunt. Ouum corui grauidis cauendum constat, quoniam transgressus abortus asperos facit. F

*Cornix, κερξ*

Cornici natura omniuora est: nam & litora petunt cornices, & quæ unda eiecerit animalia aggrediuntur. Nucis duritiam rostro repugnantem uolantes in altum in laxa regulasue iaciunt iterum ac sapius, donec quassatā perfringere queant. circa urbes præcipue uiuere solent: neque latent unquam, sed omni tempore apparent. Ales est inauspicatæ garrulitatis, à quibusdā tamen laudata. Huic quoque deest ingluuius: sed eius loco gulam habet latam & patentem. Incessu ambulant cornices, id est pedetentim progrediuntur, neque currunt neque saliant. Cornicum fæminæ tantum incubant, asiduæque in opere perseverant: mares his cibum suggerunt, pascuntque incubantes. Pullos edunt imperfectos & cæcos, magnamque proli curam impendunt: quippe quæ sola in aduncorum genere etiam uolantes iam suos G pullos pascens ipsa comitetur. Longa cornici uita est: & ab autumnio corripitur morbo. Cornix cum noctua dissidet: cornix enim meridie oua surripit, noctua absomit, cum non clare interdum noctua uideat: noctua contra, oua cornicis noctu exediteque; altera interdum, altera noctu potentior. A cornice occiditur tympanus. Imbres prænuntiat cornix, cum scilicet contra aquam clangores dabit perfundens sese. Et ut ait Vergilius,

*Tympanum.*

Cum cornix plena pluuiam uocet improba uoce,  
Et sola in sicca secum spatiat arena,  
Et caput obiectat querulum uenientibus undis.

Et Cicero quoque,

*Fusca cornix.*

Fuscaque nonnunquam cursans per littora cornix  
Demersit caput, & fluctum ceruice recepit.

H

Cornicis carnes esse, & nidum illinere in longissimis morbis utilissimū putant: & in tertianis fiat potestas experiendi. Cornicis cerebrum coctum in cibo sumptum capitis doloribus remedio esse traditur. Monedula quoque deest ingluuius, sicuti & coruo & cornici, sed eius uice gulā habet amplam & patentem. Monedulam κελύς uocant: de cuius uenatione hæc narrat Clearchus: Vasculum si statuatur oleo plenum, aues ad uasculi margines accedentes, effigiemque suam in oleo conspiciat, sese immergunt: quo fit, ut pennæ earum ex oleo conerent, facile capiuntur. Monedularum tria sunt genera: unum quod coraciæ uocatur (latine graculum appellari putant), 3 magnitudine

*Monedula, κελύς.*

Sed uide ne apud Athenæum pro κελύς scribi debeat κελύς. κελύς, graculus.

A magnitudine quanta cornix, rostro rotundo & rutilo. In Lemno insula graculos ob id colunt, quod aduerso uolatu occurrant locustarum exitio. <sup>4</sup> Graculi sero à pabulis recedentes hyemem præfagiunt. Immensa in Insulbrum tractu examina sunt graculorum monedularumque, cui soli aui furacitas auri argentique præcipue mira est. Alterum monedularum genus lycos, <sup>Lycos,</sup> id est lupus cognominatum est: paruum est & scurra. Tertium genus pal- <sup>Lupus.</sup> mipes est, Lydiae ac Phrygiae terræ familiare. Monedula simili specie est a- <sup>Spermologos,</sup> uis, quam spermologon uocant, magnitudine tetraci æqualis, ut author est <sup>Fringilla.</sup> Alexander Myndius, ab eruendis seminibus spermologos & spermatolo- <sup>Spermatolo-</sup> gos uocatur. <sup>gos.</sup>

1 Apud Apuleium de deo Socratis, uulpes astute coruum laudat his uerbis, **B** Quantum ad decorem, pluma mollis, caput argutum, rostrum ualidum: iam ipse oculis perspicax, unguibus tenax: nam de colore quid dicam? Enimvero cum duo colores præstabiles forent, piceus & niucus, quibus inter se nox cum die differunt, utrumque colorem Apollo suis alitibus condonauit, candidum olori, nigrum coruo. 2 Apud Ouidium 2 Fastorum Phæbus coruo minatur:

At tibi cum lactens hærebit in arbore ficus,

De nullo gelidæ fonte bibantur aquæ. 3 Coracias, Idem fortasse pyr- <sup>Pyrhocorax.</sup> rhocorax Alpium peculiaris, luteo rostro niger, & præcipuo sapore. 4 Graculos aues esse minime solitarias, sed gregales apparet ex Varrone de re rustica lib. 3.

5 Monedula, ni fallor, de secunda illa specie <sup>ἡ πορματικὴ</sup> dicitur: cui & Ouidius immensum illum auri amorem tribuit:

Seytonis accepto quod auara poposcerat auro,

Mutata est in auem quæ nunc quoque diligit aurum,

**C** Nigra pedes, nigris uelata monedula pennis. <sup>κοινοὶς</sup> quoque pro hac secun- <sup>κελοῖς.</sup> da specie nonnunquam accipitur: ut apud Constantinum Cæsare de agricultura lib.

14 6 Spermologos. Aristophanis interpret, <sup>ἡ τὴν ἐρύττην τὰ ἀνθρώπων καὶ λατρίαν:</sup> ut uero Suidas, <sup>ἡ τὴν τὰ ἀνθρώπων ἀκλίαν.</sup> Et hanc Suidas auiculam esse dicit.

De pico martio, psittace, pica, & quibusdam id genus aliis.

Cap. CXXXIX.

**S**unt & parue aues uncorum unguium, ut picus martius cognomine: <sup>Picus Martij,</sup> cui & rostrum aduncum esse tradunt. Hic humi nunquam consistere pa- <sup>ἀρυνελά -</sup> titur: circum in capite habet. Tudit hic quercus uermium causa, & eorum <sup>πνε.</sup> 1 quos <sup>ἐκ τῆς</sup> uocamus: recipit enim egressos lingua sua, quam maiusculâ & <sup>Picus arborea -</sup> 2 latiusculam habet. Incedit per arbores uelociter omni quidē modo: sed & <sup>tiui.</sup> 3 supinus quoque more stellionum. unguis habet commodiores quàm mon- <sup>Arborum cau-</sup> edula ad tutiorem arborum reptationem: his enim affixis ascendit. Sunt <sup>nator.</sup> pici martij cognomine tria genera: unum minus quàm merula, cui rubidæ aliquid plumę inest: alterum maius quàm merula: tertium non multo mi- nus quàm gallina. nidulatur in arboribus: pullósque in cauis educant pici auium foli. Picorum aliquis (inquit Plinius) nidum suspendit in furculo pri- mis in ramis cyathi modo, ut nulla quadrupes possit accedere. Picus mar- tius pascitur formicis & iis qui in arboribus nascuntur uermibus: qui & perculsi corticis sono pabulum subesse intelligit: cū uermes uenatur, tum uehementer excauare dicitur. Iam uero mitescēs quidam, amigdalū quod rimæ inferuisset ligni, ita ut fixum constanter ictum reciperet, tertio ictu

pertudit, & nucleum edit. Et Trebius author est clauum uel cuneum ada-  
 ctum quanta ui libeat in arbores, in quibus nidum habeat, statim exilire  
 cum crepitu arboris, cum infederit clauo aut cuneo. Picus martius in Tarē-  
 tino agro negatur esse. pici martij rostrum secum habentes ab apibus, ue-  
 spis, crabronibꝫ sue non feriri traduntur. Vngues iyngi grandes, quæ simi  
 les ut monedulis (uel, ut Plinio placet, graculis) exeūt. Iynx paulo maior est  
 quàm fringilla, colore uario. digiti à calce iyngi bini, ut paucis quibusdam  
 auibus, eo quòd corpus eius minus quàm cæterarū propesum est in aduer-  
 sum. Linguam habet serpentibus similem: quippe quam in longitudinem  
 mensura quatuor digitorum porrigat, rursumque cōtrahat intra rostrum. 5  
 Collum etiā circūagit in auersum, reliquo quiescente corpore, modo ser-  
 pentum: uoce autem stridet. Psittace Indica auis (quam αἰθραπὶ λαῖος dicūt, 6  
 quasi humanam linguam referentē) quemadmodum aliæ aues unæ, collū F  
 habet breue & linguam latam, aptamque ad imitādum. Et loquacior cum  
 biberit uinum redditur. Viridis est toto corpore, torque tātum miniato in 7  
 ceruice distincta. Capiti eius duritia eadem quæ rostro: ut si quando ad dis-  
 scendum plaga sit admonendus psittacus, ferreo uerberetur radio: nec sen-  
 tit aliter ictus. Quæ accipit uerba pronuntiat: studētque ut quod homines,  
 loquatur. in syluis inconditam uocem, cuiusmodi indoctæ aues solēt, mit-  
 tit: non autem expressum os & explanatum habet. Dum pullus est, atque  
 adeo intra alterum suæ ætatis annum, quæ monstrata sunt & citius discit  
 & tenacius retinet: maior paulo segnior est & obliuiosus & indocilis. Cum  
 deuolat, rostro se excipit, illi innititur, leuiorēque se pedum infirmitati G  
 facit: cuius rostri tanta duritia est, inquit Solinus, ut cum è sublimi præci-  
 pitatur in saxum, nisu se oris recipiat, & quodam quasi præsidio utatur ex-  
 traordinariæ firmitatis. Inter nobiles & plebeos discretionem digitorum 8  
 facit numerus. Qui præstant, quinos in pede habent digitos, cæteri ternos,  
 inquit Solinus. Minor nobilitas, quia nō ex longinquo uenit, sed expressior  
 loquacitas certo generi picarum est. Adamant uerba quæ loquuntur: nec  
 discunt tantum, sed diligūt, meditantēsque intra semet cura atque cogita-  
 tione intentionem nō occultant. Nec uulgaris his forma, quanuis nō spe-  
 ctanda: fatis illis decoris in specie sermonis humani est. Verum addiscere  
 alias negant posse, quàm quæ ex genere earum sunt quæ glande uescantur:  
 & inter eas facilius, quibus quini sunt digiti in pedibus: ac ne eas quidem  
 primis duobus uitæ annis. Pica uoces plurimas cōmutat: singulis enim fere H  
 diebus diuersam emittit uocem. Picarū genera longa insignes cauda, uarię  
 appellātur: proprium his caluescere omnibus annis cum seritur rapa. Pica 9  
 nidum in arboribus facit, ex pilis & lana: parit oua circiter nouē numero,  
 picæ cum diligentius uisum ab homine nidum sensere, oua trāsferūt alio.  
 Glandes cum deficiunt colligit pica, & in repositorio abditas reueruat.

Iynx.  
 Torquilla.  
 Turbo.

Psittace.  
 Psittacus.  
 αἰθραπὶ λαῖος.  
 αἰθραπὶ λαῖος.  
 Sittace.  
 Αἰθραπὶ λαῖος.  
 αἰθραπὶ λαῖος.

Pica, αἰθραπὶ λαῖος.

Varia.

1 Ouidius 14 Metamorph. de pico in auem mutato. - Duro fera robora rostro  
 Figit & iratus longis dat uulnera ramis,  
 Purpureum chlamydis pennæ traxere colorem,  
 - Et fuluo ceruix præcingitur auro.

A 2 Linguam maiusculam, *μυγῶν*, fortasse longam. uetus interpres, quam habet longam & latam. 3 Supinus, Plinius, in subrectum, felium modo. 4 Theocriti interpres *lynga* cam auem uult intelligi, quæ *σασπυγῆς* dicitur: sed an recte hoc, an *ζῆλινος*, secus, considerat lector. Lynx sola, inquit Plinius, utrinque binos habet digitos. 5 Col- *Torquilla*. lum, Hinc torquilla uulgo appellata est, inquit Theodorus: quanquam turbo ab an- *Turbo*. tiquis. 6 Solinus & Pausanias, Sola India mittit pſittacum. 7 Torquetantum *Turbo*. miniato, Solinus, torque puniceo. 8 Hæc apud Plinium uidentur potius ad picas referri quàm ad pſittacos. Ouidius lib. 5 Metamorph. de Peronibus in picas mutatis, sic habet, - Nemorum conuitia picæ.

Nunc quoque in alitibus facundia prisca remansit,

Raucaque garrulitas, studiūque immane loquendi.

9 Rapa duas habet sationes: feritur enim & uere ante calendas Martias & Augusto, ex Plinio & Columella & Palladio: uidetur hic Plinius intelligere de secunda satione, quæ mense fit Augusto.

B De aliis quibusdam auibus, quæ uictus causa arbores & ligna feriunt contunduntque. Cap. CXL.

1 N On alio magis quàm uenatu uermiculorū circa arbores lignaue nascentium (*πρίπτος*, ἢ *σπίπτος* Græci uocant) pipra uiuit, tum maior tum minor: utranque *σφουκαλιά*, id est picum martium appellant. Similes inter se sunt, uocemque similem emittunt, sed maiorem, quæ maior est, pascitur utraque ad ligna aduolans. Pipra cum lutea dissidet: oua enim inuicem exedunt. Ardeolæ quoque inimica est: oua enim & pulli ardeolæ uiolantur à pipra. In iis est & auis quæ proprio nomine *κηπιόλος* dicitur: magnitudine parua, quanta est acanthilis. colore cinereus distinctus maculis, uoce parua: hic etiam lignipeta est. Et *καλὸς* (galgulum interpretantur) lignipeta mirum in modū est: magnāque ex parte ad ligna aduolans pascitur. cui magnitudo quanta turturi fere est: color luteus, uocem emittit magnā. Incola maxime Pelopōnesi auis hæc est. Crex cum galgulo pugnat: amici sunt galgulus & ledus: colit enim galgulus fruteta & nemora: ledus saxa & mōtes: suisque locis uterque contentus degit pacifice. De galgulis hæc refert Plinius. Galgulos quidem ipsos dependentes pedibus somnum capere confirmant, quia tutiores ita se sperant. galguli cum sætum eduxere hinc abeunt. Auis icterus uocatur à colore: quæ si spectetur, sanari id malum tradunt, & auem emori. Hanc puto latine uocari galgulum, inquit Plinius. Sitta quodque uiuit ligna contundens. mores huic pugnaces, sed minus hilaris, concinnus, cōpos uitæ familiaris. Rem maleficam ei tribuunt, quia rerū caller cognitione. prolem hæc numerosam facileque progignit. Cum aquila dissidet sitta, & oua eius frangit. Est & auicula quædā certhius nomine, cui domiciliū apud arbores, uictus ex uermiculis in ligno nascentibus, qui culicibus similes sunt (thripes uocantur): mores illi audaces, ingenium sagax, in uitæ officij uox clara. Quæ unguēs habent aduncos, quæque carne fere pascuntur, aut uermiculis atque id genus bestiolis in ligno nascentibus: eorūque causa arbores lignaue petunt, fere persecuti sumus.

1 Pipra, &c. Theodorus piponem uocat. 2 Ad ligna, *πρὸς τὰ ὕληα*, ad maceriem uertit Theodorus. Aristoteles, ni fallor, & arbores uiuentes intelligit, & succifas atque aridas: ut legi fortasse debeat, ad maceriem, 3 *κηπιόλος*, Theodorus culicilegam dicit.

xit. 4 Luteus, *χλωρός*: uetus interpres, citrinus: fortasse uiridans. 5 Cum galgulo, Hæc utraque sententia est mihi quidem suspecta: tum quodd in Græca Aristotelis li-  
 tera, quod Theodorus (cum galgulo) uertit, habetur *καλὴ*: in posteriore uero galgulus *καλὸς* bis dicitur: tum etiam quodd interpres Arabicus non idem habet utroque loco nomen: nam pro galgulo in priore sententia aut nihil habet, aut oreo: in posteriore uero seleoz. Item quem Theodorus ledum, Aristoteles *λεῶν* uocat. Postremo, quod Aristoteles dixit, *ὁ μὲν καλὸς πικρὸς ποταμὸν ὀνομαζομένην καὶ λόχμας*, Theodorus uertit, Colit enim galgulus frutera & nemora: quanquam & uetus interpres ante illum ita uertit, Feleoz uero manet prope fluuios, & loca in quibus sunt arbores. 6 Ligna cōtundens, *ὕλο πομῦζε*. 7 Rem maleficam, &c. *λίγη τοι φαρμακικὴ ἔσται*, quod ita reddidit uetus interpres, Et nigromantici utitur ipso, quoniam certificat in multis. 8 Viſtus ex uermiculis, &c. *ἐπιπικρῶς*: est & cerchnes, sed alia uidetur auis, quæ locustas deuorati: ex Aristophane in Auihus.

Auis.

Cerchnes.

*Λεῶν, λεῶνας*, id est quæ spinis uiſitant.

Cap. CXLI. P

Acanthis.

*Γοικαλὶς*,  
*Varia.*

*Ægithus.*  
*Salus.*

*Traupis.*  
*Carduelis.*  
*Carduelus.*

*Chrysometris.*  
*χρυσόμετρας.*  
*Auriminetis.*

*Acanthis.*  
*Lipurinum.*  
*Spinus.*  
*Lipurinus.*  
*Spinifus.*

*Passer.*  
*Πέδιος.*

Non ligna arborésue, sed spinas appetunt nonnulla auium genera, atque in spinis uiſitant aut dumetis: uermem autem aut quoduis animal aspernatur: ut acanthis, carduelis siue traupis, & chrysometris. dormiunt hæc, & pascuntur eodem loco. In his acanthidi à uepribus spinisque uiſtus: neque uermes nec ullum animal comedit. Viſtu & colore ignobilis est, sed ualet uocis amœnitate. Acanthis oua parit duodena, auis minima: hyeme ad loca nemoribus frequentia confugit. Acanthis & asinus inimici inter se sunt: asinus enim spinas tenellas adhuc pascit, à quibus acanthidi uiſtus est. Sunt qui *πικαλίδε* quoque hanc auem uocari arbitrantur. Est autē *πικαλὶς* (quasi uariam dixeris) auicula colore uario, & in dumetis uersatur: Quæ *πικαλὶς* dicuntur, cum alauidis dissident: oua enim inuicem exedūt. G  
 Ægithus auis minima cum asino dissidet, propterea quodd asinus spinetis sua ulcera scabendi causa atterat, nidōsq; ægithi dissipet: ob id igitur, si uel rudierit asinus, oua deiſciuntur, & pulli præ metu decidunt: itaq; ob eam iniuriam aduolans, ulcera eius rostro excuat. Ægithus uita cōmoditate & partus numero cōmēdatur, sed pede claudus est. Traupis spinis uiſtitat: uermem autem aut quoduis aliud animal aspernatur: hanc carduelem esse uolunt. Minime auium cardueles imperata faciunt: nec uoce tantum, sed pedibus & ore pto manibus. Chrysometris etiam in spinis uiſtitat, & uermem quoque & quoduis aliud animal aspernatur, nō aliter atque traupis. Et hæc quidem in spinis dumetisque maxime uiuunt: uermiculos uero aut bestiolas alias ne attingunt quidem.

H

1 Acanthis, & acanthilis, & lipurinum uocatur, spinum uertit Theodorus. Est uero *αἰνίς* apud Athenæum & Suidā auis genus: & *αἰνίς* apud Pollucem: uerū nondum constat an sit acanthis. Vergilius de acanthide,

Littorāq; halcyonem resonant, & acanthida dumi. 2 Oua deiſciuntur. Pli. Quod illa adeo pauet, ut uocem omnino rudentis audita, oua deiſciat, pulli ipsi metu cadāt.

De iis auiculis, quæ maxima ex parte uermiculis aliisque id genus animalculis uiuunt, *σκαλοκοφῆς* dicuntur. Cap. CXLII.

Passeres autem fere uermiculis aluntur: circa muros urbium uersatur passer: minor est quā alaуда. Eius pennæ ob temporis mutationem, (ut propter frigus) è nigris albidæ fiunt. Neque gulam neque ingluuiem amplam



- Aplam habet: sed uenterculus illi lōgior, qualis est auiculis fere omnibus. Fel in aliis uētri, aliis intestino iungitur. Passeres tum lauare tum puluerare solent: incedūt autem saliendo. Procliuis in uenerē auicula est & multipara: superfiliens coit, & cito perficit. Fœminæ maribus imbecilliores sunt, tum aliis corporis partibus, tum uero maxime ipso rostro. Sūt qui fœminas hoc in genere uiuaciores esse uolūt, quàm mares, (& id quidem ob marium sa-  
laciditatem:) capi enim has inter nouellos pullos, cognoscique laborum cal-  
lo asseuerant: mares uero anno diutius durare non posse arbitrantur, argu-  
mento, quod ueris initio nulli mentum, id est partes sub rostro proximas  
habere nigrum spectentur: sed postea, tanquam nullus anni superioris ser-  
uetur. Terpsicles author est, uenerem concitare passeres in cibo, uel oua eo-  
rum. Passerum cinis sarmentis crematorum cochlearibus duobus morbo  
resistit regio. Passeres *ἀνθρωπίνους* uocant nonnulli, alij *ὄρνιθες*. Apud muros *ἀνθρωπίνους*  
ueteres sepeſque uictum quatritat troglodytes, omnium auicularum mini-  
ma, præterquam illa quæ *βασιλίσκος* appellatur, id est regulus. In multis quo-  
que basilisco auiculæ similis est, nisi quod in fronte aureas non habet pen-  
nas troglodytes. Est uero troglodites basilisco reguloue paulo maior ma-  
gisque nigricans, tenui rostro, caudamque semper gerit subrectam, in aue-  
sa parte candicantibus maculis interpunctam. magis item garullus quàm  
basiliscus est, & apud alarum extrema cinerei magis coloris. breues item sa-  
cit uolatus. In hyeme frequens ubique apparet hoc auicularum genus. in ci-  
bo calculum renum comminuit, & assa & sale condita, si assidue edatur: &  
Cne alius progignatur calculus, efficit. Eadem præstat & combustæ auiculæ  
cinis eporus: uerum sale obruitur integra, auullis pennis: uritur autem unâ  
cum pennis. In iis quæ uermiculis uictitant tyrannus est, auis minima: ut  
cui corpus non multo grandius sit quàm locustæ. Cristani gestat rutilam,  
cætera elegans auicula est cantuque suaui. Vermiculos petit & spiza, frin-  
gillam uocant: fero magnitudine æqualis, orospiza non admodum dissi-  
milis, & magnitudine quoque. Spiza contrā quàm turtur, æstate tepidis lo-  
cis, hyeme frigidis degit. Orospecies (quasi montis fringillam dixeris) spiza  
similis, & magnitudine proxima: sed collo cæruleo, & in montibus degit.  
uermiculis maxima ex parte uiuit. Spizites, ægithali, id est pari species est.  
Sunt autem pari tria genera: horum maxima spizites, siue fringillago est,  
D quippe quæ fringillam æquet magnitudine: alter *ἰεθός*, id est monticola co-  
gnomine est, quoniam in montibus degat, cui cauda longior: tertius cæte-  
ra quidem similis illis, magnitudine discrepat: est enim corpore exiguo. Pa-  
rus, ut aiunt, plurima oua parit. Inferunt iniuriam apibus auiculæ, quas pa-  
ros uocant. uermibus fere uiuunt. Para cœnanthe græce dicitur, (ac si ui-  
tistoram dixeris.) statos latebræ dies habet, ex oriente syrio occultata, ab oc-  
casu eiusdem prodit: quod miremur, ipsis diebus utrunque. Melancoryph-  
us etiam uermibus pascitur, atricapillam uocant. Hanc plurima edere  
oua aliqui referunt post Africum struthionem. Iam uel decem & septem  
oua eius reperta sunt: sed plura etiam quàm uiginti parit, & numero impa-  
ri semper, ut narrât. Proprium huius & lusciniæ præter cæteras aues, ut lin-

*ἀνθρωπίνους*  
*τρωγλοδυτες*  
*Troglodytes*  
*βασιλίσκος*  
*Basiliscum*.

*Tyrannus*  
*Κρίστα, λίσκος*  
*Cantu suaui*  
*Ευρυδμος*  
*Spiza*  
*Fringilla*  
*Orospecies*  
*Montis frin-*  
*gilla*.

*Spizites*  
*Fringillago*  
*Parus*  
*Κίχλ, Παλος*  
*Ορνίθς*  
*Monticola*  
*Para cœnanthe*  
*Vitistora*  
*Melancoryph*  
*Atricapilla*.



*Melanoryphus.*  
*Ficedula.*  
*Σινγυλῖς.*

guæ summæ acumine carcant. Melanoryphi & ficedulæ uicibus commu-  
 tantur: sit enim ineunte autumno ficedulæ, (& hoc nomen non nisi autumno  
 habet,) ab autumno prorinus melanoryphus: nec inter eas discrimen ali-  
 quod, inquit Aristoteles, nisi coloris & uocis est. Ficedulæ, inquit Plinius,  
 formam simul & colorem mutant. Auem autem eandem esse constat, quia  
 dum immutaretur hoc genus, utriusque conspectum est nondum perfecte  
 mutatum, sed cum utriusque proprium quiddam inesset. *Σινγυλῖς* Alexander  
 Myndius in parorum, siue ægytholorum genere numerat, quæ à nonnullis  
*Ιλαυός*, ab aliis uero *Πινυός* appellatur: *σινγυλῖς* uero cū iam ficus maturuerint.  
 Epicharmus *ἑρπυλῖς σινγυλῖδας* in fieuum maturitate capi dixit. Luscinia, ut  
 modo diximus, præter cæteras aues hoc habet commune cum melanory-  
 pho, ut linguæ summæ caeumine careat. Mutat quoque & uocem & colo-  
 rem: canere nanque solet diebus ac noctibus quindecim sine intermissu  
 cantus, cum sylua fronde incipit opacare. Dein canit quidem, sed non as-  
 siduo: mox adulta ætate, uocem mittit diuersam, non insuper uariam aut  
 eelerem, modularámque, sed simplicem. Singulis quidem sunt cantus: &  
 non idem omnibus, sed suis euique. Certant inter sese, palámque animosa  
 contentio est: uicta morte finit sæpe uitam, spiritu prius deficiente quàm  
 cantu. Iam uero luscinia modulos suos pullos docere, uersúsque, quos imi-  
 tarentur, tradere uisa est. Audit tum discipula intentione magna, & reddit:  
 uicibusque retieent. Intelligitur emendatæ correctio, & in docente quæ-  
 dam reprehensio. Canunt in lusciniarum genere tam mas quàm fœmina:  
 cessat tamé fœmina à cantu, cum incubat pullósque educat. Colore etiam  
 immutatur luscinia: & quidem in terra Italia per id tēpus alio nomine ap-  
 pellatur. Apparet non diu: abdit enim sese & latet: & hyeme quidem non  
 cernitur, usque ad uernos dies. Parit ætate quinque aut sex oua cum pluri-  
 mum. Inuicem transeunt & phœnicurus & erithacus. Estque erithacus  
 hyeme, idem phœnicurus ætate: nec alio fere inter se differunt, nisi pecto-  
 ris colore & caudæ: uermiculis pascuntur erithacus & pyrrhulus. Chloris  
 à colore dicta pallido (*χλωρός*) inferioris suæ partis. magnitudine alaude est:  
 uermiculos petit: parit quatuor aut quinque. Nidum sibi ex symphyto her-  
 ba euulsa stirpitus facit: sed stragulum subiicit ex uillo & lana. In arbore ni-  
 dulatur, & in eius nido parit nonnunquam cuculus. uermes pascitur &  
 curuca. In huius nido cuculus parit: fouet illa, & excludit, & educat: quo  
 quidem præcipue tempore pinguis & grati saporis pullus cuculi est. Inter  
 eas aues quæ uermibus pascuntur numeratur & asilus, & batis. Et hæc qui-  
 dem uermiculis uictitant.

*Σινγυλῖς.*  
*Ἰλαυός.*  
*Πινυός.*  
*Λυσκινία.*  
*Κινυός.*  
*Philomela.*

*Luscinia uocis*  
*uarietatem ele-*  
*gantissime de-*  
*scripsit Plinius,*  
*Et ad uinum,*  
*ut aiunt.*

*Erithacus.*  
*Rubecula.*  
*Silvia.*  
*Phœnicurus,*  
*Φοινικῦρος.*  
*Χλωρίς.*  
*Luteola.*  
*Curuca.*  
*Ἐπιλαίς.*  
*Υπυλαίς.*  
*Asilus.*  
*Batis.*  
*Rubetra.*

*Χρῆσθους.*  
*Περὶ τῶν*  
*πτηνῶν.*  
*Περὶ τῶν*  
*πτηνῶν.*  
*Περὶ τῶν*  
*πτηνῶν.*  
*Regulus.*

1 Passeres, &c. *Χρῆσθους* nonnunquam pro struthocamelo accipitur, sed frequentius  
 ut sit generale ad omnes auiculas, sicuti & *Χρῆσθους*, qui passerces dicuntur, à Galeno, ni-  
 fallor, *πτερυγῖται χροσθῖται* uocantur, & *πτερυγῖται*. 2 *Βασιλῖς* est apud Aristotelem in-  
 ter eas quæ uermes pascuntur: an alia sit avis à *Βασιλῖσκῳ* Aëtij & Pauli cōsidera lector:  
 Theodorus regulum uocat: nerum de rege aue, quæ *Βασιλῖς* dicitur, infra in trochilo.  
 Colore, inquit Paulus Aegineta, inter cinereum & uiride: uel fortassis inter cinereum  
 & pallidum, ut legatur *χλωρός* pro *χλωρός*. 3 Cincree magis coloris, Num coloris ma-  
 gis uarij: *ἡρώδης*. 4 Quomodo & sale conditur & uritur, docet Aëtius. 5 Stru-  
 thionem,

6  
 7  
 8  
 F  
 G  
 9  
 H

A thionem, &c. τὸν δὲ λιβύην φρονέον: uetus interpres, passerem qui est in Libya dixit: & itē Albertus. 6 Ficcdula quoddam ficus edax, hoc nomē sortita est, ut inquit Varro: quod & Martialis testatur hoc disticho est,

Cum me ficus alar, cum pascar dulcibus uuis,

Cur potius nomen non dedit uua mihi?

7 Ἀμπυλὶς & ἄμπυλός, auis sunt nomina apud Pollucem: hæc ne sit auis an alia, Ἀμπυλὶς, nondum cōstat. 8 ἐλαός, &c. Vide ne sit Athenæi liber mēdosus hoc in loco. 9 Ῥυβικίλος, Pyrrhulas cadem uidetur, quæ phœnicutus: quanquam Theodorus rubicillam inter- Ῥυβικίλος, pretatur, cum phœnicurum rutilicillam uocet: si cui secus uideatur, non contendo. 10 Ῥυβικίλλος, Chlorens (quem Theodorus quandoque luteum quandoque luteam uocat) mea qui- χλωρός, dem sententia longe alia auis est, & maior quàm chloris: nam turtar & chlorens pu- Luteus, gnans, & occiditur à chlorco turtur. Adhæc chlorens & pipra dissidens: oua enim in- Lutea, uicem excedunt. Et coruus & chlorens pugnant, ut refert Plinius: nisi forte exemplaria hoc in loco sint mendosa. In hoc genere lutearum nonnulli uirconem marem esse opinantur.

De auibus, quæ circa aquam uiuunt: primò de uolacibus.

### Cap. CXLIII.

**V**ermiculis etiam uiuit anthus: nec iis solum, sed herbis quoque pasci- Anthus, tur. Colit hic paludes & amnes, & fidipes est: coloris pulchri & uictus Florus. facilis. Eius magnitudo quanta fringilla: odio equum habet: pellit enim e- quum à pabulo herbæ, quæ uestitur anthus. Nubeculan hic nec ualens acie- Nubeculan, oculorum est: uocem equi imitatur, & aduolans equum territat atque fu- ἰππὶς γαμῶν. gat: sed qui interdum excipitur, occiditurque ab equo. Vt hic equi uocem, ita auis est quæ boum mugitus imitetur in Arelatenſi agro, taurus appel- Taurus. lata, alioqui parua. Trochilus parua auis, rex auium in Italia uocatur: apud Trochilus, rex auium. aquas uiuunt. Crocodilis hiantibus trochili aues inuolantes depurgant dentes, & os ipsum totum: quo munere & ipsi aluntur, & crocodilus sen- tiens secum commode agi, nihil nocet: sed cum egredi auem uult, ceruices mouet ne comprimat. Sed uaria sunt trochilorum genera & nomina, nec cum iis omnibus scedere deuincitur amicitiamque colit crocodilus: sed cū solo nūcupato cladorincho societatem atque amicitiam seruat. Condensa Cladorinchus. loca incolit trochilus & foramina. capi difficile potest, & fugax est: uictus Condensa loca, probitate & solertia præditus. uocatur idem πτερόν & βασιλεύς, id est senator δόχμιος: Theodor. frutera. & rex: quapropter aquilam cum eo pugnare referunt. πτερόν priuatas con- πτερόν, se- tra noctuā inimicitias gerit. Elea inspectat paludes ab arundinibus. parator. Elea. D uo corpore est, sed uoce proba, & cum primis uitæ cōmoditate nota. Con- Elea. sidit ætate in umbra & aura, hyeme in sole & apricis. Genus halcyonum Velia. aquas adamat, lacus scilicet & fluuios: sed apud mare halcyon quoque uer Halcyone, satur, & à mari uictum petit. Duplex hoc genus est, alterum uocale, arun- Halcyon, dinibus insidens: alterum mutum, quod ampliore corpore est. Minores in Halcedo, arundinetis canūt. Halcedo paulo amplior est passer: colore tum cæruleo, κλαύων. tum uiridi, tum etiam leuiter purpureo insignis: uidelicet nō particularim colore ita distincta, sed ex indiscreto uarie refulgēs corpore toto, & alis, & collo. Rostrum subuitide est, longum & tenue: collo gracili, inquit Plinius, ac procero. talis species eius est. Nidus marinae similis pilæ, & iis quæ halo- sachnæ dicantur, præterquam colore, qui leuiter rufus est. figura proxima

cucurbitis medicinalibus, iis quibus collum porrectum est, magnitudo amplior quam maxima spongiarum. Inania quoque habet cauis spongiarum similia. Renitur ferramento acuto, ut uix possit discindi: sed si unâ & ferro tundis, & manu collidis, facile perinde ut flos maris aridus (halosachnem dico) confringitur. os eius per quàm angustum, quoad sit exiguus aditus, ut etiam si uertatur mare, influere nequeat. Ambigitur ex quanam materia componatur: uidetur tamen è spinis potius belones piscis constitui: piscibus enim halcedo uiuit, sed amnes etiam subit ascendens longius. Fertificat toto suæ ætatis tempore. parere nata menses quatuor incipit: partus huic maxime quinque ovis consumitur. Circa brumam parere solita est. dies earum partus qui maria quoque nauigant nouere: sternitur enim mare halcyonum fœtura, & inde nomen ii dies traxere, septem scilicet ante brumam, & septem à bruma: quamobrem quoties bruma serena existit, dies halcyonæ appellantur. Septem primis diebus nidum cōficere auem hanc fertur: reliquis septem parere educarēque. Dies halcyoneas fieri circa brumam non semper nostris locis contingit, ait Aristoteles: at in Siculo mari pene semper id euenit: ut uero Plinius, in reliquis partibus est quidem mitius pelagus: Siculum utique tractabile. Halcyonē uidere rarissimum est: fere enim circa uergiliarum occasum brumamque ipsam apparet: & ubi primum per portum non plus quàm nauem circunuolat, statim abit, ut nusquam præterea uideatur. Antigonus author est halcyonas cum senecurint cerylos uocari, quos tamē Aristoteles separare uidetur. Apud mare, inquit, halcedo uersatur & cerylus. Idem quoque Antigonus tradit cerylos à nonnullis mares halcyonas appellari: alii ceyx mas est & halcyone fœmina. ut elegantissimo carmine ostendit Ouidius de Ceyce & Halcyone coniugibus, quos fabulantur in huius generis autē mutatos:

Tandem superis miserantibus ambo

Alite mutantur: fatis obnoxii iisdem.

Tunc quoque mansit amor, nec coniugale solutum est

Fœdus in alitibus: cocunt fiuntque parentes:

Pœrque dies placidos hyberno tempore septem

Incubat halcyone pendentibus æquore nidis.

*Halcyonem.* Fit in mari halcyonem appellatum ex nidis (ut aliqui existimant) halcyonum & ceycum: alij è sordibus spumarum crasse fœtibus, alij è limo uel quadam maris lanugine. Quatuor eius genera, inquit Plinius, cinerum, spissum, odoris asperi: alterum molle, leuius, odore fere algæ: tertium candidioris uermiculi: quartum pumicosius spongiarumque putri simile, pene purpureum: quod optimum, id & Milesium uocatur: quo candidius autem, hoc minus probabile est. Ut uero Galenus tradidit, unum eorundem densum est & graue, fœtidum: olet enim pisces putridos, figura spongiæ simili: alterum figura oblongiore, rarum & leue, odorem refert marinis fucis simile: tertium uermis figura, colore purpurascens, substantia molli, Milesium id uocant: quartum æque atque secundum genus rarum leueque, succidæ lanæ simile: quintum postremo extima superficie leui, interna uero habet aspera: odore

*Dies halcyonides, Plinius.*

*Κέρυλος, Αερίτις, Cerylus, Ceyx.*

*Milesium.*

A dore quidem nullo, sed quòd gustu manifestam præferat acrimoniã. Hoc & omnium halcyoniorum calidissimum est: ut quod uel pilos exurere possit. Halcyonij genus omne discutit & abstergit, acri scilicet & calida uis: magis tamen minusue pro cuiusque generis acrimonia calorêque, & quòd aliud alio partes habeat tenuiores. Nam cum prima duo genera ad alphas, lichenas, leprãsque & pforas utiliter adhibeantur, & præterea splendidam reddant cutim, id nõ præstabit quod ultimo loco dictum est: quippe quod non summam tantum cutim exterit: sed abradit & exulcerat. Milesium omnium est tenuissimum: itaque ustum alopecij in edetur ex uino fuluo & tenui illitum. Vires habet minime omnium efficaces: quartum halcyonij genus, ut Galeno placet. Vfus, inquit Plinius, totis & sine oleo mire  
B lepras, lichenas, lentigenes tollunt cum lupino & sulphuris duobus obolis.

halcyoneo utuntur & ad oculorum cicatrices. Phœnicopterus avis est lacustris: circa lacus enim & paludes uicinat, uisu pulchra & colore decora purpureo. Phœnicopteri linguã præcipui saporis esse Apitius docuit, nepotum omnium altissimus gurgis. Auẽ hanc breui carmine depinxit Martialis:

Dat mihi penna rubens nomen: sed lingua gulosis

Nostra sapit: quid segarrula lingua foret?

11 Ad hæc lacus & fluuios petunt albicula, schœniclos, cinclus, & tringa,

12 quæ omnes caudã motitant: quin etiam calidris, cur cinereus color distinctus uarie. Schœniclos in iis minor est turdo: aquas adamat, & cauda illi motitat. alaude amica avis est. Cinclus minor itẽ est, quàm tringa: nõ apud

C lacus solum & fluuios, sed uitam etiam apud mare traducit. Astutus hic & capi difficilis est: sed captus maxime mitescit. Læsus hic est & prope mutulus: incontinens enim partẽ suã posteriore est: ideo suapte natura & per se, ut aiunt, nidum sibi construere non potest, sed in alieno parit. Hæc semper caudam motitat. Tringa inter minores has aues maxima est: turdo enim æquiparat. Hæc & circa aquas uiuit, & caudã motitat.

1 Elea, Theodorus (nisi culpa sit librariorum) hanc auem confudit cum gnaphalo. 2 Alterum genus eorum, inquit Plinius, magnitudine distinguit & cantu.

3 Pila figura, inquit Plinius, paulum eminenti, ore perquam angustò grãdiũ spongiarum similitudine. 4 Theodor. Magnitudo maximis amplior quam spongia.

5 Nidum ubi intertexere, in mare descunt: ubi fluitans ab intercurrentibus undis earum opus probatur: & partes quas aqua incidẽs ostendit non firmas esse, ita sarcunt, ut neque si percutiatur saxo rumpatur, neque fetto discindatur. Ita Ælianus. 6 Plinius, Putant ex spinis aculearibus cõstitui: piscibus enim uiuunt. 7 In latebras abit, Plinius.

8 Cerylos, Theodorus carulos dixit. 9 Numerantur ab Aristotele uir diuersæ aues halcyone & cerylus, cum differant tantum sexu, sicuti & melæcoryphus & ficcula pro diuersis numerantur in eodem capite: & crithacus, & phœnicurus: cū tamen non differant specie, sed affectione quadam. 10 Videtur phœnicopterus insigni esse magnitudine, ex Sneronio in Caligula. Hostiæ erant phœnicopteri, pauones, crithraones: non tamen inter maximas aues numerandus, sed iuter inter diocres magnitudine potius uidetur ex Cor. Celso. Iuuenalis in Satyr.

Et Scythicæ uolucres & phœnicopterus ingens. Heliodorus de rebus Æthiopicis lib. 6. Νῆλιδος φœνικος πτέρως dixit, id est phœnicopterum Niliacum. 11 Albicula apud Theodorum habetur, sed non in nostris exemplaribus Græcis. 12 Omnibus iis color cinereus, ut habet uetus interpretes.

*Larus, λάρος.*

**L**arus auis aquatica est, uorax admodum & gulosa: cui gula tota ampla & lata est. In petris maritimis nidificant lari. Oua bina ternæque pariunt ætate: nec unquam latent. Lari duplex genus, alter colore est cinereo: hic circa lacus & fluuios uiçitat: alter albus est, & à mari uiçtū quærît, ac proinde cum brentho & harpa dissidet larus: quandoquidem & hæc à mari uiçtum petunt. Eadem ob causam, quia scilicet uiçtus earum similis est, inimica harpæ & phoix est: cui peculiare præceteris est, ut oculos auiū deuorare potissimum appetat. Harpa quoque cum triorchæ accipitre dissidet: & eommunibus inimiciis harpa & miluus contra triorchin pugnant.

*Gauia.*

Gauia eadem quæ larus creditur. In petris, inquit Plinius, nidificant gauræ ætate, dissidet anates & gauræ. Auis peralba illa, inquit Apuleius, gauria, quæ super fluctus marinos natat, demergit sese propere ad oceani profundum gremium. Charadrius à mari uiçtum petit. degit plurimum in saxis & cauernis. Praua hæc auis & colore & uoce est: & noctu apparet, die aufugit. Morbo regio medetur, (ut affirmant quidam) si ab ægro uel conspiciatur duntaxat. Quocirca qui auem uendunt, abscondunt eam ne ab ægro prius uideatur, quàm eam uendiderint, ut author est Euphranius: alij non hoc uisum, sed in cibo efficere asseuerant. Cepphus (fulicam interpretantur) circa mare uiçtitat. Cepphi spuma capiuntur: appetunt enim eam auidius: quocirca spuma insperla eas uenari in usu est. Caro earum probi odoris est, excepta parte posteriore, quæ circa clunes est, quæ sola limum olet: sunt autem pingues. Cepphi, inquit Aratus, cum relicto mari gregatim in terram aduerso uento reuolant, uentum prænuntiant. Fulica, ut Plinius tradit, circum in capite pro apice gestat. Fulicæ maturino clagore tempestates prænuntiant: & ut carmine quoque ex Arato tradit Cicero, qui & fulicem eam uocat,

Cana fulix itidem fugiens ex gurgite ponti,  
Nuntiat horribiles clamans instare procellas,  
Haud modicos tremulo fundens ex guttore cantus.

Et Vergilius,

Iam sibi tum curuis male temperat unda carinis,  
Cum medio celeres reuolant ex æquore mergi,  
Clamorémque ferunt ad littora: cumque marinæ  
In sicco ludunt fulicæ.

*Æthya.*

Æthya circa mare uiçtitat, & in aqua degit. æthya cum frequentius in mare sese immergunt tempestates nauigantibus futuras præfagire ferunt: huius causam reddunt, quod tranquillo mari progredi non audet æthya marinarum beluarum metu: at cum tempestatem præsenferit, audacter progreditur, quod tunc temporis marinæ illæ beluæ in altum abierunt: uerum Auratus æthiæ, inquit, maria aut stagna fugientes pennasque in terra rostro purgantes uentum præfagiunt. Æthya saxis maritimis oua bina ternæque statim à bruma pariunt ineunte uere: nec ullo tempore latent. Æthya uentriculum

H

A uentriculum amplectuntur nonnulli, tanquam medicamentū, quod concoctioni conferat: uerum (ut inquit Galenus) neque ipse facile concoquitur, neque quicquam ad aliorum concoctionem iuuat. Iecur autem inueteratum exsiccatumque ex aqua mulsa binis cochleariis eporum, secundas ei eicere author est Dioscorides. Eandem esse æthyam cum *καρόνι θαλάσσιον*, id est cum cornice marina authores sunt Hesichius & Suidas. Et mergū quoque eandem esse auem nonnulli tradunt. Mergus, inquit Plinius, infatiabilis auis est, eo quod à uentre protinus recto intestino (minime inquam flexuoso) trāseunt cibi. Mergi in arboribus nidificant: pariunt oua plurimum terna, idq; incipiente uere: nec unquam latent. Inter aquaticas mergi soliti sunt deuorare quæ cætera reddunt. Mergi pennas rostro purgātes, uentū, maria quoque aut stagna fugientes, tempestatem præfagiunt: ut & Vergilius testatus est,

Iam sibi tum curuis male temperat unda carinis,  
Cum medio celeres reuolant ex æquore mergi,  
Clamorēque ferunt ad littora.

Vocem nonnunquam mutare mergum author est Lucretius:  
Accipitres atque ossifragæ mergique marinis  
Fluctibus in salso uictum uitāque petentes,  
Longe alias alio iaciunt in tempore uoces.

Mergi totam speciem, seseque immergendi frequentiam pulchre depinxit Ouidius in Æsaci in mergum mutatione:

C Utque nouas humeris assumpsit alas,  
Subuolat, atque iterum corpus super æquora mittit.  
Pluma leuat casus: furit Æsacus, inque profundum  
Pronus abit, lætisque uiam sine fine retentat.  
Fecit amor maciem: longa internodia crurum,  
Longa manet ceruix, caput est à corpore longe.  
Æquor amat, nomēque tenet, quia mergitur illo.

Cataracta mari uiscitat: & cum se in altum immerferit, manet nō minus temporis, quāam quo spatium transieris iugeri. Minor quāam accipiter auis hæc est: gula eius tota ampla & lata est.

D 1 Larus, *λάρος, εὐφρόνης περὶ σταγυρίων*, Athenæus. 2 *περόνις*, Theodorus anacē *εὐφρόνης* interpretatur. 3 Ex hoc Plinij loco forsitan Theodorus apud Aristotelem *βερώνις* anacē uertit. 4 Charadrius, Inter fluuiatiles uidetur Aristophanes hanc auem numerare in Auiibus: *οἱ χαράδριον ἢ τ' ἄλλα περὶ μὲν ὄρνικα*. 5 Cephphus, Theon Arati interpres, Auis & gracilis atq; macra admodū, uti carnis nihil habere uideatur, sed ossa solum & penas. 6 Quo pacto fulicæ spuma capiātur, ostendit Nicander in Alexiphar. 7 Limum oler. Quæ sola fœteret, ita reddit uerus interpres. 8 Æthyam, Arrianus in Pontici maris navigatione *καρόνιον θαλάσσιον* unā enumerat eum *αἰθίαν*, tanquam aues diuersas. Eadem forrasse apud illum est, quæ coruus marinus uocatur: de quo infra. Mergum etiam bungam à poetis uocari author est Phocion grammaticus. 9 Quibus animalibus intestina recta sunt, inquit Aristoteles, ea cibori uida sunt. 10 Mergi in arboribus nidificant, inquit Plinius. Qui mergum eandem esse cum æthya sentiunt, locū hunc Plinij aliter legant necesse est. Io. Claymondus ex coniectura ita legendum arbitrat, Gaviæ in petris nidificant: mergi etiam in arboribus



uerum codices omnes, quos equidē uiderim, in altera litera consentiunt. Et Maria E quoque aut stagna fugientes, & cætera. Neque hæc quidem æthyæ conuenire uidentur.

De elorio, crece, ortigometra & glottide.

Cap. CXLV.

ΕΛΕΙΟΣ.

Crex.

Crexibin magnitudine comparat Herod. uti infra uidebitur.

Ortygometa, ὀρτυγομήτης. Tardis incrementi, θυδαιλός.

Glottis.

Λωττίς.

Lingulata.

**E**Lorius auis est apud mare uictitans creci similis. celo tranquillo ad litus pascitur. Habet porro crex rostrum longum & acutum serratumque: crura item longa: & digitus pedis posterior, qui loco calcis geritur, minutus est. Crex pugnax est, & ingenio ualens ad uictum, sed cætera infelix. Cum gulgulo pugnat, & merula, & uireone: nocet enim his & corū pullis. Lacustribus auibus similis ortygometa est, quæ ex iis una est quæ duces se præbent coturnicibus hinc abeuntibus. Magnitudo illi turturis, crura longa, atis timida, tardique incrementi. Glottis etiam ex iis est quæ duces se præbent coturnicibus hinc commigrantibus: cui forma quoque similis est auibus lacustribus: hæc linguam exirit prælongam, unde illi nomen. Hanc in initio blandita peregrinatione auide profectam penitentia in uolatu, cum labore scilicet subit, reuerti in comitatum piget & sequi: nec unquam plus uno die peragit, in proximo hospitio deserit: uerum inuenitur alia, antecedente anno relicta: simili modo in singulos diēs.

De ardeolarum generibus, porphyrione & hamatopode.

Cap. CXLVI.

Ardea, Ardeola, ἰραδής. Ouidius de Ardea urbe in aenem murata.

**A**Fluuiis & lacubus uictum petit ardeola: cui, ut inquit Ouidius, Et sonus, & macies, & pallor, & omnia captam Quæ deceant urbem: nomen quoque mansit in illa Urbis.

Volat ardea protensis in auersum cruribus, quibus loco uropigij utitur ad uolatum dirigendum. Ardeolæ pipra inimica est: oua enim & pulli ardeolæ uiolantur à pipra. Aquila etiam cum ardeola pugnat: unguibus etenim ualens aquila aggreditur: hæc autem repugnando emoritur. Et hostes sunt forices & ardeolæ inuicem scetibus insidiantes. Rursus amici cornix & ardeola contra uulpium genus communibus inimiciis. Ardea in mediis arenis tristis hyemem prænuntiat: uel, ut Aratus prodit, herodius, cum ad mare magno cum clangore uolitat, imbres prænuntiat: sed cum præter consuetum morem relicto mari, terram etiam cum clangore petit, uentos. Ardeolarum tria sunt genera, pella, alba, asterias, id est stellaris. Pellæ coitus difficilis est: uociferatur enim mas, & sanguinem ex oculis (ut aiunt) emittit. parit etiam ægre fœmina, summoque cum dolore. Sagax & in uictu queritudo operosa est & cœnæ gerula. Agere interdum solet: colore tamē est prauo & aluo humida. Prælium cū iis inquit, à quibus læditur: hoc est cum aquila, à qua rapitur: cum uulpe, à qua noctu capitur: cum alauda, à qua oua eius diripiuntur. Reliquarum duarum, cādidā colore est pulchro, & coit, & nidulatur probe in arboribus. Pascitur in paludibus, lacu, campis & pratis: & hanc inter aues altero oculo carere tradunt. Sed asterias, quæ & ὄρνις, id est pigra cognominata est, (ut cognomē sonat) iners otiosaque est. Est & quæ λευκοπάρδις, id est albardeola uocatur, quæ magnitudine

Herodion fulicam nonnulli uocant.

Pella,

Pellos,

πῆλος.

Λευκὴ ἰραδής.

Candida, uel

alba ardeola.

Asterias,

stellaris.

ὄρνις,

ardeola pigra.

Albardeola,

λευκοπάρδις.

A dine minor est, rostro lato porrectoque. Ardeolæ rostrum in pelle asinina fronti adalligatum, somnum allicere aiunt. Putant & per se rostrum eiusdem effectus esse uino collutum. Et crura longa habet porphyrio, collumque longum & angustum: & uolat porrectis cruribus, ut ardea, cum uropygium ad uolatum incptum habeat. Auis est Lybica porphyrio, ut author est Alexander Myndius: uerum, uti Plinius refert, Balears insula porphyriorem mittunt: laudatissimi in Commagene. Gallinacei magnitudine est porphyrio, colore cœruleum imitante. Rostra porphyrii & prælonga crura rubent, pedibus fissis. Auium quibus longa sunt crura solus porphyrio morfu bibit. Cibum omnem aqua subinde tingit: deinde pede ad rostrum ueluti manu affert. Volatu porphyrio minime in sublime fertur: puluerationis insatiabili gaudio tenetur. in locis ubi columbæ se lauare solent labuatur: nec prius tamen se uel in puluerem dat uel in lauacrum, quam ambulando certa spatia confecerit. In magnificis splendidisque domibus porphyrio ludicra delectatio est: quarum intra claustra solutus errat. Porphyriorem qui cibi gratia in cœnis apposuerit hominem scio neminem, inquit Ælianus. Scribit Polemon porphyriorem, si in edibus nutriatur, mulieres anxie obseruare, sensumque adulterij habere: ac significare id patrifamilias in cuius domo alitur: & id quidem haud alio modo quam sese iugulando. Hematopus multo minor est quam porphyrio, quanquam eadem crurum altitudine: rostrum quoque illi & crura rubent. nascitur in Ægypto. insistit ternis digitis. Præcipue ei pabulum muscæ uita in Italia paucis diebus. Clitarchus in India scribit uolucrem nomine horionem nasci, magnitudine herodio æqualem, rubris cruribus, oculis cœruleis, sic musica instructum, ut naturæ munere tam suauiter canat, ut ipsas Sirenes lacefferet possit.

Porphyrio.  
Porphyrio.

Hematopus.

Horion.

1 Porphyrio, alia auis est apud Athenæum, & latiporphyra alia. 2 Cœruleum imitante, *καρφοίριος*: uel, ut habet Aristophanis interpretes, *καρφοίριος*, id est cœruleo, uel fusco, uel nigro. 3 Hematopus, aliàs himatopus.

Porphyrio,  
Latiporphyra,  
Himatopus

De grue, platea, ciconia, & ibide.

Cap. CXLVII.

GRUES ad paludes aduolant: & de ultimis, prope dixerim, in ultima: ex Scythicis enim cāpis ad paludes Ægypto superiores, unde Nilus profluit, ueniunt: quo in loco pugnare cum Pygmæis dicuntur. Immensus est tractus quod ueniunt, inquit Plinius, si quis reputet à mari Eoo. Rostrum habent grues longum. Balearicæ grues cirrum in capite gestant. Cocūt grues non confidente humi fœmina, sed stante: & quam celerissime rem peragunt: mas enim superfiliens, cito, ut passeret, perficit. Pariunt oua bina. In incessu ante se pedes iaciunt. In grandiorum alitum genere grues tantum mutant colorem, & in senectute nigrescunt. Grues etiā multa prudenter faciunt: loca enim longinqua petunt (ut dictum est) sui commodi gratia: & uolant statu secundo alte, ut procul perspicere possint: & si nubes tempestatis uiderint, conferunt se in terram, & humi quiescunt. Ideoque grues silentio per sublime uolantes, serenitatem: in mediterranea uero festinantes uentum

Grus, & Egri

Grues Balearicæ.

præſagire ſeruntur. Ducem etiam habent: & eos qui clament in extremo agmine diſpoſitos, ut uox percipi poſſit, quo gregem uoce cõtineant. Illud quoque animaduerſum, grues cum maria tranſmittunt, trianguli effidere formã: eius autẽ ſummo angulo aër ab iis aduerſus pellitur: deinde ſenſim ab utroque latere dilatante ſe cuneo, porrigitur agmẽ: quæ ſequũtur grues, in tergo præuolantium colla & capita reponunt: quod quia ipſe dux facere non poteſt, (quia non habet ubi nitatur) reuolat feſſus, ut ipſe quoque quieſcat: in eius locum ſuccedit ex iis quæ aſſequitur: eaque uiciſſitudo in omni curſu conſeruatur. Cum conſiſtunt, excubias habent nocturnis temporibus lapillum pede ſuſtinentes, qui laſſatis ſomno decidens, indiligentiam ſono coarguat: cæteræ dormiunt capite ſubter alam condito alternis pedibus inſiſtentes. dux erecto proſpicit collo, & quod ſenſerit uoce ſignificat. Eadem manſuefactæ laſciuũt, gyrosque quoldam indecoro curſu uel ſingulæ peragũt. Corn. Nêpos, qui diui Auguſti principatu obiit, cum ſcriberet turdos paulo ante cœptos ſaginari, addidit ciconias magis placere quàm grues: cum hæc nunc ales inter primas expetatur, illã uero nemo uelit tetigiſſe. Gruum caro, inquit Gãlenus, tota fibroſa durãque eſt: qua tamen uel ſci ſolemus poſtquã pluribus à morte diebus quaſi cõputruerit. In Balcaribus inſulis uipiones in menſarum honore ſunt: porro uipiones uocãt minores grues. Gromphænã auem in Sardinia narrãt grui ſimilẽ, ignotã iam etiam Sardis, ut exiſtimo. Plataleæ etiã migrant, & de Strymõne amne ad Iſtrum aduolant, prolemque ibi faciunt: roſtrum habet platalea magnũ. Hanc ſibi cibum querere aiunt aduolantem ad eas aues quæ ſe in mari mergũt: quæ cum emerſerint piſcemque ceperint, uſque eo premere earum capita mordicus, dum captum illæ amittant, atque ita capturam extorqueat. eadẽque hæc auis ſcribitur conchis ſe ſolere complere, easque cum ſtomachi calore concoxerit, euomere: atque ita hiantibus iam teſtis, eligere ex iis quæ ſunt eſculenta. Ciconiæ circa lacus & fluuios degunt: ſed quonam è loco ad nos ueniant, aut quò ſe referant incompertum adhuc eſt: è longinquo uenire non dubiũ eodem quo grues modo, illas hyemis, hæc æſtatis aduenas: hyeme nanq; latent ciconiæ. Abitura congregantur in loco certo: comitataque ſic ut nulla ſui generis relinquatur, niſi captiua & ſerua, ceu lege prædicta die recedunt. Nemo uidit agmẽ diſcedentium, cum diſceſſurum appareat: nec uenire, ſed ueniſſe cernimus: utrunque nocturnis ſit temporibus. Inceſſu pedes ante ſe iaciunt ut grues. Sunt qui ciconiis non ineſſe linguas confirmet: uerũ ſonum, quo crepitant, oris potius quàm uocis eſſe. ciconiæ nidos eoſdem repetunt. Eximia illis ineſt pietas: etenim quantum temporis impenderint ſcietibus educandis, tãtum & ipſæ à pullis ſuis inuicem aluntur: ita impenſe nidos fouet, ut incubitus aſſiduitate plumas exuant: & genitorum ſenectutem inuicem educare inuulgatũ eſt. Nocerẽ eis omnibus quidem locis nefas ducunt, ſed in Theſſalia maxime, ubi ſerpentum immanis copia eſt: quos dum eſcandi gratia infeſtantur, regionibus Theſſalicis plurimum mali detrahũt. Proinde honos iis in Theſſalia ſerpentum exitio tantum, ut capitale fuerit occidiſſe, eadem legibus pœna quæ in homicidam

*Vipiones.*  
*Gromphæna.*  
*Platalea.*  
*Πλατῆλαι.*  
*Plataea.*

*Ciconia.*  
*Pelargus.*  
*Πελαργός.*

A homicidam. Tráspadana Italia iuxta Alpes Lariú lacum appellat, ad quem ciconiæ non permancant. Contra uenenata omnia ciconiarum uétriculus ualet. Ciconiæ pullum qui ederit, negatur annis continuis lippiturus. Figura & magnitudine ciconiæ similis est ibis, auis māsuetiffima. graditur magna tarditate : nec eam ocyus quispiam ingredi uideat, quàm molli gradu & tardo. Inuocant & Ægyptij ibes suas contra serpentium aduentum: incunte nanque uere (ut aiunt) angues alati ex Arabia in Ægyptum frequentes aduolant, quos ibes interficiunt: eamque ob causam auem hanc colunt Ægyptij. Duplici genere distinguuntur ibes. Sunt enim aliæ candidæ, aliæ nigrae. Candidæ apud Pelusium tantum nō sunt, cum in reliqua tota Ægypto habeantur. Nigrae contra, apud Pelusium tantū, in cætera Ægypto nullæ. Extra Ægyptum non progrediuntur ibides. Incolis tum utiles sunt, tum

Ibis.

Aliæ candidæ.  
Strabo. aliæ,  
inquit, colore  
ciconia.

B inutiles molestæq; : utiles quidem, quod serpentes aliæque noxia animalcula, & omnia macellorum purgamenta deuorant: inutiles uero & molestæ, quod omnia deuorant, nec facile arceri possunt. Herodorus ita distinguit: Ibis quæ serpentes oppugnat, nigra tota uehementer est, cruribus gruinis: rostro adūco, eadem qua crex magnitudine. Alteri generi gracile caput ac totum collum, pennæ ubique candidæ præter caput ceruicemque atq; extremitas alas & nates, quæ partes nigrae sunt: cruribus atque rostro priori simile hoc genus est. Cinis ibidis sine pennis crematæ potus, tormina sanare traditur.

Rostro adūco;  
πύου τοῦ ἰβί-  
δου.

1 Platalæ, Aristoteles, οἱ δὲ πελαγῆες εἰς τοὺς περὶ τοὺς γινόμενοι. 2 Cum stomachi calore. Aristoteles, ἐν τῷ πρῶτῳ κεφαλῆς πρῶτον, hoc est: ubi sua ingluuie coxerit, uel ea parte quæ ante uentriculum proxima est. Plutarchus hæc tribuit herodio.

De aquaticis grauioribus, quæ omnes palmipedes sunt: de anserum generibus, de ore & onocrotalo. Cap. CXLVIII.

Palmipedum quæ grauiores sunt, circa lacus & amnes uersantur: huius generis anser præcipue rusticis gratus est: nam clausæ pascuntur in nesciotrophis & anates, querquedula, boscares, phalarides similisque uolucres, quæ stagna & paludes rimantur, sed maiore impensa: anser autem nō magni fructus, sed minimi oneris est. Anseri gula tota ampla & lata est: &

Palmipedes,  
παλαίπιδες.  
Anser, χήνη.  
Alias, boschides.

D appendices quasdam paucas habet infra quæ definit intestinum. Iecur fartibus in magnam amplitudinem crescit: exemptum quoque lacte mulso augetur. Anseres in aqua coeunt: à coitu sese aquis ingurgitant. Anseribus admittendis, ut Varro & Columella prodidere, tempus aptissimum est à bruma: atque ad pariendum & incubandum à calēdis Martij usque ad solstitium. Pariunt uere, inquit Plinius, aut si bruma coiungere, post solstitium quadagesimo die prope. Bis anno, si priorem sætum gallinæ excludant: alias plurima oia quindecim, paucissima septem. si quis surripiat, pariunt donec rumpantur. hæc Plinius. Singulæ, inquit Varro, non plus quater in anno pariunt: uel, ut Columella, singulæ ter anno pariunt, si prohibeantur sætus suos excludere. Pariunt autem singulis sætibus oua primo quina, sequenti quaterna, nouissimo terna. Fœminæ tantum incubant: pullis autem

Solstitium Columella sic ultima parte mensis Iunij.

formandis excludendisque triginta diebus opus est, cum sunt frigora: nam E  
 tepidis quinque & uiginti satis est. negatur anser aliena excludere oua, nisi  
 subiecta quoque sua habuerit. Supponuntur autem gallinis huius generis  
 oua, sicut pauonina, plurima quinque, paucissima tria: ipsis autem anseri-  
 bus incubanda subijci utilissimum nouem aut undecim: supponuntur au-  
 tem paucissima septem, plurima quindecim. Pullis anserum urtica cōtactu  
 mortifera: nec minus audivitas, nunc satietate nimia, nunc suamet ui: nam  
 si anserculus adhuc parum firmus & indigēs ciborū peruenit in pascuum,  
 fruticibus aut solidioribus herbis obluatur ita pertinaciter, ut collum ab-  
 rumpat. In legendo anserum grege obseruare solēt, ut mares sēmināque  
 quā amplissimi corporis, & albi coloris eligantur: quod plerūque pullos  
 similes sui faciūt. Nam est & aliud genus uarium, quod à sero mitigatum, F  
 domesticum factum est. Id neque æque sēcūdum est, nec tam pretiosum:  
 propter quod minime nutriendum præcipiunt. Hoc auium genus, candi-  
 dum præcipue, nutriendum: non quia magni sit fructus, ut dictum est, sed  
 quia minimi oneris: attamen præstat ex se pullos atq; plumam, quam nō,  
 ut in ouibus lanam, semel demetere, sed bis anno, uere & autumnō, uellere  
 licet: rursus enim plumigeri uestiuntur: molliorq; pluma, quæ corpori quā-  
 proxima: & è Germania laudatissima. Candidi ibi, uerū minores ganzæ  
 uocantur: est uero Aristoteli anser maior, est & minor, qui gregatilis est.  
 Anser solertiore custodiam præbet quā canis: nam clangore prodit in-  
 sidiantem. Anseres continuo clangore intempestiui hycem præfagiunt.  
 Anserum caro excremētosa est, concoctūque difficilis: atque domesticarū G  
 omnium auium calidissima, humidissimaq; & crassissima: ut eodem ordi-  
 ne apud ueteres habita sit cum struthocameli carne: alæ tamen nihil sunt  
 cæterarum auium alis deteriores: uentriculi suauitate etiam superāt. Iecur  
 quoque anseris in cibo gratum est, concoctioni facile opumique succi: &  
 qui abunde nutriat, si alimenta quæ anseri antea præbentur, lacte fuerint  
 imbuta. Testes anserum in cibo ad sobolem procreandam iuuare ferun-  
 tur: lingua uero singulari quadam proprietate stranguriæ prodest. Sanguis  
 anseris aduersus uenena in antidotis miscetur: maxime uero contra lepo-  
 res marinos ualet cum olei æqua portione. Item contra mala medicamēta  
 omnia asseruatur cum Lemnia rubrica & spinæ albæ succo, passillorū dra-  
 chmis quinq; qui in cyathis ternis aquæ bibātur. Anserinus adeps calidior H  
 est, & partium magis tenuium q̄ suillus: qua ratione corpora facilius pene-  
 trat, & eorum quæ intus & in corpore sunt, acrimoniam magis obtūdit.  
 Ex anserum adipe in Cōmagene Syriæ fit unguentum odore iucundo, pa-  
 riter & medicamētum celeberrimi usus, quod à gente dicitur Comma-  
 genum: utilissimum ad perfrictiones, conuulsionēs, cæcos ac subitos dolores,  
 omniāque quæ acopis curantur. Adeps anserū labris fissis prodest, si co-  
 perlinātur: aurium grauitatē dolorēque sedat instillatus: quidā adiciunt suc-  
 cum cepæ & allij pari modo. Si aqua in aurē intrauerit, præcipuū remediū  
 est anserinus adeps cum cepæ succo. Stercus anserinum (ut author est Gale-  
 nus) præ nimia acrimonia nullius est usus. Chenalopex circa lacus & amnes  
 uerfatur

*Ganzæ, aliās,  
ganzæ, ut Rhe-  
nanoplacet.*

*Cōmagenum.*

*Χλωδαομφ,  
Chenalopex,  
Vulpanser.*

Auerfatur. Est uero chenalopex corpore quàm anser minor, sed animi robore superior atque ad inuadendum audentior, ut qui se ab aquilæ, felis ac cæterorum hostiũ ininiuriis melius defendat. Pullos suos uehementer amat: eandemque operam, quam perduxit, in eis tuendis ponit: nam ante suos fœtus sese prouoluens, aucupi spem sui capiendi præbet: hi uero interea dum uenator illuditur, elabuntur: quibus fuga elapsis, is sese alis eleuans discedit: ac sæpe, ut pulli facilius euadant, capiendum se uenatoribus præbet. Parit  
 2 chenalopex nonnunquam oua hypenemia. Anserũ generis sunt chenalo-  
 3 peces, & quibus lautiores epulas nõ nouit Britânia, ceramides, fero anseres minores. Olor grauius habet corpus:

Nec se caloque louique

Olor.

Κύαξ, Ούς,

Κύαυς,

Κύαυς.

B

Credit, sed -

Stagna petit patulosque lacus: ignemque perosus,  
 Quæ colat elegit contraria flumina flammis.

- Collumque à pectore longe

Porrigitur, digitosque ligat iunctura rubentes:

Penna latus uelat: tenet os sine acumine rostrum.

Appêdices quasdam habet olor paruas infra apud intestinum. Oloribus ut alter alterum deuoret in more est maxime in uolucrum genere. Aquilam, si pugnam cœperit, repugnantes uincunt olores: ipsi autem nunquam nisi prouocati inferunt pugnam. Canere soliti sunt, & præcipue iamiam morituri. in mari Africo hoc sæpe sentiri ferunt. uolât etiam in pelagus longius.

C Præcipue faciem purgat atque erugat cyni adeps. Olorum similitudinem

4 onocrotali habent: nec distare existimarentur omnino, nisi faucibus ipsis inesset alterius uteri genus. huc omnia inexplebile animal congerit, mira ut sit capacitas: mox perfecta rapina, sensim inde in os reddita in uerâ aluum ruminantis modo defert. Gallia hos septentrionalis proxima Oceano mittit. Onocrotalorum duo produntur genera, alterum aquatile, alterum solitudinis. Diomedæas aues luba cataraëtas uocat: & eis esse dêtes oculos: que igneo colore, cætero candidas tradens:

Onocrotalus.

Si uolucrum quæ sit dubiorum forma requiris,

Vt non cygnorum, sic albis proxima cygnis.

Magna pedis digitos pars occupat: oraque cornu

Diomedæa

aues:

Cataraëta.

D

Indurata rigent, finemque in acumine ponunt. Hæc Ouidius.

Solinus uero, Formâ, inquit, illis quæ fulicis, color candidus, ignei oculi, ora dentata. Congreges uolitant: duo super iis duces, alter agmen ducit, alter cogit. Cum fœtum adest tempus, rostro scobes excauant: deinde furculis in uersum superpositos imitantur texta cratium, & sic cõtègunt subtercauata: hanc struem comprimunt terra quam egresserant, cum puteos excauarent: sic nidos moliuntur bifori accessu. Aditus qui dimittit ad pastus in ortum destinatur: qui excipit reuertẽtis, occasum uersus est: ut lux morantes excitet, & receptui non denegetur. Aluum exoneratur: aduersis flatibus subuolant, quibus proluuius longius auferatur. Aduenas barbaros clangore infestant: Græcis tantum adulantur, miro discrimine. Hæ in solo



loco totius orbis uisuntur in insula cōtra Apuliæ oram, quæ tumulo ac de- E  
lubro Diomedis insignis est.

Πλωλάφ.

Ceramides.  
Chenerotes.  
Truones.

1 Vnguētū, Huius cōpositionē uideas apud Pli. lib. 10, ca. 22, & 29, ca. 3. 2 Alij uero apud Plinium hoc pacto legi malūt. Anserum generis sunt penelopes, & quibus lauriores epulas non nouit Britannia, chenalopeces, fere anseres minores: uerum penelops (si Aristophanis scholiastæ credimus) anatī similis est, columbæ magnitudi-  
ne: uel, ut alijs placet, anate maior (nisi fortasse pro μεῖζω scribi debeat μεῖω.) Penc-  
lops, ut refert Aristoteles, circa lacus uersatur & amnes. 3 Ceramides, alij legūt  
chenerotes. 4 Onocrotalos Festus truones uocat. Onocrotali, ut quidam existi-  
mant, dicti sunt ab a sinio, quem in aqua faciunt, rudiru.

De anatino genere, & alijs quæ anatibus similes sunt. Cap. CXLIX.

Anas.  
Νῆσται, uel  
νῆται.

E Palmipedum grauiorum genere anates sunt, quæ & circa lacus & a- F  
cas habet infra quā definit intestinum. Anas mas, ut Alexander Myndius  
prodit, maior est femina, & colore magis uario. Anates solæ, quæque sunt  
eiusdem generis, in sublime protinus sese tollunt: atque cuestigio cælū pe-  
tunt, & hoc etiam ex aqua: itaque in foueas quibus feras uenamus delapsæ  
solæ euadunt. Veneno anates Ponticas uiuere autumant. anates pennas ro-  
stro purgantes uentum præfagiunt. Anatis caro durior est, quàm sit tur-  
dorum merularumue aut paruorum auium. Quod uero traditur in tormi-  
nibus mirum est: anate apposita uentri transire morbum, anatémq; emori.

Anates Pon-  
tica.

Anates Pon-  
tica.

Τλωκίον,  
Glaucium.  
Boscas.

Sanguis anatum Ponticarum aduersus omnia mala medicamenta pollet:  
itaque & spissatus seruatur, uinóque diluitur. Mithridatis inuentum autu-  
mant sanguinem anatum Ponticarum miscere antidotis, quoniam uene- G  
ci uocant ab oculorum colore. Anati quoque similis, sed minor est & bo-  
scas: circa lacus quoque & amnes uiçtitans. Mas in hoc genere magis ua-  
rius cernitur: habent & mares rostra sima atque minora. Inuenitur & bo-  
scadis genus quoddam anate maius, sed minus chenalopece. Quas ab u-  
rinandi uoluptate colymbidas & colymbos nominant. omnium aquatica-  
rum quæ palmipedes sunt, & in lacubus aut amnibus uiçtitant, minimæ  
sunt: attri ac sordidi coloris, acuto rostro. soli earum spectantur oculi, cæ- 4

Colymbis.  
Colymbus.  
Urinatrix.

Phascades.  
Vris, oueia.  
Phalaris,  
Phaleris.

Phascades paulo maiores sunt quàm colymbides: cæte-  
ro similes anatibus. Est & uria dicta, non multo minor anate: rostro lōgio- H  
re ac tenui, colore sordido figlino. Angustum & phalatis uocata rostrum  
obtinet: caput rotundius, uentrem subcinericio colore, dorsum nigricans: 6  
hæc & circa lacus & amnes uiçtum quærir. Phalarides in Seleusia Partho-  
rum, & in Asia laudatissimæ.

Boschides.

1 Anates, Νῆσαι πλωλάφαι dicuntur ab Aristophane, quasi cingulum candidū  
habentes, ut uult scholiastes. Νῆσαι ἀγρίαις uocauit Aratus aues marinas, quæ in  
insulis sunt. 2 Boschidas dixit Columella: sed uide an sint exemplaria uera. 3 Ma-  
gis uariis, κατὰ χροίος. 4 καὶ ποταμὶ καὶ ἐμμοτα, τὰ δὲ πολλὰ κατὰ δύναι, id est se-  
pissime merguntur, uel urinantur. 5 Longiore, μακροτέρη. 6 Sordido figlino,  
ὑποκρίνοντες. 7 In hoc lacustrium genere nominantur à Varrone & Columella,

Querquedula, querquedula.

De coruis

A De coruis aquatilibus. Cap. C L.

**C**Orui aquatici naturaliter caluent, quibus apud Græcos nomen est inde. Phalacrocoraces aues Balearium insularum peculiare, iam etiam in Alpibus capiuntur. Qui corax, id est coruus appellatus est, magnitudo illi est quanta ciconiæ, sed crura breviora: palmipes natansque, colore nigro. Insidet arboribus, & nidulatur in iis unus ex hoc genere. Et hæc quidem aues circa aquas uictum sibi quarunt.

*Corvus aquaticus.*  
*Phalacrocorax.*  
*Corvus marinus.*  
*Kiegl.*

1 Corax, καράξ, ὁ φάλαιος hæc est, ni fallor, apud Arrianum in ponti Euxini navigatione, & alia ab æthya: quanquam aliter uideatur Suidæ & Hesichio, uii supra in æthya.

*καράξ ὁ φάλαιος.*

De brinthe &amp; upupa.

Cap. C L I.

**B**Montes autem colunt & sylvas upupa & brinthus: cui & uictus probus, & uox sonora est. Upupa quoque montium incola est & sylvarum, coturnice paulo maior: & ut poeta de tyreo ait,

*Brinthus.*  
*Upupa.*

-Cui stant in uertice crista,

Prominet in modicum prælonga cuspide rostrum:

Nomen epops uolucris est, facies armata uidetur.

*Epops.*

1 Obscena pastu auis, crista uisenda plicatili, contrahens eam subrigensque per longitudinem capitis à rostro residentem. Eminent pennæ, inquit Paulianias, in galeæ modum. Upupa una in suo genere non nidificat: sed stipites arborum subiens, parit sine ullo stramento in cauis: & nidum potissime è stercore hominis facit. Trimestris auis upupa est: quippe quæ cum fortum eduxerit abit, &

Deserta quatit nemorum, &amp; inuias plagas,

ut Æschylus testatus est. Colore etiam immutatur tempore æstatis &amp; hyemis, ut idem author est,

Colore speciem multimodo pingit suam:

Nam uere candicans ubi exiit nouo,

Æstate tum deinde ut recanduit seges,

Alas repente uarias maculatus quatit.

Vagatur hic semper fastidians locos,

Deserta quatit nemorum &amp; inuias plagas.

**D**Indicam upupam Indorum rex amores deliciasque suas ob eius uenustatè circungestat. Upupæ cor in lateris doloribus laudatur.

1 Crista, &c. *τελὸς* dixit eā Aristophanes, quasi triplicè habentem in galea cristam, uti in scholiis habetur: forsitan ab insigni crista dictum est. 2 In suo genere, *ἡ καὶ ὁ γὰρ ποσειδώνων.* 3 Nidum hominis stercore luti loco circumliniit, inquit Ælianus.

De auibus partim peregrinis, partim monstrosis.

Cap. CLII.

**I**N Hercynio Germaniæ saltu inusitata genera alitum accepimus: quarum plumarum ignium modo luceant, quanuis densa uox obtegit & denset tenebras. unde homines loci illius plerunque noctu rationem uia moderantur indicio plumarum resurgentium. Authores sunt omnibus annis cater-

*Hercynia aues.*

# DE DIFFERENTIIS

*Memnonides*, uatim aduolare Ilium ex Æthiopia aues, & confligere ad Memnonis sepulchrum, quas ob id Mēnonidas aut memnonias uocant. Hoc idem quinto quoque anno facere eas in Æthiopia circa regiam Memnonis exploratum sibi Cremutius tradit. Aues hæc terrā Mariandineam incolere ferunt, colore nigras: corporis forma accipitris simili. Carne abstinēt: eis enim ad cibum semina satis sunt. Seleucides uocantur auiculæ, quæ iugiter locustas, quas *ἰσχυροὶ* uocant, edunt, easdēque celeriter excernunt. Harū aduentum ab Ioue precibus impetrāt Casij montis incolæ, fruges eorum locustis uastantibus. Nec unde ueniant, quōue abeant, compertum est: nusquā cōspectis, nisi cum præsidio earum indigetur. inexplabilem habent deuorandi naturā. Scythica terræ incola auis est otidis magnitudine, quæ binos pro-

*Seleucides aues.*

*Scythica auis.*

*Rhyntaces.*

*Scylla.*

*Phoenix, quāvis.*

creat pullos. & quæ pepererit oua, non incubitu fouet, sed condita in lepore aut uulpina pelle relinquit: atque ita obuoluta in summa arbore collocat: cumque à uenatione uacat, custodit: & si quis scandit, impugnat & uerberat alis, perinde ut aquilæ faciūt. Apud Perlas gignitur auicula rhyntaces nomine, in qua nihil inuenitur excrementi: sed interna omnia adipe plena: quo fit, ut eam acre atque rore solum nutrirī arbitrentur. Chloriten dicunt magi gemmam inueniri in scyllæ auis uentre, congenitam ei: ferroque includi iubent ad quædam prodigia moris sui. Æthiopes atque Indi discolorēs maxime & incenarrabiles ferunt aues: & ante omnes nobilem Arabiæ phœnicē: haud scio an fabulose unum in toto orbe, nec uisum magno opere. Manilius senator author est, neminem existere, qui uiderit uescētē. Nam ut tradit Ouidius:

-Nec fruge nec herbis,

Sed thuris lachrymis & succo uiuit amomi.

Aquilæ narratur magnitudine, capite honorato, cristis faciē caput plumbo apicē honestante: plumarum serie, medio exeunte alio: auri fulgore circa colla, cætera purpureus, cæruleam roseis caudam pennis distinguentibus,

Et Tyrio pinguntur crura ueneno.

Viuerē quadraginta & quingentis annis: uel ut aliis placet sexcentis LX: senescentem casia thurisq; furculis (uel ut tradunt alij, cinnamis) construere nidum, replere odoribus, & superemori. Ex ossibus deinde ac medullis nasci primo ceu uermiculum, inde fieri pullum prodit idem Manilius.

Fœmina sit uel masculus hæc, fortasseq; neutrum:

Felix quæ ueneris fœdera nulla colit.

Ipsa sibi proles suus est pater, & suus hæres:

Nutrix ipsē sui, semper alumna sibi.

Hæc atque alia de phœnice Lactantius. In Arabia quoque cinnamomus aut cinnamulus auis appellatur, quam furculos cinnamomi portare, ac nidum ex his conficere aiunt. Nidificant excelsis arboribus & ramis: ad quos quoniam non est peruenire ob ramorum altitudinem & fragilitatem, accolæ congeries illas plumbatis petunt iaculis: deiectasque pretiis uendunt amplioribus: quod hoc cinnamum magis quàm aliud mercatores probēt. Aues dacnades nuncupatas Ægyptij ad potentium coronas alligare soliti sunt, ut uellicando & assidue cantitando potantē à dormiendo sustinēt.

*Cinnamomus. Cinnamulus. Cinnamoleus.*

*Dacnades.*

In maris

- A** In maris Casprij insulis auem quādam nasci ferunt, quæ magnitudine anserem superet: pedes autem habeat grui per similes: dorso sit uehementer rubro, uentre uiridi, collo albo & disseminatis maculis croceis distincto: non minus quàm duo cubita longo, rostro nigro. uocem similem ranis mittit. Auis etiā Caspia est, uel potius Indica: (nam in India etiam nascitur) anseris magnitudine: & lato quidem, sed tenui capite, cruribus paruis. uario colore distinguitur: nam eius dorsum purpureum est, uenter maxime coccineus est: caput & cutis exalbescunt: uocem caprinam mittit. Apud Caspios etiam fama est auē procreari magnitudine maximi gallinacci, uersicolore uarietate florentem: supināque uolare, & sub collum extensis cruribus ipsum iisdē subleuare, tū catellī uocē edere: neque in sublime, sed circū terram idcirco uolare, quod in altum non queat sese attollere. *Catreus.*
- B** ram idcirco uolare, quod in altum non queat sese attollere. *Catreus.* eximia formæ pulchritudine auem Clitarchus prædicat, pauonis magnitudine: cuius pennarum extremitates smaragdi similitudinem gerunt. Quæ si alios intueretur, eius oculi quo sint colore nescias: sin te aspiciat, purpureos dices. Quod in aliorum oculis album, illius pallidum est. peracuto uidendi sensu prædita est. capitis plumæ partim candidulis ocellis, partim guttis quibusdam aliis in alias implicatis distinctæ sunt. Eius pedes sandaracini: & uox canora. eam in deliciis maxime omnium auium Indi habent, ut quī aspectu illius impleri non possint. ex oculis facula splendet, ut lucidissimæ flammulæ similis sit. gregatim uolant, ut nubes esse uideantur. Auis in India nasci fertur: magnitudine triplo maior otide, ore permagno & longis cruribus: eam absonum quiddam sonare: summāsque eius alas pallidas: cæteras uero pennas cinericias esse: Indi celā uocant. In India auis ad sturni magnitudinem accedens, uariis coloribus picta nascitur, quæ & humanā uocem effingit, & psittacis uocalior, & maiore est docilitate. Nō tamē humanum uictum æquo animo sustinet: sed libertatis desiderio famem potius quàm seruitutem amplectitur: cercionem appellant, quod similiter caudā atque cinclus mouet. *Cercio.* Paruularum quarundam auium Indicarum genus in excelsis rupibus nidificat: quarum magnitudo perdici, sandaracino colore: Indi sua lingua dicerum solent nominare: Græci, ut fertur, dicæum. *Dicerum.* *Dicæum.* Huius stercus si quis milij magnitudine sumpserit in potionem dissolutum, ad uesperam morietur: mors suauis somno similis est, & nullum omnino sensum doloris habet. *D.* Quamobrem summopere Indi id assequi studēt: ipsum etenim malorum obliuionem existimant inducere. Quod quidem ex India muneri missum rex Persarum omnibus rebus antefert & asseruat, infanabiliū malorum remedium, si sumere sit necesse: neq; apud Persas quīquam alius quàm rex id habet. Peregrina auis & gnaphalus esse uidetur, *Gnaphalus.* quippe quæ raro in nostris locis appareat, inquit Aristoteles. Gnaphalus uoce proba est, & colore pulchro: nec non ingenio ualet in uitæ officiis, & speciem præ se fert decoram. Incēdiaria inauspicata est: propter quam se penumero lustratam Urbem in annalibus inuenimus (inquit Plinius): quæ sit auis ea, nec reperitur nec traditur. quidā ita interpretantur incēdiariam, quæcūque apparuerit carbonē ferēs ex aris uel altaribus: alij spinturnicem *Spinturnix.*

eam uocant. Sed hæc ipsa, inquit Plinius, quæ esset inter aues, qui se scire diceret non inueni. uerum Festus spinturnix, ait, auis genus est turpis figuræ, occurratrix: unde artificum perditis. Spinturnix ea græce dicitur, ut ait Sanctus *ambrosius*. Cliuinam quoque auem ab antiquis nominatam animaduerto ignorari: quidam clamatoriam dicunt: Labeo prohibitoriam. Et apud Nigidium subis appellatur auis, quæ aquilarum oua frangat. Tragopanadem uel tragopana plures affirmant maiorem aquila, cornua in temporibus curuata habentem, ferruginei coloris, tantum capite phœniceo. Equidem & hanc auem, inquit Plinius, & pegafos (quos Æthiopia generare dicitur) equino capite uolucres, cornibus armatos: & griphas auritos aduncitate rostri, fabulosos reor. Porro griphas sunt qui tradunt quadrupedes uolucres esse, corpore & unguibus leoninis: ore & alis aquilinis, sed candidis: oculis igneis, & capite cuiusmodi pictores fingunt, alites ferocissimas. Maculas quasdam griphibus inesse, quidam aiunt, quales pardalibus. In Asiatica Scythia aurum effodere, & cum his assidue bellum esse Arimaspi circa metallâ. Circa Stymphalidas aquas, aues anthropophagos fuisse aiunt: quas Hercules sagittis confecit: uerum Pisander Camireus Hercule minime aues interfecisse, sed crotalorum strepitu abegisse tradit. Arabiæ terræ deserta loca, & alia fert ferarum genera, & aues quoque stymphalidas cognominatas, leonibus ac pantheris in homines haud minus atroces: inuolant enim in eos, dum illas aucupantur: rostrisque feriunt, atque adeo interficiunt, & quæcunque ex ære aut ferro gestant homines, ea perforant aues: sin uero ex cortice ueste cõtuerint crassiorē, nō aliter stymphalidum rostra corticibus, quā minorum auium pennæ uisco inhærēt. Sunt autē stymphalides gruum magnitudine, ibis specie, sed rostra habēt ualidiora, nec adunca more ibis. cirrū in capite gestant. Aues istæ Arabiæ Arcadicis cognomines, an eiusdē fuerint generis, nihil affirmo (inquit Pausanias): alioqui fieri quidē potest, ut cum natæ primū in Arabia fuerint, earū pars aliqua in Arcadiā ad Stymphalim fluuium uolauerit: indeque nomē stymphalidū ortum, cum aliud tamen nomē forsitan apud Arabas sortitæ sint. Esse in maledictis antiquis strigem conuenit, sed quæ sit auium constare uon arbitror. Has ita depinxit Ouidius:

Grande caput, stantes oculi, rostra apta rapinis,  
Canicis pennis, unguibus hamus inest.  
Nocte uolant, puerosque petunt nutricis egentes,  
Et uitiant cunjs corpora rapta suis.  
Carpere dicuntur lætentia uiscera rostris:  
Et plenum potō sanguine guttur habent.  
Est illis strigibus nomen: sed nominis huius  
Causa, quod horrenda stridere nocte solent.

Fabulosum autem arbitror, inquit Plinius, de strygybus eas infantium labris immulgere. Nec Sirenes impetrauerint fidem, licet affirmet Dino Clitarchi celebrati authoris pater in India esse: mulcerisque earum cantu, quos grauatos somno lacerent. De his ita cecinit Ouidius,

-Vobis Acheloides undæ,

Pluma

*Cliuina auis.*

*Clamatoria.*

*Prohibitoria.*

*Subis, uel*

*Subin.*

*Tragopanades*

*Tragopan.*

*Pegafus.*

*Griphas.*

*Strix.*

*Stymphalides.*

*Strix, stryges.*

*Sirenes.*

- A** Pluma pedéſque auium, cum uirginis ora geratis. Deinde,  
Ne tamen ille canor mulcendas natus ad aures,  
Tantáque dos oris linguæ deperderet uſum,  
Virginei uultus, & uox humana remanſit.

**1** Otidis magnitudine. Hoc in loco uetus Ariſtotelis interpres habet, Non minor aquila: ut legiſſe uideatur apud Ariſtotelem, *οἰδὶς ὡς τῆς ἀνθρώπου*: nō *αἰ ὅλως*, ut legit Theodorus, & ante illum Plinius. Et mihi certe quadrare magis uidetur Ariſtotelis contextui, ut legatur *αἰνῶς*, quàm *αἰ ὅλως*: nō propter phraſin ſolū, ſed quòd antea uerba plura fecerat Ariſtoteles *ὡς τῆς ἀνθρώπου*: uerum nihil muto. **2** Quando & ubi uiſus eſſe traditur phœnix oſtēdunt Solinus & Plinius: ſed quæ falſa eſſe nemo dubitat, inquit Plinius. De phœnice lege Herodotū, Ouidiū in Metamorph, Claudia-num & Laſtantium. **3** Solinus, Capite honorato, in conum plumis extantibus, criſtatis faucibus. **4** Solinus, Poſtera parte purpurēs abſque cauda, in qua roſeis pen-nis cœruleus interſcribitur nitor. **5** Gnaphalus, &c. Hæc omnia refert Theodorus ad ueliam auem, ex Græco exemplari (ut opinor) mendoſo: nam & in noſtris exem-plaribus & ueteri traditione tanquam diuerſe ponuntur aues. **6** Solinus, Cor-nibus arietinis proferens armatū caput. **7** Hæc ales, inquit Solinus, pegafi ſcilicet, equinum nihil præter aures habet. **8** Griphas priſcis Latinis picos appellatoſ tra-didit Nonius, ut Plaut. in Aulul. *Pici diuites*, qui aureos montes colunt: eos ſolus ſu-pero. **9** Strigem, &c. Hæc ſyrnia græce nuncupatur: uide Hermolaum in ſtriaz, uo-cabulū explanatione poſt annotationes Plinianas.

*Pici.  
Syrnia.*

## De ſtruthiocamelo.

## Cap. CLIII.

**S**truthio Africus, quem & ſtruthiocamelum uocant, animal eſt naturæ duplicis: partim enim auem, partim quadrupedem refert: quippe qui ut non quadrupes pennas habeat, ut non auis, neque ſublimes uolet, nec pen-nas ad uolandum commodas gerat, ſed pilis ſimiles. Item quaſi quadrupes ſit, pilos habet in palpebra ſuperiore: & glaber capite & patre colli ſuperio-re eſt: itaque cilia habet utrinque piloſiora: ſed quaſi auis ſit, infra pennis tegitur. Bipes etiam tanquam auis, biſulcus tanquam quadrupes eſt: ut ue-ro alij, in capite pilis minutis, oculis groſſioribus nigriſque, nō diſſimili for-ma & colore camelis: collo oblongo, roſtroque acuto. Magnitudine non a-uis, ſed ceruorum eſt. Africi autem uel Æthiopici ſtruthiocameli altitudi-nem equitis inſidentis equo excedunt, celeritatem uincūt: ad hoc demum datis pennis, ut currentem adiuuent. Vngulæ uero ceruis ſimiles, biſulcæ, comprehendendis lapidibus utiles, quos in fuga contra ſequentes ingerūt pedibus. Oua pariunt complura, quæ propter amplitudinem pro quibuſ-dam habentur uafiſ: conoſque bellicos & galeas eorum pennis adornant. Concoquendi ſine delectu deuorata, mira natura: ſed non minus ſtolidi-tas in tanta reliqui corporis altitudine: cum colla frutice occultauerint, la-tere ſeſe exiſtimantium. Struthocameli caro, ut & reliquæ partes omnes, excrementoſa eſt concoctūque difficilior. Venterculus nonnullis in pretio habetur, & loco medicamenti quod concoctionem adiuuet: qui tamē ipſe non facile concoquitur, tantum abeſt ut aliorum ciborū concoctioni con-ferat. Seuum ſtruthocamelinū efficacioris ad omnia uſus, quàm eſt adeps anferis. Animalium eorum quæ inter ſanguine prædita, terreſtria appella-uimus, eo ſcilicet quòd aërem recipiant, partuſque faciant in terta, indica-tæ iam differentiæ ſunt. Hinc natura aquatiliū dicitur.

*Struthiocamelus.  
Struthiocamelus.  
Struthio Africus.  
xps. d. s. o. Av-  
cud. s.  
xps. d. s. s.  
Struthio.  
Struthion.*

*De ſtruthiū  
nensatione lege  
Strabonē lib.  
16, & Oppia-  
num de nena-  
tio. lib. 3.*



# DE ANIMALIVM DIF- E FERENTIIS LIBER VIII

Continet ea quæ in sanguineo genere aquatilia dicuntur: quæ scilicet in aqua uiſitant, & in aqua quoque pariunt, uidelicet piſcium & cæterorum genera.

De piſcibus, & primo de eorum partibus exterioribus.

Cap. CLIII.

*Piſcis, 12818.*



Nter ea quæ aquas incolunt, piſcium genus unum eſt ab aliis diſtinctum: quod & forma F euariat numeroſiore. Habet id caput & pro- na & ſupina ea parte qua uenter & uiſcera cõ- tinentur. Caudam cõtinuam indiuiſamque fere parte gerit poſteriore, ſed uarie. Mutila- tius autem eſt piſcium genus atque imperfe- ctius quàm auium, partibus exterioribus: pi- ſcium etenim nulli ceruix, nulli manus aut pedes: ſed nec alas habet, ſed pinnulas quaſ- dam: nulli teſtes aut intus aut foris, nulli mammæ. neque meatum genita- lium ullum habet piſcium genus foris conſpicuum, ſed continuo ac ſimpli- ci corpore à capite in caudâ uſque porrigitur. Capita piſcibus proportionem G corporum maxima: oculi omnibus ſine palpebris: uerum non duri, ſed lu- bri. Auditus uero olfactuſue nullum continent membrum manifeſtum: quod enim uideri tale poteſt per loca narium, id non ad cerebrum uſque tranſmeat: ſed partim obſeptum & cæcum mox deſinit, partim ad bran- chias fertur: audire tamen atque olfacere piſces palam eſt. Sunt autem qui uel maxime animalium piſces auditu ualere arbitrentur: uidelicet hominũ experimento, qui aſſidue in mari uerſentur, rêmque piſcatoriam percallêt. Sunt etiam qui liquidius inter piſces audire prodantur, ut lupus, mugil, ſal- pa & alij quidam: cætera piſcium genera minus audiunt. Sunt in piſcium genere oris diſcrimina: aliis enim os ante & promptum eſt: aliis infra parte ſupina, ut cartilaginei generis maximæ parti: quamobrem hoc genus niſi H conuerſum reſupinetur, cibum corripere nequit. Adhæc differetia exiſtit, quod aliis os reſciſſum eſt, ut iis quæ carne uſcuntur: iis enim uires ore cõ- tinentur: aliis ſubinde eſt in arctius compreſſum & coarctatum, iis ſcilicet qui non carne uſcuntur. Dentes habent omnia piſcium genera ſerratos peſtinatimque coeuntes, excepto ſcaro, & acutos: atque ſerie dentium multiplici fulciuntur. Piſcibus etiam data quidem eſt lingua, ſed imperfe- cta incertaque, ac minime explanata: oſſea enim nec fere abſoluta eſt, ſed adhæret, extrema eius parte tantummodo diſcreta. In lingua etiam dentes nonnullis & in palato & toto ore: ut turba uulnere molant, quæ attritu ſubigere non queunt: præterea in os uergentes, ne excidant cibi, nullũ ha- bent-

*Huius rei ar- gumentum ui- deo apud Ari- ſtolelem lib. 4. hiſtor. animal.*

- A bentibus retinendi adminiculum. Palatum etiam quibusdam adeo carnosum est & molle, ut si parum diligenter aduertas, lingua id esse uideatur, ut cyprino. Piscibus nullum omnino collum esse dixeris, aut breue admodum ex duabus solum primis uertebreis compositum. Branchias autem pisces *ῥέτιλα* habent peculiarem, quibus humorem, quem ore acceperint, reddūt: atque etiam pinnas, quas magna ex parte quaternas gerunt, binas scilicet parte prona, & binas supina. Et hæ quidem in piscibus similiter quodammodo habentur, atque alæ & crura in auibus: his enim alæ duæ superne dependent: illis pinnulæ duæ parte prona: his pedes resupinæ parti subduntur, illis pinnulæ infra adhærent fere iuxta pronam partem. Binas illas quæ parte prona lateribus geruntur, omnes fere habent: reliquis quæ subditæ sunt carent nonnulli ex iis qui longi sunt & corpulenti: ut anguilla, ut conger & mugilum genus, quod in lacu Sipharum nascitur: & præterea quæ tania appellatur. Iis uero qui prælongi sunt, atque magis serpentis speciem referunt, ut murena, nullæ omnino sunt pinnae, sed flexuoso impulsu corporum ita humore utuntur, ut terra serpentes: quibus neque branchiæ integræ atque discretæ, ut cæteris piscibus habentur. Cartilaginei quoque generis aliqua pinnae carent, uidelicet quæ plana sunt & caudam habent, ut raia & pallinaca: suæque ipsa latitudine natant. Ranâ tamen pinnas habere uidemus: & quæcunque suam latitudinem colligunt in mucronem. Et branchias ipsas quidam pisces operimento spineo intactas continent: at cartilaginea omnia cuticulari tantum operimento opertas. qui intactas habent, iis in obliquum C utroque latere tenentur: qui tegumento illo spineo carent, cartilaginea dico, iis fere si plana sunt, parte inferiore supinæque habentur, ut raia. Rana autem deductas in latera habet branchias: sed si oblonga sunt, eorum lateribus adhærent, ut in quouis mustelino genere (quod galeodes uocant) cernitur. Item branchiatorum ipsorum, aliis simplices branchiæ sunt, aliis duplices: omnibus tamen simplex est, quæ nouissima corpori admoda est: & aliis pauca, aliis multæ: uerû in utrûque latius æque partitæ omnibus sunt. Habent quibus paucissimæ sunt singulas branchias utrinque, easque duplices, ut aper: aliis binæ utrinque, alteræ simplices, alteræ duplices, ut cōgro, scaro: aliis quaternæ utrinque simplices, ut accipenser, dētici, murena, anguilla: aliis quaternæ duplici ordine, nouissima excepta, ut turdo, perca, si- D luro, cyprino: his qui galeodes dicuntur etiā duplices & quinæ utraque ex parte sunt: gladio octonæ duplices. Ita branchiarû colligitur numerus. Sed præter branchiarum discrimen, pisces à cæteris animalibus differunt, eo quod non pilis, ut terrestria quæ animal generant, non cortice, ut nonnullæ quadrupedes quæ oua pariunt, non penna, ut genus auium, integuntur: sed plurimis squama cutis operta est: quæ præ sua rigiditate tenuitateque facile auellitur. Pauci quidam scabri sunt, cutemque habent asperam: paucissimi leues: cartilaginea enim squamis carent, sed aspera cute fere muniuntur: leuia sunt per pauca: conger autem & anguilla & thunni leues sunt. 1 Squama integuntur illi pisces tantum, qui ouum arenidum friabile uo pariunt: nam ex longis conger tale ouum non edit, nec murena. qui autem

*ῥέτιλα**Pinnas, ῥέτιλα**Duplici ordine, dissimile*

squamis integuntur, iis extenuatis ac senescentibus duriores crassioresque efficiuntur squamæ. Testes non habent pisces, sed nec genitale ullum foris conspicuum, sicut nec ullum aliud animalium genus quod careat pedibus: meatus tamen idem est coitus, qui & siccæ excrementi: quæ quidem similiter tam in feminis eorum quàm in maribus sunt. Piscibus cauda ad natatum data est, quæadmodum auibus uropygium ad uolatum dirigendū: sed continua fere ac indiuisa: uerum cauda ipsa nō omnibus similis est: sed cum ceteris non euariet, planorum nonnullis spinosa, & longa, & gracilior est, ut torpedini & pastinacæ, & si quid aliud huiusmodi cartilagineum est: quorundam carnosa quidem, sed breuis, ut ranis accidit.

1 Arenidum, *ἄλ. ὑπόρ*, quia non continuum, sed quoddam arenulentum est, ita diffundi in multa potest. *ἄλ. ὑπόρτα σμφω*, id est fungosam & friabilem corpulentiā transtulit Theodorus, in mollibus, scilicet in sepio.

## De piscium interioribus partibus.

## Cap. CLV.

**G**ula paucis piscibus inest, ut congro, anguilla: iisque breuis, sed plurimis ab ore statim sequitur uenter: quocirca sæpius euenit grandioribus nonnullis, ut dum per impetum insectantur minores, uentriculus in os procidat. Piscium cor suum mucronem non ad pectus spectantem, sed contrā quàm in aliis spectatur animantibus, ad caput & os habet: extremūque eius inde pendet, quā branchiæ dextræ atque sinistræ inter se coeunt copulatūrque. Sunt etiam meatus alij de corde ad branchias tendentes singulas pro ratione magnitudinis, hoc est maioribus maiores, & minoribus arctiores: inter quos in maioribus crassa admodum & candida fistula est, quæ de cordis extremo oritur. Pisces omnino pulmonē non habent, neque arteriam: (non enim respirant) sed branchias uice pulmonis obtinent, quibus diximus modis. Piscium iccinora maxima ex parte pallidiuscula sunt. Iecoris partes in quibusdā adeo dirimuntur, ut bina esse iccinora uideantur, ueluti cartilagineis. Iecur adipicum nonnullis est, ut cartilagineis: quorum iccinoribus colliquatis oleum facimus. Lien piscibus partim non magnus est, partim uero notæ gratia duntaxat habetur. Fel habent omnes pisces: sed aliis iecori adiunctum est, ut musteligenis, siluro, squatinæ, leuiraiæ, torpedini: atque ex longis anguilla, belonæ, zygenæ: aliis, & H magnæ quidem parti, intestino annexum est, dependens à iecore meatibus quibusdā perpetuis summæ tenuitatis: & aut semotius a iecore, aut propius, ut ranæ, accipenser, dentici, murenæ, gladio. Nonnulli etiam toto intestino prætextum continent, ut amia. Sæpe etiam genus idem utrūque patitur situm, ut conghi: aliis enim ad iecur, aliis infra sepositum adhæret. neque renes neque uescicam pisces habent. Venter piscibus unus & simplex est, sed figura uaria est: alij enim modo auium uentriculum habent carnosum, ut mugilis: nonnulli uentrem intestino similem habent, ut scarus, qui & ruminare solus piscium creditur. Intestinum etiam simplex est replicās se, similēque sibi in omnibus eius partibus. Piscibus magna ex parte superne cir-

- A ne circa uentriculum exeunt appendices, ut in iis quasi lacunis cibum conditum macerent atque concoquant: nonnullis complures, ut gobio, galeo, perca, scorpion, mullo, sparo. at mugili parte altera plures exeunt, altera una tantum: aliis paucæ, ut hepato, glauco, auratæ. Tum autem eiusdē speciei consortes inter se differunt: auratarum enim aliis plures, aliis pauciores. Sunt etiam quibus nullæ omnino sint, ut magnæ cartilagineorū parti: cæteris ita ut aliis paucæ, aliis uel plurimæ habeantur: omnes tamen ad ipsum uentrem eas appendices habent. Pisces testibus carent, ut modo diximus: sed *ῥέπος*, id est meatus continet binos, qui à præcordiis uenæque maiore exorti bifurces, utrunque spinæ latus perreptæ, coeantque superne in unum caput, atque ita ad ostium excrementi finiunt: (quod enim ad spinā est, id superius nomino.) hoc ergo inseritur atque in locis tenditur fœminarum. Pleni ij meatus in maribus *ῥέπος*, id est humoris fœtifici redduntur tempore coitus, latissimæque patent eo tempore, etiam imperitis, (æque in maribus atque illi qui in fœminis in matricem feruntur,) attritūque pisciū mutuo, atque adeo etiam si compresseris, facile semen ipsum effluet genitale candidum. ubi uero id temporis præterit, incerti uel meatus ipsi interdum redduntur, ut de testibus in auiū genere expositum est. Differunt inter se meatus genitalis maris & fœminæ, tum aliis rebus, tum etiam quòd maris lumbis inhaerent firmitus, fœminæ mobiles sunt. Piscium uulvæ bifidæ sunt, & non ut auium suprà iuxta septum, sed infra habentur sicut bipedum aut quadrupedum quæ animal pariunt, sed tenues & mēbrana con-
- C stantes & longæ: ita ut in minutissimis pisciculis partem uulvæ utranque, dextram scilicet & sinistram iungi in faciem unius oui uideatur. At galeis reliquisque cartilagineis uulva bipartita pertinenſque suprà ad septum, quomodo auiibus est, & infra quoque porrecta: atque etiam de medio sui bipartiti sinus arctior ad septum usque pertendit: ac oua hoc in loco ad septi originem maxima pro parte cōsistunt: mox prolapsis in spatium latius, fœtus animales excluduntur. Piscibus ouiparis nō infrà apud aluum, sed lumbis adhærens uulva continetur: at cartilagineis uterus utrunque situm habet, scilicet in parte priore & ad lumbos: partem enim uulvæ superiorem, in qua oua gignuntur, sub septo ad lumbos & pronā habent, inferiorem ad
- D aluum: hac enim iam procreant animal. Piscium ossa proportionem similia sunt animantium terrestrium uiuiparorum ossibus: qui enim inter eos animal generant, cartilaginem pro spina habent, ut ea quæ cartilaginea appellantur. in iis nanque quod per dorsum proportionatum ossibus tendit, cartilago est: quæ etiam humorem in medullæ speciem continet. Quæ autem oua pariunt, spinam continent: quæ perinde ut spina dorsi in quadrupedū genere habetur. Sed propriū in piscibus est, quòd nonnullis spinulæ quædam prætenues separatim per carnem inhaerent. Piscium sebum adipem præ se fert: nec enim concreſcere solet. Cartilagina nullo discrete adipe carni uentriusque adhærente pinguescunt: eorum tamen quorundam iecinoribus colliquatis oleum facimus. Pisces genituræ loco *ῥέπος* habent, id est genitale quoddam uirus sui generis, quod meatibus quibusdam continetur,

*Sparo, aliis  
scaro.*

*ῥέπος.*

*Aliis, partem  
utranque.  
Aliis, sinum  
utranque.*

*ῥέπος, aliis  
ῥέπος.*

*ῥέπος, aliis  
ῥέπος.*

qui à septo uenâque maiori oriuntur, ut ante dictum est. Semen eiusmodi E genitale habent mares omnes præter anguillam.

1 Respirare etiam pisces contendunt nonnulli, ut apud Oppianū lib. 2 de pisc. & Plinium. 2 Intestino, &c. *Errandum* potius lego apud Aristoteli hoc in loco, quàm *irrespondi*: tum ex ueteri traductione, tum ex lib. 3 de partibus animalium, cap. 14.

De sexus discrimine in piscibus: deque eorum coitu, & aliis quæ ad generationem pertinent. Cap. CLVI.

*Epitragæ.*

**P**iscium maxima pars consummatur mare & fœmina. In piscium tamē genere sunt qui omnino sexus discrimen alterutram in partem non habeant: nonnullis enim nec mares nec fœminæ gignuntur. Sunt enim pisciū nonnulli epitragæ appellati, qui nec ouum nec semen prolificum unquā <sup>F</sup> habeant: sed qui solidiores pinguiorésque in eo genere sunt, iis intestinum <sup>1</sup> paruum est, & laus præcipua in pastu. Nec desunt quæ absque maribus sexu uno fœmineo formentur: sunt enim genera quædam, ut passerum, erythrinorum & chanarum, in quibus omnibus oua reperiuntur. Hæc perinde pariunt ut aues oua, quæ hypenemia dicuntur: uerum ea quæ aues concipiunt pariuntque etiam sunt infœcunda: piscium uero nonnullis, cum spontanea ediderint oua, euenit, ut ex his animal progeneretur: in his tamen, si in eo genere mas est, infœcunda manent oua, quæ sponte constiterint, nisi mas suum asperferit semen. Piscium fœminæ plerunque maiores suis maribus euadunt: ut qui ex cartilagineis parui sint, & pars plurima gregalium, & genus omne saxatile. Fœminas quoque maribus esse uiuaciores constat, eo <sup>G</sup> quodd fœminæ uetustiores quàm mares capiantur. Pisces non coire existimauere quidam: sed mares uentrem ad arenas fricando semen exprimere: fœminas deinde ore exforbere, atque hoc pacto concipere. coeunt tamen pisces omnes in quibus sexuum discrimen reperitur, uel ad motus inuicem partibus supinis, exceptis planis cartilagineis: quanquam eorum coitus qui oua pariunt, rarius cernitur: quoniam congressionē quamprimum digressio sequatur: fieri tamen ita eorum coitum uisum est. Tanta enim celeritate rem peragunt pisces, ut etiam piscatores complures lateant: nemo enim eorum aliquid tale cognitionis gratia obseruat: ueruntamen coitus eorum uisus aliquando est. Ex cartilagineis autem plani, iidemque habentes caudam, ut raia & pastinaca, & reliqua huiusmodi, non solum ad motus supi- <sup>H</sup> nis, sed etiam tergo fœminarum supinis marium superpositis (modo cauda nullo impedimento ob crassitudinem fit,) coeunt. Squatinæ & quibus plenior cauda est, his attritu mutuo partium supinarum coitus agitur. Sūt qui se uidisse confirmant nonnulla ex cartilagineis auersa, modo canū terrestrium coherere. Coitus etiam tempore complura ex his sibi adhærentia capiuntur. Piscium cæterorum diuersa genera coire, uisum à nemine est: squatinam solam & raiam hoc facere creditur argumento piscis cuiusdam qui nomen ex utroque compositum trahit, rhinobati. Conceptus pisciū magna ex parte uerno agitur tempore: sed tamen & æstate, & autumno, & hyeme nonnulla coitu implentur. Apud Lesbium insulam omnia tam pelagica

A lagica quàm Euryptica parere solent in Eurypo, & coeunt autumnò, pariùt uere. Cartilaginea etiàm autumnò mares cum fœminis congregantur: sed uere subeunt Eurypum disiuncta, neque coniugium reperitur ullum donec pariant: uerũ nec pariter omnibus aut simpliciter aut generatim id euenit, sicuti plurimæ parti, ut uerno tempore concipiant: neque etiàm cæteris temporibus tam numerofo partu fœtificatur quàm uere. Denique latere non decet, ut stirpium & quadrupedum animantium generi, plurimum interesse ex regione nõ solum ad cæteram corporis fœlicitatem, sed etiàm ad coitum partumque ampliorem: sic in piscium quoque ratione locis ipsis discrimen plurimum oritur, non ad magnitudinem tantum habitumque uegetiorem, uerum ad coitum etiàm & partum: ut iidem alibi pluries generent, alibi minus. Tempore coitus cum mares meatus illos genitales plenos iam feminis genitalis habent, modo quo dictum est, fœminę mares sequentes uentrem eorum suis percutiunt rostris: quo etiàm fit ut mares semen & celerius fundant & largius. Tempore deinde partus mares fœminas sequentes, quæ illæ oua ediderint, ipsi mordicus fere uorant: pisces uero ex iis quæ remanserint, oriuntur, quibus scilicet mas semen asperferit genitale. Sub partu enim mas sequens, semen ouis quæ reliqua sunt, aspergit, & quæ uitale id uirus contigerint, ex his pisciculi nascuntur: quæ uero nõ attigerit liquor masculi ille uitalis, sterilefcunt & irrita fiunt. Nõ omnibus enim id contingit ouis in tanta multitudine: alioqui replerentur maria & stagna, cum singuli uteri innumerabilia concipiant. Discrimine partus sic discrepant pisces, ut alij oua pariant, alia animal. pariunt oua omnes qui squama integuntur: animal omnes qui genere cartilagineo continentur, excepta rana. genus enim cartilagineum tam planum quàm mustelinum animal generat. reliqua oua pariunt. Sed nec cartilagineis quidem fœtus sine ouo: pariunt enim intra se primum oua, & augent atque excludunt, præterquam rana: mox animal foras pariunt. Oua piscium imperfecta eduntur omnium, excepta rana, & putamine duriusculo intacta: quæ postquam edita sunt, foris augentur & perficiuntur: incrementum enim oui simile uermibus est. Animal enim quæ uermem pariunt, primo exiguum edunt, quod per se augetur sine ullo annexu: ita & piscium oua in mari cresunt: sed quædam summa celeritate, ut murenarum: quædam paulo tardius. Ouum piscium non bicolor ut auum, sed unicolor omnium est, & album magis quàm luteum, tam antea quàm postea cum fœtus insidet. Et piscium generatio ex ouo, quanuis ab auum generatione differat, simili tamen agitur modo, siue intus siue foris est ouum: quippe cum & fœtus in summo ouo nascatur, membrana obducta: & uenæ similes inter initia spergantur, & caput & oculi: denique partes superiores principio fiunt prægrandes: incrementum etiàm fœtu, humor pari modo subinde absorbuitur: demum nihil superest quod non fœtum subierit, sicuti de uitello auum expositum est. Adhęc cibus in aluo suggeritur eodem modo pisciculis albus, quo auum pullis luteus: nutritur enim non ex luteo, cum oua piscium unicolora sint, sed neque est luteum à candido separatum, sed miscetur in iis ista usque-



# DE DIFFERENTIIS

quaque & confunduntur. Fœtus, ubi absumptus fuerit oui humor, nuclei si- E  
gura iam constant: & primum nullum accipiunt cibum, sed ex oui humo-  
re iam hausto increſcunt. poſt nutriuntur aquis dulcibus uſquedum ſatis  
augeantur. Piſcibus autem hoc commune omnibus eſt, ut celeri incremēto  
perſiciantur, ſed præcipue coracino inter minores: orphus uero breui ex  
paruo inſignem magnitudinem accipit. Qui oua pariunt piſces, in his ouū  
ipſum arenidum eſt, & tota uulua ouis reſerta eſt: itaq; fit ut in paruis qui-  
buſdam piſciculis oua tantummodo gemina eſſe uideantur: nam ob tenui-  
tatem exiguitatēque uulua incerta in iis eſt. De coitu piſcium ſatis dictū  
iam eſt. Partus autem piſcium neque eodem tempore, neque ſimili mo-  
do omnium fit: nec pari temporis ſpatio geritur uterus. Piſces plurimi ſe-  
mel anno pariunt, ut ij ſere qui *geni*, id eſt ſuſanci ex argumento cognomi F  
nantur, quia ſuſim retibus capiuntur. quidam tamē ſapius: ſunt enim qui  
bis pariant, ut ſaxatiles omnes: & in iis nullus ter parit. Non deſunt qui o-  
mnibus anni tēporibus pariant, ut murena. Pariunt piſces plurima ſui par-  
te menſibus iis tribus, Martio, Aprili, Maio: Autumno pauci, ut ſalpa, ſar-  
gus & nonnulla ſimilia, paulo ante æquinoctium: adde iis torpedinem &  
ſquatinam. Sunt certe quæ per hyemem ſuos edant partus, ut lupus, mugi-  
lis, belone. Mugilum quoque genera graueſcere menſe Decēbri incipiunt,  
geruntque diebus tricenis. Per æſtatem menſe Iunio thunna circa ſolſtitiū  
parit: ſpargi etiam per æſtatem pariunt: & qui pelagici ſunt, æſtate magna  
ex parte pariunt. Nec etiam pari temporis ſpatio geritur uterus: alij nanq;  
diebus tricenis ferunt uterum, alij minus. Pariendi terminus piſcium com-  
pluribus eſt, ubi uermiculi nati in uentre fuerint: innāſcuntur enim minu- G  
ta quædam animalia uermium ſpecie, partūmq; expellunt. Profecto omne  
genus piſcium celeriter adoleſcit, & præcipue in ponto: quippe cum incre-  
mentum ſingulis diebus intelligatur. Omnino ita exiſtimandum eſt, ut ei-  
dem piſcium generi, non iisdē locis degenti, nec cocundi uterūque feren-  
di tempus eſſe idem, nec ſœtificandi, nec in magnitudine proſiciendi. Ve-  
rum hæc nos ita exponimus, inquit Ariſtoteles, ut magna ex parte res eue-  
nit. Lacuſtres & fluuiatiles piſces quinto ſuæ ætatis menſe uterum ge-  
ſtare magna ex parte incipiunt. pariunt omnes intra annum. Nec ſemen  
generationis ſimul omne emittunt mares, nec ouum ſcēminæ: ſed modo  
marinorum hi quoque ſemper intra ſe aliquid plus minūſue, ſcēminæ o- H  
uorum, mares liquoris proſifici retinent. Cyprini quinquies aut ſexies an-  
no, chalcis ter, reliqui ſemel edunt oua. Pariunt omnes in fluuiorum ſta-  
gnantibus locis, & lacuum arundinetis, ut phoxini & perçæ. Non ſolum pa-  
res cum paribus, ſed etiam admodum grandes cum paruis conueniunt, ad-  
mouētque meatus, quos aliqui umbilicos uocant: qua quidem parte ſcē-  
mina ouum, mas liquorem uenereum depromit. Et oua quæ liquor ille  
uitalis conuergit, admodum glutinoſa redduntur, & candidiora ex tem-  
plo cernuntur: maiorāque reddi eodem die propemodum dixerim. paulo  
autem poſt, oculi fœtus exiſtunt conſpicui, prægrandēſq; apparent: quæ ex  
ouis non attigerit liquor maſculi ille uitalis, hæc ſterilia redduntur, ut in  
marino

*Arenidū, ſa-  
dū, nō ſa-  
dū.*

*Χυμὶ ἰχθύος,  
ſuſanci piſces.*

*Semen genera-  
tionis, ſp̄or.*

*Umbilici pi-  
ſcium.*

A marino etiam genere euenire diximus: mas deinde oua quæ edita sunt custodit, fœmina ab it cum pepetit. Pisciculus iam ex fœcundis ouis increſcente, detrahitur uelut putamen, quod membrana eſt ouum ambiens & piſciculum. Horum quibusdam tardius incrementum ex ouo eſt: ideoque filurus mas, uel quadraginta aut quinquaginta aſſidet custodiens oua, ne à piſcibus occurrentibus abſumantur. at minorum nō nulla, uel tertio die ſpeciem piſciculi capiunt. Fœminas cū parturiunt ſæpenumero ſingulas, mares tredecim ſequuntur. Mox fœmina oua procedendo emittit: mares ſectātes ſemen illud ſuū ouis reſpergūt, ut modo diximus. uerū plurima pereūt: quod enim fœmina non ſtabilis, ſed mutans continue parit, diſſipari oua neceſſe eſt, uidelicet ea quæ non in materiæ inciderint aliquam, cui hæreāt, ſed excepta unda ferantur. Habent mares omnes ſemē genitale præter anguillam: quæ neutrum neque ouum neque ſemē fortita eſt. Piſces maxima quidem ex parte ouo gignuntur, ut dictum iam eſt: quidam tamen uerme naſcuntur, ut mugilum genus quoddam, & aliorum ſturiatium piſcium: ad hæc anguillarum genus. Sed ſunt qui & limo & arena proueniāt, etiam ex iis generibus quæ per coitum & oui primordio generantur: quod tum aliis locis paluſtribus, tum apud Gnidum factū olim memoratur: ſtagnis enim ſub canis ortu reſiccatis, & limo iam arido, ubi primū imbris reſtagnare loca inciperēt, piſciculi naſcebantur generis mugilum. Quod per coitum procreatur, magnitudine *μωκιδος*, id eſt haleculæ parum: nec in his aliquid uel oui uel ſeminis continebatur. Quæ autem nec ouum nec animal parium, omnibus iis ortus uel ex limo uel ex arena, uel etiam ex putredine per ſumma aquæ facta agitur, ut in anguillis & apuarum generibus. De coitu & partu atque de omni piſcium generatione dictum iam eſt.

1 Epitragæ, ab hirici ſterilitate ſic dicti, ut uult Theodorus. 2 Quo uero diſſeratur piſcium generatio ex ouo ab aui generatione, pluribus oſtendit Ariſtoteles lib. 6. hiſtor. animalium.

De ratione uictus piſcium.

Cap. CLVII.

Piſces omnes ſecturam, etiam piſcium, ſuo tempore deuorant: reliqua uictus ratio non eadē omnibus ineſt: alij enim carniuori ſunt, ut cartilaginei, & congreſſi, & alij quidam. Alter etiam alterum edit: maiorūque minores ſunt præda, exceptis mugile & cephalo: ij enim ſoli carne omnino abſtinent: alij non carnibus tantum uelſcuntur, ſed & alia deuorant: alij nanque cœno uelſcuntur, ut cephalo: alij cœno & ſtercore, ut daſquilli: alij alga, ut ſcarus, melanurus: alij & carne uelſcuntur & alga, nauſchōq, & cōchis, & cœno, ut mulli. ſalpa ſtercore & alga: porrum etiā petit, & cucurbita capitur. Veſcitur mugilis unusquiſque alga & arena. cephalaſorum genere eſt, qui non niſi mycore uelſcitur ſuo. Anguillæ plurimæ dulci humore uiuunt: nam qui in piſcium genere humorem accipiunt, cum non potus, ſed cibi potius gratia aſſumunt. Viuunt ſturiatiles tū ſeſe mutuo deuorantes, tum ex herba, tū ex radice, & ſi quid in cœno comperiant. nocte potius paſcere, interdum ſecedere in altum ſolēt. Cæteris piſcibus captura minorum

à fronte agitur ore, ut solent natare: at cartilaginei (quæadmodum etiam E delphini & omnes fere cetacci generis) resupinati corripunt: habent enim os subter. Victus causa in eunt prælium maiores contra minores: maior enim quisque atque robustior minorem infirmiorémque deuorat. Et piscium alij gregatim degunt amicique sunt, ut qui dromades uocantur & thynni & hamia: alij non gregatim, inimicique uiuunt. Qui amici sunt congregantur partim cum utero ferunt, partim cum sætum ediderint. Est sane plurima piscium pars gregatilis: nec ullus grex caret duce: & horum nonnulli non modo gregales sunt, uerum etiam coniugales. Greges statis temporibus (ut modo dixi) constituunt: scilicet cum uterum gerunt, aut post partum. Coeunt in gregem non solum quæ eiusdem generis sunt, sed etiam quibus idem aut similis pastus appetitur, modo abundet cibus: nam lupo & mugili quamquam inimici sint capitales, tamen statim tempore congregantur. Talis piscium uictus est.

*Dromas,  
æqualis.*

*Coniugales,  
ouyxa.*

*Cursor.  
Cursio.*

1 Porrum, *παραίος*, id est marthubium: ita habetur in nostris exemplaribus Græcis.  
2 *æqualis* Theodorus cursores uocat & cursiones: ut lib. 6 histor. animalium. Æstate pariunt omnes, qui cursores uocatur.

Quod loca mutant pisces uarie, atque latitent. Cap. CLVIII.

**L**ocum etiam mutare solent pisces: alij enim ex ponto aut in pontum tranant: alij per hyemem ex alto in litora teporis gratia ueniunt: contra æstate ex litore in altum uitantes æstum discedunt. semper quæ imbecilliora sunt prius utrauis ratione discedunt: ut scombri ante quam thyni. Perunt autem pontum tum pastus gratia, qui uberior & commodior ibi propter aquarum dulcium admixtionem suppeditatur: facit enim copia amnium loci illius, ut mare sit dulcius, & cibus largior habeatur, quem iidem fluuij deferunt: tum etiam propter partum: sunt enim ibi loca ad partionem aptiora & tutiora: (beluæ nanque magnæ pauciores ibidem sunt, nec in ponto fere quicquam maleficum est,) & humor dulcior ac potulentior sætum melius educat. Quin & latet piscium complures: alij hyeme, ut hippurus & coracinus, thynus, & pisces saxatiles, omnique cartilagineum genus, diebus scilicet frigidissimis: nonnulli æstate, ut glauci: non enim fere capiuntur hi nisi statis quibusdam temporibus, eisdemque semper: cum cæteri omnes fere semper capiantur. Saxatiles uero coniugatim mares cum feminis conduntur, quomodo & sætificare solent: ut turdi, merule, perca. Duo lacus Italiæ, inquit Plinius, in radicibus Alpij, Larius & Verbanus appellantur, in quibus pisces omnibus annis uergiliarum ortu existunt squamis conspicui crebris atque præacuris clauorum caligarium effigie: nec amplius quam circa cum nientem uiuantur.

De coloris mutatione in piscibus, uocetque & somno. Cap. CLIX.

**M**utant colorem pisces nonnulli pro anni tempore, (quemadmodum & ex auibus quædam) ut qui merula uocatur & turdi: uere enim nigrescunt, post uer albedinem suam recipiunt. Phuca etiam mutat colorem: cum enim

**A** enim cæteris temporibus cædida sit, uerno uaria redditur. Pisces uocis quidem expertes sunt: quippe qui neque pulmonem neque arteriam aut guttur obtineant, sed sonos quosdam stridorésq; mouent, qui uocales esse existimantur, ut lyra & chromis: his enim quasi grunitus quidam emittitur: chalcis quodammodo stridet. cuculus perinde ut cuculus auis obstrepit, unde nomen accepit. Necnon cartilaginei generis nonnulla *τεῦλι*, id est stridere uidentur: uerum ab iis uocem emitti ullam, recte dici non potest: at sonum siue strepitum reddi uerius dixeris. Dormiunt pisces noctu potius quam interdum: & magna ex parte uel ad arenam, uel ad lapidem aliquem procubentes quiescunt imis gurgitibus, uel sub saxo aut limo abditi. Planis autem piscium arena sese occultant: deprehenduntur situ ipsius arenæ, tollunturq; sub scina percussis: cartilaginea uero ita interdum dormiunt, ut uel manu tollantur.

Limo, Stru.

De ualetudinis piscium differentiis, tum ex locis,  
tum ex temporibus. Cap. CLX.

**L**oca pro sua natura piscium genera quæque sibi habent ad incolumitatem commodiora: quod enim litorale aut pelagium est, huic suo loco pro naturæ desiderio uersari commodius est: quod autem ambigit, id commodè utroque degere potest: sed sunt loca quædam singulis propria, in quibus rectius ualeant. Limosa regio planum educat piscem, ueluti soleam, rhombum, passerem: at arenosi gurgites planos quidem non pessime, sed pelagios melius pascunt, ut auratas ac dentices: nec omni mari potest piscis **C** omnis inesse, ut helops, qui Pamphilio profundo nec alio mari pascitur, ut Atlantico faber. Commodiora piscibus (quod simpliciter dixerim) loca sunt ea quæ algarum copia scatent: pinguioribus enim locis his capiuntur. nam & quibus alga in cibo est, abunde hic pascuntur: & quibus caro appetitur, plures pisces sibi reperiunt. Interest etiam aquilonia loca sunt, an austrina: genus enim longum aquiloniis melius uiget: & quidem æstate loco eodem in aquiloniis plures longi quam lati capiuntur. Sed discrimen piscium diuersitate etiam locorum ac temporum existere potest: ut circa Cretam insulam gobiones omnèq; saxatile genus satis pinguescit. Lupi pisces in Tyberi æmne inter duos potes meliores sunt: rhombus Raurænæ, murenæ in Sicilia, elopes Rhodi. Illa non in nouissimis mira, amarissimos esse pisces ad Pelen **D** insulam & ad Clazemonas: contra ad scopulū Siciliæ & Leptim Africæ, & Eubæam & Dyrhachium: rursus ita sallos ut possint falsamenta existima-  
ri, circa Cephaleniam & Ampelon & Paron & Deli petras: in portu eiusdem insulæ dulces. Quam differentiam pabulo constare non est dubium. Thūnus post arcturū melior est, æstate deterior. Viget pisces ouipari fere ueris tempore donec pariāt, uiuipari autumno: & mugiles item, & mulli, & reliqui generis eiusdem. Pariendi tempore laborant omnes pisces: unde fit ut tunc potissimum ruant in terram: feruntur porro graui stimulo agitati in terram. Innascuntur enim in uentre minuta quædam animalia uermium speciei, quæ partum expellunt, ut dictum antea est. atque omnino id temporis motu perpetuo incitantur donec pariant: à partu statim requiescunt.

Piscibus omnibus (exceptis quibusdam paucis) imbres conducunt, tum ad E  
ceteram sanitatem, tum etiam ad partum: contráque anni sicci incómodi  
sunt: annis enim pluuiis non modo plus cibi nascitur, uerum etiam pluuió  
humore plurimum iuuantur: ueluti etiam quæ terra gignuntur: olera enim  
quanuis rigentur, tamen nō tantum proficiunt quantū imbre: quod idem  
arundinibus etiam lacu prognatis euenit: nihil enim fere accrescunt, nisi  
aquæ pluuiæ incidant. Ex pluuiis autem ipsis æstiu imbres commodiores  
sunt parti maximæ pisciū, & præcipue cū uer, & æstas, & autumnus imbri  
bus abundauerint: hyems cōtrā serenior fuerit. Locis autē frigidis parum ui  
gent: & hyeme maxime infestatur, qui lapidē in capite habent: ut chromis,  
lupus, phanger, umbra: facit enim lapidis rigor, ut per algore gelent & defi  
ciant. Sed cū plurimis pisciū generibus imbres conducāt, quibusdā tamē F  
nocent, ut mugili, cephalo, & ei qui à nonnullis myrinus uocatur: sit enim  
ut pluuiis multi excæcentur, si modum aqua excesserit, atque ad postremū  
malo eodem intereant. quod tamen non magis imbrium copia quàm al  
gore accidere uidetur: iam enim quibusdam in locis multi capti sunt cæci  
cum hyems fuisset asperissima: multi etiam albos habētes oculos capti sunt.  
Piscium uisus maxime fallitur circa solis ortum & occasum. ac proinde re  
tibus capiuntur præcipue non multo ante quàm sol oriatur, aut postquam  
occidit: quippe cum noctu quiescant, luce autem iam clariore melius ui  
deant. Morbus pestilens nullus incidere piscibus uniuersis uidetur, qualis  
plerunque hominibus & quadrupedibus nonnullis accidit, tum feris tū ur  
banis: agrotare tamen & ipsi putatur. Et quidem piscatores pro morbi in  
dicio capiunt, cum aliquot extenuatos languentibus similes, & colore G  
mutatos inter multos pingues ac ualidos eiusdem generis ceperint. Mari  
num genus ita se habet: fluuiatile & lacustre pæste quidem & ipsum immu  
ne est, sed nonnullis morbi incidunt proprii: glanis enim canis exortu po  
tissimum syderatur & tonitruo sopitur magno: quod & cyprino accidit,  
sed leuius. Chalcida pediculi multi sub branchiis innati interimunt, quod  
nulli ex cæteris accidit.

In alimenti medicamentique ratione piscium discrimina.

Cap. CLXI.

Q uod ad alimenti rationem attinet, non parua est piscium differentia. H  
Alimentum sane quod ex piscibus prouenit, sanguinē gignit tenuio  
rem quàm quod ex pedestribus: adeo ut nec abunde nutriat, &  
per insensibilem halitum celerius digeratur. estque eorum caro tempera  
mento frigidiore humidiorque. Pilces, prope dixerim omnes, boni succi  
esse iudicantur, exceptis lacustribus, palustribus, & qui in immundis flumi  
nibus ac turbidis degunt. Præstantissima uero eorum piscium caro habe  
tur, tum ad bonos gignēdos succos, tum ad gustus uoluptatem, qui in mari  
syncero uictitant, ubi dulci aquæ non miscetur: maxime uero ubi regionē  
uenti perflauerint: & ubi neque limoso neque tranquillo litore continetur  
mare. Qui non apud litora sed inter saxa & scopulos degunt, indēq; *πρῆτοι*,  
id est

- A** id est saxatiles appellantur, saluberrimi omnium sunt: modo caro eorum minime dura sit, ut phycides, iulides, perca, scarus, merula, turdus. Hi neque alimento utuntur uario, nec loca mutant, nec fluuiatilibus aquis gaudent: ideoque perpetuo manent inculpati: omniumque mollissimam simul ac maxime friabilem habent carnem: quamobrem & concoctu sunt faciles, & probum generant succum, sanguinemque crassitudine mediocrem: & humectant modice. corpus quoque recte & alunt & augent: neque excrementosi sunt, neque flatum gignunt: & ut Mnesitheus prodidit, uel siccus præbent alimentum. Saxatiles, ut diximus, carnem habent mollem & friabilem, ac proinde saluberrimam: alij quidem sunt carne, sed minime friabili, utpote quibus innatus est succus quidam lentus pinguisque: alij nihil uiscidum pingue habent: qua quidem in re cum saxatilibus conueniunt: eò tamen quòd caro illis durior existat differunt: cuiusmodi sunt muli & pelagici propemodum omnes, nisi qui forte prauo alimento suam corruerint carnem. Qui duri sunt crassiorum corpori præbent in cibo succum, ægrèque conficiuntur: nam neque in uentrem concoctio, neque in iecinore uenitque, in sanguinem mutatio, nec denique, quæ in singulis fit partibus assimilatio, tam facile in duram habentibus carnem, perficitur, quàm mollem. Duram habent carnem scorpij, pagri, trachuri, orphi, glauci, canicule, congridi, hamia, coracini, myli, thunni, atque id genus alij: cartilaginea quoque omnia præter torpedinem & pastinacam. Mediocritatem obtinent nonnulli pisces inter durum ac molle, qui scilicet neque tam molles sunt quàm qui mollissimi: nec duram tamen carnem habent, quales sunt murena, lacerti, passerres, rhombi, cythari, sciæna, hepatis: (& ut Xenocrati placet, aselli,) hos omnes Philotimus ἀπλοσάρκεις, Mnesitheus μαλακασάρκεις, uocant, id est teneros pisces. Hominibus in otio uiuentibus, senibus, imbecillibus & ualitudinariis accommodatissimum ex his atque saxatilibus gignitur alimentum: qui autem corpus exercent, ualidius desiderant. Quod uero ad succi crassitiem tenuitatemue pertinet, in symmetria omnisque excessus mediocritate consistunt pisces saxatiles, pelagici & litorales, ut gobij, murenæ, buglossi, aselli, omnesque qui neque insuauem malie odoris neque glutinosum quicquam gustu præ se ferant. Grandiores pisces omnes (quos **D** cetaceos uocant) crassum tenacemque succum procreant. Saxatiles pisces febrientibus picrocholis utiliter in cibo dantur: nec ipsis minus aselli conueniunt, nisi si qui prope lacum aut magnum flumen, quod in mare decadat, depasti, humidam magis glutinosamque habeant carnem. Proxime asellos sunt buglossus & torpedo: itemque lupus & mulus, post mugil è pelago. Qui ἀπλοσάρκεις uocantur, saxatilibus humidiorum præstant succum: & iis qui à morbo conualescunt sunt magis idonei, & uentrem quoque & urinam uehementius cient. E marinis piscibus saxatiles, uti Diphilus prodidit, facilius corrumpuntur, bonum procreant succum, leuioresque sunt, & mo dice nutriunt, atque abstergerendi uim obtinent. Pelagij contra, copiosius nutriunt, difficilius concoquantur digerunturque. Pelagici litorales præstāt, inquit Aristoteles: quippe qui cibo copiosiore meliorèque potiantur: tum

Turdos & merulas Mnesitheus non inter saxatiles numerat, sed inter μαλακασάρκεις.

Mollioris carnis pisces, μαλακασάρκεις.

Duri pisces, χυρδοσάρκεις.

Απλοσάρκεις. Μαλακασάρκεις.

Κητώδεις. Cetacei pisces.



etiam bene ex calido frigidóque temperata sunt loca magis terrena: quo fit E  
ut caro eorum piscium magis constet: cum pelagiorum humida, mollis solutáque sit. Sed discrimen horum quoque, diuersitate etiam locorum ac té  
porum existere potest: ut thunnus post arcturum, uti diximus, melior est, æstate deterior. Lupi pisces in Tyberi amne inter duos pôtes meliores sunt, inquit Plinius: rhombus, rauennæ, murenæ in Sicilia, clops Rhodi. Qui tamen pelagij dicuntur, longe perstant iis qui limoso litore uiuunt, aut ubi in mare influit amnis: tum ut ex iis probus gignatur succus, tum etiam ad saporis gratiam. Deteriores sunt, qui in paludibus aut maris stagnantibus locis uersantur: his etiam peiores sunt, si stagnantia loca in quibus uiuunt angusta exiguaue sunt, & neque magnos recipiunt fluuios, neque fontes habent scaturientes, neque multum est quod effluat. Quòd si nihil penitus effluat, sed perpetuo stabilis maneat aqua atque immobilis, longe sunt deteriores. Excrementitia penitus mucosáque, & omnino pessima caro est eorû, qui sordidas limosâsque aquas incolunt: ubi uero fluuios multos ingentéscque suscipit mare, (uti in Ponto fit) qui locis eiusce modi degunt pisces, quò præstantiores iis qui in paludibus nutriuntur, eò sunt inferiores iis qui in syncero mari uiçant: mediûmque locum obtinent inter pelagios ac fluuiatiles pisces. Marini autem pisces suauiores sunt fluuiatilibus, ut Xenocrates prodidit. facile in corpus digeruntur: sanguinémque procreant copiosum, & bonum in corpore reddunt colorem. Qui autem in fluuiis aut stagnis uiçant, ut idem author est, stomacho sunt ingrati, crassiorem sucum gignunt, nec tam facile permeant. Sunt tamen & inter fluuiatiles qui G  
marinis minime cedât, ut in Nilo coracinus. In Rheno perca & in Tyberi lupus: uictus enim in huiusce generis locis probus est, & qui abunde suppetatur. Porro eorum qui in fluuiis degunt, cæteris præstat qui in eo amne capiuntur, ubi & aqua copiosa est, & celeriter fluit: mali contrâ sunt, qui in paludosis stagnantibusue fluuiis uiuunt. Omnium autem pessimi, qui in fluuiorum ostiis uictum queritant, in quos cloacarum, balnearû aut coquinarum, uestiûmque ac linteorum sordes, cæterâque urbium purgamêta defluunt. Qui in piscinis seruantur pisces, si ad pelagios conseras, ingrato sunt sapore. qui è mari in fluuios ascendunt puros ac lymphidos, suauiores sunt iucundioréscque: qui uero in aqua stagnante limosa clauduntur, quantius pingues, insuaues tamen sunt. Pisces quicunque herbis radicibusque o- H  
primis ad saturitatem pascuntur, ij meliores euadunt: qui autê cœnolis herbis malisue succi radicibus uiçant, aut iis quæ ex urbibus expurgantur, (uti modo diximus) pessimi: putrescuntque ac male olent, si post capturam paulo diutius seruentur. Nec minus & qui in aquis uiciatis degunt, mali odoris atque insuaues mucosique euadunt: cumque sint aliis longe pinguioribus, citissime putrescunt. Minime uero tardissiméque omnium putrescunt, qui puro ex mari uictum petunt, bonique odoris sunt & sapore iucundo: pinguidinis autem uel nihil uel minimum in se habent. Qui in paludibus aut fluuiis gignuntur, eorum caro fere spinis abundat: quod in marinis raro accidit. Pisces cum impleri incipiunt à coitu boni omnes sunt: sed procedente

*Alijs in Ty-  
burtino agro,  
uide infra in lu-  
po.*

A cedente uteri tempore alij præstant, alij non. Mæna utero grauis melior est. coracinus etiam cum utero fect optimus est. mugilis uero & lupus & reliqui fere omnes squama iuncti, deteriores sunt cum ferunt. Similes sibi ferentes & non ferentes pauci sunt, ut glaucus. Hæc Aristoreles. Xenocrates autem, uere inquit, cum utero gestant, optima est piscium maxima pars: ætate præstant phagri & synodontes. Hepatus autumnio uilescit, ut qui uitiolum tunc procreat succum: lupi uero ac mugiles eo tempore grariores habentur. Subeunt etiam fluuios piscium genera cõplura, & præstāt in fluuio ris & lacubus, ut amia, mugilis. gobiones etiam pinguescunt, qui in fluuios ascenderint. Fluuiatiles & lacustres optimi sunt post partum & seminis emissionem, postquam cibo se refecerint: sed nonnulli etiam cum ferunt, cõmendantur, ut saperdes: alij damnantur, ut silurus. Cum cateri omnes mares suis fœminis sint præstantiores, glanis fœmina præstat suo mari: & in genere anguillarum quoque meliores sunt, quas fœminas nominant. Vitiuntur senectute pisces: & quidem thunni ad rem salamētariam senes improbi sunt: multum enim carnis sale absuntur, quod idem uel in cæteris piscibus euenit. Pisciculi recens nati facile in uentriculo corrumpuntur: qui uero cetacea specie sunt & magni, duri sunt, concoctu difficiles & stomacho ingrati: qui autem & ætate & magnitudine sunt media, concoctionem pariter & digestionem facilius admittunt. In partibus quoque pisciũ discrimen est: quæ nanque caudæ proximæ sunt, suauis existunt, & meliuscule nutriunt, ut quæ sui motione exercitentur magis: quæ uero ad uentrẽ C pertinent, pinguedinis nonnihil habet: ac proinde stomacho innatant, & per aluum facilius redduntur. Dorsum carnem habet duriorẽ: caput uero etiam minus præbet alimenti, & quod non facile digeritur. Rursum pisces asii, Xenocrates ait, nutriunt magis, nec tam facile permeant: iurulenti minus exhibent alimenti & citius permeant: frixi gustui suauis, sed stomacho minus grati, faciliusque corrumpuntur: minus nutriunt, & uentriculo innatant. Piscium genus omne dum adhuc spirat, (ut ita dicam) coquendum est: non enim facile seruari patitur, nisi carnem admodum duram habeat. Piscium ius, qui recentes sunt, modo per se, modo cū uino aluum mouet: idem & urinas citè uino maxime. Priuatim uero ad hunc usum conficitur: & qui uirus minime respiciunt, ex aqua, oleo, sale & anetho. addit Plinius apiuni, coriandrum, & porrum. Ius piscium in patina coctorũ cum lactucis tenasimum discutit. Piscium adipem ad suffusiones imponere nonnulli. Omnium piscium fluuiatilium marinorumque adeps liquefactus oleo, admixto melle, oculorum claritati plurimum confert. Piscium natura generatim ita se habet.

De cartilagineis.

Cap. CLXII.

Q Vicquid inter marina pedibus orbatum & branchias habens animal generat, sub cartilagineorum nomine continetur, præterquã rana. *Cartilaginea.* Cartilagineis omnibus quod per dorsum proportionatum of-

A pariunt enim intra se primum oua, & augment atque excludunt, præterquã rana: mox animal foras pariunt. Oua, maxima quidem ex parte, iuxta præcordia omnibus: sed nonnullis non iuxta præcordia, sed in medio uulvæ circa spinam oua adhærent, uti modo diximus: unde aucta in imum transferuntur uteri locum, efficiunturq; animalia infra ad genitale, umbilico hærente ad uulvam: ita ut ouo absumpto partus nõ aliter fiat, quàm in iis quæ iam inde à primo ortu animal generant. Omnia fere cartilaginea simul & oua parte superiore continent complura, & alia maiora, alia minora, & inferiore animalia iam exclusa. unde fit ut genus id piscium sæpius mense & parere & coire nonnulli arbitrentur: quippe quod non simul uniuersa edere soleat quæ conceperit, sed particulatim repetens sæpe & diu peragens: ut dum superius oua contrahit, inferius concoquat atque perficiat. Superstant cartilaginea, & ferunt utero mensibus cum plurimum senis: & cum tempus pariendi instat, repetit litus & uada, pelago & alto relicto gurgite, ut neque tepore careant, & progeniem tutius collocent. Oua omniũ cute molliore operta sunt, præterquam ranarum, quod unum solidum durumq; est. Omne genus cartilagineum minus scetificat, quia animal gignit. Carnibus tantum uescuntur cartilaginei: & resupinati corripunt pisces quos deuorant: habent enim os subter, ut ante diximus. Motus eorũ lentus pigerq; est: ut qui non spina aut neruo corroboratur, sed cartilagine. Latent omnes diebus frigidissimis. In hoc genere torpedo & pastinaca molliorem habet carnem atque suauem, & quæ modice alium moueat, nec concoctu difficilem: quæ & mediocriter corpus enutriat, sicuti & alia quæ carnem habet mollem: ut nonnunquam in piscium etiam saxatiliu penuria his uti possis. Raia uero leuiraia & squatina atque alia id genus duriora sunt, & concoctu difficiliora: alimentum autem præbent copiosius, quàm aut torpedo aut pastinaca: senibus tamen inutilia sunt. Diphilus omnium cartilagineorum carnem concoctu esse difficilem, succumque gignere flatuosum prodidit: usumque eorum assiduum ac diuturnum uisus hebetudinem procreare.

*Animalia iam  
exclusa, & uul-  
uæ uis.*

1 Plana sunt, &c. τὰ πλάγια πλάγια uocantur hæc ab Aristotele lib. de animalium gressu. 2 De his plura uideas apud Aristotelem lib. 6 histor. animalium, & lib. 1 de generatione animalium.

De cartilagineis planis.

Cap. CLXIII.

Planorum piscium unũ genus est, quod pro spina cartilagineum habet, ut raia, pastinaca, squatina, torpedo: & quos bouis, lamie, aquilæ, ranæ nominibus Græcia appellat. Raia piscis est cartilagineus planus: cutim habet asperam, & caudam quoque spinosam ac longam. pinnas nõ habet, sed ipsa extrema corporis sui latitudine natat. Branchias habet nõ à latere, sed parte inferiore & supina. genitale sæminæ simile muliebri est. Cocunt raie non solum ad motus inuicem partibus supinis, sed etiam tergo sæminarum supinis marium superpositis. Raie in utero gerunt testacea quædã, in quibus humor ad oui similitudinem consistit: figura eius testæ similis tibi arũ

*Raia.*

**A** innascitur, dentium dolores mitigat, inquit Dioscorides: quos & frāgit atque excutit. Pastinacæ radio scarificare gingiuas in dolore utilissimū prodidit Plinius. Conteritur is & cum helleboro albo illitus, dentes sine uexatione extrahit. Pastinacæ item radius adalligatus umbilico, existimatur faciles partus facere, si uiuenti ablatus sit, ipsaque denuo in mare demissa. Iecur pastinacæ in oleo decoctum, lichenas & lepras tollit. pruritū scabiēque, non hominum modò, sed & quadrupedum efficacissime sedat.

Est & torpedo piscis cartilagineus planus:

Hæc grauis & mollis, sunt nullæ in corpore pigro

Vires: & nimium premitur gravitate. natantem

Non credas, liquidis ita clam subrepat in undis.

*Torpedo  
rayan.*

**B** Duas parte prona iuxta caudam pinnas habet, pro reliquis latitudine utitur: & utroque sui corporis semicirculo, quasi geminis pinnis natat. caudam habet sōgam atque spinosam. Huius iecori tenacitas nulla præfertur. Fel habet iecori annexum. prope litora cœnosa uictitat, ut Oppianus tradit. Parit circa autumnum paulo ante æquinoctium. Fœtus etiā suos & emittit & recipit intra seipsam, ut squatina. & iam quidem uisa est torpedo grandis, quæ fœtus intra se circiter octoginta haberet. Condi per hyemem torpedines terra, hoc est uado maris excauato, tradunt, quod frigoris causa eas facere Theophrastus existimauit. Sunt qui duo torpedinis genera tradunt: marinum scilicet & fluuiatile. Quæ de torpedinis solertia narrantur, uera omnino certaque sunt, inquit Aristoteles. Torpedo pisces quos appetit, afficit ea ipsa quam suo in corpore continet, facultate torpendi: (ipsa tamen non torpens) atque ita retardos præ stupore, capit & uelcitur. Abdit se in arena & limo: tum pisces qui adnatantes obtorpuerint, corripit: quam rem plerique à se conspectam retulerunt. Plato torporem appropinquantibus tangentibusue inferre torpedinem tradit. Quinetiam procul & è longinquo, uel si hasta uirgæue aut fuscina attingatur, uel piscatoris linea, quauis præualidos lacertos torpescere: quālibet ad cursum ueloces alligari pedes proditur. Torpedo, ut Galenus auctor est, mollem habet carnē & suauem, nec concoctu difficilem: quæ corpus mediocriter alit & aluum modice emollit: qua & nonnunquam in saxatiliū piscium inopia, eorum loco uti liceat. Icesius torpedinem, exiguum in cibo præbere succum tradit:

**C** tit, afficit ea ipsa quam suo in corpore continet, facultate torpendi: (ipsa tamen non torpens) atque ita retardos præ stupore, capit & uelcitur. Abdit se in arena & limo: tum pisces qui adnatantes obtorpuerint, corripit: quam rem plerique à se conspectam retulerunt. Plato torporem appropinquantibus tangentibusue inferre torpedinem tradit. Quinetiam procul & è longinquo, uel si hasta uirgæue aut fuscina attingatur, uel piscatoris linea, quauis præualidos lacertos torpescere: quālibet ad cursum ueloces alligari pedes proditur. Torpedo, ut Galenus auctor est, mollem habet carnē & suauem, nec concoctu difficilem: quæ corpus mediocriter alit & aluum modice emollit: qua & nonnunquam in saxatiliū piscium inopia, eorum loco uti liceat. Icesius torpedinem, exiguum in cibo præbere succum tradit:

**D** & cartilagineum quoddam in se continere, quod stomacho sit pergratum. Diphilus cum alioqui uirosam torpedinem concoctūque difficilem esse dicat: quæ circa caput tamen sunt partes, & teneras esse, stomachoque gratas, & concoctu faciles prædicat: aliàs uero minime: optimas quoque esse quæ paruæ sint, præsertim si in simplici iure coquantur. Torpedo uiua adhuc diuturnis capitis doloribus adinota, cruciatus uehementiam mulcet: id quod illi ob stuporem quem affert accidere putatur. Oleum quoque in quo uiua torpedo sit decocta, uehementes articulorum dolores illitum lenit. Euerfam sedem proci duāque coercet apposita torpedo, ut prodidere quidam. Lieni medetur imposita torpedo. Mirum & quod de torpedine inuenio: si capiatur cum luna in libra fuerit, triduōque adseructur sub dio,

# DE DIFFERENTIIS

faciles partus facere: postea quoties inferatur, adiuuare. Venerem inhi-  
bet fel torpedinis uiuæ genitalibus illitum.

*Rana marina.*

*Rana piscatrix*

βαρφαλας,

βαρφαλας α-

λίας.

Et uisu turpes, & molles tergore ranæ

è planorum piscium genere sunt, quod pro spina cartilaginem habet. Ra-  
nis caput amplum atque spinis asperum: quo fit ut sobolem non recipiat  
intra se. Ranæ non ipsa sua latitudine natant, sed pinnas habet: & quæ pro-  
niori parti accommodantur, eas infra gerunt propter amplitudinem par-  
tis superioris: quæ autem parti supinæ commissæ sunt, eas iuxta caput ad-  
iunctas habent: nihil enim latitudo impedit, quo minus moueantur. Rana  
tamen contra quàm alia plana cartilaginata deductas in latera habet bran-  
chias, eas tamen non spinco tectas operimento continet, (ueluti ea quæ nõ  
cartilaginea sunt) sed cuticula. Posterioiorem partem carnosam habet rana: F

*Plinius, Emi-*

*nentia sub ocu-*

*lis cornicula*

*exerit. Op-*

*pianus, Caru-*

*cula quædã cã-*

*dida sub mëtro*

*enascitur.*

& caudam quoque carnosam & breuem. Dependent illi ante oculos gemi-  
na quædam, quæ longitudine capilli speciem referunt, quorum extrema ro-  
tundis quibusdam præpilantur, quasi escæ causa additis: his, inquam, ubi  
locis arenosis aut sicculæ obturbato solo se absconderit, piscatur attollens  
illa pendentia fila, assultantescq; pisciculos pertrahens, donec tam prope ac-  
cedant, ut eos suum in os adducat. Fel habet rana semotum à icore, intesti-  
nis commissum. Rana cartilaginatorum sola, non animal sed ouum parit:  
quod & solidum durumque est, neque tamen proprie oui similitudinẽ ha-  
bet, cum sit squamosum atque asperum. edit oua simul omnia, & iuxta ter-  
ram. Rana inter cartilaginea fertissimum: uerum quod de facili  
pereunt, hinc efficitur, ut appareant pauca. Ranarum marinarum ex uino  
& aceto decoctarum succus contra uenena bibitur, & contra ranæ rubetæ G  
uenenum, & contra salamandras. Quæ de ranis ad dentium dolores sunt  
descripta, omnia ex marina efficaciora. Ex hoc cartilagineorum pisciũ pla-  
norum genere & bos est, latitudine ingenti: ut qui in duodecim sæpe cubi-  
torum latitudinem porrigatur: corpore in tanta uastitate carnosum, præmol-  
li atque imbecillo. Dentes intus parui & occulti, ac proinde

*Bos, βοῦς.*

-Non uiribus ullis

Confidit: sed fraude uiros in funera pellit.

Hinc grati pastus, hinc mollia membra palato

Grata suo, & seculo nimium iucunda sapore.

*Lamia.*

Non longe à litore uersatur in locis cœnosis. Lamia quoque in hoc carti-  
lagincorum planorum genere est, magnitudine insigni: quæ tamen non-  
nunquam amiarum gregem aggressa, uulnera accepisse uisa est. Et item  
Aquila, αἰεῖς: aquila cum his numeratur, quam & Philorimum inter pisces duræ carnis  
recte adnumerasse dicit Galenus.

βαρφαλας, βαρφαλας.

βαρφαλας.

1 Raia, βαρφαλας, nomen habet ex eo quod cauda quibusdam aculeis constat  
ad similitudinem rubi agrestis mora feretis. Hæc Massarius. βαρφαλας & βαρφαλας Athenzus  
tanquam uarios pisces numerare uidetur. Et Sophron, βαρφαλας piscem quendam nunc  
pauit: sed an idem sit qui βαρφαλας non explicatur. 2 Figura eius testis, &c. Hæc senten-  
tia non habetur in ueteri Aristotelis traductione, & mihi certe uideretur suspecta. 3  
Molliore, &c. βαρφαλας legitur apud Athenzum, sed uide an rectius legeretur βαρφαλας.

- A 4 Squalus (de quo est apud Plinium, nisi exemplaria sint mendosa, quod scilicet autumno parit circa æquinoctium) idem uidebitur forsitan eum squatina: sed Massarius hoc loco non squali, sed galei legendum censet. 5 Obruat, &c. Plinius, Abdira pinna exertas mouet specie uermiculorum. 6 Verberat, &c. *ῥαβδίζονται πῖτε τοῦ θῆτος*, & *ῥαβδίζονται ἐν αἰσῇ* uetus interpres, Cum latuerit, habet in orificio quandā partem sicut uirgam. 7 Venenarius, Huius mali uenenum pulchre describitur ab Oppiano lib. 2. de piscibus. 8 Pinnis natat, &c. iuxta, huic, inquit Massarius, caput parte prona ueluti duo foramina spectantur: os uero infra parte supina, ut pastinacæ. 9 Pinnas habent, &c. Suspectus uidetur hic Aristotelis locus de pinnis ranarum & torpedinis. 10 Bouem numerauit Aristoteles uno in loco cum cetis: forsitan ob ingentem eius magnitudinē, & quodd animal pariat uiuum. Bos quoque à Strabone inter Niloticos pisces numeratur: an idem sit piscis, nondum constat. Item apud Oppianum inter cetos habetur malthe (*μαλθη*) quæ à corporis mollitie nomen traxit: idē ne sit cum boue, an similis? 11 Sed fraude, &c. Quo pacto homines natantes, per fraudem capiat bos, lege Oppianum lib. 2. de pisc. 12 Lamia quoque, &c. *λάμνα* piscis ferrox est cetaceus: an eadem sit cum lamia an diuersa: & an eadem sit, quæ proximo capite carcharius uocatur.

*Malthe, μάλθη.*  
*λάμνα.*

De cartilagineis oblongis, ut de galeis & iis quæ *γαλιόσθι* dicuntur. Cap. CLXIII.

- 1 ET qui galei uocantur, quanuis nō plani, cartilaginei quoque sunt. Quinas hi ex utroque latere adhærentes branchias habent, easque duplices, nouissima excepta. In his circa extremēti ostium, maribus omnibus bina quedam pendent, quibus fœminæ carent. Habet & galeus plures appendices superne circa uentriculum. fel habet iecori annexū. iccur ipsum fissum est: & partes in utroque latere, dextro scilicet & sinistro ita sepositæ sunt, ut non eadem origine contineri uideantur, sed bina esse iecinora. Habet uulua in galeorum genere paulo à præcordiis inferius ueluti mammas albidas, quæ non nisi grauidis insunt. Porro galeorum nō una est species. Differunt autem galeorum generis pisces inter se ratione uteri. nonnullis enim medio uulua circa spinam oua adhærent, ut caniculis: spinaces uero galei oua ad præcordia continent super mammas. Ceteri galei bis anno pariunt, excepta canicula, quæ semel: & qui stellares uocantur, sapissime, quippe qui bis mense putantur parere: quod ideo uidetur, quia oua eorū non simul perficiuntur. Ceteri fœtus suos & emittunt, & metu aliquo imminere recipiunt intra seipfos, præter unum spinacem: maxime hoc faciunt præcylos & alopecius: ceteri minus ob cutis asperitatem. Galeorum plura sunt genera, canicula, quam Græci *κανών* uocant: alij *ῥόσειον*, alij *σκούλιον* uel *σκούμιον*, ἢ *σκούμιον*: uulpecula, quæ & *ἰλάπις* & *ἰλοπικιάς*: spinax uel *ἰσπιδιάς*: & *ἀστέρης*. id est stellaris, quem *πικύλος* alij uocat. Vna omnibus forma uictusque idē est. ueluti cristam habent extantem prope caudam, sed in relinqua dorsi spina nullā. Differunt uero inter se maxime ratione uteri, uti modo diximus. Duram omnes carnem habent. ceteris suauitate præstat, quæ asterias uocatur, teneriorque est & melior, ut Icesius author est. Canicula galeus (ut Xenocrates tradit) & qui illi sunt similes, sapore uirus referunt, & malum procreant succum. Porro caniculæ trifariam dicuntur: unum genus ferrox est, quod inter cetacea numeratur: magnitudine thynnos superat, quos & deuorat.

*Canicula, canis marinus, κανών.*



Hæ urinantes circa spongas, graui periculo infestant: atroxque cum his di-  
 micario. In mari rubro tanta est earum copia, uix ut respicere è naui (nedū  
 3 urinare) tutum sit nauigantibus, remos plerumque ipsos inuadentiū: Theo-  
 phrastus carchariam uocat: & canem carchariam Arcestratus. In amnes  
 nonnunquam subit canicula. Huius caro, quæ prædura atque excrementi-  
 tia est, in uulgi cibum sale maceratur, in quatuor partes dissecta: ingrati au-  
 tem saporis est atque mucosa: idèoque non nisi raro absque sinapi aut oxe-  
 læo, aut alio id genus acri quopiam condimento edi solita. Ex iis qui bene  
 periri sunt, aliud ex aliis membris, aliud ex ore pharmacum colligūt, quod  
 cynosphastum appellant: Nicæder Colophonius carchariam lamiā quoq;  
 uocari tradit, & scyllam. Alterum caniculæ genus centrine uocatur, acu-  
 4 leo insignis, quem ad ceruicem gestat, quod in aliis galeorū generibus non  
 F conspicitur: uel, ut alij produnt, innati sunt iis aculei duri, alter in capitis  
 summo uertice, alter in cauda: atq; uenenatum quiddam habent. cibo in-  
 grata & hæc est grauique odore. Hæc & inter galeodeis pisces numeratur,  
 5 & malefica est ictu aculei uenenofo. Tertium canicularum genus, idèmq;  
 galei species, γαλιός uocatur, id est galeus canicula, & σκύμιος, & σκύμιος, &  
 σκύμιος & σκύμιος. colore est uario. Caniculis hisce in medio uulua: circa spinā  
 oua adhærent: quæ cum accreuerint, absoluta feruntur per uuluam bifurcē  
 annexamque ad præcordia. Caniculæ testacea quædam gerunt in utero, in  
 quibus humor ad oui similitudinem cōsistit. figura eius, testē similis tibia-  
 6 rum ligulis est: meatūsque sunt capillamētorum specie in testis: fœtus de-  
 inde, rupta dilapsāque illa testa proueniunt. Cum ceteri galei bis anno pa-  
 G riant, (uti modo diximus) canicula semel parit in uere. Fœtum ubi aliquis  
 7 imminet metus, in se recipit, & rursus emittit, ut & ceteri galei. Galeus ca-  
 nicula uiroso sapore est, & malum procreat succum. Dentium dolores se-  
 dantur cerebro caniculæ in oleo decocto adseruatōque, ut ex eo dentes se-  
 mel anno colluantur. ἄλωπις ἢ ἄλωπικίς, id est uulpecula, gustu similis est ter-  
 restri uulpeculæ quadrupedi, unde illi nomen. Oua ad præcordia continet  
 super mammas illas: quibus, ut descenderint, iam absolutis, fœtus innasci-  
 tur. Fœtus suos frequentissime emittit & recipit alopecias. Pisces, qui uul-  
 pes marinæ nuncupantur, cum se deglutisse hamum senserint, hoc modo  
 sibi opitulantur: transglutientes magnam lineæ partem usque ad tenuio-  
 8 ra fila, lineam ita abrodunt. Arcestratus, inquit, uulpem galeum piscem  
 H Rhodi optimum esse: & canem pingue à Syracusanis uocari. λακτίς, id est  
 spinaci idem generandi modus, qui uulpeculis est: oua enim ad præcordia  
 9 continent spinaces super mammas illas: quibus ut descenderint iam abso-  
 lutis, fœtus innascitur. Spinax unus ex galeis recipere intra se prolē spinæ  
 impedimento non potest. & hoc quoq; illi peculiare, quod cor habet pen-  
 tagonum. Galei λῶος, id est leues uocati, oua per uuluam mediam, ut canicu-  
 læ gestant: quæ postea in utrumque uteri sinum descendunt, & animal gi-  
 gnitur umbilico hærente ad uuluam, ita ut ouo absumpto, partus non ali-  
 ter atque in quadrupede contineri uideatur. ἀστέρης, id est stellaris, quem  
 ἰσπεύς, stel-  
 laris, πεύκλος alij uocant, parit sepiissime: quippe qui bis mēse putatur parere: quod  
 ideo

Carcharias.  
 Canis carcha-  
 rias, κάρχαρος-  
 χαρίας.

Cynosphastū.  
 Lamiā, scyllā.  
 Centrine, κα-  
 τείνη.

γαλιός κύος,  
 Galeus canic-  
 ula.  
 σκύμιος,  
 σκύμιος,  
 σκύμιος,  
 σκύμιος.

ἄλωπις, ἄλω-  
 πικίς.  
 Uulpecula, uul-  
 pes marina.

Canis pinguis.  
 Λακτίς,  
 Spinax.

λῶος γαλιός,  
 leues galeus,  
 uel mustelus.

ἰσπεύς, stel-  
 laris, πεύκλος

A ideo uidetur, quia oua eorum non simul perficiuntur. ſepiſſime factus ſuos intra ſe recipit & emittit. Cæteros galeos ſua uitate uincit aſterias: eſtq; tenerior & melior, ut Iceſius prodidit. E galeorum genere eſt & qui apud Romanos maximo habetur in pretio, quem galexian uocant. Hic in Græco quidem mari nuſquam uidetur naſci. & cum cæteri galei duriorẽ habeant carnem, hic teneriore carne præditus eſt. Quæ galei uocantur, ita ſe habere palam eſt: quæ autem γαλι, id eſt muſtelæ appellatur, ſimilimæ ſunt mureni: nullamque cum muſtelo communẽtatem habent. in Silphio lacu naſcuntur plurimæ. De muſtela hæc cecinit Aufonius,

*Galexias, γαλις.*

*Γαλι, muſtela. Murenis, τὰς τανόρας.*

Quæque per Illyricum, per ſtagna binominis Iſtri

Spumarum indiſci caperis muſtela natantum,

B In noſtrum ſubuecta fretum: ne lata Moſellæ

Flumina tam celebri defraudarentur alumno,

Quis te naturæ pinxit color: atra ſuperne

Puncta notant tergum, quæ lutea circuit iris:

Lubrica cæruleus perducit tergora fucus.

Corporis ad medium fartim pingueſcis: at illinc

Vſque ſub extremam ſqualet cutis arida caudam.

Vt uero alij, muſtela breuis piſcis eſt & iccorino adeo ſimilis, ut eundem ei ſe diceres. Pupillæ oculorum ad cyaneum colorem accedunt: eius mentum quàm iccorini maius eſt, & minus quàm chremyris. algas depaſcitur, & faxatilis eſt: atque ſimiliter ut muſtela terreſtris omnium cadauerum in quæ

C inciderit, oculos exeſt. Proxima eſt ſcaris mæſa generis dūtaxat muſtelarū, inquit Plinius, quas mirū dictū inter Alpes quoque lacus Rheticæ Brigan-

10 tinus æmulas marinis generat. Comitiali morbo correptis datur muſtelæ marinae iecur.

*Muſtela marina.*

1 Galei uocantur, &c. Theodorus muſtelos uocat. 2 Squalus, ut equidem arbitror, apud Pliniū lib. 9 galeus eſt, cap. 24 & 51: quanquam Maſſarius in priorẽ capite non ſqualum ſed galeum legi mauult. 3 Pugna ſpongiarorum cum canibus marinis pulcherrime deſcribitur à Plinio lib. 9. 4 Scyllam, &c. Eſt apud Oppianum ſcytale, quæ in alto degit pelago, raro lirora adiens: uide an ſit eadem quæ ſcylla, an Oppiani exemplaria ſint mendosa, & legendū potius ſit σκυλλαι pro σκυταλαι. 5 An idem piſcis hic ſit, qui apud Ouidium in Halieuticis inter pelagios piſces numeratur:

*Muſtelus.*

*Squalus.*

*Scytale.*

Cercyrósque ferox ſcopulorum ſine moratus,

uel cetucuros, κερκυρος apud

*Cercyros, cetucuros.*

D Oppianum, qui in ſaxorum cauernis uiſitat. 6 Suſpectus mihi quidem uidetur hic Ariſtotelis locus, uti prius in ſcila admonui. 7 Quomodo ſerum emittit & recipit, docet Oppianus lib. 1 de piſc. 8 Hoc in loco libentius ſecuti ſumus ueterẽ Ariſtotelis interpretem quàm Theodori uerſionem, ex Oppiani quoque & Plinij auctoritate. 9 Spinaces, inquit Maſſarius, ſic à ſpinis quæ binæ & albe eminet dorſo nuncupati. 10 Marinis, aliàs murenis, ſed potius legendum arbitror marinis: ut ſcilicet comparentur muſtelæ, quæ lacuſtres ſunt, marinis piſcibus uel optimis, uel marinis, ſcilicet muſtelis, de quibus Plin. hoc loco lib. 32: & inter marinos piſces Columel. lib. 8 auidas muſtelas habet: & Ennii uerſus eſt apud Apuleium apolog. prima,

Omibus ut clupea præſtat muſtela marina.

De piſcibus longis.

Cap. CLXV.

Q Vi longi ſunt piſces & corpulenti, ut anguilla, conger, ut mugilū genus quod in lacu Sypharum naſcitur, parte corporis prona binas ha-

bent pinnas: sed quæ in cæteris piscibus supina parte habetur, carent ex iis E nonnulli. Iis uero qui prælongi sunt & serpentis speciem magis referunt, nullæ omnino sunt pinnae, ut murenæ: sed flexuoso impulsu corporum ita humore utuntur, ut terra serpentes: & iis neque branchiæ integræ sunt atque discretæ, ut cæteris piscibus habentur. Genus piscium longum aquiloniis locis melius uiget. Et quidem æstate loco eodem in aquiloniis plures longi quàm lati capiuntur.

De murena & aliis quibusdam longis.

Cap. CLXVI.

*Murena,  
Μύρηνα.  
Ταφροσία.  
Ταφροσιος.*

*Myrus,  
Μύρος.*

*Ardens auratis  
murena notis,  
inquit Ovidius.*

*Alias, lætatu*

*Hæc Ovidius  
in Halieuticon  
tribuit,  
non murena.*

**M**urena prælongus piscis est, & serpentis potius quàm piscis speciem i referens. pinnas nullas habet: sed flexuoso impulsu corporis adnatatum ita mari utitur, ut terra serpentes ad gressum: modòque simili repit in humore, & in sicco quoque nonnunquam: nec ullæ huic branchiæ, inquit Plinius. Licinius Macer murenas tantum fœminini sexus esse tradit: Aristoteles myrum uocat maræ qui generat. Discrimen, quòd murena uaria & infirma est: myrus unicolor & robustus, colore laticis. Myrum præterea, Dorian author est, nullas per carnem sparsas habere spinas: sed totum in alimentum utilem esse, & carne admodum tenera. Sunt uero duo eius genera, alterum nigrum, alterum subrufum est: præstat qui niger est. Ad murenam reuertamur: dentes tam intus quàm extra os possidet. In Gallia septentrionali murenis omnibus dextra in maxilla septenar maculæ ad formam septentrionis aureo colore fulgent duntaxat uiuentibus, pariterque cum anima extinguuntur. Tenuissimum his tergus, contrà anguillis crassius. Branchias non habet murena integras articulatasque, ut ceteri pisces: quaternas tamen utrinque possidet, & eas simplices. Fel habent murenæ semotum à iecore, intestinis commissum. exeunt in terram, & sæpe in ea capiuntur. Licinius Macer (ut diximus) murenas tantum fœminini sexus esse tradit: & concipere è serpentibus in siccum litus elapsas, id quod falso credi affirmat Andreas. Murenarum certe coitus, ut & Aristoteles prodidit, complexu mutuo supinarum partium agitur, ut serpentum. Murena omnibus anni temporibus parit oua parua: cuius partus & numerosior est, & ex paruo in maximum cito adolefcit. Murena neque in stagnis gignitur, nec temere fluuios ipsam subire inuenias: nonnunquam tamen & quæ in utroque uiuicunt, in mari scilicet & aqua dulci, reperiuntur. Partim pelagia partim litoralis murena est, sed fere in saxorum cauernis degit: & sola ex pretiosis piscibus (quanuis Tharsensis Carpathiisque pelagi quod est ultimum, uernacula) quouis hospes freto, peregrinum mare sustinet. Sola carne uescitur murena. pinguescere lætatu traduntur. latent autem quibusdam anni temporibus. Ouidius prodidit in eo uolumine quod Halieuticon inscribitur, murenam rete circumdatam maculas appetere ipsas consciam teretis ac lubrici tergi: tum multiplici flexu laxare donec euadat. Murena ut hæserit hamo, amplius deuorat hamum, admouetque dentibus lineas atque erodit. Idem infixam hamo inuertere se, quoniam sit dorso cultellato, spinæque lineam præsecare. In piscinis nonnullis commisceri eas cum alterius notis piscibus

A piscibus non placet: quia si rabie uexantur, quod huic generi uelut canino solet accidere, saeuissime persequuntur squamosos, plurimósque mordendo consumunt. Fuste non interimi murenas aiunt, easdem ferula protinus. Animam in cauda habere certum est, (inquit Plinius) eaque icta celerrime exanimari: at capitis ictu difficulter. Nouacula & ferrum quæ pisce tacta sunt, olent. Murenæ morsus uenenosus est: eademque comitantur symptomata, quæ uiperæ morsum: uerum perniciosas illas teretes esse minoresque ac uarias, atque è uiperâ prognatas tradit Andreas. Murena polypo hostis est & carabo, atque cum utroque pugnat. Probantur ex murenis maxime è Siculo freto quæ *ῥαῖναι* & Latine flutæ dicuntur, quod in summo supernatantes, sole torrefactæ curuare se posse, & in aquam mergere desinant: atque ita faciles captu sint. Carnem habet murena nec durâ nec mollem, sed mediocrem: quæ tamè in uitiosis aquis degunt, pessimæ sunt. Alunt murenæ, inquit Iccius, nō minus quàm anguillæ aut conghi. Murenæ morsus, ipsarum capitis cinere sanantur. Lichenas & lepras tollit murenarum cinis cū mellis obolis ternis. Est & murena quædam fluuiatilis, cui spina unica est, ut Dorion prodidit, non aliter quàm asellorum generi, quod callariam dicunt. Serpentis quoque speciem refert anguilla, piscis longus ac leuis: binas habet pinnas iuxta branchias, quas utrinque quaternas gerit simplices, easque exiguas: gula quoque illi exigua: sel in iccore inest. In omento sebū pinguius paucum, & in paucis inest: plurimæ eo carent. Nō est in iis genus masculinum: solum fœminæ: nec per coitum procreant, nec pariūt oua. Nec uero capta unquā aliqua est, quæ aut semen genitale aut oua haberet. Meatus quoque uel semini uel uulvæ accommodatos nulla rescissa ostendit: sed hoc unum fere inter sanguinea genus totum sine coitu, sine ouo procreatur: quod ita esse argumento constat, quod in nonnullis fœculētis stagnis, aqua omni exhausta, & limo detracto, anguillæ denuo generantur ubi aqua accesserit pluuia: nam siccis temporibus gigni nequeunt, etiam in stagno perenni: quippe quæ imbre & uiuant & alantur. Conuolutis sibi inuicem anguillis attritu corporum mutuo, ut nonnulli tradunt, mucor quidam in arenam limumque distillat: ut uero aliis uidetur, atterunt se scopulis: ea strigimenta uiuescunt. nec alia est earum procreatio: nam anguilla neque mas neque fœmina est, ut modo diximus, neque prolem ex se aliqua potest procreare. Quam autem differentiam maris & fœminæ anguillæ notauit quidam, scilicet alteram caput habere amplius atque oblongius, alteram, hoc est fœminam, repandius, hæc non maris ac fœminæ differentia est, sed generis: non sunt enim fœminæ, sed quia aspectu à cæteris differunt, fœminæ appellantur. & sunt in anguillarum genere meliores quæ fœminæ uocantur. E fluuiis in mare descendunt anguillæ: & in utroque humore degunt, marino scilicet & dulci. Anguillæ octonis uiuunt annis: durat & sine aqua senis diebus aquilone spirante, austro paucioribus. At hyemem eadem in exigua aqua non tolerant, nec in turbida: ideoque circa uergilias maxime capiuntur, fluminibus tum præcipue turbidis. Anguillæ paucae quædam cer-

*Plotæ flutæ.**Murena fluuiatilis.**Anguilla.  
Ἐγγελλος.  
Ἐγγελλος.**Mucor, ἰχθυός.*

tiſque locis uſcuntur limo atque eduliis, ſi quis apponat: ſed plurimæ dul- E  
ci humore uiuunt, idq; qui uiuariis anguillariis dant operam (ελχλιοφόροι  
dicuntur) ſummo opere curāt, ut quā maxime pura ſyncerāque ſit aqua af-  
fluens ſemper & efluens per ripas, ubi uiuaria extruuntur: in turbida nanq;  
breui ſuffocata intereunt: ideoque quo caſ facilius capiant, aquam pertur-  
bant. paſcuntur noctibus: interdū in luto quieſcunt. exanimes piſciū ſolæ  
non fluitant. Anguillæ quanuis uel ex puriſſima capiantur aqua, ſuccum  
probum nunquam efficiunt, ſed lentum pituitoſumq;. Et anguilla paluſtris  
ſapore magis ingrato eſt quā marina: ſed uberius alit, ut Diphilus author  
eſt. Iceſius autem anguillas inter piſces optimum procreare ſuccū, & ſto-  
macho admodum gratas eſſe prædicat: abundēque nutrire, & edētes facile  
ſaturos reddere. & Macedonicas anguillas inter ſaſcimenta numerat. Cō- F  
ger (quem & gongrum appellant) gryllus quoque à nonnullis uocatur, an- 6  
guillæ ſimilis eſt, lōgus leuiſque ac lubricus. Pinnulas tantum binas habet:  
& binas utrinque brāchias, alteras ſimplices, alteras duplices. gula illi exi-  
gua eſt. In fellis ſitu ambigit: aliis enim ad iecur, aliis inſtrā ſepoſitum adhæ-  
ret ſel. Conger ad ingentem creſcit magnitudinē, præſertim in Sicyone, ut  
Eudoxus author eſt. Congrorum generatio, ut Oppianus tradidit, nō aliter  
fit atque anguillarum, attritu ſcilicet corporum mutuo, indēque mucore  
quodam in arenam limūmuc diſtillante ex quo naſcuntur conghi. uerūm  
ut Ariſtotelei uidetur, conghi ſœturam intra ſe continent, ouum ſcilicet, ſed  
minime arenidum, quale in piſcibus cernitur qui ſquamis integūtur. Nec  
ipſa ſœtura ſatis patet in utero pinguedine obelo: eſt enim prolixiuscula, ut G  
in ſerpentibus, quod certe ignis periculo innotefcit: pingue enim abſumi-  
tur atque euaporatur, oua autem crepitant & extruſa diſſiliunt. ad hæc ſi  
palpites & atteras digitis, pingue leue utique ſenſeris: ouum autē duriuſcu-  
lum. Congri itaque alij pingue habent, ouum nullum: alij contrā, pingue  
nullum, ouum autem quale modo expoſui poſſident. Congrorum genus  
duplex, albicantes pelagij ſunt: at uero nigricantes ambigunt, partimq; pe-  
lagij, partim uero litorales ſunt. Viſitant autem frequenter in paludibus  
& ad fluuiorum oſtia, ubi copia inſluit aquæ dulcis:

Et fluctus cœno commixtus uertice multo  
Voluit à terra.

Carne tantum uſcuntur conghi, uti docet Ariſtoteles. Congri polypos c- H  
dunt: leue enim & lapſum conghi cotpus uſum hoſtis in dimicatione effu- 7  
git. Conger & murena caudas inter ſe prærodunt. Conger, ut Philotimo  
placet & Galeno, duram carnem habet: quæ tamen concoctu non admodū  
difficilis eſt, uti Xenocrates docuit, nec mali ſucci. Nutrit copioſe, uerūm 8  
ori non adeo gratus eſt. Acus ſiue belone, quem & aculeatum uocamus &  
rhapsida, piſcis eſt longus, tenuis & leuiſ, roſtro præacuto & in cornu mo-  
dum duro. Dentes non habet, ut refert Athenæus: ſel habet iecori annexū. 9  
ſœtificat ſero, & hyeme parit. Vnus piſcium deſiſcēte utero non tam pro-  
pter multitudinem ouorum, quā magnitudinem parit: habet enim hic tri 10  
mam quandam ſub uentre imo, ut cæcæ ſerpentes, τριζλίους uocant, à partu  
uiuit

*Anguilla Ma-  
cedonica,  
Cōger, Cōger,  
Γόγγρος.  
Gryllus.*

*Acus, belone.  
Rhapsida,  
Aculeatus,  
Αἰχμώδης.*

- A uiuit, & uulnus coalescit: & modo phalangiorum proles parentem offusa circumdat, & si tetigeris, fugiunt. Victitat belone locis partim saxosis, partim arenosis. Postquam laqueos retiâque piscatorum euaserit belone, uti refert Oppianus, dum conuersa morfu lacerare retia cupit, dentibus hæret in lino, atque ita capitur. Stomacho minime grata belone est: malum procreat succum, facileque corrumpitur & parum nutrit, ut Xenocrates prodidit: ut uero Diphilus, concoctu difficilis est, sed probum efficit succum. Belone sphyrena similis est, eam Athenienses cestram dixere. *Sphyrena. Sudis. Cestra.*
- B bitur: adeo lubrico est tergo. Gregatim degunt sphyrenæ. sapore nõ admodum grato sphyrena est: sed succum gignit bonitate mediocrem, & qui copiosius nutriat, quàm qui è congro. Zygena piscis longus est, ut prodidere quidam: ab aliis uero inter cete numeratur ferocissima. Zygenæ seladnexum iecori est. Caro zygenæ & dura est & insuauis. Zygena cū sit aspectu infausto infelicique, non est prospera nauigantibus. Forma (ut Oppianus scribit) anguillæ proxima est echeneis, pisciculus sesquipedalis: quinque digitorum crassitudine, ut Trebius Niger prodidit. Qui eum uidere, inquit Plinius, limaci magnæ similem esse dicunt. Saxis assuetus est, pelagiûsque, raro litora petens, colore nigricante fuscoue: rostro *Zygena. Libella. Echeneis. Eχεναις. Remora.*
- C bere prodiderunt: expes autem omnino est: sed quoniam pinnas habet pedibus similes, hinc fit ut pedibus instare uideatur. Hoc pisce carinis adhærente, naues tardius ire creduntur, inde nomine imposito. & è nostris quidam Latinis remorâ appellauere eū. Ruant uenti licet, & sæuiant procellæ, imperat furori, uirêsq; tantas cōpescit, & cogit stare nauigia, quod non uincula ulla, non anchoræ pondere irreuocabili factæ. Hæc prætoriam Antonij nauim Acciaco marte tenuisse fertur: & postea Caij Caligulæ. Ad mirandum certe, quomodo adhærēs teneat, nec idem polleat in nauigium receptus: mirumque è Græcis alij lubricos partus atque procidentes contineri ad maturitatem alligato eo, prodiderunt: alij sale adseruatum adalligatumque grauidis, partus soluere: ob id alio nomine odynolyontê appellari. Præterea hæc esse eius uim adseruati in sale Trebius Niger arbitratur, ut aurum quod reciderit in altissimos puteos, ad motus extrahat: tamen in cibos non admittitur. Oblongo corpore musculus est, *Odynolyon. Alias, appellauere.*
- D lar. Oblongo corpore musculus est, *Musculus marinus. Musculi περ.* Græci uocant, piscis paruus, cauda tenui. Dêtes nullos habet: sed pro his, setis, suillis similibus intus os hirtum, & linguam etiam ac palatum. Balenam antecedit musculus, os oculorum uice fungitur, monstratque uiam ducitque per æquor, nec balenæ solum dux est, sed & ceterum aliorum, ut tradit Oppianus: nam cete non lōge cernunt. *Alias, & linguâ etiam appellatam. Βαλνα.*
- 13 nus: nam cete non lōge cernunt. *Βαλνα* in quodam Lybiæ fluuio nascitur septenium cubitorū, quæ branchias habent perforatas, ita ut per eas respice rare possint, inquit Strabo. *Βαλνα*, id est hirudines, quas & sanguifugas uocant, nonnulli captas seruant: diuersus etenim earum ad extrahendū san-
- 14 *Hirudo. Sanguifuga. Βαλνα.*



guinem usus est. quippe eadem ratio earum, quæ cucurbitarum medicina- E  
 lium ad corpora leuanda sanguine, spiramenta laxanda, iudicatur: sed ui-  
 tium, quoddam admissæ semel desiderium facere circa eadem tempora anni  
 semper eiusdem medicinæ feruntur. decidunt satietate & pōdere ipso san-  
 guinis, aut sale cineræ asperæ. Quoddam si forte hirudinum penuria sit, aut  
 cum admouentur, pauciores quàm pro desiderio adhæserint, forcipe cau-  
 da inciditur: ita enim fiet ut effluente ex ipsis sanguine, ab attractione non  
 desistant, donec cinere aut sale aspergatur. Scire autem oportet, hirudines  
 non sanguinem qui in intimo corpore est extrahere, sed eum qui in extre-  
 ma carne cōtinetur, exugere. Aliquando, inquit Plinius, affixa relinquunt  
 capita: quæ causa uulnera insanabilia facit, & multos interimit: inuehūnt-  
 que uirus remedio uerso: maximèque rusæ ita formidantur. Ergo sugentia F  
 ora forcipibus præcidunt: ac ueluti siphonibus defluit sanguis, paulatimq;  
 morientium capita se contrahunt, nec relinquuntur. Hæc Plinius. Incedūt  
 hirudines parte corporis priore præcedente, & quod reliquum est corpo-  
 ris, ad illam contrahunt: & hoc quidem pacto, uno ex loco in alium ferun-  
 tur. Capillū denigrant sanguisugæ, quæ in uino nigro diebus quadragin-  
 ta computruere: alij in aceto sextariis duobus sanguisugarum sextarium  
 in uase plumbeo iubent putrescere totidem diebus, mox illini in sole.  
 Sornatius tantam uim habere tradit, ut nisi oleum ore contineant qui tin-  
 gunt, dentes quoque eorum denigrari dicat. Palpebrarum & aliis quoque  
 locis nascetur pilorum, psilothrum sanguisugarum cinis ex aceto illitus  
 esse putatur. comburi eas oportet nouo uase fictili. In Gange Indiæ 16  
 Sebosus haud modico miraculo affert uermes brachijs binis LX cubitorū G  
 caruleos nomine & colore, (hi nomen à facie traxerūt) adeo robustis uiri-  
 bus, ut elephantos ad potum uenientes, mordicus cōprehensa manu ipso-  
 rum, rapiant in profundum. Ctesias Gnidius author est, in Indo fluuiio be-  
 stiarum ferarum experte, uermen nasci, qui eorum qui in ligno gignūtur  
 & aluntur uermium, speciem habet. Hunc ad septem cubitorum longitu-  
 dinem, & eo amplius excrecere: cuius crassitudinem decem annos natus  
 puer manibus uix circūplecti queat. Huic in superiori oris sede unus dens  
 inest, in inferiori alter: ambo quadrāguli cubitalem longitudinem habēt:  
 & quodcunque siue animal siue lapidem comprehenderit, facillime cōte-  
 rit. Interdiu ima in sede fluminis uersatur, noctu ad terram procedit, & in H  
 quodcunque inciderit, uel equū, uel bouem, uel asinum cōficit, atq; in suas  
 sedes trahit: & in flumen abstrusus, membra omnia, excepto uentre, exest.  
 Ac si interdiu fame premitur, siue camelus siue bos in ripa bibit, uiolenti-  
 simo impetu, summa labra mordicus comprehendit, & robusto tractu in  
 aquā protrahit, edit. eius pellis duorum digitorum crassitudine est. Hūc  
 cum ceperint, triginta dies appēsū tenent: atq; ex eo in fictilia uasa cras-  
 sum oleum stillat, quod quidem ipsum regi Indorum apportant. Huius ea  
 est uis olei, ut sine ullo igne eius infusa hemina, quencunque lignorum a-  
 ceruum comburat. Ac si uel hominem uelis, uel aliud animal exurere, pri-  
 mum ut hoc infuderis, funditus statim deflagrauerit.

*Hirudines  
rusæ.*

*Ceruleus  
vermis.*

- A 1 Etiam lib. 1. hystor. animalium uidetur Aristoteles murenam separare à piscibus natandi modo. 2 Pliniani codices plurimi pro myro myrinum habent: uerū my- *Myrinus.*  
rino, ut Aristoteli placet, (Theodorus murinum uocat) imbres nocent: sit enim ut plu- *Murinus.*  
uiis multo exaceretur, si modum aqua excesserit. Colore laricis, *ῥυμινος* τῆς μυρίδος ita legit  
Theodorus: Athenæus uero *ῥυμινος*, id est colore auis, quæ iynx dicitur: cui lectioni cōsen-  
tire uidetur & uetus Aristotelis interpres. Sed scrupulus restat, quod Athenæus addi-  
dit, *ἁλὸς τῶν ῥυμινῶν ὡς ῥυμινῶν*, ut scilicet in omnibus partibus tam externis quàm inter-  
nis unius sit coloris. Nihil uolui mutare, sed admonere. Smyrus etiā à Plinio inter ma- *Smyrus.*  
rinos pisces numeratur, uerum tanquam alietius generis à murena. 3 In utroque.  
Inter eos pisces numeratur etiā à Galeno, qui in utroque humore, scilicet in mari &  
aqua dulci uiuunt, in lib. de cib. bo. malleque suc. 4 Vetus codices nonnulli  
habent, Nouacula pisce quæ tacta sunt, ferrum olent, ut sit nouacula piscis. 5 Sicu- *Nouacula.*  
lo frero, &c. Martialis lib. 13.

Quæ natus in Siculo grandis murena profundo,

Non ualet exustam mergere sole cutem.

- B Flutæ Theodorus etiam *ῥυμινος* flutas interpretatur lib. 4 hystor. animalium. Rhyades *ῥυμινος.*  
quoties piscium lotura uel naui sentina eiecta est, fugiunt ut odorem sentientes. Libro  
autem quinto, rhyades per æstatē pariunt: Theodorus spargos uocat. Libro 6, rhyadas *Spargus.*  
piscium genera dixit solitaria, id est quæ solitarie uagantur: *ἰσὶ δὲ ῥυμινῶν τῶν ῥυμινῶν*  
*τῶν ῥυμινῶν*, id est: parit solitariorum genus in uere. Sed uide ne mēda in his locis sub-  
sistat in Græcis exemplaribus, 6 Gryllus, inquit Diphilus, similis est anguillæ, sed in-  
suauis. 7 Vescuntur. Hæc non de congro, sed de murena narrat Oppianus. A liter  
hunc locum uertit Theodorus, sed nos hic & Græcam secuti lectionem, & ueteris in-  
terpretis sensum ita dedidimus. Et ex Plinio quoque lib. 9 polypum congre lace-  
rant. 8 Ori non adeo gratus *ἰσὶ δὲ ῥυμινῶν*: forsitan *ἰσὶ δὲ ῥυμινῶν* apud Oribasium.  
9 Duro. Addit Massarius, dorso cæruleo ad uiride inclinante: uentrēque argen-  
tei coloris. Et Alberus Magnus Spinam habet uiridis coloris. 10 Piscium de-  
hiscence. Dehiscence propter multitudinem utero, inquit Plinius. 11 Sphyræna.  
Mirum quoddam dicat Plinius hunc & alios quosdam pisces, de quibus in hoc lib. 32 scri-  
bit, à nullo auctore nominatos. Sphyræna Theodorus malleolum uocat. 12 Sef- *Malleolum.*  
quipedalis. Apud Plinium leguntur hic quidam, semipedalis. 13 Brachias habet per-  
foratas. Et gulam perforatam habent ad respirandum: Alianus. 14 *ῥυμινῶν*  
*ῥυμινῶν*, id est emulgerē: sanguinem nanque cuti admotæ exugunt. Quo pacto ser-  
uantur, atque ad usum accommodantur, monstrat Galenus lib. de hirudinibus. 15  
Branchiis binis. Alias, brachiis binis 1 x cubitorum. Solinus ita habet, Hi bina habet  
brachia longirudinis cubitorum non minus senum.

De planis piscibus, qui *ῥυμινῶν* dicuntur, id est qui passeri-  
na sunt specie. Cap. CLXVII.

D

**Y** *ῥυμινῶν* τῶν ῥυμινῶν, id est pisces qui passerina sunt specie (qui & plani uo-  
cantur) eodem modo natant quo coelites, & altero oculo orbatu ince-  
dunt: nam eorum natura à recta figura peruersa est. Psettaceum genus non  
coit: nec enim in eo genere mas est, sed oua in omnibus reperiuntur. Limosa  
1 regio, ut Columella prodidit, planum educat piscem, ut soleam, rhombum  
& passerem. Cibo suasues sunt, & probe nutriunt rhombus, passer & buglof-  
sus. Passeres à rhombis situ tantum corporum differunt, dexter resupina-  
2 tus est illis, passeri leuius. *ῥυμινῶν*, quam passerē uocamus, buglossus similis quo-  
dammodo est: non tamen omnino eiusdem speciei: buglossus nanque caro,  
ut Galenus affirmat, & tenella magis est, & in cibo suauior, atque in omni-  
bus præstantior quàm passeris: quanquam nec illius caro dura est, sed me-

*ῥυμινῶν*  
*ῥυμινῶν*  
*Planus piscis.*

*Passer,*  
*ῥυμινῶν, ῥυμινῶν.*  
*Rhombus,*  
*Buglossus.*

diocris. Xenocrates autem buglossum & psettam, carnē habere duram & E corruptioni minime obnoxiam, probūque gignere succū & aluum mediocriter ciere prædicat. ut uero Diphilus, psetta & buglossi suaves sunt, & copiosum præbent alimentū. Buglossi caro, ut docet Galenus, ex iis est, quæ succum gignunt neque crassum admodum neque tenuem, sed qui usquequaque mediocritatem obtineat: qua & in saxatiliū penuria eorum loco uti licebit. neque uictus utrique prorsus eadem ratio est: buglossus nāq; loca arenosa magis, passer cænosa amat. Cynoglosson quoque psettam uocant Athenienses, à buglossō diuersum. Rhombum Diphilus buglossō & psetta nihilo deteriore iudicat: quod scilicet ad saporis gratiam pertinet, alimētū, quod ex eo præstatur copiam. Mediocritatem obtinet rhombus inter duram & mollem carnem ait Galenus: asello tamē durior est. Xenocrates autem duram esse eius carnem, nec facile corrūpi posse: oportere uero rhombum magnum uno die adseruatū, postea coquere: in uentriculo egre concoctionem pati, sed nutrire abunde. A rhombis passerēs (uti modo diximus) situ tantum corporum differunt: dexter resupinatus est illis, passeri leuius. Latus admodum piscis rhombus est, uel Martiale teste:

Quauis lata gerat patella rhombum:

Rhombus latior est tamen patella.

Rhombi abditi pinnas exertas mouent specie uermiculorum: ita Plinius, Aristoteles uero de ῥόμβος. Cum nullam, inquit, sui corporis partem intectā reliquerit, uerberat radiolis sui oris, quos piscatores uirgulas uocant: quas 4 pisciculi cum aspexerint, adnātant quasi ad algas quibus uesci soliti sunt. G Lieni in edetur (ut aiunt) rhombus uiuus impositus, dein remittitur in mare. Buglossō atque passerī similis tania est, piscis tenuis gracilisue, & in cibo quoque gratus, & qui paruo igne indiget. pinnas habet tantum binas. Tanix frequētes & optimæ nascuntur in Alexandria Canopo & Seleucia Antiochia. Tanix iecur siccatum pondere xiiii cum oleo cedrino per unctis pilis ix mensibus, psilothrum palpebrarum esse putatur. Citharus 6 piscis planus rhombo similis est: uerum rhombus teneriorem habet carnē. neque huius tamen caro dura est, sed mediocris, uti iudicat Galenus. Est autem, ut Xenocrates prodidit, stomacho ingratus: malum procreat succum, sed non facile corrumpitur. Alga pascitur, in arenosis locis uictitans. Dentes habet ferratos, linguam solutam, cor album atque latiusculum. appen- H dices habet plures superne circa uentriculum. In hoc genere alius rufescit aut flauescit, alius candidior est. Hæc ex Athenæo. In mari rubro, inquit Ælianus, piscis nascitur, cuius corpus ita figuratum est, ut similitudinem lingulæ eius latitudo gerere feratur. Squamæ non magnam tangenti asperitatem habent. subaureo est colore, & lineis à summo capitis uertice ad extremā caudam sic distinguitur, ut eas cytharæ fidiculas contentas esse dicas, unde is citharus appellatur. Os illi pessum it & subdidit, idēq; nigerimum est, atque cingulo croceo circumligatur. uertex uarietate distinguitur, fulgore aureo & nigris quibusdam lineis. Pinna aureas habet. rufo colore multipliciter nariatur. Cauda est nigra præter extrema: ea enim candidissimo

ῥόμβος  
ῥόμβος dixit  
Archestratus.  
Cynoglossus.  
Rhombus.

ῥόμβος.

Tania, tania.

Alia hoc loco  
Plinius legunt  
channæ iecur.  
Citharus.  
κίθαρας.  
κίθαρας.  
κίθαρας.

A didissimo colore asperguntur. Alij item picti nasci dicuntur, toto corpore purpurei, certis intervallis aureolas possidentes: eorum uero caput cingulis uiolaceis illustratur, uno quod est ante oculos ad branchias pertinente, altero secundum oculos usque ad medium caput excurrente, alio autem tanquam monili sic collum circumplicante. Piscis est, ut nomen indicat, Apollini sacer, ut & Apollodorus author est, sicuti cytheria Veneri. Inter planos pisces, ut author est Dorion, unà cum psetta & buglossus numeratur & elcharus, quem etiam corin uocant. Lato quoque generi epodas ex Ouidio adiecit Plinius, eorum ex numero quorum nomina apud neminem alium reperiuntur.

*ῥέγγος.*  
*Cytheria.*  
*ἑλαργός.*  
*κορίν.*  
*Epodas.*

**B** 1 Rhombum, &c. Nusquam Aristoteles (quod meminerim) rhombum nominat, sed *ῥήγματος*: & (ut refert Athenæus) Latini *ῥήγματος* rhombum uocant: Theodorus passerem interpretatur. Galenus *ῥήγματος* à rhombo distinguit, & pro una specie *ῥήγματος* accipit, quam Plinius passerem uocat, & nonnunquam psetta: ita & Athenæus frequenter. itaque *ῥήγματος* quasi genus uidetur esse rhombo & passeris: & item unam significabit speciem, passerem scilicet, uel sentit Hermolaus in annotationibus in Plinium. Passer inter aues *ῥοῦδος* uocatur: at *ῥοῦδος* pisces est apud Aristotelem alius à passere, cui felis inquit, non longe à icore est intestinis commissum. Theodorus non habet. 2 Buglossus. Buglossus. Coniicit Hermolaus buglossum latine soleam dici: & quem Plautus atque Varro lingulacam nominant, aut solea est, aut illi non absumilis. Plauti locus est in Cassin. cum dixit uillius, Vin lingulacam? (Respondit senex) Quid opus est: quando uxor domi est: ea lingulæa est: nam nunquā tacet. De solea & psetta ita refert Plinius. Terra quidem, hoc est uado maris excauato, eondi per hyemes psetta soleamque tradunt. Item, soleæ cum rhombis non intrant pontum. Lieni medetur solea piscis impositus. & Ouidius in Halieut.

*ῥοῦδος.*  
*Buglossus.*  
*Solea.*  
*Lingulaca.*

**C** Citus. & Ouidius in Halieut.

Fulgentes soleæ candore: & concolor illis  
Passer: & Adriaco mirandus littore rhombus.

3 Dexter resupinatus, &c. Addit Massarius asperum esse rhombum: quandoquidem ossa quædam rotunda aculeata habeat, quemadmodum raia. 4 Verberat, &c. *ῥαβδίζουσι τοὺς ἰχθύας ῥαβδοῖς, ἢ κελεύων οἱ ἄλλοις ῥαβδοῖς*, Verus interpres, Et cum latuerit, habet in officio quandam partem sicut uirgam. 5 *ταύριος* Theodorus uitram uocat. Tenius gracilisue, *λεπτή*. 6 *κινίτης* sunt apud Athenæum: an iidem pisces, an potius legendum sit *κινίτης*? 7 Cytharus, &c. *κινίτης* etiam dicitur: *κινίτης* apud Pollucem, an sit idem? 8 Lato quoque, &c. Ouidius quoque in Halieutic. latos epodas cū solea, passere & rhombo connumerauit.

*Vitra.*  
*κινίτης.*  
*κινίτης.*

De piscibus quibusdam litoralibus saxatilibusque, de scaro.

Cap. CLXVIII.

**D**

1 **A** Pud antiquos nobilissimus habitus accipenser nullo nunc in honore est, inquit Plinius: sed scaro datur principatus hodie: ut qui ceteros omnes suauitate præstet. Hic solus piscium dicitur ruminare: huic etenim uni aquatiliū dentes plani & non ferrati. Litoralis piscis scarus est, circa petrosa herbosaque loca degens: herbis namque uescitur & phuco præcipue. Solitarius hic est, (ut author est Aristoteles) & carniuorū quoque. Sed Plinius, herbis, inquit, dicitur uesci, nō aliis piscibus. Linguam habet parua, & quæ ori non ualde adhareat: cor triquetrum & candidum, lienem nigrum. Superne circa uentriculum exeunt appendices complures. binas utrinque branchias habet, alteras simplices, alteras uero duplices. ætate opti

*Scarus.*

mus habetur. Noctu fere nō capitur: dormit enim in cauernis latitans. So-  
 lus piscium, ut refert Oppianus, magnam edit uocem. Vacat Eurypus Py-  
 ræus scaro & thryssa, & reliquis spinosioris generis: ita Aristoteles. Scarus, 3  
 inquit Columella, totius Asiæ & Græciæ litoribus Sicilia tenus frequen-  
 tissimus exit. nunquam in Ligusticum, nec per Gallias enauit ad Ibericum  
 mare: itaque ne si capti quidē perferantur in nostra maria, diuturni quæ-  
 possideri. Vti uero Plinius refert, scarus mari Carpathio frequēs, promon-  
 torium Troadis Lectum sponte nunquam transit. Inde aduectos Tyberio  
 Claudio principe Optatus præfectus classis, inter Hostiensem & Campa- 4  
 niæ oram sparfos disseminauit: postea frequentes inueniuntur Italiæ in li-  
 tore, non ante ibi captæ. Alga uescitur, uti diximus, phucoue marino, cōq;  
 capitur. Fallitur quoque à piscatoribus per fœminas, quas amore nimio F  
 prosequitur. Mirum scari ingeniū Ouidius prodidit in eo uolumine, quod  
 Halieuticū inscribitur: scarum inclusum nassis, non fronte erumpere, nec  
 infestis uiminibus caput inferere: sed auersum caudæ ictibus crebris laxare  
 fores, atque retrorsum ita erumpere. quem luctatum eius, si forte alius sca-  
 rus extrinsecus uideat, apprehensa mordicus cauda adiuuare nixus erum-  
 pentis. Duo esse scarorum genera prodidit Nicander Thæaterænus, alterū  
 onian uocari, alterum æolon. Saxatilis est scarus, ut diximus: & caro illi, ut  
 Diphilus scribit, tenella, fragilis, suavis, leuis: atque facile & concoquitur  
 & in corpus digeritur, modicēque aluum mouet. Non sine præcautione ta-  
 men scaro (præsertim recenti) uescendum suadet: pascitur enim nonnun-  
 quam marino lepore: quo fit, ut eius interanea choleram excitent. Xeno-  
 crates scarum cito in uentre corrumpi dixit. Scari piscis marini iecinore ad G  
 parotidas utuntur nonnulli.

1 Sed scaro, &c. Scarus, inquit Plinius, principalis hodie. Extat Ennii uersus apud  
 A pulerum apologia prima, de scati præstantia: Scarum præterij, cerebrū louis pe-  
 nē supremi. 2 Dicitur ruminare, &c. Ruminat & piscis, quem ab ea re ruminale  
 quidam appellauerunt, *μύρνα*. ita Theodorus Aristotelis uerba retulit: mihi uero ita uer-  
 tendum uidetur, Ruminant & pisces (scilicet quidam) & quem ab ea re *μύρνα*, id est  
 ruminalem appellant: ut incertum adhuc sit, in quo animalium genere numerari de-  
 beat *μύρνα*. Athenæus ex Aristotelis autoritate scribit scarum esse carniuorum. 3  
 Scarus habetur in codicibus nostris, & hic in cap. 16 lib. 8, & cap. 17. 4 Optatus,  
 &c. uide an ita legendum sit, an Optanus uel Octauius: ex Macrobio lib. 3 Sat. H

De mullo, coccyge & aliis quibusdam similibus.

Cap. CLXIX.

Post scarum mustelamque, ex reliqua nobilitate, gratia maxima & co-  
 pia mullis. Nomen his Fenestella à colore mulleorum calciametorum  
 datum putat: trigle à Græcis uocatur, ut nonnullis placet, quia ter anno pa-  
 riat solus saxatilius. Rufus piscis est, gemina barba insignis fere: sed nullū 2  
 expirantem uerficolore quadam & numerosa uarietate spectari, procures  
 gulæ narrant, rubentium squamarum multiplici mutatione palleſcentem,  
 utique si uitro spectetur inclusus. Litoralis piscis est, in arenosis fere litori-  
 bus uiclitans: & inter saxatiles quoque à nonnullis, sicuti ab aliis inter pe-  
 lagios

Vide ne men-  
 dosa sint in  
 hoc loco exem-  
 plaria Aristoteli-  
 ca.

Scarus apud  
 Varronē etiā  
 in piscinis dul-  
 cibus seruat.

Quo modo ca-  
 piatur leges a-  
 pud Oppianū  
 lib. 4. de pisc.

Onias, αὐχλος.

Ruminalis,  
 μύρνα.

SCARUS.

Mullus,  
 Τρίγλη,  
 Τριγλίς,  
 χαμαίτις.

**A**lagios numeratur: quandoquidem secedit nonnūquam & in altum mare:

Plures habet appendices superne circa uentriculum: gregatilis est. Ter anno parit, sed autumnō potissimum. oua sua limo committit: unde fit, ut se-  
3 ro parere uideatur: diutius enim frigus continetur in limo. Mullus postea quam ter pepererit, sterilis redditur, inquit Athenæus: gignuntur etenim illi in utero uermiculi quidam qui semen eius deuorent. Mullis magnitu-  
4 do modica, binasque libras ponderis raro admodum exuperant: nec in uiuariis piscinisue crescunt, cum sit mollissimum genus, & seruitutis indignantissimum. Septentrionalis tantum hos & proxima occidentis parte

5 non gignit oceanus. Vigent nulli potissimum autumnō. Eorū genera sunt plura: nam & phucis uescuntur marinis, & ostreis, & limo, & aliorum pi-

*Non in quibusdam exemplaribus expūgitur.*

**B**licium carne: & barba gemina insigniuntur inferiore labro. Sunt & qui barba carent: uerum lautissimi barbati, ut Sophron author est, κατὰς uocantur: Xenocrates ita distinxit, Mullus pelagius, qui & optimus, perquam rubicundus est igneōue fulgore & ueluti minio aurōque splendescens, quo à faxatili genere maxime differt. barbam quoque gerit. Lutarium ex iis ui-

*Γοματῖς.*

6 lissimi generis appellāt, ut qui cœno & sordibus uel uilissimis pascitur. nec litoralibus gratia, laudatissimi ex mari purissimo, & qui conchylium sapiunt: qui cancellos deuorant, & grauitè olent & gustui ingrati sunt. Præduram carnem habent nulli, sed friabilem tamen: quo fit, ut nihil habeant in se aut lentum aut pingue, sed nec mali succi quicquam. Difficulter concoquitur, nec facile corrumpitur: quod si probe concoquatur, nutrimenti

*Mullus luterius.*

**C** plurimum præbet. Stomacho grata est nulli caro, (inquit Diphilus) modicæque astringens, & aluum sistit, præsertim assa: nā frigida grauis est & concoctu difficilis: sanguinem autem elicit quouis modo parata. Iucunda quidem est nulli caro, inquit Galenus, atque hominum naturæ familiaris: ἀ-

*κίματος ἰακέρτη.*

siduo tamen mullorum esu, oculorum aciem hebetari prodit Dioscorides. Mullos in cibo inutiles neruis inuenio fieri, inquit Plinius. Mulli grandiores nec adeo suauis sunt carne atque minores: nec concoctu tam facili, ut quæ dura admodum sit. Et ut in uniuersum dicam, mullus neque tantam habere suauitatem, neque corpori salubris adeo uidetur, ut tantopere expe- ti debeat. Cum itaque quendam interrogassem, inquit Galenus, qui mul-

**D** eos expeteret, propter iecur potissimum respondit se grandissimos emere:

7 deinde & propter caput. Mullus si crudus atque dissectus admoueat, marini draconis, aranei ac scorpionis ictibus medetur. Contra omnia ueneficia ex menstruis mulierum auxiliatur mullus: item cōtra pastinacam, & scorpiones terrestres marinosque, & dracones, & phalangia illitus sumptusue in cibo. Vomitiones nulli inueterati tritique in portione concitant. Eiusdem recentis è capite cinis, contra omnia uenena, priuatim contra singulos auxiliatur. Attritis quoque imponitur cinis è capite mullorum: comburitur autem in fictili nase: illini cum melle debet. Carbunculos discutit mullorum salsamenti cinis: quidam capite tantum utuntur cum melle.

Mullum lutarium semper comitatur fargus nomine alius piscis: & cœnū

*Sargus.*



# DE DIFFERENTIIIS

fodiente eo (fodere enim potest) hic descēdit & pascitur : imbecilliorēsque E  
ne eodē adnatent arcet: piscis alioqui faxatilis inter herbosa saxa uictitans.

*Sargus* & *me*  
*lanurus*, πολυ  
χερμολ π υ  
μλαρο χερμ  
μιν dicitur a  
pud Athenai.

Insignis fargusque notis, insignis & alis:  
Et spinis ueluti palis horrentia terga  
Occulit, ut totus ualido mucrone tegatur.  
Nec dextram iniicies, rigeant quod tergora densis  
Sentibus.

Sargus bis parit, uere scilicet & autumnō paulo ante æquinoctiū. Fert ute-  
rum dies triginta, coit mense Decembri. Sargus cum hamo tenetur, ad sco-  
pulos lineam terit: astutum certe piscem esse fargū tradit Numenius. Ma-  
res pro fœminis contendūt: quo in certamine qui uictor euaserit, solus fœ-  
minis potitur omnibus. Caprarum miro amore tenētur fargi: ut sæpissime F  
ementita earum specie decepti capiantur. In cibo laudatur fargus: est enim 8  
stomacho gratus, probū generat succum, facilēq; in corpus digeritur, abū- 9  
de nutrit, & aluum mouet. Gregalis piscis farginus est: sed farginum alium

*Sarginus.*

*Pediculus pi-*  
*scis.*

*Coccyx.*

*Cuculus.*

*Τεγδα.*

esse à fargo, Epicharmus author est. Vt circa mullum lutarium fargus, ita  
in mari quod à Cyrena in AEGyptum panditur, piscis pediculus nomine,  
circa delphinū est: qui omnium pinguisissimus efficitur pabuli copia, quæ  
delphini opera suppeditatur. Rufus est & coccyx, id est cuculus, ut author  
est Numenius: & mullo similis, ut Pseusippus. Quo fit ut nōnulli trigolam  
ab similitudine coccyga appellent: sed partes posteriores squalidiores ha-  
bet trigola. Coccyx ambigit: hoc est partim pelagius est, partim apud litōra  
degit arenosa. Coccyx piscis perinde ut cuculus auis obltrepit, unde nomē  
accepit: caro illi dura est. Hirūdinem quoq; piscem (nam est & hirūdo po- G  
lypo similis) Pseusippus mullo similem esse tradit: chelidona Græci uocant.  
Chelidon fel habet seorsum à iecore intestinis cōmissum. Volat hirūdo fa- 10  
nē perquam similis uolucris hirūdini: sublimēsque adeo uolitant hirundi-  
nes, ut mare ne attingant quidem: altiūsque in uolatu sese attollunt quā  
miluus, non tam alte tamen quā lolligo: & pinnis stridere sentiūtur: sunt  
enim his pinnae latae & longæ. Item pelago gaudens, & nigro tergo mil-  
uus subit in summa maria. Piscis ex argumēto appellatus lucerna, linguā-  
que ignea per os exerta tranquillīs noctibus relucet. uolitat autem miluus  
(Hegala uocat) cum sibi à maiore pīse metuīt, sed summa tātum maria at- H  
tingens: neque enim tam alte se effert quā aut hirūdo aut lolligo, ut ne-  
scias uolitet ne an super aquā natet. Quoties uero cernatur miluago extra  
aquam uolitans, tempestates mutari Trebius Niger author est. Carnem ha-  
bet miluus coccygi cuculoue alioqui similem, sed duriorem. Rubellio quē 11  
erythrinum & erythrinum uocant, litoralis piscis est, & arenosa loca inco-  
lens: uel, ut Aristoteli placet, pelagius magis. In hoc genere non reperitur  
mas: omnes enim ouis grauidę capiūtur: neque mas ullus adhuc uisus est.  
quamobrem de his nōdum compertum habemus quod fidem faciat satis.  
Erythrinus sapore iucundo est, & alimentum præbet copiosum. in cibo si-  
stet aluum: si in uino suffocatus moriatur, uenere cieri dicitur uinum il-  
lud epotum, ut ait Xenocrates: uel uti refert Plinius, rubellio in uino putre-  
factus,

*Miluus.*

*Miluago.*

*Lucerna.*

*Lucerna.*

*Erythrinus.*

*Erythrinus.*

*Rubellio.*

A factus, iis qui inde biberint tedium uini affert. Venerem concitat erythini  
 12 in cibo sumpti. Et rutilus pagur (pagrus etiam & phagrus dicitur) similis *Pagur.*  
 erythrino est: & modo pelagius modo litoralis, in saxorum cauernis degens. *Pagrus.*  
 Lapillum in capite continet: ideoque hyeme pregelida maxime infestatur: *Phagrus.*  
 facit enim lapidis rigor, ut per algore gelet. Cor illi triquetrum est: solitarius *Phagrus.*  
 est & carniuor. Vere pagrum uigere sentit Aristoteles: at caniculæ exor- *Phagrus.*  
 tu edendum suadet Arhelstratus. & caput in eo præcipuum: duram habet  
 13 carnem, & quæ nec corrumpitur facile, nec aluum ciet. Est & fluuiatilis pha-  
 grus: sed marinus præstat. Niloticus est piscis, qui (uti refert Ælianus) adue-  
 tantem Nilum præsentens præcurrit, futuramque aquam Ægyptiis præ-  
 nūtiat. Pagro similis arque erythrino hepatus est: qui & lebias à nonnullis *Hepatus.*  
 B appellatur, colore nigricante. estque piscis solitarius, carniuor. dētes ha- *Hepatus.*  
 14 bet pectinatum coeuntes: oculos, quam pro corporis ratione maiores, cor-  
 triquetrum & candidum. lapillos gerit in capite duos, ut Hegesander au-  
 1, thor est, colore splendorēque ostreis similes, rhombi figura: felle caret. Ap-  
 pendices habet quasdam paucas superne circa uentriculum. Saxatilis est,  
 ut Diocles prodidit: & in cauernis latitat in alto mari. Hepati caro, ut Gale-  
 nus docuit, duritie mollitiēque mediocris est: autumno uilescit, author  
 Xenocrates.

1 De mulleis calecamentis, uide Hermolaum in annotationibus in Plinium.

2 Ouidius in Halientic.

-Tenui suffusus sanguine nullus. Addit Massarius, Si niuius desquametur, san-  
 C guineum colorem habet. Epicharmus *τεῖλας* uocauit *κύφας* ἢ *συγκυφίτης*, id est *κύφας.*  
 gibbas, ab eo quod eatum formæ contigit. 3 Sero parere. *οὐκ ἔτι τέλει*, Vt sero pariat: *Gibbe.*  
 ita Theodorus ad Græcam lectionem. Et uetus interpretes aliter: sed mancus est. 4  
 Binâsq̃ue libras. Mulli trilibris meminit Horatius lib. 2. Sermon. & quadrilibris Sene-  
 ca epist. 96: sed rara hæc. Mullum etiam 1 x x x librarum in mari rubro captum Lici-  
 nius Mutianus prodidit, inquit Plinius. 5 Eorum genera plura. Mullorum genera  
 forsitan pabulo maxime discretæ intelligemus: sicuti & de purpura dixit Plinius. Algæ  
 se, enutritū alga: ostrophagum, conchis: carniuorum, carne: lutariū, luto limōue. 6  
 Lutarium. An hæc fortasse triglis sit Oppiano, quæ in cœcisosis litoribus uidetur? *τεῖλας.*  
 Iecur potissimum. Mulli iecur quo pacto appareret conditūturque, docet Galenus lib.  
 3. de aliment. 8 Decepti capiantur. Quo pacto fallantur spargi à piscatoribus sub  
 caprarum specie, legito apud Oppianum. 9 Sarginus. Theodorus sargiacū uoca-  
 uit, nisi mendosus sit codex. 10 Volat hirūdo. Quod de hirūdine scribunt, hirūdine  
 scilicet uolare, &c. an de alietā hirūdine potius dicitur, quæ polypo similis est? cum  
 D dicat Plinius, eam nō pisci, sed uolucti hirūdini similem esse. Massarius aliter sentit:  
 equidē adhuc nihil affirmo. Non me latet, huius sententiæ uerba apud Plinium aliter  
 à nonnullis distinguī: sunt enim qui hunc Plinij locum hoc modo legant. Volat hiru-  
 do sane perquam similis uolucti hirūdini, item miluus: ut scilicet hic finis sit illius ea  
 pitis: deinde alterius principij. Subit in summa maria piscis ex argumento appellatus  
 lucerna, &c. ut scilicet diuersi sint pisces miluus & lucerna. Nos à uetustis exemplari-  
 bus non recedimus. Et certe Plinius ipse lib. 31, cum lucernam inter marina numerat,  
 miluum non numerat. 11 Rubellio, à colore rufo, ni fallor: quanquam Oppianus  
 lib. 1. *ῥοῦβελιόν* ἢ *ῥοῦβελιόν*, id est flauig. erythrini dixit. Rubrone etiam uocat hunc Theo-  
 dorus ex Plinio, & rubrum: *ῥοῦβελιόν* cum dixere Cyreni, hyecam. Erythrinus fluuiati-  
 lis etiam fortasse uidebitur legenti primū caput lib. 3. de generatione animalium:  
 nisi mendosus sit codex, quod certe suspicio. Nā quod statim in eo loco sequitur, (Et  
 enim nonnulli statim habere oua uidentur, ut de his in historiis scripsimus) de phoxi-  
 niatilis.

A hic piscis, nec facile concoquitur, alimentum præbet copiosum, nec improbum, sed tamen quod lentius est: nō facile corrūpitur, & urinam ciet. Partes quæ ad caput sunt, facilius cōcoquuntur: carnosiores uero graues sunt, & concoctionem non tam facile recipiunt: teneriores sunt quæ circa caudam. -Concolor illi Cantharus ingratus succo-, inquit Ouidius, *Cantharus, καὶ δαγός.* partim litoralis, partim pelagius est. Cantharus nassa capitur, esca carabo aut polypo: sed utrouis asso. Cantharum Xenocrates author est, & grati saporis esse piscem, & probū creare succum: qui & abunde nutriat, faciliēque in corpus digeratur, & aluum modicē cieat.

† 1 Et fului synodontes, dixit Ouidius in Halieutic, eo forsitan modo, quo Oppianus *ἰσχυρὸν ὄψιν, ὁπλιτὸν.* 2 Dentex Columellæ pelagius est piscis, qui & arenoso gurgite optime pascitur. 3 Nidificat. Atqui Ouidius in Halieutic, *Dentex.*

B Atque auium dulces nidos imitata sub undis potius de salpa dixisse uidetur. Cremys uel chremys apud Athenæum lapillum in capite gerit. Et *χρίμψ* apud Aristotelem inter eos pisces numeratur, qui acutissime audiunt. An uel eremys uel chremys idem sit qui chromis: cum Theodorus hunc omiserit: & quod chromis additus sit ab explanatore aliquo, tanquam magis notus quàm chremys: alioqui locus ille Aristotelis suspectus est. Chremes item apud Oppianum piscis est, qui in paludibus uiuat, & fluuiorum ostiis: an idem sit cum chrome, an diuersus? Iecorino, ut uidetur, similis est chremys, ex Eliano. 4 Ouidius in Halieutic. non orphum sed orphan uocat, modò absit menda, & inter pelagios pisces recenset. An sit idem cum orpho, considera. epithetum habet *ὠρεοφάγος.* 5 Meatus, *δενκὺς πῖπος*, ita legendum arbitror, non *ὠρεῖος.* 6 Cantharus, &c. Theodorus scarabeum hunc uocat. *Scarabeus.*

C De anthiarum generibus. Cap. CLXXI.

1 HIs natura non dissimili anthian esse docuit Icesius. Porro anthian nō nulli sacrum piscem uocauere: quādoquidem quo in loco anthias sit, nullam ibi beluam esse confessum est, quo iam indicio secure spongiatores urinantur. Sed id casu sic euenire dixerim: quo modo & ubi sit limax, neque sus est neque perdix: omnes enim limaces ab his eduntur. Frequens hic piscis apud Chelidonias Asiæ insulas, & circa Sarpedonem promontorium, *Anthias.*

Anthicon petris sunt pascua grata profundis.

Non illis semper gaudent, uulgoque trahuntur

Quò gula, quò uentris iubet insatiata libido.

D Ante alios, istos compellunt æstra palati.

Anthias æstate parit, hyeme in cibo optimus est. strepitu gaudent, eoque allecti nonnunquam capiuntur. Anthiæ cum unum hamo teneri uiderint, spinis quas in dorso ferratos habent, lineam secare traduntur, eo qui tenetur extendente, ut præcidi possit. Hæc Plinius: at uero Ouidius,

1 Anthias (inquit) iis tergo quæ non uidet, utitur armis.

Vim spinæ nouitque suæ, uerſoque supinus

Corpore, lina secat, fixumque intercipit hamum.

2 Nam, ut Oppianus scribit, dentibus aut nullis armatur, aut certe obscuris obtusis: sed si hamo detinetur, plurimum reninitur, magnasque ostendit in renitendo uires. Anthiam stomacho minime gratam esse, sed probum tamen generare succum Icesius author est, faciliēque excernitur. Anthiarum

*Quibus modis capiuntur anthias, ostendit Plinius & Oppianus. Plinius hoc, Pithæa auctore, murena tribit. 28 μαι. πῖ - ὠρεοφ., & δδδ.*  
*Anthias species.*

species quatuor: aliaē nanque fuluæ, aliaē candidiores, nigricant aliaē. Sunt E  
 Ἐυωπες. & quos ὀφθαλμοὶ καὶ αὐλοπῆς uocant, quasi magnos aut cauos habentes oculos 1  
 Ἀυλοπῆς dixeris: quādoquidem supercilium in iis ueluti in orbem ducitur. Anthian  
 Callichthis. quoque alij callichthin uocant, alij callionymon: nonnulli elopa: & alij ly-  
 καλλιόνημος. con. Quos tamen diuersos esse pisces Dorion affirmat: est enim callichthis  
 Callionymus. (qui & callionymos à quibusdam uocatur) serratis dētibz, & carniuosus,  
 & gregalis: atque, ut sentit Oppianus, pelagius, & qui non admodum lito-  
 re gaudeat. Hunc sacrum piscem cognomine uocant: nam ubi callichthis  
 est, noxia magnarum non cetera monstra ferarum apparēt: & si hamo de- 3  
 Callionymus. tinetur, ingente ui renititur. Callionymus Aristoteli litoralis piscis est, idē 4  
 Pulcher. qui & uranoscopus uocatur ab oculis, quos in capite ita sitos habet, ut etiā  
 Vranoscopus. si noluerit, non potest non suspicere calū: nonnulli agnum uocant. Fel cal 5  
 Ἀγνῆς, ἀγνῆς lionymo in iecore inest proportionē corporis maxime omnium pisciū co-  
 piofum. Vranoscopus malum procreat succum, & sapore habet uirosū,  
 ut Xenocrates author est: & cibus grauis, ut Diphilus prodidit. Et sunt qui  
 callionymum dicant esculentum esse: plerique negant. Fel callionymi ocu-  
 lorum suffusioni, albugini, & hebetudini obscuritatē medetur. cicatrices  
 sanat, & carnes oculorum superuacuas consumit: auribus utilissimū, cum  
 Ἡμεροκρῆτες. rosaceo infusum. Ignauus piscis est hemerocretes: oculos hic habet in sum- 5  
 Nyctæris. mo uertice, os inter oculos medium. Interdiu semper dormit, noctu uigi-  
 Νυκτοπῆς. lat oberrans: indēque à nonnullis nyctæris uocatur. Piscis uoracissimus, & 6  
 nunquam edendo satius. nec cessabit unquam,

Donec cum rapido disrumpat uiscera uentre:

Et nimio pastu uita spoliatur onustus.

Est tantæ lignum crapulae uentrisque rapacis:

Apprendat si quis piscem, dein porrigat escas,

Dum cibus ore tenuis, pastu & summa ora replentur,

Arripit.

Ellopa quoque nonnulli anthian uocant: eundēque esse quē callichthin 7  
 & callionymum arbitrantur. Dorion distinguit, uti modo diximus,

Est pretiosus helops nostris incognitus undis, ut scripsit Ouidius.  
 Pamphilio nanque mari profundo nec alio pascitur: quanquam Arche-  
 stratus ellopen ex Syraculis præcipue laudare uidetur. Branchias quaternas  
 habet utrinque simplices. Fel à iecore semotū est, & intestinis commissum. H  
 Helopi palmas saporis inter pisces multi dedēre: estque stomacho gratus,  
 abūde nutrit, & aluum facile mouet, ut Xenocrates docuit. Appion gram-  
 Accipenser. maticus eundem esse ellopa & accipenserem tradidit. Sed falluntur, ait Plin- 8  
 nius, quicundem accipenserem existimauerunt: quanquam & peregrinus,  
 & apud antiquos piscium nobilissimus habitus accipenser est: tanta nan-  
 que erat apud Romanos ueteres accipēseris gratia, ut à coronatis ministris  
 cum tibicine & cantu in conuiuium introduceretur. Vnus omnium ac-  
 cipenser squamis ad os uersis contra aquam nando meat. Nullo nunc in ho-  
 nore est: quod quidem miror, inquit Plinius, cum sit rarus inuentu. Piscis  
 est non equidem magnus, figura ad triquetrum accedēs, rostro porrectio-  
 re. Hu-

A re. Huius piscium generis, uel minimus non minoris uenire solitus est, mil  
lenumamis Atticis. Χαλιω δρκα  
χμωτ.

1 *Ισθρίχθω*, id est sacrum piscem alij quoque pompilum uocant, alij delphina, a-  
lij piscem, quem *λίκνερ*, id est candidum appellant: alij autatam: alij denique *Ισθρίχθω* Ισθρίχθες.  
Sacer piscis.  
significare dicunt, *Ισθρίχθω*, id est sacrum piscem, ut *Ισθρίθω*. 2 *Φυλζ* Φυλζ.  
Candidus piscis.  
*Cynedi* soli piscium lutei, inquit Plinius, qui an sint ex hoc genere nondum constat:  
sicuti neque an cum cynedis iudem sint *αλφειστ*. Sunt autem *αλφειστ*, pisces toto qui-  
dem corpore cerei coloris, quibusdam tamen partibus admixto purpureo. Capiuntur  
autem fere, ut aiunt, bini, alter ad alterius caudam insequens. *Αλφειστικ* Aristotele  
*κνέπες*, id est fului aut rutili coloris est. Est & *κνέπες*, cetis, tenella carne piscis, stomacho Κνέπες, cetis.  
Αυλοπίος.  
gratus, uentrem mouet. succus ex eo & crassior est, & abstergeri uim habet. *Αυλοπίος*,  
aulopion qui circa insulas Tyrrenicas uersantur cetaceum quendam piscem appellant  
magnitudine maximum, qui etiam cum thynnīs pugnat, & contra piscatores nonnun-  
quam decertat, & sēpissime uictoriam reportat: cum est captus, eximia forma specta-  
tur. oculis est parulis, rotundis, magnis, dorso cœruleo & uentre eandido. à capite ad  
caudam pertinens aurea quædam linea in orbem dēfinit. Ex his nonnulli cicures  
sunt, quos sane piscatores ut beneficos ab aliis internoscunt, eosque tanquam duc-  
es sectantur, nec comprehendunt unquā: alij feri sunt aulopij, quos & capiunt pisco-  
tores & occidunt. Hæc *Ælianus*. 3 Hæc ex Oppiano. Eadem suprà de anthia ex  
Aristotele dicta sunt. 4 *Ηαλεστύριον*, inquit Hermolaus, sunt qui pro callionymo Ηαλεστύριον.  
piscis capiunt. 5 *Ηεμεροεετες*, &c. Hic cum callionymo aut idem est, aut certe nō  
dissimilis: neque Aristotele Pliniūque aut Athenæus hoc nomen habet, neque cōtrā,  
Oppianus callionymum nomen, quod meminimus. 6 *Νυκτερίς*: Lippius noctuam  
uerit. 7 *Ελλοπα*, &c. Theodorus accipenserem uocat. *Ελας* alius piscis ab *ελλοπε*,  
apud Iul. Pollucem. Ouid. in *Halientic*.

Tūque petegris accipenser nobilis undis. Ob raritatē laudatur à Martiale,  
C Ad palatinas accipensera mittite mensas.  
Ambrosias otinant munera rara dapes.

8 De accipenseris pteio & nobilitate apud antiquos, plura leges apud Macrob. lib. 3 Accipenser.  
Satur. 9 An de accipensere hæc, an de galeo Rhodiaco potius dicantur apud Athe-  
næum, considera.

De lupo & asellis.

Cap. CLXXII.

P Ræcipuam olim auctoritatem fuisse lupo & asellis, Corn. Nepos & La Λυπυ, λικ-  
ερετ.  
berius poeta mimorum tradidere. Lupus (*λίκνερ* Græci uocant) lapi-  
dem in capite gerit: ideoque algore maxime infestatur: linguam habet os-  
seam atque adhaerentem, cor trigonum: ut inter pisces liquidius audit. So-  
litarie est & carniuor, uti prodidit Aristoteles. Lupus quanuis pelagius sit:  
(ita enim uocantur & qui in mare profundum secedunt:) in paludi-  
bus tamen maritimis (quas *λυνοθάλασσες* uocant) & fluuiorum ostiis fre-  
quens est: præsertim ubi copia dulcis aquæ influit. Et iis maxime locis fœ-  
tificat, ubi flumina exeunt in mare: sæpius uero in fluuios ascendit. Hunc pi-  
scem, inquit Galenus, in aqua dulci natum non uidi: in paludes tamen &  
fluuios è mari ascendisse conspeximus: eoque fit ut raro paruus, quemad-  
modum mugil sæpius inueniatur. Bis anno parit lupo, prior partus æstate  
perficitur: uerum posterior, qui scilicet hyeme accidit: infirmior est. Cum  
9 alios pisces complures intra piscinarum septa, tum etiā sine macula (nam  
sunt & uarij) lupos includimus. Fuscina interdum lupo sæpenu-  
mero capi-  
tur dormiens, alioqui minime fuscina posse capi existimatur. Lupum piscē

reti circumdatum arenas arare cauda, atque ita conditum transire rete, pro-  
didit Ouidius. Quapropter solertia in tuendo sese lupum aliis prestare pi-  
scibus nonnulli prodidere: uerum, ut Plinio placet, minus in prouidendo lu-  
pus solertiae habet: sed magnum robur in pernitando: nam ut haerit ha-  
mo, tumultuoso discursu laxat uulnera, donec excidant insidiae. Lupus &  
mugilis quanquam inimici sint capitales, tamen statim tempore congregan-  
tur. Cum fert utero lupus deterior est. Luporum laudatissimi, qui appellan-  
tur lanati à candore mollitiæque carnis. optimo sapore iudicantur in Tybe-  
ri amne inter duos pontes. Hæc Plinius. Lupus marinus, inquit Xenocra-  
tes, quo maior est, eo durior euadit. Optimus autem est qui magnitudine  
mediocri est: tenellus enim & stomacho gratus, bonique succi est: suavis  
quoque & copiosum præbens alimentum: facileque & per corpus digeri-  
tur, & per aluum deferitur: contra qui in piscina seruantur inclusi, sapore  
sunt minus grato. Cum in utroque humore uictitet lupus piscis, marino  
scilicet & dulci, qui in puto mari degit, inquit Galenus, longe præstantior  
est eo, qui in mixtis uiciatisque aquis uiuit: atque quod ad succi probitatem  
attinet, ne auibus quidem montanis multum cedit. Optimis quoque ma-  
rinis piscibus æquari tradit Xenocrates fluuiatiles lupos, maculosos ua-  
riofus, (ita uoco *ὑδραγροὺς*) ex Tiburtino Aniene. Lupum appellant Foroiu-  
liensis piscem ex quo garum faciunt. In mari rubro piscis nascitur quem  
perseum Arabes simul & Græci nominant, aspectu lupo similis, pari ma-  
gnitudine cum anthia maximo. naso est leuiter aduoco, cingulis aureis dis-  
tinguitur, quæ à capite exorientia oblique feruntur, & ad uentrem usque  
pertinent. frequentibus & prægrandibus dentibus munitus est. Ex omni-  
bus piscibus qui in eo mari uersantur, robore & audacia maxime excellere  
dicitur. Asellorum, inquit Plinius, duo genera: collyri minores, & bacchi,  
qui non nisi in alto capiuntur: ideoque prælati prioribus. Et callarias asel-  
lorum generis, ni minor esset. Quos Plinius asellos, Græci *ὄρους* uocant, & *ἰ-  
ρίσκους*, id est asinos & asellos: quos Philotimus *ὄρους*, alij *ἰρίσκους* dixere, inquit  
Galenus. Est uero *ὄρος* & *ἰρίσκος*, ut Aristoteles prodidit, (inquit Athenæus) 4  
piscis minime gregatilis, cuius os magno hiatu rescissum gerit, non aliter at-  
que galei: & qui solus inter pisces cor in media aluo gerit: & in cerebro la-  
pillus habet molari forma. *ὄρος*, inquit Aristoteles, caniculæ temporibus ca-  
lidissimis latet: indicio autem esse uidetur, quòd longo interposito tempo-  
re capiatur. Cum pisces uenatur *ὄρος*, obruit arena sese: cumque nullam sui  
corporis partem intactam reliquerit, uerberat radiolis, quos in ore gestat, &  
quos piscatores uirgulas uocant, quas pisciculi cum aspexerint, adna-  
tant, quasi ad algas quibus uesci soliti sunt. Differunt autem (ut Dorio tra-  
dit) *ὄρος* & *ἰρίσκος*: *ὄρος* quidam *γάρδον* appellarunt: *ἰρίσκος* autem *γαλβρίδης* & *μά-  
6  
ξιστος*: nonnulli uero *βύλινος*: alij *γλαβίω*, ut refert Euthydemus. Arcestratus  
*ὄρος* à quibusdam *καλαρίω* uocari dicit. Oniscus, ut Oppianus scribit, in locis  
pascitur cænolis & herbidis: at onos non nisi in alto mari minoribus pisci-  
bus insidiatur: qui & caniculæ temporibus latet. Cūque hamo tenetur, non 7  
facile sequitur trahentem: sed plurimum reluctando, piscatori nō paruum  
facefcit

*Lupus lanatus*

*Lupus marinus*

*maculosus*

*ὑδραγρὸς*

*γάρδος*

*Lupus Foroiu-*

*liensis*

*Perseus*

*Asellus*

*Bacchus*

*Callarius*

*ὄρος, ἰρίσκος*

*Molari forma*

*ἰμφοῦς*

*μύ-*

*λαις, id est ro-*

*tundus*

*ὄρος, γάρδος*

*ἰρίσκος*

*γαλβρίδης*

*μάξιστος*

*βύλινος*

*γλαβίω*

*Oniscus*

*Onos*



- A facecit negotium. Afellorum caro, inquit Galenus, mollis quidem est, sed non æque ac saxatilium friabilis. Xenocrates mediam habere substantiam mauult eam inter molle & durum, & succum probum eundemque copiosum gignere. Aselli ipsi non parum inter se discrepant: nam qui in syncroniari uiſitant, probòque utuntur alimento, carnis bonitate cum saxatilibus contendunt: qui uero prauo aluntur nutrimento, aut in aquis quoquo modo mixtis degunt, (præsertim uero si uitiosæ fuerint aquæ) mollè quidem habent carnem: uerum ob pinguedinem lentorémque, neque suauis adeo iam sunt, & alimentum gignunt excrementosum. Ex asello pisce lapilli, qui plena luna inueniuntur in capite, adalligātur linteolo contra febriū circuitus. Bacchus, ut Xenocrates tradit, mediocris est substantiæ: ut uero
- B Diphilo placet, bonum procreat succum: sed qui non facile cōcoquatur, & uirosus quid in se habeat. Aselli nomen à colore diductum est, ut Varroni placet, sicuti & umbræ turdique.

Bacchus.  
Vide an sit Athenai exemplar hoc in loco mendosum.  
Asellus.

- 1 Quos sine macula lupos uocat Columella, iidem fortasse sunt quos Plinius lanatos dicit: quos uero Columella uarios, eos Oribasius *ὑπερχαλκίους*, id est maculosos.
- 2 Et piſtæ mormyres (mormylos uocant alij) eodém modo retia declinant, in arenase condentes. in arenosis litoribus uiſitant. Mormyros (à Theodoro mormur dicitur) ætate parit. Copiose nutrit mormylus, inquit Iſeſius, (Epicharmus myrmat uocauit) Archeſtratus piſcem inutilem, neque tempore ullo bonum esse dixit. Confidera lector, an eiusdem an diuersorū piſcium sint hæc nomina omnia.
- 3 Ex Strabone. Est Anio fluuius in Tiburtino agro, qui in Tyberim influit tertio ab urbe miliario: ut refert Blondus in Umbria. In hoc fluuiio tradit Iouius magnam esse eorum piſcium copiā, quos troctas uocamus. Hermolaus hoc in loco apud Pliniū pro collyri callariæ legit, ex Athenæo, ut scribit: uerum Plinius ipse lib. 32 separauit callariam ab asellorū genere: quandoquidem asellis minor est callarias. Apud Athenæū Dorio refert quosdam *χαλκίους* uocare *ὑπέρκους*. Euthydemus *χαλκίους*, Archeſtratus *καλλαρίας*.
- 4 Aristoteles (quod meminimus) *ὑπέρκους* ne nominat quidē, sed *ὑπέρ*. 5 Verberat. Verus interpres, Habet in orificijs quandā partem sicut uirgæ, &c. Vide supra in squatina, & item in rhombo.
- 6 Vnus idēmq; piſcis bacchus uocatur, oniscus & schellaris, uti alio loco ex Dorione refert Athenæus.
- 7 *ὑπέρ το σπέρ*, id est segnè ignauūm uocat Oppianus: & inter magnos piſces illum enumerat lib. 3 de piſt.

Lupus lanatus.  
Lupus uariatus.  
ὑπερχαλκίους,  
Maculosus.  
Mormyros.  
Mormylus.  
Mormyros.  
Mormur.  
Myrma.  
Troctas.  
Callarias.  
Gallerida.  
τελαρίν.

De umbra &amp; glauco.

Cap. CLXXIII.

- D Vmbrā, quam *σκία* uocant & *σκιάδης*, lapillos etiam in capite habet: ideoque algore infestatur. Sciēna cum metuit, caput oculosq; abscondit, aut in cauera quapiam, aut herbis marinis, reliquo corpore neglecto, ita se totam abscondi putans. Sciēnæ caro minime quidem dura est, sed mediocris: quæ tamen saxatilibus duriuscula sit. Sciadeus, inquit Xenocrates, bonum gignit succum: facile in corpus digeritur: saporis est iucundi: nutrimentum præbet non admodum copiosum. Sciēnæ interanea, & squamæ combustæ, pauos discutiunt. Siena alia esse uidetur à sciēna: nam sciēna, uti Oppianus scribit, in saxis herbosis degit: siēna uero in saxis nudis. Vmbrā quoque fluuiatilem habet Aufonius,

Vmbrā.  
Sciēna.  
τελαρίν.  
σκιάδης.  
σκιάδης.  
τελαρίν.  
Sciēna.  
An idem qui sciēna.  
Sciēna.  
Vmbrā fluuiatilis.

Effugiens oculos celeri leuis umbra natatu.

- Glauco quoq; à colore, uti arbitramur, cæruleo dictus, pelagius piſcis est: latetque ætate mediis feruoribus dies sexaginta. Appēdices habet paucas

Glauco.  
τελαρίν.

superne exeuntes circa uentriculum. Fortum, cum metuit, ore recipit, rursusque emittit. Capitis in cibo præcipua laus: uel ut Arcestrato uidetur, rostri maxime, (*κεφαλῇ* uocant) sicuti in cōgro capitis totius. In maiorum piscium numero cēsentur, qui à nonnullis *ταυτοὶ* uocantur, id est qui in partes secantur ad patinam. Caro illi dura est. in omnibus lupo inferior est: & ut Xenocrates prodidit, non minus à lupo uincitur, quàm ipse sparum superat. Verrucas tollit glauci iecur. Glaucus è iure sumptus (uel uti aliis placet, 3 glauciscus) mulieribus lactis copiam facit. Glauciscus, inquit Diphilus, in 4 cibo similis est cephalo & mugili.

*Glauciscus.*

*Vimbra marina.*

1 De umbra marina extat Ennii uersus apud Apuleium, - Melanurum: Tutum merulamque umbramque marinam. 2 Latet æstate. Ouidius in Halieut, Ac nunquam æstiuo conspectus sydere glaucus. 3 Glauci iecur. Hermolaus F hoc in loco Plinij glauci iecur legit, non glauci. 4 Glauciscus piscis an idem sit cum glauco, an alius, cōsidera lector.

De sparo & aurata.

Cap. CLXXIII.

*Sparus.*

*Sparulus.*

**S**parus (de quo Ouidius in Halieuticis, Et super aurata sparulus ceruice refulgens) Xeuocrate, uti modo diximus authore, lupo & glauco in cibo deterior est. Icelius uero ita prodidit, Sparus, cum aliis plerisque piscibus copiosius alitur uero quàm mana meliorē succum progenerat. Diphilus sparū acrem esse prædicat, carne tenera, minime uirosa, Itomacho grata, concoctū haud difficili, & quæ urinam ciet: frixa tamen difficilius concoquitur. Auratæ, 1 quam chrysopteryn Græci à fulgente splendore uocant, in gustus suauitate G primas partes tribuit Icelius. uerum uti Martialis cecinit,

*Auratæ,  
χρυσόπτερος.*

Non omnis laudem pretiūque aurata meretur:

Sed cui solus erit concha Lucina cibus.

Litoralis piscis aurata est, partim saxosis partim arenosis locis degens: pelagus quoque. uonnunquā appendices habent auratæ superne exeuntes circa uentriculum, aliæ plures, aliæ pauciores. Parit aurata æstate. parit uero, ut lupo, in iis maxime locis qua flumina exeunt in mare: quinetiā in maritimis paludibus auratas quoque gigni apertum est. medijs feruoribus latet, ut onos, plurimum temporis. Hyeme aduersa ualitudine laborat. Fusci na sæpenumero capitur interdium dormiēts, ut lupo: alioqui minime fuscina posse capi existimatur. Auratam Ephesij ioniscum uocarunt, ut Arcestratus author est. Aurata carnem habet cādidam, solidam, & quæ bonum procreat succum, abundēque nutrit, facile digeritur atque excernitur.

*Onos, Plinius,  
afellus.*

*Ioniscus.*

*Orata.  
Chrysol.*

1 Auratæ. Orata, ut Festus inquit, à colore auri: quod rustici orum dicebant. Aurei coloris chrysol habet Plinius ex Ouidio: qui in Halieutic. inquit:

- Et auri chrysopterys imitata decus. Oppianus in Halieutic. lib. 1.

ἡ χρυσόπτερος ἰονίσκος, id est ut uerit Lippius, Aurata à splendoris nomine dicta.

De turdo, merula & aliis quibusdam saxatilibus. Cap. CLXXV.

**I**nter saxatiles scarus, ut dictum est, principatum obtinere creditur. secundum uero locum Galenus merulæ ac turdo tribuit: tertium deinde iulidi,

A di, phycidi & perca. De scaro satis diximus. Merula, quæ κέρουρος græce di-  
 citur, inter saxatiles laudata, colore est subobscurus uiridante. Merula mas  
 est, uti Oppianus tradit: turdus uero (κέρουρος uocant) fœmina, inter saxatiles  
 quoque nobilis, inquit Plinius, & μυλαέσις, id est nigris quibusdam macu-  
 lis insignis. Merula & turdus mutant colorem: uere enim nigrescunt: post  
 uer albedinem suâ recipiunt: & hyeme latent. Branchias habet turdus utrin-  
 que quaternas, easque duplices, excepta nouissima. Mollis utrique caro est,  
 & quæ probum creat succum: qui tamen per halitum facile digeritur, ne-  
 que copiose admodum nutrit. Turdum nonnulli τῶρον, alij αὐλίαν uocant.  
 Turdorum cōplura sunt genera. Iulis (ut Galeno placet) saxatilis piscis est:  
 cuius caro & concoctu facilis, & corpori humano saluberrima est. Et Op-  
 piano quoque iulis piscis saxatilis est in muscosis algosisq; saxis uiuēs: par-  
 uus admodum pisciculus: uerum hominibus in mari natantibus & urinā-  
 tibus uenenato morsu infestissimus. Agmine dēso adhærēt iulides immotæ  
 corporibus natantum, non aliter atque muscæ solent in autumno. Os huic  
 (inquit Ælianus) sceleratissimi ueneni refertum est. quæcunque piscem de-  
 gustarit, inhabilem ad esum, perniciosumq; ei qui postea gustauerit efficit.  
 Hominem quoque non minus morsu persequitur mus, (μὺς à Græcis uoca-  
 tur) piscis alioqui paruus: sed duro tergo & dentibus robustis. Est & μύς  
 qui capriscus dicitur. caro eius uirus olet & dura est, difficiliusq; concoquitur.  
 cutis ori grata est. Phycis, qui & phycus dicitur, saxatilis piscis & tenel-  
 lus est: perca similis est spinis uallatus. mutatque colorem: cum enim cæte-  
 ris temporibus candida sit, uerno uaria redditur. eadem pisciū sola ex ma-  
 rinis piscibus nificat ex alga atque in nido parit. Et cum ceteri pisces, qui  
 oua pariunt, semel pariant, pusillæ phycides bis anno pariunt. Differt in hoc  
 genere mas à fœmina, quod mas nigrior & squamis amplioris est. Phy-  
 cides, quanquam cetera abstinent carne, tamen squillas sæpenuerò appe-  
 tunt. Mollem carnem habent phycides, probumque succum gignunt, qui  
 facile diffatur: nec multum nutriunt. Facile corrumpuntur, inquit Diphi-  
 lus, minimèq; uirosæ sunt. Est & phycen huic similis, pisciculus saxatilis &  
 tenellus: faciliq; (ut perca) corrumpitur. Phycidi perca similis est, quæ & per-  
 cis dicitur, piscis & amni & mari cōmunis, id est marinus & fluuiatilis. sa-  
 xatilis est circa m. f. o. s. a. l. g. o. s. a. que uiuētans, uirgulis lineisque quibusdam  
 Duarius. Branchias habet utrinque quaternas, easque duplices nouissima ex-  
 cepta: plures quoque appendices superne circa uentericulum. Parit fluuiati-  
 lis perca in fluuiorum & lacuum paludibus, id est quæ prope fluuios aut la-  
 cūs stagnant, (παλμυρίδες uocant) in arundinetis. In partu continentem emit-  
 tunt suum fœtum, eo quo rana modo: adeo enim fœtus ipse continuo filo  
 sibi cohæret, ut cum piscatores ex arundinibus colligant. De fluuiatili per-  
 ca hæc cecinit Ausonius,

Nec te delicias mensarum perca silebo,  
 Amnigenos inter pisces dignande marinis,  
 So us puniceis facilis contendere nullis.

Nanque & gustus iners, solidæque in corpore partes

Merula.  
κέρουρος.  
Turdus.  
κέρουρος.

τῶρον.  
αὐλίαν.  
Iulis, αὐλίαν.

Mus, μύς.

Capriscus.  
Phycis.  
Phycus.  
φύκος.  
Enca.

Phycen,  
φύκος.  
Perca.  
Percis.  
τρίκην.  
τρίκην.  
ερεμμοπύ-  
νιλος.  
Perca fluuiati-  
tilis.

Segmentis cocunt, sed diffociantur aristis.

E

Perca alimentum gignit saluberrimum, & quod concoctu facile est: uerū, ut inquit Diphilus, æque atque phycis facile corrumpitur. Pro locorum tamen ratione in quibus uiscitant, perca nonnulla uarietas contingit. Quæ in Rheno gignitur perca, marinis piscibus in succi probitate æqualis est, ut prodidit Xenocrates. Perca falsæ ē capite cinis, melle addito, uerendorum pustulas discutit. Channe aut chaune, phycidi & perca similis: pelagius piscis, ut Aristoteli placet, & carne sola uescitur. Circa saxa uiscitat, ut scribit Oppianus, alga muscōque plena. Colorem habet, uti ex Aristotelis sententia refert Athenæus, nigro rutiloque uarium, aut in nigro rufescentem, & maculis lineisue quibusdam distinctum. Huic uenter prope os positus est: adeo ut cum minores pisces insequitur, uentriculus illi in os nonnunquam procidat ob uoracitatem. Channe omnes grauidæ capiuntur. Et ex se

Concipiens channe gemino fraudata parente est, inquit Ouidius.

Carnem habet channe mollem quidem & tenellam, sed quàm perca tamē duriorem. Channe iecur siccatum pondere. x. i. i. i. cum oleo cedrino, perunctis pilis nouem mensibus, psilothrum fit palpebrarum.

Χάιτη.  
Χαύτη.  
Χαίτη Θ.  
Είσιαυλά.

Ποικιλὸν ὄνθρον  
μύλας αὐτῆς πρὶ  
κλόνος μύλας

Alilegūt, nō  
channa iecur,  
sed tenia iecur

1 Viridante, &c. Merulaeque uirentes dixit Ouidius: Athenæus uero κέσυνφος μελάγχρον. 2 Iulis, &c. An idem sit piscis Galeno & Oppiano qui ἰούλις uocatur, ambigui uidetur. 3 Vide an fortasse hoc in loco apud Athenæum legi debeat (ut cōiicit Hermolaus) ὄς pro ὄνθ, id est sus 4 Spinis uallatus. ἄνελ δὲ σπέρμας καὶ παρὶς κλόνος.

Υς.

De melanuro, coracino &amp; aliis quibusdam. Cap. CLXXXVI.

Melanurus.

Saxatilis piscis est melanurus: & prope litora in locis arenosis alga passitur. Coracino similis est piscis uarius, notis pluribus nigris insignis, non aliter atque fargus. Percarum ducem Numenius melanurum dixit. Viribus haud magnis est, sed solers: non facile reti aut nassa capitur: nec ad pastionem mari tràquillo, sed tempestatibus agitato proficiscitur: capiturque tunc temporis apud litora esca ex caseo & pane. In Stabiano Campaniæ ad Herculis petram, inquit Plinius, melanuri in mari panem abiectū rapiunt: iidemque ad nullum cibum in quo hamus sit, accedunt. Xenocrates melanurum stomacho gratum esse prædicat, probumque gignere succum: & qui facile digeritur, abundeque nutrit, atque haud difficulter excernitur. Icesius melanurum fargo similem esse tradit: uerum succi bonitate atque suauitate inferiorem: probe tamen nutrire & succum procreare modice astringentem. Melanuro similis est melanderinus: & coracinus melanuro similis est: pecten hunc uocant Nili accolæ. Et Alexandrini παλαιοὶ καὶ: Parmeno autem Rhodius etiam platistaticon uocari dixit, αἰολίαν quoque nonnulli coracinum uocant: alij tamen alium piscem significare æolian contendunt. Est uero coracinus piscis amni & mari communis. colore est nigricante, præsertim in pinnulis. lapidem gerit in capite. Gregalis piscis est: & parit autumnō inter algas locis densis. Fert uterum longo temporis spatio: & cum utero fert, optimus est coracinus, perinde ut mæna. Parit etiam nonnunquam messe tritici. loca saxosa incolit & herbida, latet hyeme: neque

capi

Melanderinus.  
Coracinus,  
καρχαρίθ.  
ῥαλτος.  
ῥαλτος.  
Platistaticon.  
Æolian.

A capi solet nisi certis quibusdam temporibus & eisdem semper. Prodest co-  
racino ferme, præter cæteros pisces annus squalens, quia teporem potius  
affert. Cum alij pisces magna celeritate adoleſcant, hoc coracinus præcipue  
accidit inter minores. carnem habet duram, & ad salituram idoneam, uti  
infra docebimus. Coracinus marinus parum corpori præbet alimenti, idq;  
bonum mediocriter, ut Icesius prodidit. Sed coracinus in Ægypto princi-  
patum obtinet, & præcipue qui in Nilo nascitur: ideóque Nilo peculiarem  
esse piscem uoluere nonnulli. hunc Xenocrates, uel nobilibus marinis pi-  
scibus æquari tradit. Dorion coracinum à nonnullis saperden appellari, o-  
primúmque in palude Mæotide gigni prodidit. Porro saperdes, ut Aristote-  
les author est, inter fluuiatiles lacustrésque pisces, cum uterum gerit, com-  
mendatur. Xenocrates *λέγετο* scribit piscē esse præduræ carnis, qui & in ma-  
iorem auctus magnitudinē durior euadit, sapore uiroso, difficulter in cor-  
pus digeritur. Est & *λέγετο* apud Athenæum, carne quàm sit hierax durior.  
Coracinorum carnes aduersus scorpiones ualent impositæ. fel eorum ui-  
sum excitat. Coracinum fluuiatilem sale maceratum *ψύμνος* appellant Ale-  
xandrini: hoc inter fassamenta facile concoquitur digeriturque, abunde  
nutrit, miniméque mali est succi. Coracini fassamenta pauos discutiunt  
& carbunculos.

1 Theodorus ocularam uocat: uerum Plinius utrunque enumerat piscem eodem prope uersu, tanquam uarios, lib. 32. cap. 7. Oculatâ Cellius inter mediæ materiæ pisces duriusculos numerat. Melanurum Athenæus ὀφιοφάγος καὶ πύρρος μολύχης καὶ μολύχης dixit. 2 πυρρὸν quem Numenius Ἰβρίαν uocauit: an idem sit, uide apud Athenæum. 3 Coracinus, κορακίνος dicitur, quod assidue oculos moueat, inquit Athenæus: πλάττωκεν uocat scribit Massarius, à lata figura: Theodorus quandoque coruolum, nonnunquam gracolum uocat. Porro graculo similem draconem marinum dixit Plinius, καὶ κορακίνος τὸ πύρρον αἰθῶπι χοῶν, id est, ut uertit Lippius, Et nigro cui nomina dicta colore. Coracinus, Athenæus quoque ex Aristophane μολύχης πύρρος καὶ κορακίνος uocat. Epicharmus κορακίνους κρεῖσθαι dixit.

De exocæto & cordulo.

## Cap. CLXXVII.

**M** Iratur Arcadia suum exocœtum, appellatum ab eo, quòd in siccum  
somnia causa exeat. Circa Clitorium uocalis hic traditur & sine bran- Exocœtus,  
est Clitorea.  
**I** chiis: idem aliquibus adonis dictus. Piscis est colore subfuluo subrufoue: Adonis.  
**D** cui à branchiis utrinque ad caudam usque protenditur linea siue uirgula  
candida. Est autem figura minime lata, sed terete, magnitudine paruis mu- Reg. 29.  
gilibus, qui apud litora inueniuntur æquali: hoc est longitudine octo digi-  
torum aut semipedali. Et, ut paucis rem absolua, pisciculo qui tragus uo-  
catur, similimus est exocœtus, præterquam quòd tragus infra gulam nigrū  
quoddam gerit, quod tragi, id est hirci barbam uocāt. Est autem exocœtus  
piscis saxatilis, ut qui petrosis locis uiuit. Hic mari tranquillo unā cum  
maris effluxu egressus dormit in sicco inter lapillos ad solem cōuersus: qui  
ubi satis quieuerit, sese denuo aquā uersus reuoluit, donec ab undis marinis  
recipiat. Obseruat quoque tunc temporis aues marinas, quæ in litore pa-  
scuntur, sæpe nanque illum aggrediuntur. Has cum uiderit, quantum po-

Tragus.  
Squalidus,  
ἀσπιδωδης.

test, fugit quocunque modo saliendo reptandoque, donec in aquam per-  
petet. Tragus uero cui similem diximus exocætum, infraque gulam nigrū  
quoddā habere quod tragi, id est hirci barba uocatur, pisciculus squalidus  
est, minimūque aut succi continens aut pinguedinis: uictitat apud lito-  
ra herbosa. Exeunt in terram & alia aquatilia, ut qui marini mures uocan-  
tur, & polypi, & murenæ: sed inter ea quæ brachias habent, qui terram pe-  
tit, ut inde cibum accipiat, unum adhuc tantummodo nouimus (inquit A-  
ristoteles) cordulum nomine. Pinnis hic caret, sed brachias habet & pedes,  
& caudam præterea laxam & latam. Natatque pedibus & cauda, quam si-  
milem siluro habet, quoad paruum magno licet conferre. quadrupes idem  
est, ut ad ambulandum idoneus: egressusque cibum petit in terra.

Cordulus.  
κέρδινλος.  
κέρδινλος.

Teragus.

κέρδινλος.

1 Subfulus. Oppianus, *ὑποφύλλος*: Athenæus, *ὑποφύλλος*, id est subrufo. 2 Tragus, &c. Teragus paruus piscis est ex Ouidio, an idē an alius à trago, nondum constat. 3 Inter pisces non inter quadrupedes cordulum numeramus: tum Aristotelem secuti au-  
thorem, tum etiam quia branchias habet, quod piscium proprium est: *κέρδινλος* etiā uo-  
cat eum Numenius. 4 Laxam, *μακρόν*: uetus interpretes, non spissam.

De marino dracone & scorpiōe.

Cap. CLXXXVIII.

Dracomar-  
inus.

δρακων,

Draco.

δρακωνος α-  
μύτης θηου-  
καίης, inquit  
Oppianus.

Dracunculus.

Graculus.

Hæc fere de  
serpente mari-  
na ab Aristo-  
tele narratur.

Scorpio.

Scorpius.

Scorpio mari-  
nus.

Itoralis piscis est draco marinus, partim in arena, partim inter saxa de-  
lgens: cætero quidē corpore (ut Ælianus prodidit) aliis piscibus similis:  
caput uero atque oculorum magnitudo terreni draconis speciem similitu-  
dinemque gerunt: magni enim sunt & uenusti: maxillæ etiā similitudinem  
quandam habent cum terrestribus. Et pellis quoque non procul abesse à ter-  
reni draconis pelle palpanti uidebitur. Simul & infestis & uenenatis arma  
tus est aculeis: habet nanque in brachiis aculeos spinasue uenenatas ad cau-  
dam spectantibus. Quidam aliud uolunt esse dracunculum: est autem, ut Pli-  
nius tradit, graculo similis. Draco marinus captus atque immisus in are-  
nam, cauernam sibi rostro mira celeritate excauat. Draconem marinū car-  
nem habere duram uescientibus omnibus apertum est. Draco marinus ad  
spinæ suæ qua ferit, uenenum ipse dissectus & impositus, uel cerebro toto,  
prodest. Quentiū dolores sedantur ossibus draconis marini scarificatis gin-  
ginis. Quemadmodum draco marinus, sic & scorpio lædit, dum manu at-  
tollitur: aculeo nāque uenenofo armatur: piscis partim pelagius, partim li-  
toralis. Est enim duplex scorpiōum marinorum genus, ut Icesius author  
est. Sapore præstant atque alimenti bonitate qui pelagij sunt: hi rufo  
sunt colore. Alterum genus subatrum est, palustre potius atque cœnosum.  
Vario colore scorpiū esse tradit Epicharmus. Plures habet scorpio appē-  
dices superne circa uētriculum. bis anno parit. Caro scorpiōum dura est,  
& cum sinapi manditur. Ut uero Icesius scribit, cartilagineam duritiē ha-  
bet scorpius: alimentūque præstat copiosum: faciliq; excernitur, ut qui  
absterforiam uim habeat. qui pelagij & rufo colore sunt, uberius alunt. Io-  
cinoris doloribus scorpio marinus in uino necatur, ut deinde bibatur. Scor-  
pius marinus necatus in uino, uesciæ uitia & calculos sanat: lapis qui inue-  
nitur in scorpiōis marini cauda, pondere oboli potus. Pauos discutit scor-  
pio in uino decoctus, ita ut foueantur ex illo. Scorpij marini fel alopecias  
replet;



A replet: oculorum suffusioni, albugini, hebetudini obscuritatiue medetur.

Vel ut alij tradūt, fel marini scorpionis rufi cum oleo uetere aut melle Attico incipientes suffusiones discutit: inungi ter oportet intermissis diebus.

3 eadem ratio albugines oculorum tollit. Scorpana, inquit Xenocrates, durā *Scorpana*. habet carnem, saporis minime ingrati. In mari rubro sagittarius gignitur, *Sagittarius*. erinacei speciem habens, firmis & bene longis armatus aculeis.

1 Ab Ephippo *σφακενίς*, id est dracena uocatur. 2 Spinas, *κακίδες*: uenenum *Dracena*. habent, sed minime mortiferum. 3 Plinius scorpanam & scorpium tanquam diuersos enumerat: Athenzus quoque differe tradit scorpium & scorpanam & colore & succo. Scorpidas quoque narrat Aristoteles in alio fortificare: necdum cōstat an sint *Scorpidēs*, ē scorpium genere.

B

De mugilum generibus.

Cap. CLXXIX.

1 **N**on in saxosis locis, sed in maritimis paludibus fere uictitat mugilū *Mugil*. genus, & apud fluuiorum ostia, ubi copia influit dulcis aqua: atque *Mugilis*. in iis maxime locis parit. Mugil, ut inter pisces, facillime audit. Ventriculū *κατὰ βίς*. habet auium modo carnosum: & altera uentriculi parte plures exeunt appendices, altera uero una tantum. Mugilum genera plura sunt: sed quatuor 2 præcipua numerantur, cephalus, chelon, fargus & myxos: ita Aristoteles. *Cephalus*. Iclesius autem, Leuciscorum, inquit, id est mugilum plura dicunt genera, *χιλών*, cephalus, cestreus, chelon & myxinus: quorum cephalī & suauitate & suc- *σαρχός*, ci probitate cæteris præstant. Secundum locum obtinent, qui *μύξος*, *Leuciscus*. *κατὰ βίς*. tur: iis inferiores sunt myxini: sed omnium deterrimi chelones, qui & bac- *μύξινος*. chi banchiue appellantur. Hæc Iclesius. Euthydemus duo prodidit mugilū *βακχός*, genera, sphenea (quod iciunum est & figuram refert quadrāgulam) & di- *βαλχός*. dactylea, qui latitudinem habet minorem quā duorum digitorum. Do- *ιφλωδός*. rion mugilis marini species duas posuit, cephalum & *αἰστ*, id est iciunum. *αἰστανωδός*. Sunt qui omne mugilum genus sponte oriri opinantur, sed non recte: nam *Νῆστις*. & oua eorum sœminæ, & semen genitale mares habere cernuntur: uerū *Ieiunus mugil*. genus quoddam eorum est, quod nō coitu, sed limo arenāue enascatur, ut quod apud Gnidum olim factum memoratur. Stagnis eorum sub canis or- tu resiccatis, & limo iam arido, ubi primum imbribus restagnare loca inci- perent, pilciculi nascebantur generis mugilum, quod per coitum procrea- tur magnitudine menulæ paruulæ: nec in iis aliquid uel oui uel seminis cō- tinebatur. Et genus quoddam mugilum reperitur in fluuiis lutulentis, in *Mugil flumina- tilis*. quo nec mas est nec sœmina. Nascuntur & in Sipharū lacu mugiles, qui bi- *Chelones*. nas tantum pinnulas habent. Qui chelones dicuntur & fargi, myxi atque *Sargi*. cephalī, grauescere mense Decembri incipiunt: geruntque diebus tricenis. *Myxi*. Parit cestreus iis locis maxime, quā fluuius exit in mare, ut dictū est. Et in- *Cephalī*. ter primos pisces partum accelerat: parit nanque hyeme. In piscium gene- *Cestreus*. re alter alterum sui generis edit, excepto mugile. Cephalus & *κατὰ βίς* soli car- ne omnino abstinent: cuius rei argumentum est, quod neque in uentre tale quid unquam habentes reperiuntur: neque esca in eos ex carne utimur, sed panis ossa. Neque oua fortisue cestrei ab ulla belua uiolantur: ideoque co-

*οὐλοστρον* id est  
minime gulo-  
sum esse: κα-  
στρα, dicit Op-  
pianus.  
Alias, eide[m]  
tam incauta[m]  
facilitas.

piosi existunt: sed cū adoleuerint, tunc à cæteris piscibus corripuntur. Ve-  
scitur mugilis unusquisque phuco algæ, atq; arena. Gulosus omniū ma-  
xime mugilis est atque insatiabilis, inquit Aristoteles: quocirca uentre di-  
steto grauescit: & cum sit ieiunus, uilis est. Cum hic metuerit, caput absco- 6  
dit, corpus totum occultari credens. Eidē tamen tanta facilitas, ut in Phœ-  
nice & Narbonensi prouincia, coitis tempore è uiuariis mare[m] linea lōga  
per os ad branchias religata emissum in mare, eadē[m]que linea retractum,  
fœminæ sequantur ad litus: rursusque fœminam mares partus tēpore. Scit  
mugil esse in esca hamū, insidiāsque non ignorat: audivitas tamen tanta est,  
ut cauda uerberando excutiat; cibos, capitur autem esca, ex pane, lacte &  
menta. retia saltu nonnunquam superat. Viget mugilis autumnō: deterior  
est cū fert utero. Cū plurimis piscium generibus imbres conducāt, mu- F  
gili tamen nocent: fit enim ut pluuiis multi ex his de facili excæcentur, si  
modum aqua excesserit. Et cum pisces omnes, dum uterū gerunt, graui sti-  
mulo agitentur, ita ut in terram exiliant, omnium maxime mugilē ita so-  
licitari certum est. Mugilis & lupo quanquam inimici sunt capitales, ta-  
men statō tempore congregantur. Sæpe mugiles cauda abscissa uiuunt: ab-  
roditur uero à lupo eius cauda. Subit cestreus in amnes & lacus, ibiq; pro-  
spere degit. Cestres (ut Artemidorus tradidit) ascēdunt in Nilum uere, cum  
prægnantes sunt: descendunt autem paulo ante pleiadum occasum unā o-  
mnes parituri: & tunc quoque in septa incidentes capiuntur. Sunt mugiles  
(ut Icesius author est) boni admodum succi: facile excernuntur, nec multū  
alunt. Porro ex alto mari mugil optimus habetur, sapore iucundo, subacri,  
lupo nihilo inferior. subiens hic purū lympidūmq; flumen carnis duritiem G  
temperat, euaditq; delicatior: qui uero in limosis lacubus stagnantibusue  
locis capitur, uirosior est. Attritis imponitur cinis è capite mugilū: cōburi-  
tur autē in fictili uase: illini cū melle debet. Inter falsāmētā mediæ materiæ  
Cestreus est. Bāchi, quē quidam myxinon uocāt, sel auribus utilissimū est.  
Inueniūt in bāchi piscis capite ceu lapilli: hi poti ex aqua, calculosis præ- 7  
clare medētur. Mugilū genus præstantissimū cephalus est, nomen à capitis  
grauitate sortitus. Est uero cephalus alter, qui chelon dicitur: alter pheræus. 8  
Cephalus, quē chelona uocāt, litoribus gaudet: sed prope paludes maxime 9  
uicētat, aut ad fluuiorum ostia ubi copia influit dulcis aqua: alter eiusdē H  
generis trāllitoranus, qui non nisi mucore uestitur suo: quāobrem semper 10  
ipse ieiunus est. Pascuntur limo cephalī: quo fit, ut graues & sordidi sint. Pi-  
scem ipsi nullū omnino edunt, sed & carne penitus abstīnēt: cuius rei argu-  
mentum est, quōd nihil tale in uentre unquā habentes, reperiūtur. Et quo-  
niam uersari in limo solent, efferunt se, urinanturque sæpe, ut corporis sor-  
des mucū[m]ue abluant. Oua sētūsque eorum à nulla belua uiolantur: qua-  
propter copiosi existunt: sed cum adoleuerint, tunc à cæteris piscibus corri-  
piuntur, maximēque ab archana. Parit cephalus ad æquinoctiū autumnā- 11  
le, & eius fœtus nouissime fere omnium apparet. De cephalo Galenus hæc  
prodidit. Cephalus ex eorum piscium genere est, qui squamis integuntur.  
Nascitur autem non in mari solum, sed in paludibus ac fluuiis: quo fit, ut ce-  
phali

*Banchus.*  
*Myxinos,*

*Cephalus.*  
*Chelon.*  
*Labeo.*  
*Cephalus trāf-*  
*litorianus.*

*Archanus.*

*Cephalus.*

A phali non paruum inter se discrimen habeant: ut uideri possit cephalus pelagius alterius esse generis, carnéque ipsa plurimū differre ab eo, qui in palude uiuit, aut fluuio, aut limoso aliquo stagno, aut cloaca, qua expurgatur urbium stercoraria. est enim eorum caro qui in cœnosis & fœdidis aquis uiſcitant, excrementi mucique plena: sicut optima eorum qui in puro mari uiuunt, præsertim si uentorum flatibus agitur. Inter pisces cephalus maxime utraque aqua utitur, marina scilicet & dulci: & hanc habet naturam, ut aduerso flumine natans, quàm longissime à mari discedat. Et hic quidē cephalus numerosas illas ac paruas spinas non habet, sicuti neque marinorum quispiam alius: uerum qui ex fluuio aut palude in mare descendit, non secus ac congeneres huiuscemodi, spinarum plenus est. Hęc de cephalo Galenus. Pausanias quoque cephalos lutosos esse pisces testatur: cœnosisq; locis & fluuiis turbulentis gaudere. Cephalus præstantiam statim indicat gustus: qui enim præstantior est, & suauior sentitur & acrior, pinguedinisque expers: at contrā, qui piugues sunt atque insipidi, ij tum in gustu, tum uero ad concoctionem sunt deteriores, stomachoque aduersi, & malū procreant succum. Hic tamen si sale condiatur, (nam & cephalus sale adseruatur) longe quàm ante præstantior euadit: nam quod in eo mucosum uirosūmque est, id totum deponit. Recens autem salitus iamdiu in sale adseruato melior existit. Leuciscos uocant nonnulli pisces quosdam in fluuiis genitos, alterum cephalorum genus esse rati. Est autem leuciscus cætera quidem usquequaque cephalo similis, nisi quod leuciscus candidior paulo est, capitēque minore & sapore acutiore. Quod ad alendi facultatem attinet, cephalo fluuiatili similis est. De cephalo autem fluuiatili ita cecinit Ausonius: capitonem uocat.

Insipidi, et  
πάλιν γὰρ οὐ  
ἴκανστοι.

Leuciscus.  
Λευκίσκος.

Cephalus flu-  
uiatilis.  
Capito.

Squameus herbosas capito interlucet arenas,  
Viscere præteneris fartim congestus aristas:  
Nec duraturus post bina trihoria mensis.

1 Mugil & κηλίς tam genus quàm speciem significant: uocantur etiam mugiles à quibusdam πλάκας. Mugil apud Varronem etiam in piscinis dulcibus seruatur. 2 Chelon, &c. Plinius placentem cauda labrum dixit ex Ouidio: an idem labrus sit qui chelon? quem Theodorus labeonem uocat: sicuti & σάργον sargonem, & μύφορ muconē interpretatur. 3 Bacchi legitur apud Athenzum: uide an potius banchi legendum sit. Sed banchum alteram speciem uocant quidam, quæ myxinus dicitur, uti infra explicabimus. 4 Mugil fluuiatilis etiam oxyrynchus uocatur, ut Diphilus prodidit. 5 Sipharum lacu mugiles, &c. An sint hi mugiles potius ex anguillarum genere? 6 Ieiunus utilis, &c. Videtur Theodorus hoc in loco legisse, ὅτι οὐ μὴ ἴσῃς: uel uos Al-  
dinam secuti literam Græcam, quam & iisdem uerbis citat Athenzus, ita reddere malimus. 7 Cephalus, &c. Theodorus capitonem uocat. Cephalum alium à cephalino, qui & λαλάς uocatur, Dorian author est. 8 Pherxus, &c. aliàs πέραιος, id est Cephalus, transitoranus, ut uertit Theodorus: hoc est, ut ego arbitror, qui longius à litoribus de-  
git. 9 Eurhydemus & Dorian hæc non de cephalorum sed mugilum generibus re-  
serunt: sed uarie, uti supra uidere licet. 10 Mucore uescitur, &c. Est apud Aristotelem pholis, quæ mucorem quem ipsa emittit, sibi obducit: ita ut in eo quasi cubili quiescat. Acharnas, uide an idem sit piscis, an eiusdem saltem generis. 11 Et apud Aristotelem acharnas, quem æstate laborare scribit, atque eo tempore extenuari. Athenzus acharnū habet: & alio loco acarnan, qui suauis piscis est, & in gustu subastringens: qui & medio-  
Acharnus.

# DE DIFFERENTIIS

*Acarina.*  
*Acarne.*

critet nutrit, & alium ciet. Acharnas, ut uult Xenocrates, neque stomacho gratus est, E neque probum generat succum. Dura carne est, nec facile corrumpitur. Et Plinius acaren habet, an iidem sint pisces an diuersi?

De dasquillo, salpa & quibusdam aliis. Cap. CLXXX.

*Dasquillus,*  
*δασκυλλος.*  
*Salpa, σάλπη.*  
*Σαλπής ο.*  
*Salpe.*

**P**ascuntur cephalicæno, ut dictum est: dasquilli cæno & stercore. Salpa quoque stercore uescitur: uerum hæc natura, ut alij alibi pisces principatum obrineant, ut coracinus in Ægypto, zeus Gadibus: circa Ebusum salpa, obsenus alibi: & qui nusquam percoqui possit, nisi ferula uerberatus. Stercore, ut diximus, uescitur salpa, piscis alioqui saxosis locis uictitans, algosisque & muscosis: atque alga pascitur herbisque. reperitur & in paludibus maritimis: sed esca foetida præcipue capitur, ut stercore. Quin & cucurbita capitur, quod ei ex omnibus uni euenit. Est uero piscis colore uariis, uirgis uel maculis quibusdā rubentibus distinctus. Serratos habet dentes: & solitarius uagatur. auditum habet peracutum. Semel parit, ætatis scilicet initio locis plurimis: nonnunquam uero autumnus. Gustui fere ingrata salpa est, ut Arcestratus author est: in usu autem cibario messis tempore maxime habetur aut autumnus: ut uero Xenocrates docuit, salpæ quæ in alto capiuntur, sapore sunt iucundo, subacri: abundeque nutriunt, nec facile corrumpuntur: quæ uero apud litora, carnem habent durior, saporisque ingrati, & quæ malum procreat succum. Salpe expurgat ulcera in lintecolis conceptis. Gignitur & in mari rubro piscis stomateus nomine, salpæ similis: uirgulas habens per uniuersum corpus extensas auri speciem referentes. Binis quoque uirgulis insignis est piscis, qui scerinus uocatur. Faber, qui & prisca consuetudine zeus appellatur, in Gadium municipio generosissimis piscibus adnumeratur. in Atlantico mari pascitur, nec alibi.

*Aliis, salpes.*  
*Σφαμαπύς.*  
*scerinus.*  
*Faber, ζευς.*

1 Circa Ebusum, &c. Arcestratus circa Mytilenem, Diphilus circa Alexandriam salpas prædicant optimas. 2 Virgis uel maculis, &c. Oppianus, αἰολόετες: Arhepnus, πλόχερμος καὶ ἄνδροχερμος.

De gobione. Cap. CLXXXI.

*Gobio.*  
*Gobius.*  
*Κωβίος.*  
*Gonius.*  
*Gobius.*  
*Gobio.*  
*Κωβίος.*  
*Gobio fluuiatilis.*

**P**iscis paruus gobio est, & ex iis qui parui perpetuo manent. Gobius appendices habet plures superne circa uentriculum. Pariunt iuxta litora gobiones, suæque oua lapidibus committunt latiuscula & arenida. Subeunt in fluuios nonnunquam: ibique pinguescunt. E gobionibus sunt qui in fluuiorum ostiis aut paludibus maritimis uictitant: partim etiam in saxis, & partim in arena degunt. Qui saxatilis est, hunc Numenius κωβίον uocauit. nec marinus solum piscis est gobio, sed & fluuiatilis, quem hoc modo depinxit Ausonius,

Gobio non maior geminis sine pollice palmis.

Præpinguis, teres, ouipara congestior aluo:

Propexique iubas imitatus gobio barbi.

*Κωβίον.*

Præterea alius albus est, nigricat alius, & alius uiridior est, κωβίον uocatur.

Gobionem

A Gobionem album Eurypi non esse pelagium certum est, inquit Aristoteles. Denique

Lubricus & spina nocuus non gouiis ulla est. Et,

Gouiis aculeo pugnat, funditque uenenum.

*Gobius spinosus.*

*Venenum, sed minime mortiferum inquit Aelianus.*

Gobiorum caro, inquit Galenus, ut alesorum & saxatilium piscium carne durior, ita mollior est quam mullorum: crassitudine uero & tenuitate mediocrem generat succum. Præstantissimus autem est gobio, tum ad uoluptatem, tum uero ad concoctionem digestionemque, & ad probum gignendum succum, is qui in arenosis litoribus aut inter saxa uiuit: qui uero in fluuiorum ostiis aut paludibus maritimis degunt, diuersam plane carnem habent ab iis, qui in puro mari uiscitant: neque enim æque iucundi sunt saporis, neque succum tam bonum præstant. Quod si limosa fuerit aqua, aut urbem fluuius expurget, deterrimus euadet qui in illa aqua gignitur gobio. Copiosum, inquit Icesius, sed non bonum procreat succum gobiones sapore grati: facile excernuntur, nec multum nutriunt. Gustui gratiores sunt candidi nigri: uiridium autem gobionum caro substantia est rariore, magis pinguedinis expers, succumque præstat tenuiorem, neque adeo copiosum: ob magnitudinem tamen magis alit. Gobios, qui saxatiles sunt, tene-riorem habere carnem Diocles prodidit. Diphilus, gobij inquit, percis simile præstant alimentum. qui uero ex iis parui sunt & candidi, tenera habent carnem: minimæque uirus olent: probum gignunt succum, & facile concoquuntur: uirides squalidiores minusque pingues sunt. Gobius recens, inquit Dioscorides, si in suillum uentrem coiectus insuatur, & in aquæ sextariis duodecim, donec duo supersint decoquatur: tum excolatus & sub dio refrigeratus potui detur, aluum sine molestia soluit: canum reptiliumque plagis utiliter imponitur. Gobionem saxatilem, uti modo diximus, nonnulli καθάρου uocant. καθάρου, id est (ut equidem arbitror) paruo gobioni specie similis est βλωτός. βλωτός quoque piscis est in herbosis litoribus degens. Blennorum cinis, inquit Plinius, cum ruta, uesicæ uitia & calculos sanat. Epicharmus quoque uilem quendam piscem βαϊόν nominat.

*Gobio saxatilis.*

*βλωτός, βλωτός.*

*Blennius, βαϊόν.*

1 Gobio, &c. Siculi καθάρου uocant: alij καθάρ. Sunt qui καθάρου & καθάρου habent.

*καθάρου, καθάρου, καθάρου, καθάρου.*

D De apuarum generibus & similibus quibusdam aliis.

Cap. CLXXXII.

1 E Gobionibus paruis & ignobilibus, qui terram subeunt, creatur pisciculus qui καθάρου dicitur apuæ genus. Porro quam apuam nostri, aphyen Græci uocant: quoniam is pisciculus è pluvia nascitur. Grauis cibus apua est & concoctu difficilis, ut Diphilus prodidit. Sunt autem apuæ plura genera: quæ aphritis & aphros, id est spuma uocatur, non ex coitu gignitur, sed ex terra arenosa consistit: quod quidem apuæ genus nec incrementum capit, nec prolem affert: & temporis longioris spatio perit, sed denuo nascitur: unde fit ut breui quodā tempore excepto, omnibus fere anni temporibus generetur. Effertur id pisciculi genus funditus de terra, argumentum est, quod

*Αφίς, qui in arena gignuntur.*

*καθάρου, Αφά, Αφίς, Αφίς, Αφίς.*

nisi tempore tepido non capiatur: utpote quod de humo ad summa tepo-  
 ris gratia ueniat. Fiunt locis umbrosis & tepidis, quoties temporis benefi-  
 cio solum tepescit, ut in Attica terra apud Salaminem, & iuxta Themisto-  
 cleum, & in Marathone: non nusquam uel cum aqua de cælo incessit ori-  
 tur pisciculus hic in spuma, quæ à copioso imbre cadente efficitur, unde no-  
 men spumæ (ἀφρός) accepit: ferturque interdum per summa maris, (cūm cæ-  
 lum tranquillum fuerit) & in spuma fluitat, perinde ac in fimo uermicu-  
 lus uoluitur: quamobrem in loca complura genus id apuæ affertur è ma-  
 ri: & copiose quoque generatur, & capitur anno tranquillo & humido. Iis  
 itaque ortus partim ex limo aut arena, partim per summa facta putredine  
 agitur. Reliquum uero apuarum genus, scætura piscium est: quæ etenim co-  
 bites dicitur à gobionibus, ut modo diximus, paruis ignobilibus creatur. F  
 Quæ uero phalerica uocatur, mēbradas gignit, quibus unā cum spinis ue- 4  
 sci solemus: sicuti & aliis quæ ex iis procreantur: uocantur autem trichides. 5  
 Ex iis trichidæ oriūtur, uile edulium, ut testis est Iulius Pollux. Trichias, uel, 6  
 ut Aristoteli uidetur, trichæus, cum pōtum ingreditur, uidetur & capitur:  
 sed exiens nusquam uisus adhuc est: sed hi soli Istrum amnē subeūt, unde,  
 quā diuiditur fluuius, per abditum terræ meatum in Adriaticum mare de-  
 fluunt: argumento est, quòd subeuntes ex Adriatico in meatus illos nun-  
 quam capiuntur: sed descendentes in Adriaticū semper. Trichias bis anno  
 parit. Est apuæ genus quoddā, quale in portu Atheniensium nascitur, quod  
 encrasilochos dictos progenerat. ut uero quibusdam uidetur encrasilochi  
 ex illo apuarum genere procreatur, quam cobitin appellari diximus: quin- 7  
 etiam genus aliud apuæ est, quod manarum & mugilum sit scetus. Illa ue-  
 ro altera quæ aphros & aphritis dicta est, humida est, breuēque, ut dictum  
 est, tempus durat, & restant tandem caput & oculi. sed iam piscatores quē-  
 admodum deportare possunt inuenerunt: sale enim aspersa plus temporis  
 adseruari potest. Et hæc certe cæteris quæ hæcenus dictæ sunt omnibus  
 præstat. Cobitin etiam epseton pisciculum uocat Dorion: & illum quoque  
 qui ex athrine pisciculo procreatur. Est sane epsetus in apuarum genere pi- 8  
 sciculus. epsetos uocat nonnulli pisciculos qui in fossulis relinquuntur Nilo  
 recedente. Præterea quoddā apuæ genus triglirē Dorion nominat. Iccius 9  
 in apuarum genere quædam, inquit, alba & tenuis admodū est & spumea, 10  
 quā cobitin nonnulli appellant: alia pleniorē crassiorēque corpore, & sor-  
 didior: præstantior quæ nitida & tenuis est. Engraulis, ut scribit Oppianus,  
 apuæ genus est, pisciculus perimbecillus & timidus: ut qui grauissima sit pi-  
 scibus omnibus præda. Engraulēs cæteruatim & uelut nodo indissolubili  
 colligati nantur: ut nonnunquam uel nauim remorari possint: capiunturq;  
 retibus magno numero. Sūt, inquit Oribasius, pisciculorum minimorum  
 genera quædam, quæ sale adseruantur, quæ unā cum acrioribus oleribus  
 eduntur. Vocantur alia κερκιδία, alia βοειδία, alia κελμία, alia τριφλωιδία, quæ 11  
 omnia & stomacho infesta sunt & aluum citant, nec facile corrumpuntur.  
 Apuarum tanta est Athenis copia, ut ob uilitatē (ut Chrysippus refert) uul-  
 gare sit mendicorum edulium: cum tamēn aliis locis, ubi longe deteriores  
 nascuntur,

Cobites.

Phalerica.

Membradas.

Μαμκογιδίας.

Trichides.

Trichias.

Trichæus.

An hic tri-  
 chias idem sit,  
 an alius piscis.  
 Encrasilochus  
 Ἐνκράσιλος.

Aphros.

Aphritis.

Epseton.

Επιστον.

Αθρίνη.

Αθρίνη.

Triglirēs.

Cibotis.

Κικιδία.

Boeulidis.

Κελμία.

Τριφλωιδία.

Κερκιδία.

Βοειδία.

Κελμία.

Τριφλωιδία.

Απυα.



A nascuntur, magno habeantur in pretio. Apua, ut Clearchus peripateticus docuit, piscis genus est molle ac tenerū adeo, ut admotū igni protinus de-  
 12 coquatur: & oleo feruenti iniectum, statim ab igne auferendum præcipiat Archestratus. Apua, membrades & trichides, piscesque id genus alij, quibus unā cum spinis uesci solemus, humidius præstant alimentum, statuo-  
 sūmque, dum in uentriculo concoquuntur, generant spiritum: ut qui concoctionem recipiunt minime æqualem, statim etenim caro ipsa concoqui-  
 tur, sed spinæ tempore longiore perficiuntur.

Apua.  
 Membrades.  
 Trichides.

1 καλὴς dicitur, Theodorus gobionariā uocat. 2 Apua, &c. Aplua Theodoro, Ἀφύα καὶ ἀφύδιον uocatur. 3 Oritur pisciculus. Apua proueniunt, ut docet Plinius, spuma maris incalescente, cum admissus est imber. 4 Phalerica. φαλεικὰ, Lynceus φαλεικὰ ἰφύα. B Samius φαλεικὰ ἰφύας dixit. 5 Membrades appellatur, & λιμβράδες, & λιβράδες, & λιβράδων. 6 τριχίδες, Theodorus sardinas, & τριχίνας sardas uocauit: Dorion uero τῶν τριχίδων τριχίνας appellat. Vtrunque Theodorus & τριχίνας & τριχίνας sardam interpretatur. Sed quis piscis sit sarda infra explicabitur. τριχίνας & τριχίνας an idem sit piscis nondum nobis cōstat: an uero apud alterutrum, Pliniū scilicet an Aristotele, menda sit. 7 Engrasilochos. Engralos alij legunt. Eundē piscem arbitrantur nō nulli esse engrasilochū, & engraulim. 8 Atherine an sit eadem quæ atherina? de qua infra. 9 Epsetos, inquit Hermolaus, ἀκοῦδο nominar arbitror: quos Artemidorus etiam plestos uocauit. Theodorus ἰψίνας naricas interpretatus est: nescio quā uere, inquit Hermolaus. Piscis certe minimus est narica, ut Festus inquit. 10 Spumea, ἀφρόδες, id est rariore substantia, arbitror. 11 Hæc arbitror, in apuarum genere numerantur. 12 Admotum igni. Hinc ortum est prouerbum, ἰὰ πῦρ ἰφύα, quasi uidisse modo sufficiat ad decoctionē.

Gobionaria.  
 Aplua. Ἀφύα.  
 Ἀφύδιον.  
 φαλεικὰ ἰφύα.  
 Apua phalerica.  
 λιμβράδες.  
 λιβράδες.  
 λιβράδων.  
 Sardina.  
 Sarda.  
 Engraulim.  
 Plesti.  
 Narica.

C Detrichide, thrissa & similibus quibusdam aliis.

Cap. CLXXIII.

ET trichidas, uti modo diximus, membrades gignunt: & uulgi cibus tri-  
 echis est, & qui uili cōparatur. saltu simul ac cantu summopere gaudet,  
 ut nonnunquam cantuum uoluptate captus exiliat è mari. Trichida sunt  
 1 qui arbitrantur eundem esse cum trissa: similes certe sunt trichides, thrissæ, chalcides & eritimi. Thrissæ, inquit Oppianus, chalcides & abramides ca-  
 teruatim natant locum seniper mutantes, modo in alto pelago, modo apud  
 2 litora uiscitantes. Aristofus spinosusque piscis est thrissa, nec multum habes  
 in se pinguedinis: neque succum in alimento præbet copiosum, sed eum ta-  
 D men, qui facile in corpus digeritur. Ascēdunt in Nilum thrissæ, sicuti & ce-  
 4 stres soli fere piscium, ut Aristobolus author est, absq; crocodilorum me-  
 tu. Qui Mareotin lacum accolūt, thrissas illic cātū & testarū concrepātium  
 consonantia piscantur: etenim ex saltantes in piscatoria ad se comprehen-  
 dendas explicata instrumenta incidunt: atque hoc pacto Egyptij splendi-  
 dam prædam consequuntur. Trissam nonnulli clupeam interpretantur, si-  
 cut alij alosam. Est autem clupea, authore Plinio, minimus piscis, qui attri-  
 tum ingentem fluuij Padi piscem, uenam quandam eius in faucibus mira  
 cupidine appetēs, morsu exanimat. huic inter pisces primas partes tribuit  
 3 Ennius poeta. Alosam autem piscem plebeium esse ostendit Ausonius  
 4 hoc carmine:

Τριχίς.  
 Thrissæ.  
 Thrissæ.  
 Θείας.  
 Ερίτιμοι.  
 Αβραμίδες.

Clupea.

Alosa.

Stridentēsque focus obsonia plebis alosa.

*Chalcis.*

Chalcis trichidi atque trissæ similis est, piscis aristofus spinosusue: (aut sic- E  
cus & squalidus, hoc est ἀγρόδης) neque multum in se pinguedinis cōtinet, 5  
neque succum copiosum in alimentum præbet: facile tamen in corpus di-  
geritur. gregalis piscis est. Et gregatim natat chalcides (ut modo diximus)  
locum semper mutantes, modo in alto pelago, modo apud litora degētes.  
In fluuiatiliū quoque numero chalcis est. Ter parit, & gregatim sua oua  
gurgiti altiori mandat congesta. sonitum quendam & ueluti stridorē non-  
nunquam emittit. Chalcis uitio infestatur diro, ut pediculi sub branchiis  
innati plurimi interimant: quod nulli ex cæteris accidit. Chalcidas nōnulli  
fardinos uocarunt. Aristoteles eritimos fardinos dixit. Est uero eritimus 6  
chalcidi trissæq; similis, & in alendo quoque: quē Dorion condimēto sua-  
uiorem euadere prodidit. Sale cōdiuntur nonnulli pisciculi, in quibus chal F  
cis est & halecula.

*Sardinus.**Eritimus.**Chalcis.**Halecula.**Θεγία.**Θεγία.**Thessa.**Thetta.**Αλοφα.**Clypea.**Atherina.**Arista.**Chalcem.**Erica.**Spuria.**Sardinia.**Sardina.**Sardena.**Σαρδηνία.**Halecula.**Halecula ri-**nalis.**Alec.**Maing.**Mana.**Τεγίης.**Hircus.*

1 Thrissæ. Θεγία uel Σπαγία alius, opinor, marinus est pisciculus uersicolor: thes-  
sa à quibusdam uocatur & thetta. 2 Aristofus spinosusue. Theodorus spinosum  
dixit. Græca Aristotelis exemplaria οὐκ ἀριστόφου habēt, sed falso, ut opinor: Athenæus  
ἀγρόδης fortasse, id est squalidus, aut siccus. Θεγία Theodorus alofam uocat. 3  
Ennij uersus extat apud A pulcium,

Omnibus ut clypea præstat mustella marina, &c. Sunt qui legant clypea.

4 Alofam. Atherinam Phauorinus uilem esse piscem radidit: an eadem sit cum  
alofa, consideret lector. Atherina (quam aristam appellat Theodorus) solitariorū ge-  
nere (ita nanque interpretatur ἐνιάδης) prima in hoc genere parit: fortisque eius pri-  
mum fere omnium apparet. parit atterens alium arenæ. 5 Chalceus piscis alius à  
chalcide est Cyziei frequens, figuratere, τοῦ ἀφ' οὗ τὴν καὶ κινδυνώδης: an idem sit, qui G  
faber? Chalcida Theodorus ericam interpretatur, nonnunquam & spuriam: quæ in-  
ter fusaneos pisces numeratur, & qui semel pariunt. Verum eo in loco uidetur exem-  
plaria omnia mendosa: nam chalcis gregalis est, non fusaneus: & ter parit. 6 Sardi-  
niam habet Columella pisciculum salsamentis idoneum, & à chalcide diuersum: nisi  
deprauatus sit codex. Item fardinam Galenus, uel fardenam Σαρδηνία.

De haleculā, mānā, smaride & boce. Cap. CLXXXIII.

Abentes haleculas incrementi minuti pisces iubet Columella præbe- 1  
re, qui in uiuariis seruantur piscibus. Riualet quoque haleculā no- 2  
minat inter ea, quæ sunt incrementi parui animalia. Alecem appellant nō- 3  
nulli quam Græci μακίστη uocāt, & Plinius mānam. Colore mutantur mā-  
næ, candidiores hyeme, & fiunt æstate nigriores, id quod maxime suis pin- H  
nis & branchiis declarant. Herbofis litoribus gaudet māna, & gregalis est.  
Omnium piscium fortundissima est, & post brumam parit. utero grauis  
melior est. Forma rotundior fœminæ, porrectior mari & latior. Euenit ut  
cum fœtu impleri fœmina incipit, maris color in nigriorem, plûsque ua-  
rietatis mutetur, & caro deterrima cibo efficiatur: uocantur à nōnullis per  
id tempus τεγίης, id est hirci. Mānæ succi bonitate gobiones superāt, ut tra-  
dit Icelius: sed suauitate inferiores sunt. Capitis mānarum, quæ sale adser-  
uantur, cinis, exsiccandi uim habet, nō admodum acrem: idcōque ad sedis  
rimas eo utimur: quidam & ad columellam diu induratam. Hæc Galenus.  
Mānarum ex capitibus cinis, inquit Dioscorides, si imponatur, callosas se-  
dis

Adis rimas abolet: cuius etiam garum putrida oris ulcera, si eo colluantur, sistit; Plinius mænarum muria & capitum cinis, inquit, cum melle sanat strumias. Anginas mænarum salfarum ex capitibus cinis ex melle illitus abolet. Mænæ salsa cum felle tautino illitæ umbilico aluum soluunt. Capitibus mænarum cinis ad rhagades & condylomata utilis. uulgo è mænibus iucundissimus habetur sal: ex eo saltè genere quod è muria fassamenrorum recoquitur, iterumque consumpto liquore ad naturam suam redit. Mænidis similes sunt boces & smarides, ut Pseusippus auctor est. Est autem smaris piscis *Smarides* litoralis, & litoribus gaudet herbosus. Colorem mutat non aliter atque mænæ: candida enim hyeme; rursus æstate ad nigredinem redit: quod maxime suis pinnis & branchiis declarat. Smarida nonnulli *κωὸς ἔρκε*, ἢ *κωὸς ἔρκε* uocant. *κωὸς ἔρκε* Bocarunt. Smaridis caput exustum excrecentes in ulceribus carnes reprimunt. nomas cohibet, thynnos clauosque absumit. eius caro, non secus ac cætera fassamenta, scorpionum ictibus canumque rabidorum moribus prodest. Verèdorum pustulas discutiunt smarides illitæ. Mulieribus lactis copiam faciunt smarides cum prissana sumptæ, uel cum sceniculo decoctæ. Box, ut diximus, mænæ & smaridi similis, in dorso quasi pictus, *παρὰ τὴν σελήν*, uti Athenæo placet, nominatur: piscis paruus, oculos habens pro corporis ratione grandes: adeo ut Aristophanes Bizantius, non *βόα* aut *βόνα*, sed *βόκα* potius appellandum statuerit, ab oculorum scilicet magnitudine, quasi bovinos habentem oculos. Piscis gregalis est & litoralis, in locis herbidis uiçitans. Concoquitur facilius box, atque in corpus digeritur iurulentus, & aluum mouet: uerum assus suauior est & tenerior. Sunt & quidam pisces *Λευκομένηδες* dictæ, id est mænæ candidæ, quas aliqui *βόκκας* appellant: alij diuerfos asserunt.

1 Aleculam arbitratu Hermolaus genus, non speciem esse: idemque apud nos significare aleculas, quod anthracidas apud Græcos, id est prunarios aut carbonarios: quicumque scilicet in pruna & craticula commodè coqui possent: uerum ex Columella apparet species esse. 2 Alecem appellant nonnulli, &c. Alex Plinio nō piscis, sed gari uicium est, scilicet imperfecta nec collata sex. nec sane occurrit locus quispiam apud ueterem aliquem authorem, qui plane ostendat alecem aut alec piscis genus esse. Horatius in primo Sermonum, Ego secem primus & alec inueni. Nonius Marcellus locum hunc citans piscem significare dicit. 3 Quas Græci smaridas appellant, miror unde Theodorus certos interpreteetur, inquit Hermolaus. Sunt quidem Gerres Plinio & Martiali quoque inter uiles pisciculos, sed diuersi à smaridibus, uti ex Plinio ipso liquet lib. 32. Martialis lib. 12.

Fuisse gerres aut inuitas mænias,  
Odor impudicus ureci ferebatur.

4 *Κωὸς ἔρκε*, Vocam interpretatur Theodorus. Et certe lectio Pliniana in uetustis codicibus *βόκα* habet, non box, ut notat Hermolaus. Bocar, inquit Festus, piscis genus est à boando, id est uocem emittendo. *Ἀμφιπόσι τὸ βόκα*, id est boces utriusque dixit Oppianus: quasi duo sint eorum genera.

De aliis quibusdā piscibus, qui uocales dicuntur,

Cap. CLXXXV.

Pisces uocis quidem expertes sunt, ut diximus, sed sonos quosdam stridorisque mouent, qui uocales esse existimantur, ut lyra, ut chromis, de *Lyra*.

# DE DIFFERENTIIS

*Pisces uocales,  
ἰχθύες φωνώπτες,  
φωνηλαί.*

*Porcus.  
Orthogorisc<sup>o</sup>.*

*Porcus marinus.  
κάπρος.*

*Aper.  
ῥε, Sus.  
+αμμίτις.  
+αμμίδης.  
ῥε θαλάσσιος.  
Sus marinus.*

*De his infra  
inter cybiorū  
genera.*

*ποταμὸς χοίρος, porcus fluuiatilis.  
ἰκαόρος.  
ῥαίτις.  
Sua, Hyæna  
Sus.*

qua suprà dictum abunde est: his enim quasi grunntus quidam emitti-  
tur. In Clitore amne pisces uocales esse Mnaseus Patrensis author est. Phi-  
lostephanus Cyrenensis Callimachi familiaris, in Aorno fluuiio pisces esse  
tradit similiter turdis auibus uocales: uocari autem ab accolis *φωνηλαίς*. Ego  
uero, inquit Pausanias, hos pisces cum taperent uidi: uocem autem audi-  
ui nunquam, quanuis uel ad uesperum usque, apud fluuium expectassem:  
quo maxime tempore uociferare serūt. Appion maximum piscium esse  
tradit porcum, quem Lacedæmonij orthagoriscum uocant: grunntum cum  
cum capiatur. Inter uenena sunt piscium porci marini spinæ in dorso, cru-  
ciatu magno laforum. Remedium est limus ex reliquo piscium eorū cor-  
pore. *κάπρος*, ut inquit Aristoteles, id est aper, piscis, quem amnis Achelous  
gignit, uocalis habitus est: & grunntum habet. Idem fortasse quem *ω*, id  
est, suem uocant nonnulli, alij *ἰαμμίτις* uel *ἰαμμίδης*: quanquam *ῥε θη*  
*λάσιοι*, id est sues marini non inepte dicūt etiam thynni, cum à glandium  
marinarum esu pinguiore efficiantur. Circa Lusitaniam nanque, ut refert  
Polybius, nascuntur in mari glandes, quibus uescentes thynni mirum in  
modum pinguescunt, nō aliter atque porci quadrupedes terrestribus glan-  
dibus: quocirca non immerito sues aut porci marini dici possunt. Laudan-  
tur in hoc pisce maxime, quæ circa uentrem partes sunt: *κατάγρια* dicun-  
tur & abdomina.

1 In Aorno, &c. In Arganio Arcadiæ fluuiio scribit Pausanias. 2 *κάπρος*, Hic  
forsitan est, quem Athenæus *ποταμὸς χοίρος*, id est porcum fluuiatilem uocat: quem e-  
tiam ex Aristotele uocalem esse tradit. Eodem loco habetur *ἰκαόρος*, quem & uocalem  
esse dicir, nisi forsitan menda sit, & *κάπρος* scribi debeat. 3 *ῥαίτις* quoque piscis est,  
& *θηλαία*: sed an iidem an diuersi à sue, dubitat Athenæus. Durique sues, dixit etiam Oui-  
dius in Halieutic. De hyæna ita habet Plinius, Et hyænam piscem uidi in Oenaria in-  
sula captum, caput exerentem. Hyæna ab Oppiano inter ferocia cete numeratur, quæ  
multo sit immanior quàm hyæna terrestris.

De thynno, thynnide, pelamide, & huiusce generis aliis.  
Cap. CLXXXVI.

*Thynnus,  
Thunnus.  
Scarodyla.  
Cordyla.  
Αὐσίκτη.  
Auxuma.  
Cordyla, uel  
cordula.  
Pelamis,  
πυλαμὶς.  
Limosa.  
Lutaria.  
Sarda.  
Thunnus.  
Thynnus.  
Pelamis.  
Thynnus.  
Orcynos.*

Cum annuum excessere tempus, thynni uocantur: etenim cum thynne  
in Ponto pepererint, prodeunt ex ouo, quas alij scarodylas aut cordy-  
las uocant: Bizantij auxidas (Theodorus auxumas) nominant, quia diebus  
paucis adolefcunt. Cordyla, inquit Plinius, pelamis pusilla, cum in Pontum  
è Mæotide exit, hoc nomen habet. Hæ Ponto exeunt autumnno in mare u-  
nà cum thynnus: eodem autem redeunt uerno tempore, iam adeptæ eā ma-  
gnitudinem, qua limosæ aut à luto, pelaonidis, id est lutariæ nomen acci-  
pant. Sarda quoque uocatur pelamis longa ex oceano ueniens. Limosis  
thynni prouectiores ætate anno esse putantur uno: & thynni tunc uocan-  
tur, uti modo diximus, cum annuum excessere tempus. Præ nimia pingue-  
dine disrumpuntur thynni nonnunquam: nec fere plusquam biennio pos-  
sunt uiuere, ut Aristoteles author est. Pelamis, uti Solstratus prodidit, etiam  
thynnus dicitur, cum scilicet ad thynni magnitudinem increuerit: postea  
uero maior adhuc reddita, orcynos uocatur. Postremo autem cum ingen-  
tem in

A tem in molem creuerit, cete. Et quidem iam captus est thunnus sene x, inquit Aristoteles, cuius pondus erat ad talenta quindecim: & caudæ interval-  
 uallum ad cubita quinque & palmum: (Plinius, duo cubita, inquit & pal-  
 mum.) Levis piscis thunnus est, mari amniq̃ue cōmunis. Differt mas thyn-  
 nus à femina, eo quòd feminae pinnula iuncta sub uentre est, quam apha-  
 rea nuncupant, quæ mari deest. Cocunt thunni mēse Februario post idus;  
 6 pariunt Iunio ante nonas. & semel anno parit thunna: sed quoniam partē  
 præmature, partem sero producit, hinc fecundicare bis creditur. Edit sua oua  
 condita quasi utriculo, in quo oua exigua multaq̃ue consistunt. Incremen-  
 tum autem partus præcipua sumit celeritate. Pelamides ac thynne in Pon-  
 to pariunt, nec uspiam alibi ut sentit Aristoteles: ut uero Strabo refert, pa-  
 riunt in Mæotide palude. A partu statim oua sua, & prolem deinde parua  
 adhuc, deuorat thunna. Carne sola uescitur thynnus magna ex parte: quan-  
 doque etiam algam tangit, sed & glande quoque pinguescit, ut modo di-  
 ximus. Thunni omniū maxime gaudēt tepore: & ob eam rem arenam &  
 litora adeunt. per summa etiam maris natāt, quo tepore potantur. Latent  
 thunni præaltis gurgitibus hyeme, & bruma non uagantur: sed ubicunque  
 deprehensi, usque ad æquinoctium, ibi hybernant. Pinguescunt à latibulo  
 maiorem in modum: sunt quoque magna ex parte suauissimi cum latent.  
 Primadix in cæno se abdunt, cuius rei argumentum est, quòd neque eo tē-  
 pore, hyemis scilicet, capiuntur: & si capiuntur, dorso fœculento pinnisq̃ue  
 C oppressis spectantur: uerno autem tempore prodeunt & appropinquāt ad  
 terram cocuntes parientesq̃ue: quo tempore fœtu grauidē capiuntur, tem-  
 pestiuaq̃ue tantisper esse putantur: autūno uero & hyeme deteriores sunt.  
 simul etiam mares pleni genitali semine (quod ἰσχυρὸς appellant) per id tem-  
 pus cernuntur, eoq̃ue præstant ad usum: fœtu in utero adhuc paruo, diffici-  
 le capiuntur: adultiore iam, larga captura propter infesti asili stimulum.  
 Circa canis enim exortum agitantur asilo thunni: habent enim per id tem-  
 pus ceu uermiculum quem ἰσχυρὸς, id est asilum uocāt, effigie scorpionis, ma-  
 gnitudine aranei. Infestat hoc tāto dolore, ut uel in naues sæpenumero exi-  
 liant: id quod facit, ut sit in æstate deterior thunnus. Post arcturum deinde  
 melior est: iam enim eo tempore ab infestantis asili agitatione requiescit.  
 Thynni in Pontum in dextra ripa intrant, exeunt læua: id accidere existima-  
 D tur, quia dextro oculo plus cernūt, (utroque hebetere natura) læuo hebetius.  
 Est in Euripo Thracij Bosphori, quo Propōtis Euxyno iungitur, in ipsi Eu-  
 ropam Asiamque separātis freti angustiiis, saxum miri candoris à uado ad  
 summa perlucens, iuxta Chalcedonem in latere Asiae. Huius aspectu repē-  
 te territi, semper aduersum Bizantij promontoriū præcipiti petunt agmi-  
 nes: itaque omnis captura Bizantij est magna Chalcedonis penuria. Operiū-  
 tur autem aquilonis flatum, ut secundo fluctu exeant ex Ponto: nec nisi in-  
 trantes Pontum Bizantij capiuntur. Intrant thynni, uti modo diximus, è ma-  
 gno mari Pontum uerno tempore gregatim: sed multi tamē in Proponti-  
 de æstiuant: Pontum non intrant. Thynni nauigia uelis cuntia comitātes,  
 mira quadam dulcedine per aliquot horarum spatia & passuum milia à gu-

*Aphareus.  
 ἰσχυρὸς.  
 ἄσπης.*

*Idē sentire mi-  
 detur Plin. lib.  
 32, ca. 7 de cor-  
 dyliis.*

*Primadix.  
 requiescit, id  
 est pelamides  
 nostra certe o-  
 pinione.*

*Asilus, ἰσχυρὸς.*

*Pompilus.**Pelamis.**Sarda.**Thunnus.**Cybiorum genera.**Cyβιον, κύβιον.**κύβιον, κύβιον.*

bernaculis non separantur, ne tridente quidem in eos sapius iacto terri. E  
 Quidā eos qui ex thynnīs faciant hoc, pompilos uocant. At uero pōpilum  
 alium esse piscem ſcitiunt & Ouidius & Oppianus, atque Athenæus: pelagium  
 quidem piscem, & qui pelamidi ſimilis ſit, ſed diuerſus tamen: qui &  
 circa naues frequenter conſpicitur ludibundus, eāſque ad terram uſq; eun-  
 tes comitetur. Pelamis, Diphilo authore, cibus grauis, copioſeque alit, con- 7  
 coctu difficilis, urinam ciet: quod ſi ſale maceretur, facilius aluum mouet,  
 & extenuandi ui prædita eſt. Sapore quoque iucundo eſt, inquit Xenocra-  
 tes, & meliuſculum procreat ſuccum: nec facile corrumpitur. Sarda, ut idē  
 ait, guſtui grata eſt: ob eam quam in ſe habet acrimoniā cybio præſtan-  
 tior: appetentiam incitat, & aluum mouet. Thynni autem caro, eodē au-  
 thore, ſtomacho aduerſa eſt, aridāque & mali ſucci: ægre deiicitur aluo, ſed F  
 copioſum præſtat alimentum: & in ſumma, grauis cibus eſt, ut Diphilus  
 prodidit. Galenus thynni, inquit, ſicuti & grandiores alij piſces, ſuccum gi-  
 gnunt craſſum tenacēque: ac proinde eorū uſus ſenibus inutilis eſt. Quæ  
 autem pelamides uocantur, carnem habēt teneriorem: & ſuccum gignant  
 craſſum, qui ad mediocritatem magis tendat. Et, ut paucis dicam, thynnorum  
 caro, qui & ætate & corporis mole ſunt minores, non perinde dura eſt  
 atque ſeniorum maiorūque. Thynni recentioris adipe Attalus ad recentiora  
 ulcera uſus eſt. Philothrum eſt thynni ſanguis, ſel, iecur, ſiue recentia  
 ſiue ſeruata: iecur etiam tritum, mixtāque cedria plumbea pyxide adſeruatum.  
 Thynni ad rem ſaſamentariam ſenes improbi ſunt: quæ autem pelamides  
 uocantur, iis longe præſtantes ſunt: ut quæ laudatiſſimis ſaſa- G  
 mentis non cedunt. Hæ particulatim conſectę in genera cybiorum diſpar- 8  
 tiuntur: concifa nanq; pelamis quæ poſt quadraginta dies à Ponto in Mæotim  
 reuertitur, cybium uocatur. Cum uero annuum exceſſere tempus, &  
 iam primum thynni uocantur, uti diximus: hi membratim caſi ceruice &  
 abdomine commendantur atque clidio, recenti duntaxat: & tum quoque 9  
 graui ruſtu: cætera parte plenis pulpamenti ſale adſeruantur. Melandrya  
 uocantur caſis quernis aſſulis ſimilima: uiliſſima ex his, quæ cauda proxima, 10  
 quia pingui carent: probatiſſima ea quæ faucibus. Hæc Plinius. Xenocra-  
 tes cæteras thynni partes præter collum & abdomen melandrya uoca-  
 uit, quod nigris quercuum radicibus ſimiles ſint. Sed quamnam recipiant H  
 diſcrimina thynnorum partes, quæ ſale adſeruantur, mox referetur. Thyn-  
 ni falſi carnē Dioſcorides *δυσώδην* uocari ſcribit. Hæc ſi edatur, iis quos ui- 11  
 pera, quæ præſter dicitur, momorderit, auxiliatur: oportet autem uinum  
 quamplurimum ſubinde cogantur haurire, indēque euomere. Iis quibus  
*δυσώδην* opus eſt, id eſt, qui acrioribus cibus ad uomitionem proritandam  
 indigent, accommodatiſſima eſt. Canum morſibus utiliter imponitur. Pelamidum  
 ſaſarum capitum cinis uel cybiorum cum melle ad cōdylomata & rhagadas  
 utilis eſt: ſarda priuatim contra præſteris morſum prodeſt. Quod cybium  
 uocatur, inquit Galenus, uulneri à cane inſiſto non ſine utilitate imponi  
 prodidēre quidam: & contra draconem marinum ex aceto. Cybia uetera eluta  
 in nouo uaſe, deinde trita, proſunt dentium doloribus.



- A** bus. Aluum purgant cybia uetera: priuatimque cruditates, pituitas bilé-  
que trahunt. Pamphilus melandryn genus thynni grandissimum esse sta-  
12 tuit. In pelamidum maiorū genere apolectus, (uel, ut alij legunt, apolectū)  
uocatur pelamidum generis maxima, tritone durior. Orcynus pelamidū  
generis maximus neque redit in Maotim similis tritoni, uetustate melior:  
uel (ut Diphilus prodidit) orcynus cum magnus est, chelidonia similis est,  
13 quod scilicet ad carnis duritiem attinet. Orcyni, inquit Dorion, ex oceāno  
per columnas Herculis in nostrum mare permeant: quo fit, ut in Iberico &  
Tyrtheno mari capiantur plurimi: circa Gadiram insulam pinguiissimi,  
uti refert Icesius: deinde circa Siciliam: quo uero longius à Gadibus rece-  
dunt, eo macilenti magis euadunt. Orcyni carnem tradit Xenocrates sto-  
**B** macho ingratam, malique succi, & aridam: abūde nutrire, nec facile per al-  
14 uum excerni. Synodontis maior pelamis appellatur. Triton pelamidū ge-  
neris magni, ex eo horæa cybia fiunt, quæ duriora solidioræ sunt, quàm  
quæ ex pelamide. Chelidonia pelamidi simile præstat alimentū, nisi quod  
durior est. Xáthias, inquit Diphilus, tenerior est quàm orcynus: uirus quo-  
que nonnihil olet.

*Melandryn.*  
*Apolectus.*  
*Apolectum.*  
*Orcynus.*

*Synodontis.*  
*Triton.*  
*Chelidonia.*  
*Xanthias.*

- 1 Alij scorodylos, &c. Oppianus & hās pelamidas uocat. 2 Thynnum Aristo Pelamis.  
teles nonnunquam inter pisces gregales numerat: aliquando uero inter fufaneos, nisi  
alicubi menda sit in exemplaribus. 3 Sarda quoque &c. Ex hæc (opinor) salsamen  
ta sunt præstantissima, quæ Sardica uocantur & sardæ, de quibus infra: & Galenus lib.  
**C** 3 de aliment. 4 Thynnis fœmina est Aristoteli, Oppianus eā *θυνὴ* uocat. Thyn-  
nidas quoque nonnulli trichiadas uocant, & *θυρινιάδες* uel *θυρινιάδες*, ut refert Athe-  
nezus. *Αἱ θυρινιάδες*, quantum conicio ex Aristotele, pro pelamidibus accipiuntur, si-  
cut & thynnides quoque. *Πελυγίαι* sunt apud Oppianum inter eos pisces, qui in alto  
mari degunt: an etiam ex hoc genere, an menda sit, pro *θυρινιάδες*, an sint orcynorum  
species. 5 Apharea, athera uocat Athenæus. 6 Aristotelis lib. 6 hist. anima-  
lium hæc de thynnibus refert: cum tamen lib. 5 ita scribat, Thynna partem fetus præma-  
ture, partem sero producit. Edit primam partem circa mensem Decembrem ante bru-  
mam, alteram uere. Quo pacto hæc conueniant, si uera sint exemplaria, consideret le-  
ctor. 7 Hippurus nomine piscis est alius pelagius, qui naufragiorū fragmentis mi-  
rum in modū oblectatur, (Theodorus equiuelim uocat.) Latet hippurus hyeme: & nō  
capitur præterquam certis quibusdam temporibus, ut æstatis diebus paucis, & iisdem  
semper. Vere tantum parit, cuius partus de minimo in maximum celestime augetur.  
Coryphæna etiam ab Athenæo uocatur & arneuta. Ouidius hippurus celeres dixit.  
Est & hippus nomine apud Plinium & Oppianum piscis quidam litoralis, in arenosis  
**D** locis uiuicans. Hunc Athenæus etiam hippidium uocari arbitratur. 8 Cybiorum  
genera (uti conicio) appellauit Plinius, quæ à Græcis *κυβία*, *μυλασπίαι* & *καταγεραι*  
necantur: ut eisdem nominibus appellentur pelamides concisæ partes, quibus & maio-  
rum thynnorum, quos orcynus uocant: Pelamidas quoque magnas cybia uocauit Ices-  
sius. 9 Clidio, &c. Clidia, ni fallor, uocantur partes, quæ faucibus proximæ sunt. Clidium.  
10 Melandryn Pamphilus genus thynni grandissimū esse statuit. Hinc arbitror, me-  
landrya dicta & melandriz. In orcyno, quæ melandrix dicuntur ab Icesio, eadē uel  
landrya uocantur. 11 Fit thynnorum collum *δυσπύργος*, ut Xenocrates tradidit: *κορυμ-*  
quod & ori gratum est, nec facile corrumpitur. *δυσπύργος*, inquit Diphilus, nonnulli  
*κίττιμα* dixerunt: estque cibus grauis lentusque, nec facile cōcoquitur. 12 Apolectum,  
inquit Xenocrates, catene constat, quàm tritomon fragiliore: & quæ sapore sit non  
adeo grato. Est uero tritomon, inquit, cybio durius, cetera simile, nec facile corrum-  
pitur. An error sit in exemplari (tritomon pro tritone) considera. 13 Quæ Dorion de  
Ec iij

*Sardica salsa.*  
*menta.*  
*θυνὴ.*  
*θυρινιάδες.*  
*θυρινιάδες.*  
*θυρινιάδες.*

*Hippurus.*  
*Equiuelis.*

*Coryphæna.*  
*Αἱρὸν.*  
*ἱππύρι.*  
*κίττιμα.*

*Melandrya.*  
*Melandrya.*  
*κορυμ-*  
*κίττιμα.*

*Tritomonum.*

# DE DIFFERENTIIS

*ορχυνίς,  
κινώια,  
Orcynes.*

*Synodontis.*

*Synodontis.*

orcynis, eadem fere narrat Oppianus de maioribus thynnīs: nēpe quoddam ex oceano per E  
fretum Gaditanum ingrediuntur mare mediterraneum: quo fit, ut plurimi in Iberico  
Tyrtheno que mari capiantur: postea uero passim reliquum mare pererrent. Orcy-  
norum genera statuere uidetur Oppianus *ορχυνίς* & *κινώιας*, qui in alto pelago degūt,  
rarōque ad litora accedunt. Orcynes quoq; Aristoteli in alto fœtificant. 14 Si quis  
ea quæ hoc in loco afferuntur ex Plinio & Atheno conferat, (mea quidem sententia)  
si non idem, at similes certe erunt, parūque inter se different, melandrys, apolectus,  
orcynus & xanthias, triton, synodontis & chelidonias. Hermolai coniectura est tri-  
tonem eundem esse, quem Græci chelidoniam uocant: apolectum uero, quam cyno-  
dontida: Atheniæque sensum explicat aliter atque nos reddidimus: hoc scilicet πατο,  
Maior pelamis synodontis appellatur, durior quàm chelidonias. Item paulo post, Or-  
cynus similis est chelidoniz cum magnus est: Athenæus uero, in nostris saltem codici-  
bus ita habet, *ἡ δὲ μέλαινα πελαγίς συνodontis καλεῖται: ἀπολετὴν μὲν τοὶ χελιδόνιας τῇ πελα-  
γίδι σκληρὸν τῆρος*. Et paulo post, *ὁ δὲ ὀρχυνὸς βορβορέδης καὶ ὁ μέλαινα πελαγίκα τῇ χελιδ-  
νίᾳ τῇ τῷ σκληρὸν τῆρος*. In iis tua coniectura utere lektor. F

De falsamentis.

Cap. CLXXXVII.

*Salsamentum.  
Salsura.  
Τάριχος, δ.  
ταύρος, δ.*

POscere uidetur hic locus, ut de falsuris aliqua dicamus. Salis facultatem 1  
tradunt medici compositam esse: humores etenim corporū excremen-  
titios digerit extenuatque: & corpora ipsa in sese cogit atque condensat.  
Quæ igitur corpora sua natura sunt sicciora, hæc (uti supra diximus) sale a-  
spersa reddūtur ob nimiam siccitatem cibo inepta: quorum uero caro dura  
est & excrementosa, ea ad falsamēta erunt idonea. Excrementosa autem uo-  
co, quæ succum in sese continent pituitosum undique conspersum: & hic  
quidem quo fuerit copiosior crassiorque, eo melior caro, si sale adseruatur,  
euadet. Quorum autem mollis admodū fuerit, aut impense sicca caro, ex-  
crementorumque experts, ut falsantur inepta sunt. Mollium itaq; carniū 2  
piscēs (quos *μαλακὴ ἄρκυς* uocant) & qui excrementis uacant, ut falsamenta G  
ex illis hant, minime sunt idonea. Huius generis sunt, qui saxatiles uocan-  
tur atque aselli, qui in puro mari degunt: sed neque mulli, quoddam dura sit eo-  
rum caro excrementis uacua, sale inueterantur. At coracini, mylli, pe-  
lamides, & præterea sardæ sardinique, & quæ sexitana uocantur falsamen-  
ta, atque id genus alia. Ad hæc inter ea quæ in puro mari degunt, quæ *κεφάλαια*,  
id est cetacea uocantur, ut balenæ, delphini & phocæ, cū sale condiātur,  
euadunt meliora: ut quæ carnem habent excrementitiā omnia. Huic ge-  
neri proxime accedunt magni thūni, quos melandrias, tritones, chelidoni- H  
āsque uocari diximus: sale nāque cū condiuntur, euadunt se ipsis melio-  
res. Præstantissima autem omnium, quæ mihi certe experiri licuit, inquit  
Galenus, sunt quæ à ueteribus medicis sardica uocātur falsamenta (hodie 3  
sardas uocant), & qui nunc ex Ponto afferuntur mylli. Secundum uero ab 4  
iis locum obtinent coracini, pelamides, & quæ sexitana uocantur. Hæc Ga-  
lenus. At Diphilus myllo coracinū in omnibus præfert: ut qui subpinguis  
est, bene carnosus, succi non omnino malefacile & concoquitur, & in cor-  
pus digeritur, abundeque nutrit. Quæ cybia dicuntur atq; horæa, inter ma-  
cra falsamenta præstantissima sunt, ut inter pinguia cordylæ, & quæ *θύνικα*  
*ἢ θυνάοι* uocātur. Porro thynnium ait Diphilus ex pelamide maiore fieri:  
cybia uero atque horæa (quæ eiusdem sunt generis) ex minore. Et thynnia  
quidem

*Sardini.  
Sexitana fal-  
samenta*

*Sardica falsamēta.  
Sardæ.  
Mylli.  
Myllo.  
Sexitana.  
γινώσκω.  
ἀγνώσκω.  
Cybia.  
Horæa, ὀρχυνί-  
salsamenta.  
salsamentum  
thynnium,  
thynniam.*

A quidem uetustate euadunt meliora recentibus acrioraque: & præcipue Bizantina. Qui circa Gadiram insulam capiuntur orcyini, pinguiissimi sunt, uti supra ex Icelij autoritate indicauimus. ex iis clidia seorsum cõdiuntur sale, & melandryæ quoque: uerum abdomina ipsa (quæ *ἀνδρογῆ* uocant) pingua, cæteris partibus suauitate præstant, uel eodem autore: & clidia hæc ipsa superat. Diphilus quoque orcyini abdomina, & clidia sapore grata, & tenera prædicat: & quæ *ὀρῶ* dicuntur, sale adseruatas mediocres esse: quãquam Xenocrates carnem ipsam orcyini stomacho ingrata esse tradit, malique succi atq; aridam. Salsamenta omnia quæcunq; ex sale duriora euadunt, ac ueluti neruosa coriaceaque cõcoctu sunt difficilia: at contrã, quæcunque extenuatis digestisque à sale crassioribus lentisque extremis tenuium redduntur partium, eadem ipsa in cibo crassos ac glutinosos humores extenuant. Quæcunque, inquit Diphilus, è marinis, lacustribus aut fluuiatilibus salsamenta fiunt, parce nutriunt, aluum cient, appetetiam ciborum irritant & sitim faciunt. Sunt & seruatis piscibus medicinæ: salsamentorumque cibus prodest à serpente percussis, & cõtra bestiarum ictus merito subinde hausto, ita ut ad uesperam cibus uomitione reddatur: peculiari-ter à chalcide, ceraste, & quas sepas uocant, aut elape dipsadæue percussis. Contra scorpiones largius sumi, sed euomi salsamenta prodest, ita ut sitis toleretur. Imponuntur salsamenta & contra morsum canis rabiosi: uel si non sint ferro usq; plage, corporaque clysteribus exinanita, hoc per se sufficit: & contra draconem marinum ex aceto imponitur: idem & cybio profectus. Fistulæ aperiuntur siccanturque salsamentis cum linteolo immixtis: intraque alterum diem callum omnem auferunt: & putrescentia ulcerum, quæque serpunt, emplastri modo subacta & illita. pauis uero profunt salsamenta cocta. Carbunculos uerendorum priuatim salsameta cocta cū melle restringunt. Salsamentorum cinis fictili uase combustorum, addita farina marmoris, ad dentium dolores inter remedia est. Æque prodesse dicuntur omnium salsamentorum spinæ combustæ tritæq; & illitæ. Intestinis piscium cæterisque, que abiicienda essent, sale maceratis, sit liquoris exquisiti-  
6 ti genus, quod garon uocauere, ut sit illa putrescentiũ fanies. Hoc olim cõficiebatur ex pisce quem Græci garon uocabant: nunc è scombro pisce lau-  
D datissimũ in finibus Carthaginis: id sociorum appellatur: nec liquor ullus pene præter unguenta maiore in pretio esse cœpit, nobilitatis etiam genti-  
bus. Scombros quidẽ & Mauritania Beticæque & Carteia ex oceano intrã-  
7 tes capiunt, ad nihil aliud utiles. Garum, & Clazomen, & Pompeios & Le-  
ro garum & priuatim ex inuiti pisciculus minimõq; confici, apuam nostri, aphyen Græci uocant. Foroiulenses piscem ex quo faciunt, lupum appel-  
lant. Sic & alex peruenit ad ostreas, echinos, urticas, cammaros, mulorum iocinera. Garum uehementer calfacit, si Galeno credimus, atque exsiccat: ideoque à nõnullis ad putrida adhibetur ulcera: clysteribus iniicitur ad dysentericos coxædicumque dolores. Sunt qui præcipue cõtra omnia aurium uitia laudent gari excellentis sociorum cyathum in calice nouo lenta pru-  
Ec iiij

*Alias, sed non euomi.*

*Garum.*

*Garum.*

*Garum piscu.*

*Garum socio-  
rum.*

*Alex.*

na decoquere: deinde spuma pennis deterfa, postquā desierit spumare, tepi-  
dum infundere: si tumeant aures, coriandri succo prius mitigandas iidem  
præcipiunt. Contra canum morsus prodest garum, maximèque crocodili:  
& ulceribus quæ serpunt, aut sordidis oris quoq; & aurium doloribus mi-  
rifice prodest. Et uua medetur garū cochlearibus subditum. Alece scabies  
pectoris sanatur infusa per cutem incisam: & contra canis morsus draco-  
nisque marini prodest: in linteolis autem conserptis imponitur. Garum,  
ut Dioscoridi placet, non ex scombris solum, sed & aliis quoq; piscibus at-  
que carnibus conficitur. Hoc alij, ni fallor, ἀλμυρ, id est muriam dixere. Mu-  
ria, inquit Plinius, siue salugo illa, spissat, mordet, extenuat, siccatur. dysente-  
ricis utilis est, etiam si nome intestina corripit, ut quæ exulcerata sint sistat:  
ischiadiciisque infunditur, ut exulcerationem proritet. fotu quoque apud F  
mediterraneos aquæ marinæ uicem pensat. depascencia ulcera sistit. mors-  
us à cane medetur: potissimum autem silurorum ac manarum muria me-  
dici nonnulli utuntur, quæ etiam interdum ad oris ulcera accommodatur.  
Hæc obiter indicata sint: modo ad institutum opus reuertamur.

Garum.

Μυρία,  
Ἀλμυρ.

Τετράκτυρος.

Ιππόρος.

Platinnus.

Γλαύσκαι.

Mylus.

Muria uel  
muries.

1 Salis naturam fusius explicant Dioscorides & Plinius. 2 Siccioris cuiusdam  
piscis, & qui extera pinguedinis egeat, meminit Diocles. τετράκτυρος uocat. Et Nume-  
nius ἀλλοπλιω τετράκτυρος dixit. Galenus item ex Philorimo duræ carnis piscem trachu-  
rum esse dicit: eundem & τούρος à nonnullis uocari prodidit Xenocrates. Nō idem, sed  
alius uidetur apud Oppianum platiurus: qui inter eos pisces numeratur, qui apud li-  
tora arenosa uisitant. 3 Sardica fassamenta (opinor) à sardæ, quæ dicta est pelamis G  
longa, quæ ex oceano ueniat. 4 Mylli (qui & myli) iudæ uocatur & gnotidia, & pla-  
tistaci: qui enim in hoc genere sunt maximi, πλάστια καὶ dicuntur: qui uero media sunt  
ætate, μέσοι ἢ μέλα: minimi autē γινώσκω ἢ ἀγινώσκω. Mylus apud Oppianū inter eos  
pisces numeratur, qui circa saxa nuda uersantur. 5 Carnē ipsam, &c. Recentem ni-  
mirum carnem intellexit Xenocrates: & partes solum illas, forsitan quas Icesius me-  
lādrys, Diphilus costas uocauit. 6 Græci optimū garū genus purant, quod hæma-  
tium, hoc est sanguiculum appellant, ex intestinis thynni cum brachiis, sanie ac cruo-  
re. Muria non ex intestinis, sed ex thynno ipso fere conficiebatur, Antipolim, Thuriā,  
inde uero Dalmatiam nobilitans: (ut inquit Plinius) quanquā muria siue muries Ca-  
toni, Palladio, Columellæ, non liquamen ex piscibus, sed salislaginē factitiam signifi-  
cat. Hæc Hermolaus. 7 Alex neutro duntaxat genere, inquit Hermolaus, sed Plin-  
ius alecem ex mullorum iecore dixit.

De scombro, colia & amia, & aliis quibusdam qui sale  
adseruantur. Cap. CLXXXVIII.

Scombrus.  
Scomber.  
Σκόμερος.Colias,  
κελίας.

H Ispaniæ cetarias scombri replent, thynn timeris non commēatibus: & Mau-  
ritania, ut modo diximus, Beticæque & Carteia scombros ex oceano  
intransantes capiunt, ad nihil aliud quàm ad garum conficiendum utiles. His  
est in aquis sulphureus color, extra qui ceteris. Scombri ita ut thūni coeunt  
mense Februario post idus: pariunt lunio ante nonas. Scombri discedunt à  
locis frigidioribus calidioribusque antequam thynni, ut qui imbecilliores  
sunt: sæpe tamen statu austrino uehementius occurfante fit, ut cum colias &  
scombris exeant thynni in mare. Scombri minores sunt quàm colie, ut re-  
fert Icesius. Coliæ uero magnitudo sardæ æqualis est. colias quasi lineas  
quasdam habet depictas, nō in dorso, sed obliquas. Coliæ magna ex parte  
non

- A non subeunt Pontum, sed in Propontide trahunt æstatem & pariunt: hycem in Ægeo. Optimus esse in Propontide indicat Aristoteles antequam patiant. capiuntur subeuntes Pontum, exeuntes minus. Verum, ut Diphilus prodidit, principatum obtinet Amiclanus colias, & ex Hispania lexitanus: minor enim tenuiorue est & suavior. uel, ut Plinius tradit, colias siue patianus siue sexitanus à patria Betica, lacertorum minima genera: ab iis Mæotici. Scombri, ut Icelius author est, meliorem in cibo præbent succum quàm colias, & qui è stomacho breui descendit. Colias succum dat lentiore ac mordaciore quàm scombrus, abundèque nutrit: ut uero Xenocrates author est, & scombrus & colias carnem habent non aliter atque thunni stomacho ingratam, aridam, malique succi, & quæ non facile alio
- B excernitur, atque copiose nutrit: uerum colias caro ori minus grata est, minusque succi habet. Scombrus sapore est non adeo ingrato, nec facile corrumpitur. sitim proritat. Circa Parium præstantissimi habentur. Scombri in aceto putrefacti, excitant uulua stragulatu oppressas. In mari rubro lacertus est, cuius magnitudo ei qui nascitur apud nos, æqualis est. Virgatus spectatur: lineis nimirum aureolis circumdatur à branchiis ad caudam pertinentibus, quas media argentea distinguit. ore est hiante, maxilla inferior eminet in superiore. uirides oculos habet, quos aureo fulgore palpebræ ambiunt. Eiusdem item maris sœtura est piscis cui nomen phoenix: is nigris lineis, quas cœruleæ intersecant macula, distinguitur. Hamia cum thynnineis, quas cœruleæ intersecant macula, distinguitur. Hamia cum thynnineis uere in pontum intrant ad dulciora pabula, æstatemque ibi producant. Incrementum hamia singulis diebus intelligitur. os hamia angustum, sicut & mugili. Dentes habet ferratos, spissos, præacutos & ualidos, branchias ocultas. Fel suo intestino pari processu annexum continet, sæpe etiam replicatum. gregalis est & carniuota: magna etenim ex parte carne uescitur: sed algam etiam tangit nonnunquam. Ad ostia fluuiorum uersatur, & in paludibus maritimis, ubi copia influit dulcis aquæ. Subit & in fluuios, ibique prospere degit, sicuti & mugilis. Hamias etiam in Alopeconnefo reperies, inquit Aristoteles. Audaces sunt hamia, dentibusque plurimum fidunt: quippe quæ cum sint thynnineis imbecilliores, corporeque molliori ac tenello: intrepide tamen cum alias beluas, tum uel delphinos præsertim solitariis & à suo grege aberrantes catuatiim aggrediuntur uulnerantque. Pugnat cum delphino legas apud Oppianum.
- D rios & à suo grege aberrantes catuatiim aggrediuntur uulnerantque. Pugnat cum delphino legas apud Oppianum. magnitudine præstant, lustrantes gregem citcunualant. Dentes sunt his ualidi, ut diximus: & iam cum alia belua, tum lamia aggressa, uulnera accepisse uisa est. Piscatoris lineam, si forte hamo teneatur, perrodit hamia: escam autem in primis ex ipsa multi pisces expetunt. Philotimus hamia carnem duram esse prodidit: & id quidem recte factum cõfirmat Galenus: uerum Icelius teneram esse, bonique succi, sed modice nutrire. Autumno & circa uergiliarum occasum optimas esse hamias Archestratus author est. Troctæ (inquit Ællanus) dentes habet frequentes & continentes: quibus quicquid inciderit, perfringere potest. Hamo captus solus ex piscibus non se hamo retrahit: sed impellit se in ferrum, lineam consumere cupiens. Pi

Minor, tenuiorue, lacertorum.

Lacertus.  
Scombrus.  
Colias.

Parium, uel Parium, forsitan.  
Lacertus.

Phoenix.  
Hamia, aquia.

Hamia, aquia.  
Troctæ.  
An idem sit piscis cū hamia, an certe sumis?

scatores contra machinantur longas ansas: illo uero quoniam quodammodo E  
do ualet saltu, ansas sepe transilit, ac linea concisa, ad alios pisces reuertitur.  
Hic etiam sui generis grege coacto, delphinum inuadit: adeoque urgent ij,  
ut uiuum illum lacerent. Delcanum piscem tradit Euthydemus à Delcone  
amne nominatum, (in quo & capitur) sale conditum, uentriculo esse gra-  
tissimum. Dorion uero eundem piscem à nonnullis *λαπίον λακων* uocari scribit.  
Elacatena quoque falsamento idoneus piscis est, cetaceus, id est præ-  
grandis. Et callibios sale conditur. alium mouet, & attenuantem uim ob-  
tinet.

*Delcanus.*

*Λαπίον λα-  
κων.*

*Elacatena.*

*Callibios.*

1 Mauritania, &c. Et Scombratia insula dicta est apud Strabonem à scombris, qui  
circa eam capiuntur. 2 Sulphureus color qualis sit, explicat ipse Plinius lib. 35. Ful-  
mina & fulgura sulphuris odorem habent, ac lux ipsa eorum sulphurea est. 3 Co-  
lian Theodorus non recte, ut inquit Hermolaus, monedulam uertit. 4 Lineas quas  
dam habet depictas. *καλὴ ρογῆτος*, ita legitur apud Athenæum, sed aliter legi potest.  
*ρογῆτος* ὁ βῶξ, καὶ ὁ ρογῆτος καλῆς: ut intelligatur βῶξ dorso, καλῆς in aluo picturas  
gerere. Hæc Hermolaus. 5 Sexitanus, à Sexi in Betica, ex Strabone, Plinio & aliis  
fere omnibus: urbem etiam quādam esse Sexitiā non longe à Carthagine noua (un-  
de falsamenta nomen traxere) prodit Athenæus ex Strabone. 6 Lacertorum gene-  
ris meminit Plinius: & à Celso lacertus inter grauissimi alimenti pisces effertur: ex quo  
& falsamentum fieri prodidit. Videtur ex Plinio lacertus genus esse, & in his colian ef-  
se minimum. Icelus scombrum colia minorem affimat. Theodorus *λαῖρος* lacertum  
uertit. *καῦρος* Aristoteli piscis est gregalis: carnem habet duritie mollitiæque medio-  
crem, ut Galenus auctor est. in litioribus cœnosis uiuit, & in saxorum cauernis. Est  
et *λαῖρος* piscis similis belonz & cestrz, auctor Pseusippus. 7 *λίμια παρὰ τὴν αἰνῶν* G  
*ταῖς παρὰ τὴν αἰνῶν*. 8 Est & *λαῖρος* piscis apud Athenæum: sed an idem, an alius? 9  
*ήλακων τῶν*. Festus elacatenem falsamenti genus arbitrat, quod melandryum uocatur. 10 Su-  
spectus hic uidetur Athenæi eodex.

*Monedula.*

*Salsamēta Se-  
xitana.*

*καῦρος.*

*καυρὸς.*

*λαῖρος.*

*ήλακων τῶν.*

*Elacatene.*

De prægrandibus aliis quibusdam piscibus, quorū nonnullos etiam  
*καῦρος*, id est cetaceos uocant quidā. Cap. CLXXXIX.

*xiphias, ἰχθυὸς*

Cetorum magnitudinem habet xiphias pelagius piscis, raroque litus  
cadiens. In mari Tyrrheno xiphia nauicularū magnitudinem æquant:  
quorum, dum natant, tertia fere corporis pars supra mare eminens fertur,  
ut Strabo auctor est. Rostrum habet mucronatū & rigidum adeo, (ut scri-  
bit Oppianus) ut possit durum quauis confringere saxum: & à quo naues  
perfoliæ merguntur in oceano ad locum Mauritaniz, qui Cotta uocetur,  
non procul à Lyxo flumine, ut Trebius Niger auctor est. Rostrum hoc, ut  
inquit Aristoteles, partem habet inferiorem paruam, superiorem magnā,  
reliquo corpori longitudine æqualē, ossēam: hoc & *ῥίγος* uocatur, id est gla-  
dius. Piscis edentulus est. branchias habet octonas, easque duplices, sel à ie-  
core semotum. Agitantur xiphia a silo circa canis exortum: habent enim  
per id tempus sub pinna ceu uermiculum, quē *ελγος*, id est asilum uocant,  
ut de thynno supra diximus. Infestat hic tāto dolore xiphian, ut interdum  
in terrā exiliat xiphias, & uel in nauigia sæpenumero incidat. Galeos quo-  
que uocatur xiphias & *θερῆς*, thynnorum uenatione pinguescit. Verum & 2  
alios persequitur pisces galeos, sed pastinacam præcipue. Tomum thuria-  
num aliqui xiphian uocant, inquit Plinius: ut uero Athenæo placet, thuria-  
num

*ῥίγος.*  
*Gladus.*

*Galeos, γα-  
λέος.*  
*θερῆς.*  
*Tomum thyn-  
riani.*



**A**num uocatur caniculæ marinae frustum. In frusta secatur xiphias. carnem habet aridam: concoquitur difficulter: sed plurimum nutrit, sicuti & cæteri grandiores pisces omnes, ut inquit Mnesitheus, qui à quibusdam (quod in frusta secari soleant) *τρυμη* uocantur, ab aliis pelagij: sunt enim id genus omnes concoctu difficiles: qui tamen, si recte conficiantur, plurimum exhibent nutrimenti. In cibū sinapi conditur xiphias: est enim sapore ingrato, uiroso: eius abdomen cæteris partibus præfertur. Marinus grus Corinthiaci maris alumnus ad quindecim pedum magnitudinem crescit. Eius caput & os alitis gruis similitudinem gerit. Squamæ gentilis auis ei similes sunt. Tanto in saliendo robore est, ut tanquam emissum à contento nervo telum feratur. In maximo Caspiæ lacu oxyrynchi ab acumine rostri nūcu

*Τρυμη* ἰστῆς,  
*Pelagij pisces.*  
*Grus marinus*

**B**pati, magnitudine octo cubitorum procreantur. Eos Caspij captos distrahunt: & muria conditos atque exsiccatos uendunt: simul etiam adipe detracto, farinas ex eis conficiunt, atque exempta ex iis uiscera excoquunt: unde ad permultos usus accommodatum fit glutinum, quod & firmissime adhæret atque conglutinat, ut difficilime dissoluatur. Oxyrynchus Nili alūnus ex acumine rostri nomen trahēs, illic uenerationem & religionem habet: ut piscatores ualde timeant, ne quādo is piscis apud eos sacer & magna religione præditus capiatur. Oxyrynchus quē mare rubrum profert, ore est prælongo, oculis ad similitudinem auri fulgentibus. eius dorso signa pallore insignita sunt. Pinnae priores illi nigrae existunt: quæ uero sunt in dorso, albæ. cauda proluxa & uiridis, quam mediam aureola linea interfecat.

*Oxyrynchus.*

**C**Ichthyocolla appellatur piscis cetaceus, cui glutinosum est coriū idēmq; nomen glutino eius: quidam uero ex uentre non ex corio fieri dicunt. Laudatur Pontica, candida, minime scabra, carens uenis squamisq;, quæ celerime liquefcit. Epiniētidas tollit: emplastris capitis utilis, & iis quæ ad lepras apponuntur, & tetanothris, quæ cutem faciei erugant & extendunt. Silurus quoque in salfamēta uenit, piscis amni ac mari communis, sed maxima ex parte fluuiatilis. In Nilo thynni magnitudinem æquat: quāquam alibi quoque quā in Nilo natus. Silurus grassatur, inquit Plinius, ubicū-

*Ichthyocolla.*  
*Quonā modo liquefcit ac parari debeat docet Plin. hoc loco.*  
*Silurus.*

**3** que est, omne animal appetens, equos innatantes sæpe demergens: præcipue in Mæno Germaniæ amne, & in Danubio. Mari extrahitur porculo **4** marino similimus. Et in Boristhene memoratur præcipua magnitudo, nullis ossibus spinisue interstitis, carne prædulci. De siluro ita cecinit Aufonius,

*In Mæno, alij legunt in Rhe-no, uel in Aeno*

Nunc pecus æquoreum celebrabere magnæ silure.

Quem uelut Actæo perductum tergora oliuo

Amnicolam delphina reor.

Et sequitur,

Talis Atlantiaci quondam balena profundo

Cū uento motūe suo telluris ad oras

Pellitur, exclusum fundit mare, magnæque surgunt

Æquora: uiciniq; timent decrefcere montes.

Hic tamen hic nostræ mitis balena Mosellæ

Exitio procul est, magnoque honor additus amni.

**5** Qui silurus à Plinio, glanis ab Aristotele dictus est. Glanis branchias habet

*Glanis, ὀψῖος*

utrinque quaternas, easque duplices, nouissima excepta, sel continet iecori E annexum. Cum parit, continentem emittit suum foetum, continuoque filio sibi coherente, ut rana. Pariunt glanes grandiores altiore gurgite; quippe cum nonnulli sex pedum altitudine pariant, minores breviori contenti sunt uado. præcipue ad radices salicis aut cuiusvis arboris, atque etiã inter arundines & algas muscosamue congeriem. Cũ cætera foemina in triduo excludunt, si mas attigit: tardissimum tamen glancos incrementum ex ouo est. Quamobrem mas quo in loco plurimus foetus constitit, perseverans 7 oua custodit, ne à piscibus occurrentibus absumatur: idque uel ad quadragessimum & quinquagesimum diem facit. donec satis iam aucta soboles se tueri à cæteris piscibus ualeat. Deprehenditur sæpe à piscatoribus, ubi oua custodit: dum enim arcet pisciculos quatiendo prosliliendoque, icum sonumq; mouet. Manet apud oua tam ardente animo, ut cū sæpe à piscatoribus oua, quæ præaltis gurgitibus subsidunt, educatur quoad magis fieri potest in uadum, ipse tamen eodem studio sequatur: neque deferere usquam patitur. Et tunc quidem si minor natu sit, minusque usu exercitatus (ut nonnunquam accidere solet) facile hamo capitur: sed si peritus & hamis assuetus est, morsu dentis sui durissimi rumpit hamum & foetum assidue custodit: uel ut Plinius refert, qui glanis uocatur auerfos mordet hamos, nec deuorat, sed esca spoliatur. Cũ cæteri pisces omnes mares suis foeminis sint præstantiores, glanis foemina præstat suo mari: damnatur tamen, cum uterum gerit. Canis exortu potissimũ (quod sublimis nate) syderatur glanis: & tonitruo sopitur magno. A dracone angue, gurgite parum alto ictus nonnunquam interit. Silurus si recens edatur, probe nutrit: & aluum emollit silurus è iure sale uero conditus, minimum suppeditat alimenti. Arteriam expurgat, & uocem adiuuat reces salutisue in cibo. Infixa corpori spicula extrahit salici caro trita atque imposita: uel, ut Plinius habet, siluri fluuiatilis carnes impositæ siue recentes siue salæ, tela corpori inhaerentia extrahunt. Muria eius incipientibus dysenteriiis prodest, si in ea insidentes foueantur: fluxiones namq; ad externas partes euocat. ischiadicis infusa medetur. Vel, ut tradit Plinius, ischiadicis liberant fassamenta ex siluro infusa, clystere euacuata prius aluo. Siluri suffitu, præcipue Africi faciliores partus fieri dicuntur. Glanidi qui in Danubio gignitur, similis est piscis latus nomine: Ex hoc genere, qui in Nilo fluuiio proueniunt, ea magnitudine inueniuntur, ut ducentarum librarum pondus impleant. Piscis est carne & candidissima pariter & lautissima, quocunque apparetur modo. Præstantissimum esse in Italia latum circa traiectum Scyllæum, tradidit Arcestratus. Antaceum piscem grandem (cete Herodotus uocat) in fassamenta præbet Boristhenes fluuius, delphini magnitudine, nullis ossibus spinisue interstitis. Corio (uti aiunt) adeo aspero tegitur, ut eo perpoliantur hastæ. Scorsum condiuntur sale maxillæ & quæ circa palatum sunt antaceorum partes, ut quæ aliis partibus suauitate præsent: sicuti ex orcyno quæ clidia dicuntur & melandryæ. Antacci in glacie concreti nonnunquam effodiuntur, ut Strabo author est.

Hoc de siluro

Plinius.

Syderatur, & tonitruo  
sopitur magno.

Sopitur, & iure  
sale.

Silurus.

Latius, λᾶτος.

Antaceus,

Antaceum.

In Istro quoq;

gigni antaceum prodit

Ælianus.

**A** 1 Xiphias, &c. Gladium interpretatur Theodorus, eetacetiſque uocatur. 2 *Gladiuſ.*

Quibus modis capiatur docent Strabo lib. 1. & Oppianus lib. 3 de piſc. 3 Silurus uorax dicitur à diuo Ambroſio in Hexam. 4 Mari extrahitur, ſubaudi ſilurus, ni fallor, ſed alijs à priore: ita enim ſeruabitur ſincera leſſio plinianus, conſentiētibus uel antiquis omnibus codicibus, quos equidē uiderim. Nam quod à nōnullis legitur hoc paſto: & in Danubio Mario extrahitur porculo marino ſimiliſimus, mera coniectura *Mario.*

mihi certe uidetur eſſe: neque enim exemplar ullum uetuſtū, eorum quæ mihi uidere contigit, tale quippiam indicat. Neque Mario piſcis nomē, quod ſciam, apud ullum habetur authorem. Glanis autem qui in Danubio Iſtrōne gignitur, meminit Athenęus lib. 7: Beluas quoque pernicioſas quaſdam ſcribit Pauſanias in Rheno & Iſtro gigni, quibus nomen nō indidit, ſed forma ſimiles eſſe tradit glanibus, qui in Hermo & Meandro proueniunt, excepto colore nigriore & corporis robore, in quibus glanes inferiores ſunt. *Ælianus* uero prodiit glanem piſcem, incolā Meandri & Lyci Aſianorum fluminum, & Europei Strithionis, ſiluri ſpecie ſimilitudinēque gerere: eundēque ſuorum ſortuum amatiſſimum eſſe, marem ſaltem: qui ſortum aſſidue ab aliorum

**B** piſcium iniurijs tueretur atque ſeruat. Si quis horum aliorum loca diligenter cōſerat, uidebitur eadē eſſe belua apud Pauſaniam, cui nullum nomē ab eo eſt inditum, cum eo qui ſilurus uocatur ab *Æliano*, & qui ſilurus eſt graſſator Plinio, & uorax D. Ambroſio: & item glanis Athenæo. Alius deinde erit ſilurus, qui mari extrahitur porculo marino ſimilis: & in Borithene memoratur, &c. Et qui ab Auſonio deſcribitur: atque fortaſſe idem qui Antacæus Herodoto & Straboni, de quo infra. 5 Glanins, ni fallor, alius eſt, ut qui marinus eſt, nō fluuiatilis. De glani non memini legiſſe quod ſit marinus. 6 Sex pedum altitudine, κατὰ πέντε dixit Ariſtoteles, quod Theodorus reddidit trium paſſuum altitudine, id eſt, quindecim pedum. 7 Oua cuſtodit. Plinius lib. 9, ſilurus mas ſolus omnium edita cuſtodit oua, ſæpe & quinquagenis diebus ne abuſmantur ab alijs. 8 Hamis aſſuetus, ἄγχι τοφείας, id eſt, hamos ante ederit. 9 Silurus, &c. Hæc non Siluro, ſed feli attribunt nonnulli, ἀλῦρος non ἀλῦρον legentes *Antacæus Glanins.*

**C** apud Dioſcoridem: inde forſitan perſuaſi, quod apud Galenum lib. 11 de ſimpli. med. facultat. ita habeatur, ἀλῦρος, id eſt felium ſalſarum carnem tritam atque impoſitam ſpicula corpori in fixa extrahere aiunt. Quo quidem in loco ego potius ἀλῦρος quàm ἀλῦρον legerim (facili ſane ſcriptoris lapſu) uel ex Paulo *Ægineta*, qui in litera 1. hæc habet de ſiluro, non de xiluro. 10 Quod Herodotus ἀνῆκεν dixit hoc modo expreſſit Plinius: & de eodē forſitan piſce in ſiluro.

De alijs quibuſdam fluuiatilibus, & lacuſtribus piſcibus. Cap. CXC.

**S**unt & in quibuſdam amnibus nonnulli prædictis haud minores: Eſos *Eſos Eſoxi*  
in rheno, Attilus in pado inertia pingueſcens ad mille aliquando libras *Attilas, Eſox in Rheno.*  
cathenato captus hamo, nec niſi boum iugis extractus. Atqui hūc, uti diximus, minimus appellatus clupea uenam quandā eius in faucibus mira cupidine appetens morſu exanimat. In Gæge Indiæ plataniſtas uocant, roſtro *Plataniſta.*  
**D** delphini & cauda: magnitudine autem quindecim cubitorum. In Arari gignitur piſcis grandis, qui à Celtis ſcolopidus dicitur: hic augeſcēte luna cādidus, imminuta uero niger omnino eſt: qui cum ſupra iuſtam excreuerit magnitudinem, à ſuis ſpinis interit. In huius capite lapis inuenitur chōdro ſimilis, qui febribus quartanis mederi traditur. In Aquitania ſalmo fluuiatilis marinis omnibus præfertur, de quo Auſonius in Moſella, *Salmo.*

Nec te puniceo rutilantem uiſcere ſalmo

Transferim, latæ cuius uaga uerbera caudæ

Gurgite de medio ſummas referunt iu undas,

Occultus placido cum proditur æquore pulſus.

Tu lorica ſquamofus peſtore frontem

# DE DIFFERENTIIS

Lubricus, & dubiæ facturus fercula cœnæ  
Tempora longarum fers incorrupte morarum:  
Præsignis maculis capitis: cui prodiga nutat  
Aluus, opimatôque fluens abdomine uenter.

Et quoniam in Mosellanos Aufonij poetæ pisces incidimus, age uero, quæ  
de aliis quibusdam fluuiatilibus cecinerit, uideamus,

*Capiro.*

Squameus herbofas capito inter lucet arenas  
Viscere præteneris fartim congestus arstis,

*Salar*

*Rhedo.*

*Barbus.*

Nec duraturus post bina trihoræ mensis:  
Purpureisq; salar stellarus tergora guttis.

Et nullo spinæ nociturus acumine rhedo.  
Túque per obliqui fauces uexare sarani,

Cum defluxisti famæ melioris in amnem  
Liberior, laxos exerceas barbe natatus:

Tu melior peiore æuo: tibi contigit omni  
Spirantum ex numero non illaudata senectus.

*Lucius.*

Hic etiam Latio risus prænomine cultor  
Stagnorum, querulis uis infestissima ranis,

Lucius obscuras ulua cœnôque lacunas  
Obsidet. hic nullo mensarum lectus ad usus

Feruet fumosis olido nitore popinis.

*Tinca.*

*Alburnus.*

*sario.*

Quis non & uirides uolgi solatia tincas

Norit? & alburnos prædam puerilibus hamis?

Tèque inter species geminas neutrumque & utrumque,

Qui nec dum salmo, nec iam salar, ambiguisque

Amborum medio sario intercepte sub æuo.

Hæc Aufonius.

*Cyprinus.*

*Cyprinus.*

*Cyperinus.*

Et fluuiatilis & lacustris cyprinus est, ut Dorion author est: qui & cypria-  
num hunc piscem appellauit, sicuti Oppianus cyperinm. Gregalis est, squa-  
mosus & carniuosus: in arenosis locis uiuit. Brachias habet utrinque qua-  
ternas, easque duplices nouissima excepta: palatum illi carnosum admo-  
dum est & molle, ut nisi diligenter inspexeris, lingua id esse uideatur: Cypri-  
ni quinquies aut sexies anno partum faciunt. Vada petunt cum parturiunt:  
ac sæpenumero singulas feminas, mares tredecim aut quatuordecim se-  
quuntur. Mox semina oua procedendo emittit, & mutans continue parit: H

*Plinius, sexies*

*Oppian, quin-*

*ques.*

*Cyprinus (opi-*

*nor) mas.*

quo fit ut dissipari oua necesse sit, uidelicet ea quæ non in materiam incide-  
rint aliquam: sed cyprinus tunc ea custodit, cum congesta repererit. Post  
glaniam tardissime augentur cyprinorum oua: augentur tamen quæ ma-  
res custodiunt ad milij magnitudinem: sopitur quâdoque cyprinus toni-  
truo magno ut glanis, sed leuius. Inter amnicos pisces, steriles annotantur  
carini & balagri, qui nec ouum nec semen ullum prolificum unquam ha-  
beant. Balero & tiloni lumbricus canis exortu innascitur, qui debilitat co-  
gitque ad summam aquam efferni, qua æstu intereunt. Phoxini inter fluuia-  
tiles pariunt, ut percæ in arudineticis, in fluuiorū & lacuum paludibus, quas  
περσινιδες uocant, quæ scilicet prope fluuios aut lacus stagnant. Phoxinus

*Carini.*

*Balagri.*

*Bagrioe.*

*Baleros.*

*Tillo.*

*Phoxinus.*

uero

A uero statim fere ut natus est, & admodū paruus adhuc oua habet: ut liqui-  
do appareat oua illi inesse uel absque coitu. *τύλαρα* fullonem uocant, grega-  
lis hic est: & partus tempore petit litora tranquilliora. Sunt in fluuiis pisci-  
culi quos *βαίτες* appellant, hi sub saxis stabulantur. Capiuntur autem à non-  
nullis saxo percussio sub quo latent: protinus enim exturbantur, ut qui au-  
diant, & caput per strepitum tententur. Piscem thymalum à thymi odo-  
re sic nuncupatum Ticinus fluuius Italiae procreat. is ad cubiti magnitudi-  
nem accedit: lupi & mugilis mediam speciei similitudinēque gerit. Eius  
capiti nō qualis ceteris piscibus odor est: sed thymo similem recens colle-  
cto odorem reddit. Non alia fere esca quā culice, illa quae homini nocte  
diēque infesta est, capitur: ut qua sola fere delectatur.

1 Capito, &c. Cephalum interpretantur nonnulli capitonem, uerum recte an-  
secus, nondum certum est. 2 Satio, aliās sario, 3 Carini & balagri, &c. Ita legit  
Theodorus: Graeca autem exemplaria habent, sed mendose, *καρχήνης καὶ βαλγίου*. 4  
*τύλαρα*, &c. *τυφίος* à Dorione traditur piscis, ē cuius decocto macula omnis sordē  
eluitur: an idem? 5 *βοίτης*, &c. Cottum uocat hunc Theodorus, nomine forsitan  
murato *καὶ τὸ καλόν*, qui Numenio apud Athenas, gobia saxatilis est. Ego uero arbi-  
tror non esse eundem piscem *καὶ τὸν* cum *βαίτη*. *κόψαι* etiam sunt apud Athenas lib. 3.

Fario.

τυφίος.

Cottus.

κόψαι.

κόψαι.

De Niloticis piscibus, & aliis quibusdam ignotis. Cap. CXCI.

Pisces in Nilo Aegypti fluuii plurimi sunt ac diuersi: sed maxime noti  
sunt, ut inquit Strabo, Oxyrynchus & Lepidurus (quos cōmuni omnium  
consensu Aegyptij deorum loco colebant) Latus, Alabes, Coracinus, *καρχήνης*,  
Cid est porcus, Pharagorios, qui & Phagrus, Silurus, Thrissa, Mugil, *αὐτίλος*,  
Dilichnus, Phya, Bos. Addūtur praeterea ab Athenas, *Μαρότες*, *νάρεν*, id est  
Torpedo, Simus, Synodontis, Eleotris, Anguilla, Abramis, Typhle, aliq;  
plurimi. His adiiciemus quorūdam aquatiliū apud authores posita no-  
mina, quorum differentiā insignes aut nullae aut paucae admodū reperiū-  
tur, Alopecias. Aethus piscis castitate insignis, qui postea quā cum pari  
suo tanquam cum uxore quadam coniunctus sit, alia non attingit. Aspar-  
gi pisces marini, hyeme conualescunt & latent: uere progrediuntur ad pa-  
lcua. Basiliscus in saxis nudis uiuit, id est quae sine herba algae iacent,  
Bæon, *βοίτης*. Bogpyrus in scopulis uiuit: Cynodexia, Cynops, uel Cyno-  
pus. Claria piscis litoralis, in locis caenosis degens. Etelis & squamosus est,  
D & oua parit. Eleginus, gregalis est, Lapes, Liparis, Lamyrus: Mendescus pi-  
scis (ut uidetur) ad salsamenta idoneus, Marinus, Metrys, Mythus, uel My-  
stus: *μύκων*, id est papauer, piscis marinus & gregalis. Osiophagi, aliās ophi-  
phagi in saxorum cauernis degunt. Phyea, Parus, Phytarus, Rhacinus, Pal-  
lus. Scepanus in litoribus degit caenosis: Scepinus, quē Dorion Attagenum  
uocauit. Scirris petrosus piscis, circa nuda saxa degens, Taulopias, Turpæ-  
na, Thatis, Thella, Teragus paruus, Vrena piscis, Vua. Vua marina, inquit  
Plinius, in uino putrefacta, iis qui inde biberint, cradium uini affert.

Oxyrynchus.

Lepidurus.

Alia, Deli-

chus.

Aethus.

Bæon.

Bogpyrus.

Alia, Scepa-

nus.

1 Lepidurus, &c. Lepidion est: apud Athenas an idem, an aliud? 2 *Μαρότες*,  
&c. In Ponto inueniuntur multi pisces, qui à *Μαρότι* palude nomina sortiti sunt: ue-  
rum hic in *Μαρότες* Niloticus est: qui uti *Ελίας* refert, aduentantem Nilum praesentit,  
atque praecurrendo praenuntiat.

*Luna.*

**D**emonstratus piscem quendam formæ pulchritudine eximium dici appellari lunam, exigua magnitudine, lata figura, colore cyaneo: in dorso pinnas habere molles & leues, eisdemque in natâdo explicare, & ad similitudinem lunæ semicirculum efficere: simul & ipsum cum est plena luna, tum impleri, tum implere. Nempe arbores, si ex his ullum appende-  
*Pisces fossiles.* ris decrefcente luna, exficcare atque intirire: ac si ad plantas admoueris; eas marcescere & euanescere. Si iam plena luna in id aquæ, quod in perfoliis puteis reperitur, quis hunc piscem iniecerit, aquam iugem & perennem fore: sin extrema luna, aquam exarescere. Quod si hunc eundem in fontem scaturiëntem conieceris, quo modo diximus de puteo, is ad rationem lunæ, modo euanesceat, modo implebitur. Physam Ægyptiū piscem notionē ha-  
*A Theophrasto in lib. de piscib.* bere ferunt, quando luna augeatur & diminuatur, cuiusque iecur cum luna pariter decrefere pariterque augeri: corporisq; habitu modo esse opimo, modo gracili & tenui. In Fucino tantum lacu piscis est, qui octonis pinnis natat. Piscium genera etiamnum à Theophrasto mira produntur, circa Babylonis irrigua decedētibz fluiuis, in cauernis aquas habentibus remanere quosdam: inde exire ad pabula pinnulis gradientes, crebro caudæ motu: contrâque uenantes refugere in suas cauernas, & iis obuertos stare: capita eorum ranæ marinæ similia, reliquas partes gobionum: branchias ut cæteris piscibus. circa Heracleum, & Toronem, & Lycum amnem esse multifaria. In Pôto unum genus esse, quod extremas fluminum aquas seëctetur, cauernasque sibi faciat in terra, atque in iis uiuat, etiam reciprocis amnibz  
*Pauones.* siccato litore: effodi ergo: motu demum corporum uiuere eos approbant. Circa Heracleam eandem eodēmq; Lyco amne decedēte, & circa Tium Ponti Milesiorum coloniam, ouis relictis in limo generari pisces, eodēmq; effodi, qui ad pabula petenda palpitent exiguis branchiis. Eadē in Ponti regione apprehendi in glacie piscium quosdam, maxime gobiones, non nisi patinarum calore uitalem motum fatentes. Idem tradit in Paphlagonia effodi pisces gratissimos cibis, terrenos altis scrobibus, in iis locis ubi nullæ restagnent aquæ: & uaria horū genera in terra defossos reperiri, immobilēsque uiuere prodit Aristoteles. In Hyphaside Indiæ flumine pisces esse narratur, pauones nomine: cristis quibusdam cæruleis, squamis uersicoloribus, cauda aurea, in quancunque uoluerint partem uersatili. In mari  
*Cucumis. Χαλκιδις. Orchis.* quoque piscis cucumis est, in colore & odore cucumeri similis. In Cyzice-  
*cap.* na chalceus piscis frequens est, orbiculari specie. Qui orchis uocatur, rotundus est & sine squamis, totūque capite constat: durissimum esse pisciū cōstat. In mari rubro sinu Arabico piscem Leonides Bizātius gigni ait, gobio ætatis perfectæ magnitudine nihilo inferiorem, nullos oculos nullūque os habentem: more tamen piscium branchias his innatas esse: capitis figuram, & si minus expressam, coniectari posse, infra imum uentrem formam quandam leuiter contractam in sinum apparere, quæ smaragdi colorē reddit: hoc ei oculorum loco & ouis esse idem ait. Captus cum primum est extra aquam, inflatur. Et si quis etiam nunc uiuentem in mare uelit reiciere, supernatat



**A** supernatat more inflatæ uento uesciæ: quocirca Leonides ait ab affectu phys<sup>Phyffalus.</sup> salum appellatum esse. Hunc si quis gustauerit, statim acerrimis doloribus premitur: deinde eius uenter disrumpitur. Miracula quædam dira Ctesias in Armenia scribit esse fontem, ex quo nigros pisces illico mortem afferre <sup>Pisces lethales.</sup> in cibis: quod & circa Danubij exortum audiui, inquit Plinius, donec ueniat ad fontem aluco appositum, ubi finitur id genus piscium. Hoc idem & in Lydia in stagno Nympharum tradunt. In Arcadia ad Phœneum aqua  
 3 profluit è faxis styx appellata: & esse pisces paruos in ea tradit Theophrastus lethales & ipsos, quòd non in alio genere mortiferorum fontium. In Africa feruentis aquæ lacus esse existimatur, in quo pisces & uiuere & natare dicuntur, & ad obiectum cibum assilire: ac si quis in frigidam eos inic  
**B** cerit, interire. Hactenus de piscibus dixisse abunde est: sequitur ut de cetis præciplamus.

De cetis.

Cap. CXCIIL.

**I**nter aquatilia peculiaris quædam natura cetaceo generi est, ut delphi<sup>Cete, cetus, κητες.</sup> no, balenæ, & quæcunque alia ex iis fistulam habent: cū & mare accipiāt quemadmodum pisces, pedibusque careant, & cibum in humore capiant: aërem uero spirant ut terrestria, ut quodammodo terrestria sint & aquatilia. Hoc genus neque pilis integitur aliorum more, quæ animal generant, neque pedes habet ullos. Branchias non habent cete, sed fistula iis data à na<sup>Fistula, αὐλὴ.</sup>  
 C tura est, qua humorem quem unà cum cibo recipiunt, eicere possent, quæ  
 1 admodum pisces per branchias emittunt: ea uero prope cerebrum sita est, delphinis quidem à dorso, balenis uerò à fronte. Mammæ habent cete in aquatili genere & lac: id quod in delphinis manifeste à nonnullis perspectum est. Delphinus testes habet intus conditos, & qui ad aluum necluntur. Pulmonem habent omnia cetacea atque respirant: ideoque cum dormiunt, edita per summa æquoris fistula dormitant, (quæ etiā spirant) pinnas suas mouendo leuiter. Et quidem uisus est delphinus dormire rostro emerfo, ac stertere. Fel habent omnia, excepto uno delphino. Nullum ex iis oua habere cernitur, sed statim fœtum concipiunt, ex quo redactò in for<sup>Fœtus, κύριος.</sup> mam animal constat, quemadmodum homo & quadrupedes quæ animal  
 1 pariunt. Cocundi modus omni cetario generi idē qui piscibus est: supinis  
**D** enim admotis partibus rem peragunt: nec parum multūmque temporis, sed mediocre in coitu ipso consumunt: & paulo quàm pisces diutius in coitu morantur. Cetacci, prope omnes, (quemadmodum pisces cartilaginei) minores pisces resupinati corripunt: habent enim os subter: unde fit, ut periculum minores pisces facilius possint euadere: alioqui pauci admodū seruarentur: quippe cum delphini celeritas atque edendi facultas mira esse uideatur. Beluæ omnes marinæ, quæ ingenti sunt mole, (exceptis canibus) & tardius se mouent & uisu sunt hebetiore. Duram habent carnem cetacea omnia & excrementosam, prauique succi. Atque recens eorum caro, ni optime concoquatur, crudi succi plurimum in uenis congerit: senibusque cibis omnino inutilis habetur. Quamobrem ipsis sale cōditis fere in cibis

## DE DIFFERENTIIS

utimur: ita enim fit, ut alimentum quod ex ipsis in corpus digeritur, & tenuius reddatur, concoctionique & sanguini generando accommodatius. Iuba in iis uoluminibus, quæ scripsit ad C. Cæsarem Augusti filium de Arabia, tradit cetos sexcentorum pedum longitudinis in flumen Arabiæ intrasse: pinguique eius negotiatores & omnium piscium adipe camelos perungere in eo situ, ut asilos ab his fugant odore.

1 Prope cerebrum, *πρὸς τὴν ἰσχυράν*: ita potius legendum censeo, quàm *πρὸς*, id est ante cerebrum, ex ipso Aristotele de delphino, qui non à fronte, sed à dorso fistulâ gerit: quanquam lib. 4. de part. animalium, & de respirat. habetur non *πρὸς*, sed *πρὸς τὴν ἰσχυράν*, id est ante cerebrum.

De delphino & phocæna.

Cap. CXCIIII.

F

*Delphinus.*  
*Delphin.*  
*Delphin.*

**M**anfuetudine, amore, celeritate, forma atque robore, non in hoc tantum cetaceo, sed in omni marino genere, reliqua facile superat delphinus: plurima enim narratur indicia morum placidorum ac mitium, & amoris quoque in pueros. Certum habet uocabulum, inquit Solinus, quo accepto, uocanteis sequuntur: nam proprie Simones nominantur: nomenque Simonis omnes miro modo agnoscunt, maluntque ita appellari. Hominis amicum animal delphinus, obuiam nauigiis uenit: alludit exultans, certat etiam, & quanuis plena præterit uela. Et, ut cecinit Ouidius,

Vndique dant saltus, multaque aspergine rorant.

Emerguntque iterum, redeuntque sub æquora rursus:

Inque chori ludunt speciem, lasciuæque iactant

Corpora: & acceptum patulis mare naribus efflant.

G

Velocissimum omnium animalium, non solum marinorum delphinus, sed ocyor uolucres, acrior telo: ac nisi multum infra rostrum os illi foret medio pene in uentre, nullus piscium celeritatem eius euaderet. sed affert moram prouidentia naturæ: quia nisi resupini atque conuersi non corripiunt. Certe est delphinus: neque branchias habet ut piscis, neque ouum, sed animal generat, & fistulam ad dorsum gerit. Dorsum illi repandum, rostrum simum. In dorso cultellata inest penna, qua uel crocodilum interimit: uel, ut inquit Solinus, aculeata sunt spinæ dorsuales: cum ira subiacer, inhorrescunt: cum animi conquiescunt, quibusdam receptaculis operiuntur.

H

Falcata illi nouissima cauda est:

Qualia dimidiæ sinuantur cornua lunæ.

*Delphinus, inquit Aristoteles, stridet, non mugit, μύζα.*

Lingua, contra aqatiliū naturam, libera absolutaque & mobilis est, breuis atque lata, haud differens suille. Pro uoce gemitus humano similis: caret enim labris quibus uocis aliquem possit articulū afformare. Audit quidem, sed nullis cauernis quæ uicem præstent aurium. Voces hominū aqilonis flatu celerius haurit: contra, austro spirante, auditus obstruitur. Et cum olfactus quoque nullam partem sensoriam habeant manifestam, tamen sagaciter odorantur delphini. Mammæ habet fœmina & lac, (animal enim concipit ilico & creat, ut modo diximus) quas continet non parte superiore, sed in ima aluo prope genitale: nec modo quadrupedum, papillas conspicias

- A** cuas habet, sed uelut alucolos quosdam humoris duos paulo in obliquum porrectos, utroque de latere singularem, è quibus lac fluit, quod ore catulorum sectantium parentem excipiat: idque iam à nonnullis manifeste perspectum est: neque tamen aliud animal, inquit Plinius, in cursu lambitur. Testes habet mas ultima conditos aluo prælongos, & penem à testiculis ad externa pertendentem, ut bos. Pulmonem habet delphinus & arteriâ: proindeque respirat, & nō nihil uocis, uti modo diximus, potest promouere. & dormiens rostrum fistulâmq; exerit supra mare, ut spiret. Et iam quidem delphinum stertentem etiam nonnulli audire: quamobrem delphinus retibus apprehensus, breui tempore strangulatur, ut qui spirandi facultatem amisent: & foris uero diutius uiuere potest mutiens & anhelans.
- B** do cæterorum spirantium. Delphinus inter ea, quæ mare excipiunt pulmonemque habent, unus felle priuatus est. Meatus feminarios eodem modo habet delphinus, quo pisces serpentisque. Non spinas ut pisces, sed ossa habet delphinus. Coeunt delphini ad motis supinis partibus, ut pisces: sed eorum coniunctio diuturnior est. Gestatur uterus decem mensibus. Partus ætate fit, nec alit ullo tempore alio: pariunt singulos magna ex parte, interdum tamen & binos. Adolefcit celerius proles delphini: quippe qui annis decem ad summam perueniat magnitudinem. Sola carne uescitur delphinus. uiuit annis compluribus: cōstitit enim nonnullos uixisse annis uiginti quinque, alios etiam triginta: quod cognitum est præcisa à piscatoribus cauda: ut quos ita reddidissent mari, captos item agnoscerent, & temporis
- C** spatium scirent. Delphinus in Ponto magnus non est: quanquam extra ubi aliquantum processeris magni habentur. Abdūt tricenis diebus circa canis ortum, occultanturque incognito modo. Coniugati degunt delphini, *Aliis, nec statim.* mares cum fæminis. Solent in terram erumpere incerta de causa: & statim tellure tacta moriuntur, multoque ocyus fistula obturata. Cum male se habere sentiat delphinus, simia marina remedio illi est. Cū delphinis pugnant hamia. Hominē non expauescit ut alienum: nec tantum hominis amicum animal delphinus, uerum & mulcentur musica, gaudent cātibus tibiarum: ubicunq; symphonia est, gregibus aduentant. Circa Taprobanem autē duo delphinorum genera nasci feruntur: alterum ferum & inexplabili immani
- D** tate piscato ribus infestum: alterum natura mansuetum. Delphini tràquillo mari lasciuiantes statum præfagiunt, ex qua ueniunt parte: iidem spargentes aquam turbato, tranquillitatem. Delphini & hippocampi cinis ex aqua illitus, lichenas & lepras tollit. exulcerationē sequi debet curatio, quæ perducit ad cicatricem. Quidam delphini iecur in fictili torrēt, donec pinguitudo similitudine olei fluat: ac perungūt. Febrium circuitus tollit iecur delphini gustatū ante accessiones. Hydropicis medetur adeps delphini liquatus & cum uino potus: grauitati saporis occurritur tactis naribus unguento, aut odoribus, uel quoquo modo obturatis. Delphini adipe linamēta accensa, excitāt uulnæ strangulatu oppressas. Nascitur in Ponto phocæna delphino similis: sed interest, quod minor phocæna est, dorso ampliore, colore cæruleo. Partus quoque illi delphino similis: & lac habet ut delphi-

# DE DIFFERENTIIS

nus: complures uero genus esse delphini opinantur. Delphinatorum, inquit E Plinius, similitudinem habent, qui uocantur tursiones. distant & tristitia quidem aspectus: abest enim illa lasciuia: maxime tamen rostris canicularum malehcentia assimilati.

1 De delphini mansuetudine amorque & affectibus id genus alijs legas apud Aristotelem, Plinium, Elianum, Solinum & alios. 2 Hominis amicum &c. Delphini quodam multis exemplis exprimitur à Plinio. 3 Dorsum illi repandum. Ouidius, Corporisque & presso spinæ curuamine flexi Incipit. Et latu rictus sunt. 4 Tursiones. Phocænam Theodorus tursionem interpretatur.

De balena, orca & physeteræ.

Cap. CXCv.

Balena.  
Φάληνα.  
Musculus.

Cetus quoque balena est: & fistulam non à dorso, sed à fronte gerit, per quam humorem, quam ore acceperat, reddit: qua & summa aqua innatantes in sublime nimbos efflat. Balenæ musculus quandoque prægrauis superciliorum pondere, obrutis eius oculis, infestata magnitudinem uada prænatans demonstrat, oculorumque uice fungitur. Mammæ habet balena & lac: & mammis nutrit fetus, ut delphinus: & pulmonem, ideoque & respirat: editaque per summa æquoris fistula dormit, sicuti & cætera quæ fistulam gerunt: nonnunquam uero etiam desilit in terram, solem passura calentem. Parit balena cum plurimum binos, magnaque ex parte singulos. balenæ coagulo in lethargum uergentibus, ad olfactum utuntur. Balenæ in nostra maria penetrant, inquit Plinius. In Gaditano oceano non ante brumam conspici eas tradunt: condi autem ætatis temporibus in quodam sinu placido & capaci, mire gaudentes ibi parere. Hoc scire orcam infestam his beluâ: cuius imago nulla representatione, inquit Plinius, exprimi possit alia, quàm carnis immensæ dentibus truculentæ. Et Festus, orcæ, inquit, teretes sunt atque uniformi specie. irrumpunt ergo in secreta, ac balenarum uitulos & fetas etiamnum grauidas lacerant morfu: incursumque seu liburnicarum rostris fodiunt. Illæ ad flexum immobiles, ad repugnandum inertes, & pondere suo oneratae, tunc quidem & utero graues, pariendi uæ pœnis inualidae, solum auxilium nouere in altum profugere, & se toto defendere oceano. Contrà orcæ occurrere laborant, seseque opponere, & cautium angustis trucidare, in uada urgere, saxis illidere. Spectantur ea prælia seu mari ipso sibi irato, nullis in sinu uetis: fluctibus uero ad anhelitus ictusque, quantum nulli turbines uoluant. Ingentis magnitudinis orcam à Claudio principe in portu Ostiensi oppugnatam narrat Plinius. Maximum animal in Indico mari pistrix balena est: narratur enim balenæ quaternum iuge pistrix ducenum cubitorum. In Gallico oceano maximum animal physeter est, columnæ modo se attollens, altiorque nauium uelis, diluuiem quandam eructans, ut nimbofa illa alluuie plerumque deprimat alucos nauigantium. Physeteres cum flatum efflant, (ut inquit Strabo) apparet longius intuentibus nebulosæ cuiusdam columnæ similitudo. Tubarum sonitu, multiplici plausu, strepituque id genus ingenti terrentur maxime.

Balena.  
Pistrix.  
Pristes.  
Pristes.  
Pristes.  
Pristes.  
Pristes.

ὄρχας.

1 Orcam, &c. ὄρχας habet Strabo inter cetacea: an idē sint cum orcis, an sit liber mendoſus?

A mendosus? 2 Iugerum continet pedes ducentos quadraginta. 3 Pistrix, &c. Pristes Aristoteli & Oppiano cete est: idem forsitan qui pistrix. Et in Vergiliano illo, de Scylla monstro, (-Postrema immani corpore pistrix.) In quibusdam exemplaribus habetur pristis: apud Oppianum habetur *πρῆστις*, sed legendum arbitror *πρῆστις*. 4 Phyteteres, *φυττερες* ab Oppiano inter cete numeratur: an idē qui *φυντις*? *Φύντις*.

De aliis quibusdam marinis beluis & monstrosis. Cap. CXCVI.

- 1 **S**unt & in mari beluæ, qui dromones uocantur: & qui melāthini, & serræ, materiariæ serræ similitudinem gerentes. Sunt & effigie insolēti nōnullæ in Gaditano oceano, arbor intantū uastis dispanſa ramis, ut ex ea caula fretum nunquam intrasse credatur. Apparēt & rotæ appellatæ à similitudine, quaternis distinctæ radiis, modiolos earum oculis duobus utrinque
- B claudentibus: adeo longis sunt hirsutæ spinis, ut hæ extra mare emineant. reuersiones in orbem faciunt, unde nomē traxere. Grassatur aries ut latro: & nunc grandium nauium in salo stantium occultatus umbra, si quē nandi uoluntas inuitet, expectat: nūc elato extra aquam capite, piscantiū cymbas speculatur, occultusque adnatans mergit. Sunt & alij piscium forma arietes in beluarum quoque numero. In Santonum litore beluas nōnunquā reciprocans desistit oceanus, inter reliquas elephantos & arietes candore tantum cornibus assimilatis. Circa Corsicum & Sardoū fretum hybernant arietes, atque ex aqua eminentes spectantur: simul & delphini circa eos nant. Mas aries frontem alba uitta redimitam habet, diadematis in formā: at fœmina quemadmodum gallinacei, quasdam uelut barbæ appendiculas possident, sic ipsa cirros ex imo collo pendētes habet. In Indico mari exeunt in terram pecori similes beluæ, pastæque radices fruticum, remeāt: & quædam eorum, asinorum, taurorum capitibus, quæ depascuntur sata. Leo quoque in his & pāthera, atque hyæna longe ferociores, quàm sint terrestres feræ. Cornuta etiam marina belua attollit cornua è mari sesquipedalia fere, quæ ab his nomen traxit. Panthera in mari rubro nascitur, similis terrestri pantheræ, colore & maculis orbiculatis. Castoridas Oppianus
- 4 inter cete recēset. uocem hæ querulam mœstāmq; in littore dicuntur edere: quam si forte audierit quispiam, mortem illi breui imminere prænuntiat. Tyberio principi nūtiavit Olyssiponēsiū legatio, ob id missa, uisum auditumque in quodam specu concha canentem tritonē, qua nascitur for-
- D ma: cui Vergilio autore,

Frons hominem præfert, in piscem desinit alius.

Narrat autem Pausanias se tritonem in spectaculis Romanis uidisse, cuius capitis coma, & colore, & quōd discriminari non potuisset, ranarum palustris similis uidebatur: reliquum corpus squamis tenuibus inhorrescebat: branchiæ sub aures, nasus humano similis, os amplum, dentes ferini, oculi glauci apparebant: manus habuit & digitos, unguēsque cochlearum testis non dissimiles: cauda eidem infra pectus & aluum, loco pedum erat delphino similiter. Nereidum falsa opinio non est, squamis modo hispidi corpore, etiam qua humanam effigiem habent: nanque harum uua in Olyssiponensium spectata litore est: cuius morientis gannitum tristem

*Dromones.*  
*Melanthyini.*  
*Serræ.*  
*Arbor.*  
*Rota.*

*Aries.*

*Elephantus.*  
*Aries.*

*Beluæ marinae, equi, asini, tauri.*  
*Leo.*  
*Panthera.*  
*Panthera.*  
*Hyæna.*  
*Cornuta.*  
*Castorides.*  
*Triton.*

*Nereides.*

accolæ audire longe. Et diuo Augusto legatus Galliæ complures in litore E  
exanimes Nerēidas scripsit. In eo quoque, quod circa Taprobanam insulam  
mare est, cete existere muliebri facie fertur: iisque pro crinibus spinas esse.  
*Homo mari-* Authores habeo, inquit Plinius, in equestri ordine splendentes: uisum ab  
*nus.* his in Gaditano oceano marinum hominem toto corpore absoluta simili-  
*Hunc inter be-* tudine, ascēdere nauigia nocturnis temporibus, statimque degrauari quas  
*luas marinas* infederat partes, & si diutius permaneat, etiam mergi. De differentiis ani-  
*numerat Plini-* malium habentium sanguinem, quas communes, quasue proprias singula  
*nus.* habent genera, dictum iam est.

*Dromas.*  
*Curfor.*

*Γρίσση.*

*Onis.*

*Ρεση.*

*Κεῖς.*

1 Dromonem hunc Plinianum diuersum esse arbitramur à dromade Aristotelico,  
quem Thcodorus curforem uocat: & gregalis piscis est: quanquā alio loco uidetur genus  
quoddā pisciū significare potius, quā speciem. 2 Arietes. *Γρίσση* hæc, id est oues F  
uel pecus (opinor) uocat Oppianus, qui in alio mari in latibus fere degunt, locū ra-  
ro murantes. Arietis quoque meminit idem Oppianus, *κεῖς* uocat. 3 Elephāros  
& arietes, &c. Ab his *ὁλα φάρμακον τῶν ὀνείων*, id est saluamentum elephātinum dictum arbi-  
tror. 4 Trironem. Nereidas & hominem quoque marinum, bcluas marinas uo-  
cat Plinius. 5 Nereidas fingunt poetæ Nerei & Doridis filias, quas hoc modo de-  
pinxit Ouidius,

-Quarum pars nare uidetur,

Pars in mole sedens uirides siccare capillos,

Piscæ uchi quædam: facies non omnibus una:

Non diuersa tamen, qualem decet esse sororum.

## DE ANIMALIUM DIFF- G FERENTIIS LIBER IX

Continet animalium exanguium differentias, & pri-  
uatim infectorum.

De animalibus exanguibus.

Cap. CXCVII.



Onsummata iam disputatione de toto ani-  
malium genere, quod sanguine præditū est,  
quæ reliqua nobis pars superest, absoluiamus.  
Nunc igitur ordinem persequemur eorum, H  
quæ sanguine carent: indeque *ἀναιμα*, id est  
exanguia dicta sunt: continent enim hæc  
non sanguinē, sed humorem alium qui san-  
guini proportionē respondeat: qui in hoc a-  
nimalium genere sit ultimum corporis ali-  
mentum, sicuti sanguis in iis quæ sanguine  
prædita sunt. Porro genera in hoc ordine plura sunt: primum genus infe-  
ctorum est: secundum eorum quæ *μυλῶνια*, id est mollia appellamus: tertiu,  
quæ crustis tenuibus operiuntur, *μυλῶνιζοντα*, id est crustacea aut crustata di-  
cta, ut cancrorum genus & locustarum: quartum, quæ silicea testa conclu-  
sa

*ἀναιμα,*  
*Exanguia.*

*Tria hæc ulti-*  
*ma genera, pi-*  
*scium nomine*  
*uocat Plin.*



- A sa muniuntur, *ἡτοιμασμένα* dicuntur: quale genus concharum & ostrearum est. Cum animalia quæque sanguinea partes tum interiores, tum exteriores suis quasque appellatas nominibus habeant, genus quod sanguine caret, pluribus uacat: iam enim uiscera quæ cuique sanguineo insunt omnia, nullum exangue quod habeat nouimus. Partes tamen ad uictum pertinentes omnia necessario habent, quanquam uarie, propter loca quibus cibum recipiant: communes enim omni animalium generi partes sunt, os, ueter, intestinum. Caput nonnullis indiscretum est, ut cancris & iis quæ mollia dicuntur: oculos habent maxima ex parte, exceptis testatis, omnia: linguam quoque & dentes, sed uarie, ut in unoquoque genere explicabimus. Horum etiam genus omne, quæ quidem pedibus fulciuntur, multipes est, nec ullum
- B fere quadrupes habetur: & cruscula omnia, exceptis extremis, à latere affiguntur: & partim sursum uersus flexum habent, partim uero retrorsum sublesta subtortæ uergunt: medij nanque pedes subinde ambigui sunt, (quod Græci *ἡμιποδοῖαν* dicunt) atque amplius in latius flectuntur. At uero tum priora crura tum posteriora retro flectunt. Omnium uero motus per diametrum agitur, quomodo etiam subsistere solent. Neque sanguinem (ut modo diximus) neque omnem uiscerum naturam ullum ex iis obtinet: nihil etiam eorum, quorum gratia uiscera habet animalia sanguine prædita, datum eiusmodi animalibus est: non enim uenas hæc habent, non uesicâ, non usum spirandi: sed tamē unum quod cordi proportionetur, id habeant necesse est. Hoc in mollibus quidē & crustatis ea pars est, quæ à nonnullis *μύτης* *μύτης, Adutis.*
- C tîsue appellatur: in testatis minus quidem patet, at tamen in medio semper querendum hoc principium est: in seclis uero inter caput & uentris alueum est. Sanguis etiam quanquam iis deest, quod sanguinis tamen proportionale est: quodque eandem fere in genere exanguis obtinet uim, quam sanguis in compote illo uel seuum: quandoquidem sanguis iis deest. Osse carent exanguia omnia, sed neque spinam habent ut pisces: aliud tamē quod proportionale ossium est, & quod sua duritie molliorem corporis partem, hoc est, carnem seruare possit, habent: uerum hoc præsidium aliis intus est, aliis foris: nam quæ crusta operiuntur, ut cancri genusque omne locustarum, & quæ testata dicuntur, ut ostrea, his omnibus caro intus: terrenum autem illud quod contineat & conseruet, foris est. At uero animalia insecta & mollia contrā quàm hæc, & modo inter se opposito constant: nihil enim ossis, nihil terreni habere discretum uidentur, quod dignum effatu sit: sed mollia fere tota, carnosâ & tactui cedentia sunt, naturâ inter neruum & carnem obtinentia: mollis enim ut caro est, sed intendi potest ut neruus. Habent etiam intus quod piscium spinis proportionetur, ut sepia: quod sepium uocant: lolligines quod gladiolū: at polypi nihil eiusmodi habent. Insecta contrā quàm hæc constant, ut modo diximus: quippe quæ nihil habet duri aut mollis discretum: sed dura toto corpore sunt, duritie tali, ut osse carnosiora, carne magis ossæ terrenaque magis consent. Quæ sanguine uacant, animalibus non idem membrorum ad generationem pertinētium modus:

sed tum inter seipsa, tum etiam cum sanguineis dissident. Et plurima quidem coire aptum est: testacea uero an ulla coeant, incertum est. meatus autem sicci excrementi atque coitus omnibus quæ oua pariunt, idem ut in reliquis ouiparis habetur. Quin & interior ille meatus idem excrementi & uulua est, tum in mollibus, tum etiam crustaceis: exanguium enim quædam ita sexum habent utrumque, marem scilicet & femina, ut sobolem eiusdem generis procreare possint: alia procreant quidem, sed non sui generis prolem: ut quæ non ex coitu animalium prodeunt, sed per se uel in animali, uel in terra, uel in stirpe, uel etiam in eorum ipsorum partibus, uel excrementis creantur: eademque maris ac femine sexu distincta sunt: iis coeuntibus gignitur quidem aliquid, sed ex quo nihil amplius gigni possit: uerbi gratia, coitu pediculorum, lendes dictæ procreantur: Pulicum genus uermiculorum oui speciem referens: ex quibus nec ea quæ generarint, proueniunt: nec aliud ullum animal, sed id quod sunt, sordes tantum persistunt. Quod autem in uniuersum dixerim, eorum aliis toto genere sexus uterque est, ut mollibus, ut crustatis: aliis maxima ex parte, ut generi insectorum. Eorum autem ipsorum quæ ex coitu cognatorum animalium gignuntur, ipsa quoque sibi cognata prognerant. At uero quæ non ex coitu, sed putri materia oriuntur, ea generant quidem, sed genus diuersum: quodque prodiit nec mas est nec femina, talia sunt nonnulla in genere insectorum. In exanguium genere, in iis quæ ex uermibus gignuntur contra euenit, quàm quæ ex ouo, ut scilicet pars inferior maior inter initia sit dum generantur: oculi & caput postea augeantur. Quæ sanguine carent ex aquatilibus, nec naturalia sunt, ea nasci in lacu non possunt: minus etiam in salis aquis quæ non sunt potulentiores, gignuntur, ut testata, ut mollia, ut crustata: sed stagnis marinis & iuxta amnium ostia gigni solent. Quod uero ad sensus attinet: quæ mollia sunt, & quæ crusta operiuntur, atque etiam insecta sensibus prædita esse omnibus constat: nam & uisu & olfactu & gustu: procul enim quandoque sentiunt, & odore escarum partim allecæta capiuntur, partim uero odorum quorundam suffitu fugiunt, ut insecta quædam. Gustus etiam similis ratio est: interdum enim cibum persequuntur diuersum: nec eisdem saporibus omnia delectantur. Tactu uero sentire, (quod etiam ante dixi) omnibus datum animantibus est: quæ autem siliceo tegmine operiuntur, olfactum gustumque habere constat, argumento escarum. De uisu & auditu, quanquam nihil certi manifestique habemus, quibusdam tamen hos sensus inesse apparet: ungues enim ad strepitum se subtrahere cernuntur, quoties ferramentum sentiunt admoueri. Pectines quoque admotu digito dehiscunt, mox comprimunt se ut cernentes: echini autem & testæ atque glandes olfactum minime habere uidentur. Et generatim quidæ de exanguibus animalibus satis dictum est.

1 Minus etiam, &c. Ita Theodorus οὐδ' ἂν ἀλμυρῶς ἐν τοῖς πηλμαῖς τοῖς, ἀλλ' ὁπῶς, τῶν πρὸ ὁσμῶν ὁσμῶν, &c. Vetus interpretes ita habet: neque erit aliquid animal in quo uincit falsedo in aqua dulci, nisi pauca, sicut duræ testæ, &c.

A

De insectis.

Cap.

CXCVIII.

**E**st inter exanguia insectorum genus amplissimū, ut quod plures quā *Insecta, ἑνόμεα*  
 alia complectitur species. Insecta uoco, quę (ut nomen ipsum declarat)  
 incisuras parte sui uel supina uel prona, uel etiam utraque habent: nec of-  
 fensum quicquam discretum aut carneum, sed quiddam inter hæc ipsa me-  
 dium continent: quippe quę corpore pariter intus forisq; duro constant.  
 Hoc genus multas & uarias complectitur species, ut modo diximus, qua-  
 rum nonnullis quauis cognatis, nomen nullum commune est indicum,  
 cuiusmodi sunt apes, & reliqua similis formę insecta: crabrones scilicet &  
 uespę eiusdemque generis alia quædam: item quibus pennę uagina inclu-  
 sę continentur, (*κελυμένη* uocant) ut galeruca, carabus, cantharis, & reli-  
 qua generis eiusdem. Sunt item alia ex his pennata, ut apes: alia pennis ca-  
 rent, sed pedibus gradiuntur, ut centipeda: alia utroque modo, ut formicę:  
 aliqua pennis & pedibus carētia, ut uermes terrestres. Omnium autē treis *Vitris alucum*  
 illas partes haberi constat, caput, uentris alucum, & quod inter hæc sitū est, *ἡ πρὸς τοῦ*  
 quale in cæteris pectus dorsumque habetur: unum id quod interiacet ma- *κελίαια χυδός.*  
 gna ex parte est: quę tamen sunt longa & multipeda, iis fere totidem sunt  
 quę interjacent, quot incisurę: quę nunc ceruicū loco, nunc pectorum  
 atque alui præcincta separant membra tenui modo fistula coherencia: ali-  
 quibus uero non tota incisura eas ambiente rugas, sed in aluo, uti diximus,  
 aut superne cātum, implicatis flexilibus uertebreis. Oculi duri in omnibus  
 fere patent, sed nullum ex his palpebrā habet. Ex cæteris uero partibus sen-  
 foris nulla manifesta est, præterquam lingua: olfactus tamen sensum ea ha-  
 bere perspicuum est. cibum nanque sibi peculiarem uel eminus odore sen-  
 tiunt, ut apes & culices quas *νύκτες* uocant, mel. Sentiunt autē præcincti ipso  
 (*ἀντίσταμα* uocant) odores: & natiuo quodam sui corporis spiritu, qui à na-  
 tura insitus est, non aduentitius. Linguam habent, quę & gustant & cibum  
 attrahunt: hæc in nonnullis mollis insigniāque est, aliis dura & ualida: om-  
 nia enim quibus non in aluo aculeus est, linguam eiusmodi ueluti arma  
 gerunt. Nec dentes habēt quibus iuncta ea est, exceptis quibusdam paucis:  
 nam & muscę ea pertingentes cruorem mouent: & culices *νύκτες*: dicti co-  
 dem acius pungunt. Dentēs autem quædam insecta habent, quanquam a-  
 lienos, neque aliorum animalium dentibus similes, ut apum muscarumq;  
**D** genus: quædam non habent, eorum scilicet quę cibo utuntur humido. In-  
 sectorum enim complura non uictus tantum, sed armorum gratia dentes  
 possident. Quibus igitur non in ore est aculeus, hæc dentes habent, cibi sci-  
 licet aut conficiendi aut capiendi admouendiq; gratia, ut formicę, & id  
 genus alia. Ad hæc antennę, id est, cornicula ignaui nonnullis ante oculos  
 prætenduntur, ut papilionē & carabo: quę autem in hoc genere, uolucrum  
 sortiuntur naturam, iis præter cætera membra, pennę quædam membra-  
 nę siccę annexę sunt, quibus uolant, quę nequę fissę sunt neque caulē  
 habent ueluti auium pennę. Sunt autē alii binę, ut muscis, aliis quater-  
 nę, utroque scilicet latere binę, ut apibus. Quaternas gerunt, quę aut gran-  
 diores sunt, aut aculeo in aluo armantur: quę scilicet pabuli causa necesse

# DE DIFFERENTIIS

habeant euagari, quæ & corpulentiam habent leuiorem, ut apes, & reliqua E generis eiusdem. Binas uero habent quæ aut minora sunt, aut aculeum in priore parte gerunt, ex iis scilicet quæ pabuli causa uagantur, ut musca, tabanus, culex: quæ autem parua sunt & uitam stabilem agunt, multis quidē fulciuntur pennis ut apes, sed crusta pennas obtectas gerunt, uelut melolonthæ, & cætera id genus insecta, scilicet ut pennarū uires integras tueantur. Ex uolucris itaque ipsis alia membranas ipsas quibus uolant, crusta (quam ἑλνθον uocant Græci) superuenientem quasi uagina inclusas gerunt: unde & κελύπτρες, id est uaginipennes dicuntur, ut scarabeus: alia deteectas habent, αἰλινθῶν dicta, ut apes. uaginipennis illius ordinis nullum est, quod aculeum habet: sed neque ulli aculeus in aluo cui pennæ binæ. Geritur etenim aculeus aliis parte priore, aliis posteriore: aut enim ore aut aluo extre- F ma aculeos habent pleraque insectorum: & uel intus conditos, ut apes & uespæ, uel extra prominentes, ut scorpio: uropigium caudamue non habet fere (præter unum scorpionem inquit Plinius) idque in causa est quod quæ uolucres sunt, tanquam nauigium temone priuatum in uolatu agitentur, & quocunque fors tulerit, impingant. Multipeda sunt omnia, quæ saltem pedibus fulciuntur: uarie tamen pedum numerum sortiuntur: quæ enim corpore sunt longiore & plures habent incisuras, ea numero præcipue superâr, ut iulorum genus: quibus autem pedes pauciores, hæc uolucres fere sunt, ut pedum inopia adiumento pennarum compensetur. Pedes priores nonnulla ex iis longiores habent, quibus abstergant oculis incidentem molestiam atque arceant: quod & muscas facere uidemus & apes, & reliqua generis G eiusdem, quæ scilicet oculos habent duriores. Posteriores etiâ mediis longiores, ut ambulent melius, & attollantur facilius de terra cum uel auolare uel salire libet: quæ nanque saliunt, hæc uel crura posteriora habent maiora, uel gubernaculis quibusdam saltui accommodatis fulciuntur retro curuatis, ut crura quadrupedum. Atque iis omnibus pedes seni, iis etiam quorum nix saliunt connumeratis. Quæ hunc numerum pedum excessere, ut plerique uermes, non infra duodenos habent: aliqua uero & centenos: numerus quidem impar nulli est. Partes corporis pronæ in iis omnibus differunt à supinis, sicut uel in cæteris animantibus est: cute omnia circundantur, sed admodum tenui. Partes insectorum exteriores has esse, atque in hunc modum se habere constat.

H

ἑλνθον.  
κελύπτρες,  
Vaginipennes.  
αἰλινθῶν.  
Aculeus,  
κέρως.

Maiora, μείζονα  
longiora uertit  
Theodorus.

ἑλνθον, ἑλνθον  
πῆλινθῶν.

I Quæ in hoc genere uolucrum sortiuntur naturam, πῆλινθῶν dicuntur, & ἑλνθῶν πῆλινθῶν nonnunquam Aristoteli.

De partibus insectorum interioribus. Cap. CXCIIX.

QVod autem pro carne in his habetur, id nec testæ naturam imitatur (ὀσσεύειν dicunt) neque illi simile est, quod in testaceis genus carnis continetur: sed mediam quandā inter hæc refert naturam: nihil enim habent duri aut mollis discretum, uti diximus, sed dura toto corpore sunt duritie tali, ut osse carnosiora, carne magis ossea terrenaque magis cōstent. Quamobrem his non spinam, non os, non aliquid sepio simile, non testam

**A** testam ambientem, neque terrenum aliquod durum, quod iis proportionem respondeat, natura dedit: ipsum enim corpus se sua duritia tueri potest & seruire, nec est quod aliunde muniri desideret. Plinius hæc ita retulit, Insecta non videntur nervos habere, nec ossa, nec spinas, nec cartilaginem, nec pinguia, nec carnes, nec crustam quidem fragilem, ut quædam marina, nec quæ iure dicatur cutis, sed mediæ cuiusdam inter hæc omnia naturæ corpus, arētī simile, nervo mollius, in reliquis partibus siccius uerius quàm durius. Et hoc solum his est, nec præterea aliud: nihil intus, nisi admodū paucis, intestinum implicatum. Hæc Plinius. Partes autē quæ ad cibum administrant, non pari ratione datæ omnibus sunt: alia enim linguam intra os continent, ut formicæ: alia foris gerūt uelut promuscidem fungosam & cauam, ut ea simul & gustare & cibum trahere possint. Patet hoc in muscarū genere & apum & omnium generis eiusdem: necnō a fili & tabani eodem spectant: atque iis quidē lingua, siue promuscis pro aculeo habetur: omnia namque quibus non in aluo aculeus est, linguam eiusmodi ueluti arma gerunt. Linguam hanc in quibusdam excipit intestinum rectum simplex ad ostium usque extremū porrectum: in quibusdam hoc retortum in anfractum est. Sunt etiam quæ uentrem ori adiunctum, intestinumque à uentre reuolutum habeant, ut quæ cum edatiora maioraque sint, conceptaculum cibi obtineant copiosioris. Viscus nullum in his, nullum pingue, sicut neque in cæteris quæ sanguine carent. Pars uero illa quæ cordi proportionem respondet, inter caput & alueum est: quæ etsi magna ex parte simplex est, tamē in nonnullis multiplex est, ut iulis & similibus prælongis: quo fit ut præcisa uiuere possint. Fœminis in hoc genere membrum quod pro uulua habetur, fissum iuxta intestina positum est, in quo fœtus generatur. Patet hoc in locustis & reliquis quorum magnitudo aliqua est, & natura coitum recipiat: maxima enim pars generis insecti perexigua est: idēq; & eorum ueteri incerti ignotiue propter corporis exiguitatem. Fœminæ inter ea quæ coeunt insecta, maxima ex parte maiores suis maribus euadunt, ut Phalangia.

<sup>1</sup> Præcisa, &c. Insecti diuulsi, inquit Aristoteles, uiuit cum pectore tum caput tum alueus: & sine eo caput auulsum uiuere non potest.

De insectorum generatione & interitu.

Cap. CC.

**P**rocreatur insecta quædam per coitum & ex animalibus generis eiusdem, ut phalangia & aranci ex phalangiis & arancis: ut bruci, locustæ, cicadæ. Sunt autem quæ cocunt quidem & generant, quædam etiam animal, uerum non sui generis animal, sed uermiculos tantū, ut muscæ & genera papilionum: neque eadem hæc ex animalibus procreantur, sed ex putrescente humido aut sicco: ut pulices, muscæ, cætharides. Quædam nec ex animalibus nascuntur neque cocunt: ut culices & uermiculi nonnulli, & plura eiusmodi genera, sed sponte proueniūt. Horum uero alia ex rore qui in frondibus est, uidelicet uerno tempore, ut natura fert, sæpe tamen & hyberno quoties tranquillum australeque tempus diutius constitit. Item alia ex cæno aut fimo putrescente oriūtur: alia in lignis aut stirpium aut cæsis;

alia in animalium pilis, alia in excrementis, aut iam excretis, aut adhuc in- E  
tra animantem contentis, ut quæ lumbrici appellantur. quinetiā in iis quæ  
putredinem nullam posse recipere existimantur, nasci animalia nouimus,  
ut culicum genus quoddam ex fece aceti, & uermes in niue uetustiore: o-  
mnibus autem prope dixerim, quæ sponte procreantur, uel siccis humescē  
tibus, uel humidis sicciscentibus nascuntur. Insecta uersa cocunt, deinde  
id quod minus est superuenit maius, hoc est, mas scēminam (inter ea enim  
quæ cocunt insecta, scēminæ maxima ex parte maiores suis maribus eua-  
dunt, uti modo diximus) nec mas in scēminam genitale ullum inferere mō  
brum, more animalium cæterorum uidetur, sed scēminam sursum in ma-  
rem meatum quendam reflectere conspectum in pluribus est, qui in non-  
nullis maior quā proportionē totius corporis esse uidetur, cum ipsa par- F  
ua admodum sit: sed sunt etiam in quibus minor existit. Planum hoc fuerit  
si muscas coitu uenereo copulatas diuiseris. Tardo etiam quæ coiuerint se-  
iunguntur digressu: diu nanque copulatio eorum durat, quod in iis quæ in  
nostro conspectu uersantur facile patet: uerbi causa, in muscis & scarabeis,  
phalangis & si quid eius generis coire solet. Insecta hyberno tempore co-  
cunt, & serenis austrinisque diebus nascuntur ea quæ se abdere non solent  
ut muscæ, formicæ: breui à coitu parium maxima sui parte quæ solēt coire.  
uermem autem omnia faciūt, excepto genere quodam papilionum, quod  
durum quiddā simile cartamo, id est enici semini producit, sed intus flui-  
dum. E quibusdam qui ex coitu prognati sunt uermibus, neque ea quæ ge-  
nerarint proueniūt animalia, sed nec aliud ullum animal: sed id quod sunt G  
sordes tantum persistūt, ut pulicum & pediculorum fetus: ē uermibus ue-  
ro ipsi ex quibus gignitur animal, non parte aliqua sicut ex ouis, animal  
creatur, sed totus uermis accrescit, & particulatim discretus formatur in  
speciem destinati animalis. Eadem uero gignēdi ratio omnium est quæ ex  
uermibus ortum habent, siue ex coitu animalium uermes, siue sine coitu  
prodiēre. uerbi gratia: nascuntur papiliones ex crucis. Erucæ ex uiuentibus  
foliis, maximèque ex brassica. Primum minus quid milio consistit in folio:  
mox uermiculi inde contrahuntur: aucti deinde intra triduum, erucæ par-  
uæ afformantur: postea uero auctæ motu cessant, suāque forma immutant-  
tur, appellanturque tātis per chrysalides, quasi aurelias dixeris, & duro in-  
tectæ putamine sunt: ad tactum autem immobiles arancosis quibusdā ob- H  
ductæ (quæ etenim ex crucarum numero ē uermibus gignuntur, aranea in-  
uolutæ magna ex parte principio exeunt) nō os, nō aliud ex membris quod  
conspicuum sit, possident. Vermium uero ipsorum alij hoc intra se habent  
unde incrementum ipsis nutriendis accedat, ut uermes, apum & uespārū:  
alij de foris capiunt, ut erucæ & cæterorum nonnulli uermium. Itaque pri-  
mum dū erucæ sunt, cibo alūtur atque excrementum emittunt: at uero cum  
in aurelias dictas transierint, nihil uel gustant uel excernunt. Longo post  
tempore, putamine obrupto euolant inde animalia pennigera, quos papi-  
liones uocamus. Omne autem hoc uermiculi genus, ubi suæ magnitudi-  
nis finem receperit, cum scilicet aurelia appellatur, quasi ouum efficitur, &  
oui

ἄνθρωπος.  
Aurelia.

Papilio.



**A**oui obtinet facultatem: indurefcit enim putamen eorum, & tantisper immota redduntur: quod etiam in uermiculis apum & uespærum nõ secus atque in crucis apertum est: & in cæteris quoque omnibus quæ non coitu generantur, uel in lanis uel aliis huiusmodi, atque etiam in aquis. Omnia enim post uermis naturam, motu cessant, & putamine obarescunt: mox ru pro putamine exit ueluti ex ouo animal, tertia mutatione finem accipiens generationis, idque pennatum magna ex parte est: colorem uero à sua cruce trahunt quæcunque ex crucis orta sunt. Hæc eadem gignendi ratio (ut dixi) cæterorum etiam est quæ ex uermibus consistunt, ut apum, uespærum & crabronû, scarabeorum atque aliorum id genus omnium. Eorum quæ ex uermibus gignuntur contrà quàm eorum quæ ex ouis, pars inferior maior inter initia fit, oculi & caput postea augentur. Tempus generationis insectorum à principio ad finem usque; maximæ fere parti septenariis ternis describitur aut quaternis. Culicum & uermiformis generis parti plurimæ, ter septeni dies attributi sunt: iis uero quæ sui generis animal procreant quater septeni magna ex parte: septem ex iis ab initu, concretio uermis & consummatio uendicat sibi: reliquis tribus septenis incubant atque excludunt, ea scilicet quæ suo procreant foetu ut araneus, aut id genus aliud: mutationis uero & transitus in figuras alias, trinis aut quadrinis diebus, parti maximè peraguntur, sicuti in morbis quoque dies decretorius euenit. Talis insectorum generatio est. Percunt striatis contortisque membris, ut senectute genus maiorum animalium moritur, quæ pennata ex iis sunt, peninis etiam contractis autumnò fere moriuntur: tabani quidem uel aqua intercute oculorum cæci intereunt.

De uictu insectorum, uoce, ualetudinèque & aliis quibusdam affectibus.

Cap. CCI.

**I**nsecta animalia quibus dentes omniuora sunt: quibus autem lingua tantum, humore undique eliquando sua lingua uestitur: quorû alia etiam omniuora sunt, quibus scilicet gustus omnium saporum est, ut muscæ: alia sanguiuora, ut tabani, asili: alia succis plantarum & fructuum uiuunt. Apis una nullis putidis assidet, nec utitur alio cibo quàm dulci. Formicæ nihil uenantur, sed ab aliis iam parata colligunt. Aranei nihil conficiunt neque recondunt, sed cibum solo uenatu sibi acquirunt. Apes nihil uenantur, sed ipsæ sibi cibaria faciunt atque recondunt: mel enim cibum earum est. Insecta humorem, non potus, sed cibi gratia assumunt. Omne insectorum genus minimo alimento contentum est, & prope sibi ipsa sufficiunt, non tam corporis exiguitate quàm frigiditate, uti Aristoteli placet. Insectis animalibus neque uocis, neque locutionis ulla facultas, sed sonus tantum iis spiritu interiore mouetur, non exteriore: nullum enim ex iis spirat: omnia uero in eo genere membrana septo cincturæ qua incisura est subdita, sonant attritu spiritus interioris. Insecta pene omnia hyeme conduntur, præter ea quæ uitam in domiciliis cum hominibus agant: quæque prius intereant quàm annum tempus excedant. Latent hæc hyeme, alia diutius, alia quædiu al-

gor uehemens est, ut apes. Conduntur autem quæque locis apricis abdita, & ubi sibi cubile constituere tutius solent. Senectutem etiam exuunt insecta quædam, ut silpha, & ea quorum pennæ uagina continentur, ut Scarabæi. Et omnia quidem ubi iam factum est quod gigni debuerit, exuunt, ut iam dictum est. Nam ut partui ouiparo cortex, sic uermiculariæ proli operculum circumrumpitur, æque & apibus & locustis & aliis nonnullis. Insectorum maxima pars eo tempore ualet quo gigni solet, uidelicet cum annus humidus & tepidus est. Intereunt omnia insecta tacta ex oleo: sed celerime si capite illito exponantur soli. Conglomerantur ex iis nonnulla ut sese tuto inflexu seruare possint: quæcunque scilicet prolixo corpore sunt. Quæ autem glomerari nequeant, contrahunt se in incisuras, quod parit cum tanguntur, uelut ea quæ canthari uocantur: ubi enim metuerint, motu cessant, & totòque corpore indurciscunt.

De insectorum generibus, quæ fauos sibi extruant, ut de apibus, atque id genus aliis. Cap. CCII.

Insectorum genus quoddam est nomine adhuc uacans quo uno comprehendatur, sed formam suarum partium cognatam omnium rescrens, uidelicet ea quæ fauos faciunt, ut apes & reliqua similis formæ insecta: quorum genera nouem numero sunt. Sex illa ex his gregalia, apes, reges apum: fuci qui inter apes degunt, uespæ, crabrones, & cuthredones: solitaria uero reliqua tria, sirenis maior, sirenis minor, & quem bombylium uocant. Sed inter insecta omnia principatus apibus, & iure præcipua admiratio, solis ex eo genere hominum causa genitis, inquit Plinius. Mella contrahunt succumque dulcissimum ac saluberrimum, fauos confingunt & ceras, rempublicam habent: concilia priuatum, ac duces gregarium: & quod maxime mirum sit, mores habent. Genera apum plura: optimum, quæ breues, uariæ, & in rotunditate compæctiles sunt: secundum, quæ longæ & crabronibus uespisue similes: tertium, qui φάρ, id est fur nuncupatur: quartum, fucus: (nam & hæc inter apes numerantur.) Duo item principum regumue genera: alterum rufum, fuluūque, (μυρμήκων Græci uocant) quod præstantius est, alterum nigrum magisque uarium. Duplo amplius hoc genus apum utili: & pars à præcincto inferior longitudine proportionem habet sesquialteram: uocanturque à nonnullis matres apum, utpote originis authores. Aculeum apes possident, fuci eo carent, reges ducetque habent, sed non utuntur: quocirca eos carere aculeo nonnulli existimant. Hæc Aristoteles. Tria ducum genera fecere quidam, ut refert M. Varro, nigrum, rubrum & uarium. Menecrates duo statuit, nigrum & uarium: melior nigro uarius, ita ut expediat mellario cum duo sint eadem aluo, interficere nigrum, quem scit cum altero rege esse seditiosum, & corrumpere aluum. Sunt reges apum, ut Columella prodidit, maiores paulo & oblongi magis quam ceteræ apes, rectoribus cruribus, sed minus amplis, pinnis pulchri coloris, & nitidi leuissime, ac sine pilo, sine spiculo, nisi quis forte plenioris quasi capillum quæ in uentre gerunt, aculeum putet, quo & ipso tamen ad nocendum non utuntur.

Apis.  
Μελισσα.

Apum genera.

Ducum genera.

Matres apum.  
Μυρμήκων  
Μελισσæ.

Reges apum.

A utuntur: quidam etiam in fuscis atque hirsuti reperiuntur, quorum pro ha-  
 1 bitu damnabis ingenium,

Nanque dux regum facies, duo corpora, plenis

Alter erit maculis auro squalentibus ardens,

Et rutilis clarus squamis, insignis & ore.

Atque hic maxime probatur, qui est melior: nam deterior fordido sputo  
 similis tam fœdus est, -quàm pulvere ab alto

Cum uenit, & sicco terram spuit ore uiator. Et,

-Ille horridus alter

Desidia, latâmq; trahens inglorius aluum.

Regibus omnibus, inquit Plinius, forma semper egregia, & duplo quàm eg-  
 B teris maior: pennæ breuiores, crura recta, ingressus celsior: in fronte macu-  
 la quodam diademate candicans: multum etiam nitore à uulgo defferunt.  
 Mira plebei circa eum obediētia: cum procedit, unâ est totum examen: cit-  
 câque eum conglobatur, cingit, protegit, cerni non patitur: & se quæque  
 proximam cupit esse, & in officio conspici gaudet. Reliquo tempore cum  
 populus in labore est, ipse opera intus circuit similis exhortatur, solus im-  
 munis. Procedit foras non nisi migraturo examine. Non unus in quoque  
 examine dux tantummodo est, sed plures, ut Aristoteles author est: peritq;  
 examen, si duces uel non satis habeantur, uel plures quàm satis: distrahant  
 enim examen. Plinius uero, Reges, inquit, plures inchoantur ne desint: post-  
 ea ex his soboles cum adulta esse cœpit, concordii suffragio terribilissimos ne-  
 C cant, ne distrahant agmina. Reges nunquam prodeunt foras, uel, ut pascant

*Alia, deterri-  
mos.*

tur, uel alia causa, nisi uniuerſa cum plebe, ut cum migratur: tunc enim reli-  
 quæ omnes circa ipsum glomerantur, uti modo diximus. Et ubicunque il-  
 le confedit, ibi cunctarum castra sunt. Et si cum pergant, rex ipse forte aber-  
 rarit, omnes inquirere odoratûque sagaci persequi ducem donec inueniât,  
 accepimus: gestari etiam eum à plebe, cum uolare non potest: & si petierit,  
 omnes interire: uel si aliquandiu manserint, fauos quidē conficere, sed mel-  
 nullum: nec fieri posse, quin breui omnes pereant. Sempérq; duce prehen-  
 so totum tenetur agmen, amisso dilabitur, migrantq; ad alios. Esse utique  
 sine rege non possunt: inuitæ autem interimunt eos cum plures fuere. Fuci  
 magnitudine duces æmulantur, inquit Aristoteles: quod si aculeum quo-  
 D que haberent, duces utiq; essent: & Columella, Fucus, inquit, genus est am-  
 plioris incrementi similitimum apis. Plinius quoque, Maiores sunt apibus  
 fuci, & sine aculeo, uelut imperfectæ apes. Quamobrem cum ea sint ma-  
 gnitudine, alueis aliqua intertexunt nonnulli, quò apes subire possint: fuci  
 autem ut grandiores nequeant. Manent fuci magna temporis parte in al-  
 ueis: (neque enim hoc genus nisi uere conspiciatur:) cûmq; exeunt, effe-  
 runt sese fusim in sublime gyróque uolitant, & quasi exercitium faciunt:  
 quod ubi satis iam fecerint, redeunt domum & epulis perfruuntur. Gigni  
 fucos seorsum dicitur, si dux uiuit: sed si obiit, in apum loculamentis oriri  
 ex ipsis apibus, atq; hos fieri animosiores: quocirca aculeatos uocari, quan-  
 uis aculeo careant: animo nanque ferendi, non potestate hoc meruerunt.

*Fesum, inquit  
Plinius, hume-  
ris subleuant  
uolubus fatiga-  
tū ex toto por-  
tant.*

*Fucus, an fœr.*

*Aculeatos,  
καρπορές.*

Fuci, inquit Aristoteles, nullum est inter apes munus, sed, ut ait Vergilius, E ignauum fucus pecus & immune, sine industria fauis assidens: nam neque alimenta congerit, & ab aliis inuenta consumit: uerum si pauci adsunt fuci, non nihil præstant commodi: reddunt enim apes in opere sollicitiores. Sunt tamen qui fucos & per se fingere fauos eodem in alueo, & cum apibus negotium conficiendi faui partiri dicant: uerum mellificandi nullam habere facultatem: sed uesci tum eos, tum eorum pullos melle quod apes fecerint. Hæc fere Aristoteles: ueruntamen, ut Columella author est, ad procreationem sobolis cōferre aliquid hi fuci uidentur: insidentes seminibus, quibus apes figurantur. Itaque ad fouendam & educandam nouā prolem, familiarius admittuntur: exclusis deinde pullis extra tecta proturbantur. Et Plinius, Sunt autem fuci, inquit, sine aculeo imperfectæ apes, nouissimæque à fessis & iam emeritis inchoatæ, serotinus fortis, & quasi seruitia uerarum apum. Quamobrem imperant iis, primosque in opera expellunt, tardanteis sine clementia puniunt: neque in opere tantum, sed in sætu quoque adiuuant eas, multum ad calorem conferente turba: certe quo maior fuerit multitudo, eò maior fiet examinum prouentus. Cum mella cœperint maturefcere, abigunt eos, multæ singulos aggressæ trucidant. Et si prouentus desperatur, tunc & fucos abigunt. Proprium furibus genus est se aliqui existimauere, inter apes grandissimis, sed nigris, aluóque quàm apibus utilis ampliore, ita appellatis, quia furtim deuorent mella. Furis sicuti & fuci nullum est in apum opere munus, sed cæteris quibuscum uiuunt, iniuriam faciunt: nam fur ipse si quādo in alienos fauos surripere ingressum potuerit, adeo in satietatem repletur ut nequeat auolare, sed ante alueum uoluetur. Itaque non impune semper hæc faciunt: nam deprehensi interdum à bonis apibus occiduntur, sicuti & fuci. Apes unicolores magis sunt quàm crabrones aut uespæ. Optimæ breues uariæque & in rotunditatem compactiles: deteriores longe, crabronibus uespisue similes: etiamnum deterrimæ ex iis pilosæ. Minores illæ officiosiores maioribus sunt: pennæ his detritæ, color nigricans, & quasi combustæ essent. At maiores nitidæ uenustæque sunt more otiosarum mulierum. Peripateticæ sectæ cōditor Aristoteles in iis libris quos de animalibus conscripsit, apum siue examinum genera complura demonstrat: earumque alias uastas sed glomerosas, eademque nigras & hirsutas alas habentes: alias minores quidem, sed æque rotundas & infusci coloris, horridique pili: alias magis exiguas, nec tam rotundas, sed obesas tamē & latas, coloris meliusculi: nonnullas minimas gracilisque & acuti alui, ex aureolo uarias atque leues. Eiusque autoritatem sequens Vergilius, maxime probat paruulas, oblongas, leues, nitidas,

Ardentes auro, & paribus lita corpora guttis,  
moribus etiam placidis: nam quanto grandior apis, atque etiam rotundior, tanto peior: si uero & senior, maxime pessima est. Hæc Columella. Differunt inter se apes parentibus natæ urbanis, & quæ rustico montanoque uictu educatis prodierint: sunt enim syluestres horridiores aspectu, & iracundiores & minores, sed opere ac labore præstantiores. In Ponto sunt quædam alba,

Quæ, fur.

Fur, inquit  
Varro, qui nocetur ab alijs  
fucis, lato uentre.

Apes.

**A**lba, quæ bis in mense mella faciunt. Apud Themisciram circa Thermoodontem amnem apes tam in terra quam in alucis faciunt fauos, qui parû admodum ceræ contineant, & mel crassius reddant. Fauus ipse levis atque æquabilis est, quem non semper, sed hybernis tēporibus tantû construunt: copia enim in eo tractu est hedera, quæ hyeme floreat, unde apes mel capiant. Ad Amysum urbem conuehitur à locis superioribus mel cādīdum, quallūque maiorem in modum, quod apes faciūt in arboribus sine fauo, quale etiam fieri in Ponto cognitum est. Sunt etiam apes quæ fauos sub terra triplici ordine faciant, in quibus mel est, uermis nullus: uerum nec faui omnes eiusmodi sunt, nec apes ita omnes confingunt.

*Mel candidū.*

**B** 1 Nanque daz, &c. Ex Vergilio hæc: quanquam uidetur hic Columella nonnullas notas attribuerē regibus apum, quas Vergilius apibus ipsis. 2 Quasi combustæ, Theodorus dotsum repandam legit: sed nos hunc locum ita reddidimus tum ex Græca lectione, tum ex ueteri interprete consentientibus.

Ratio operis & uita apum.

Cap. CCIII.

**S**ed petquam uaria in earum operatione & uita, ratio est: apes enim fere cum alueum receperint mundum, primum fauos cōstruunt, ceram fingunt, hoc est, domos cellasque faciunt: deinde sobolem, postea mella. Primum itaque construere incipiunt fauos, deferētes ex floribus, atque etiam ex arboribus lachrymas, salice & ulmo, & aliis quæ glutinum pariunt. His-

**C** que pauimentum & alueum ipsum intus totum, ut quodā tectorio illinūt, ne bestiolæ nocuæ subeāt. Vocant hoc opus apiarij *κωτιον*, id est tectorium: aditus etiam si ampliores sint quàm pro fabricæ ratione, obstruentes coar-

*κωτιον, mel κωτιον.*

2 tāt. Fauos deinde effingunt multi cauatos è cera: primum in quibus ipsæ gignantur: deinde in quibus reges dicti & fuci (quanquam sunt qui fucos, ut dictum est: & per se fingere fauos in eodem alueo, & cum apibus negotium conficiendi faui partiri dicant) suos certe semper componūt apes: sed regum cum fœtus largior est, fucorum autem cum copia mellis speratur. Fauos regum suis similes faciunt, qui parui sunt: fucorum autem minores quàm suos: & quandoque finguntur scorsum per se faui fucorum: sed magna ex parte inter fauos apum inserūtur. In fauis cellæ omnes (quæ & loculamenta dixeris & loculos) tam mellariæ quàm sobolariæ gemino sunt o-

*Fauus, κωτιον.*

**D** stio: uno enim eodēque intersepto, & basi duæ sibi iunguntur cellæ modo poculi gemini, altera intus, altera foris. Sūtq; loculi ipsi fucorū ampliores. Cellam facit apis ex angulis totidem, quot habet ipsa pedes (quot geometræ *ἰσῆς* fieri in orbe rotundo ostendunt) ut plurimum loci includāt. Cellæ quæ parietibus principiisue fauorū proximæ sunt, arctiores & melle uacua gemino aut triplici uersu: pleniore autem sunt faui, quibus plus ceræ obducitur. Ad ostium ipsum aluei, prima aditus pars illita est ex mitye, quod uelut extremētum purgamentū mucæ ceræ est, bene nigrum acrisque odoris: medetur hoc plagis, & huiuscemodi suppurationibus. Proximū ab eo tectorū crustaue pissocerus: leuius hoc quàm mitys, minúsque medicamento sum. Hæc Aristoteles. Plinius uero, fores, inquit, latiores circūstruūt.

*Cellæ.  
Loculamenta.  
Loculi.  
ὄστια.  
κίτταρα.*

*Μίτυς.  
Commofis.*

*Πισσοκύρως.  
Picatus ceruus*

*Mity.**Pissoceros.**Propolis.**Mity.*

Prima fundamenta operis mityn uocant periti: secunda pissoceron, tertia E propolin inter coria cerasque, magni ad medicamina usus: mitys crusta est 4 prima saporis amari: pissoceros super eam uenit picanctium modo ceu dilu- 5 tior, ceræ initium plerunque è mitiori gummi: propolis crassioris iam ma- teriæ additis floribus, nondum tamen cera, sed fauorum stabilimentum, qua omnes frigoris aut iniuriæ aditus obstruuntur, odore etiam nuu graui, ut qua plerique pro galbano utantur. Propolin uocant, inquit Varro, è quo 6 faciunt ad foramen introitus protectum in aluum maxime æstate: quam rem etiam nomine eodem medici utuntur in emplastris: propter quam rem etiam carius in sacra uia quàm mel uenit. De propoli Dioscorides hæc prodidit, In alueorum foribus inuenitur propolis, sua natura ceræ aspectu 7 similis. Eligenda est flaua, odorata, & styracem referens, in uehementi ar- F ditate mollis, & mastiches in modum ductilis. Fauos itaque primum in- tus, ut dictum iam est, conficiunt apes: mox collocant forum ore emitten- tes suo, uti iis placet qui censent aliunde prolis primordia conuehi (de ge- neratione nanque earum uaria sententia est.) Deinde cibi causa mellifi- cant, ore euomentes in cellas: mel enim apibus tum æstate tum hyeme in cibo est: sed præter hoc conuehunt reconduntque alterum quoque ciba- rij genus, cui durities ceræ proxima, quod Sandaracan nonnulli appel- 8 lant: alij Erithacen, alij Cerinthum. Hic erit apum, dum operantur, cibus, qui sæpe inuenitur in fauorum inanitatibus sepositus, & ipse amari so- poris, ut Plinius docuit. Gignitur autem rore uerno, & arborum succo G gummi modo: Africi minor, Austri statu nigrior, Aquilonibus melior & rubens. Erithacen uocant, inquit Varro, quos fauos extremos inter se con- glutinant: quod est aliud melius propoli, itaque in hoc uim esse illiciendi. Quocirca examen ubi uolunt confidere, eum ramum aliâque quam rem oblinunt hoc, admisso apiastro. Cerinthum Aristoteles melle quidem de- teriorem esse scribit, at dulcedine prope ficus. Congerunt hoc apes suis cru- ribus, ut & ceram. Carnem nullius animalis tangunt apes, nec opsoniû ap- petunt: mortuis ne floribus quidem, non modo corporibus insidunt. Apis insectorû una nullis putidis assidet: nec utitur alio cibo quàm dulci: aquâ etiam libentissime haurit, qua sinceri clarissimique fontes scaturiunt. Gau- dere plausu atque sonitu apes uidentur, quapropter tinnitu æris aut fictilis conuocari eas in alueum aiunt: quanquam incertum est an audiant: & uo- H luptatene, an formidine ita faciant. Hyeme conduntur, adeo ut nec cibum sibi appositum gustare uideantur. Et si qua ereperit, ieiuna spectatur uêtre translucente, nullôque penitus contento quod manifestum sit. Cõduntur à Vergiliarum occasu usque ad uer inquit Aristoteles: Plinius autem, latet ultra exortum, ait, adeo nõ ad ueris initium, nec ut quisque in Italia de al- uicis existimat: ante fabas florentes non exeunt ad opera & labores. Colu- mella, post confectam, inquit, brumam diebus fere quadraginta, quicquid est repositi mellis (nisi liberalius à curatore relictum sit) consumunt apes: & sæpe etiam uacuatis ceris usq; in ortû Arcturi, qui est ab idibus Februa- riis, ieiunæ fauis accubantes torpent more serpentû, & quiete sua spiritum conseruant.

*Sandaracan.**Erithace.**Ereperit, uel**perit.**Cerinthus.**Kugur, Ser.**Erithace.**Cerinthus.*



- A** conseruant. Post hoc tēpus cum diei permittit hilaritas, procedere audent in pascua: nam ab æquinoctio uerno sine cunctatione iam passim uagātur, & idoneos ad sctum decerpunt flores atque intra testa comportant. Duodequingagesimo die ab æquinoctio uerno, cum sit uergiliarum exortus, circa v. idus Maij incipiunt examina uiribus & numero augeri. Singulis deinde muneribus se distribuunt apes, ut aliæ ex floribus conuehant: aliæ mel, aliæ erithacen, aliæ extruant & poliant fauos: aliæ aquam importēt ad cellas, & cum melle temperent. Gerulæ secundos flatus captant: iuxta uero terram uolant in aduerso flatu uepribus hebetato. Nullum his tempus certum consuetūque est quo operari incipiant: sed si rebus abundent necessarii, benēque degunt, æstiuo potissimum tempore opus aggrediuntur,
- B** & quandiu serenū sit assidue operantur: nullūque cum per cælū licuir, otio perit dies. Socias quoque otiosas & desidēs ac minus parcas pellere, in more apibus est. Apum seniores intus operantur: hirtioresque moræ domesticæ ratione sunt: adolescentes foris negotium exercent, & ea quæ res exigit portant, leuiorēque sunt, labore hirtutis detrita. Præfagiuntque apes & hyemem & imbres: cuius rei indicium est, quod non uolant: sed sereno adhuc, in alueo uolutātur: quo apiarij hyemem expectant. Tempore matutino omnes silent, donec una gemino aut triplici bombo excitet omnes: tum uniuersæ ad opus prouolant. Cūque redierint, primum item tumultuant, paulatimque minus subinde strepunt, dum una circūuolitando susurret, quasi dormiendū præcipiat: tum repente omnes conticescunt. Dignoscitur examen ualere susurri frequentia, & exeundi ingrediendūque agilitate: hilaritate præterea & nitore sanitas æstimatur. Cum migrandum est, uox solitaria & peculiaris quædam aliquot ante diebus intus mittitur: & biduo aut triduo pauce circa alueum uolant. Ab exortu autem uergiliarum ad solstitium, quod fit ultimo mense Iunio, ut tradit Columella, fere examinātur alui: quo tempore uehementius custodiri debēt, ne nouæ soboles diffugiant. Vita apum anni sex: nonnullæ etiam septem possunt complere. Quod si examē nouem aut decem annos durauerit, prospere actum esse existimatur. Efferunt foras uita in alueo defunctos: & cætera mundissimum omnium hoc animal est. Amoliūtur omnia è medio, nullæque inter opera spurcitia iacent. quin & excrementa operantiū intus, ne longius recedant, unum congesta in locum, turbidis diebus, & operis otio egerunt. Sæpenumero & cum alui necessitas est, auolāt: & in secessu reddunt excrementum, quoniam male oleat. Oderūt autē non solum fædos odores, sed etiam unguentorū delicias: ex quo fit ut homines his delibutos percutiāt.

1 *κέραι*: an *κέραι* potius? Melliginem, ni fallor, hoc uocat Plinius. 2 Fauos *Melligo*, deinde, &c. Fauur, inquit Varro, est quæ fingunt multi cauatum è cera. 3 Cellā facit apis. Plinius, Hæ, inquit, cellarum minimè, sed ipsi (fuci scilicet) maiores apibus. An forrasse fauos intelligit, non loculameta ipsa? 4 Myrin, aliàs, commosin, atque ira uerit Theodorus pro mirye, inter coria cerasque, id est, inter priores illas crustas & fauos. 5 Prima, aliàs, nigra. uaria hic noratur lectio pliniana. Populi, inquit Plinius, ferunt in foliis gurram, ex qua apes propolim faciūt. 6 Propolim uocār. Videtur Varro hoc nomine duplicia illa Aristorelis, aut triplicia Plinij fundamenta cō-

## DE DIFFERENTIIS

plecti. Hæc Claymond. 7 *ὅθεν κἀποδίδηται*, id est (ut equidem arbitror) substantia ce-  
ræ simili, uel aspectu similis ceræ. 8 *ἐπεὶ δὲ τὰς, ἐπὶ δὲ τὰς* quandoque uocatur, nisi men-  
dosa sunt Aristotelica exemplaria.

De generatione apum.

Cap. CCIII.

**D**E generatione apum uaria sententia est: magnaque inter eruditos & subtilis quæstio fuit: alij enim eas parere & coire negant: (apum enim coitus uisus est nunquam) sed ex floribus quibusdam deportare fortu-  
ram existimant. Sūt qui fucorum quidem forturam comportari è floribus, illis arbitrentur, sed apum generi ortum præstari à ducibus hoc argumēto referunt, quod fucorum fœtus editur etiam sine duce, apum nunquam. Aliqui per coitum agi opinantur, maresque esse fucos, fœminas uero apes esse contendunt: alij contrā, apes mares esse, fucos fœminas opinantur. In tanta rei huiusce ambiguitate, cum non satis adhuc explorata, quæ in earū generatione eueniant, habeamus, rationi interim fides adhibenda est: præfer-  
tū cum quæ afferuntur, conueniant cum iis quæ sensu percipiuntur. Duces uel absque coitu generāt & seipsos & apes: apes deinde fucos procreāt, ipsi uero fuci nihil insuper generant: sed in ternario numero finem genera-  
ratio recipit. Et cum cæteræ in concauis imisque fauorum proueniant, duces subter ad fauum pendentes oriuntur. Fiunt autem schadones optimæ (soboleme dico) cum mellificatur: fœtu posito, apes incubant auium more. Fœtus apum & fucorum, ex quo uermiculi fiunt qui in apes fucosque trās-  
eunt, candidus est: primordium regum colore cernitur fuluo, corpulentia mellis crassioris, magnitudine ilico proxima suæ futuræ soboli: nec primū  
ex eo uermiculus gignitur, sed statim apis, ut aiunt. Vermiculus dum par-  
uus est, iacet in fauo obliquus: post deinde, sua ipse facultate se erigit, ci-  
būque capit, & fauo ita adhæret, ut retineri uideatur. Schadonibus dum membrana inuoluuntur, & pedes & alæ innascuntur: atque sub ea specie, cum scilicet formæ liniamenta receperint, nymphæ appellantur: iam neque cibum præterea capiunt, neque ullum alui reddunt excrementum: sed coer-  
citi & contracti quiescunt, nec ullo pacto se mouēt, usque dum species des-  
tinata perficiatur. Et cum iam ad finem generationis uenerunt, rupta qua cinguntur membrana, euolant. Peragitur autem fœtus intra xlv diem: non apum tantum, sed & crabronū & uespærum fœtus cum iam formæ liniamenta ceperint, eodem modo nymphæ dicuntur. Stercus quandiu sit, uermis emittit: postmodum non nisi perfectæ, (ut modo dixi) prodierint. Nouellæ istæ tertio quam prodierint die, statim negotium incunt, si cibis suppetat. Humido uere melior fœtus, ut sicco mel copiosius.

*Schadon.*

*Rex statim mel-  
lei coloris, in-  
quit Plinius:  
Statim penni-  
ger, Plinius.*

*Nympha.*

*Nympha.*

1 Varia sententia est, &c. Ambiguitatem hanc quæstionemque pluribus uerbis explicat Aristot. lib. 3 de generat. animalium. 2 Sunt qui fucorū, &c. Plinius, Sunt qui apes in torum amissas reparari putent, uentribus bubulis recētibus cum fimo obrutis: Vergilius, iuuenecorum corpore exanimato: sicut equorum uespas atque etabrones, sicut asinorum scarabeos.

De mor-

A De morbis apum, & iis quæ aliàs inimica sunt apibus.

Cap. CCV.

**P**ereunt apes tum aliis casibus, tum uero cum multi principes orti partē quicquē secum quod libuit, abducant: nascuntur aliquando in extremis fauis apes grandiores, quæ cæteras fugant, æstrus uocatur hoc malum, ab eo quod exagitet, neque patiatur examina conquiescere. Quin & morbos superte natura sentiunt: index eorum tristitia torpēs, sicuti hilaritate & nitore fanitas æstimatur, ut modo diximus: agrotant potissimum cum sylua flores æruginosos tulerit, atque etiam temporibus siccis. Aliud morbi genus quasi otium quoddam & ueternitas apum incidit, cum sædo aluci odore.

*Ogstrus.*

*Sanitatis aut morborum in apibus signa explicat Varro luculenter.*

**B** Vitiari fauos aiunt ex aranea, nisi suis fauis iucubent apes & concoquant: quod si ita se cōtinere potuerint, ut incubitu perseuerent, efficietur aranea illis ueluti alimentum: sin minus, pereunt toti faui. Gignuntur in iis quæ uitantur uermiculi, qui mox pennis subnatis euolant. Apibus etiam bestiolæ quædam in alucis innascuntur, quæ fauis officiant: ut uermiculus, quem

*Clerus, ἀλῦκος Pyrausta, ἀπὸ αὐτῆς Hepiulus.*

*Teredines, τεριδίνες.*

**1** alij clerum, alij pyrautam uocant: hic ueluti araneam facit in fauo. Nascuntur hi in pauimento, è quibus crescentibus, uelut aranea aluco toti obducitur, & faui carie pereunt. Obest & alia quædam bestiola similis hepiolo, qui lucernarum luminibus aduolat. Hæc lanuginosum quiddam parit, nec aculeo ab apibus stimulat, sed tantum fumo abigitur. Erucæ quoque nascuntur in alucis teredines dictæ, quas apes non miscētantur. Papilio etiam

*Teredines.*

*Tineæ. Et Vergil. lib. 4. Georg. tineas uocat.*

**C** ignauus, inquit Plinius, & inhonoratus luminibus accēsis aduolans, pestifer: nec uno modo. nam & ipse ceras depascitur, & relinquit excrementa, quibus teredines gignuntur. Et Columella, Papiliones enecentur, inquit, qui plerumque inter aluos morantes, apibus exitio sunt: nam & ceras erodunt, & stercore suo uermes progenerāt, quos aluorum tineas appellamus. Inter caniculæ & arcturi exortum cauendum erit, ne apes intercipientur uiolentia crabronum, qui ante aluearia plerumque obsidiantur prodeuntibus. Cum eximuntur mella, apes abigi fumo utilissimum, ne irascantur, aut ipsæ auidæ uorent.

**1** Quem alij clerum, &c. De clero ita habetur apud Plinium, Est in fauis quibusdam qui uocatur clerus amaræ duritia ceræ, cum factum inde non eduxere morbo aut ignauia, aut infecunditate naturali, hic est abortus apum: iterum, Sunt & operis morbi cum fauos non explent, cleron uocant. Verum aliter utrumque locū legit Clai-mondus ex uetustis exemplaribus consentientibus: in priore loco, clauum: in posteriore, clarum, non clerum.

De melle.

Cap. CCVI.

**E**x floribus ceras fieri prodidere Aristoteles atque Celsus, ex matucino errore mella. Quæ ubi collegere apes, ore euomunt in cellas: & melle, uino alteroue ad summum die cellas replent: omnino ante uergiliarum exortum, mel non fit. Crascescit autem mel, concoctum iam tempore. initio enim ut aqua dilutum est, & primis diebus sine crassitudine cernitur, & feruet ut mustum seque purgat: quod si exemptum eo tempore sit, crassit

*Mel, μέλι.*

dine caret: tum uicesimo maxime die spissatur, mox obducitur tenui mem-  
brana, quæ feruoris ipsius spuma concrescit. Indicium perfectionis in sa-  
pore potissimum est, dulcius enim quod crassius. Porro inuenitur in plan-  
tarum foliis floribusque, quod neque succus eorum, neque fructus, neque  
pars, sed eiusdem sit naturæ cum rore. Non tamē assidue hoc nec copiose,  
ut ille, prouenit: sed maxime syderum ortu, præcipueque in ipso syrio ex-  
plendescente fit: nec omnino prius uergiliarum exortu (ut diximus) sublu-  
canis temporibus. Itaque tum prima aurora, folia arborum melle rosca  
inueniuntur: ac si qui matutino sub diuo fuere, unctas liquore uestes, capil-  
lūmque concretum sentiunt. E fronde ac pabulis potus hic liquor, & in u-  
terculos congestus apum: (ore enim uomunt, ut diximus) ad hæc succo flo-  
rum corruptus, & alueis maceratus, totiesque mutatus, magnam tamen cæ-  
lestis naturæ uoluptatem affert. De apibus, inquit Seneca, non satis con-  
stat, utrum succum ex floribus ducant, qui protinus mel sit: an quæ colle-  
gerunt in hunc saporem mixtura quadā & proprietate spiritus sui mutant.  
ut quibusdam enim placet, non faciendi mellis scientia illis est, sed colligē-  
di. Hoc uero nobis constat, materiam ex qua mel gignitur, eiusdem cum ro-  
re generis esse: uidetur autem ex plantis ē quibus colligitur, non nihil ad e-  
ius probitatem uitiumue accedere: tātō quoque meliorē qualitatem cape-  
re mel, quanto iucundior sit materia cera confecta. In quodam Ponti tra-  
ctu, & in Sardinia, ubi ex absinthio apes mel colligunt, amarum gignitur.  
Tantumque pabulum refert, ut quibusdam in locis mella quoque uenena-  
ta fiant. Heracleæ in Ponto, quibusdam annis, perniciosissima existūt: nec  
dixere authores ē quibus floribus ea fierent. Nos trademus, inquit Plinius,  
quæ comperimus. Herba est ab exitio & iumentorum quidem, sed præci-  
pue caprarum appellata Ægolethron: huius flores concipiunt noxium ui-  
rus aquoso uere marcescentes: ita fit, ut non omnibus annis sentiatu hoc  
malum. Aliud genus in eodem Ponto, gente Samnorum mellis, quod ab  
insania quam gignit mænomenon uocant: id existimatur contrahi flore  
rhododendri, quo scatent syluæ. Et in Perside, & in Mauritanix Cæsarien-  
sis Getulia, contermina Massesulis uenenati faui gignuntur. Præstantissi-  
mum gignitur mel, ubi thymi copia est, aliarumque cum herbarum tū fru-  
ticum, quæ natura calida siccaque constant. Quod ex huiusce generis colli-  
gitur plantis, tenuioribus partibus constat: quo fit, ut & facile in bilem uer-  
tatur, in calidis saltem corporibus, & acrimoniæ quiddam in se habeat, quæ  
aluum citet. Summa quidem bonitatis, natione constat: optimum hybleum  
ex Sicilia, Thasium aut certe Atticum: mox quod ē Cycladibus affertur &  
Isthmo. Mel quoque & in aliis regionibus optimum conficitur: sed quod,  
cum ab incolis ob eius exiguitatem absumatur totum, in alia loca non per-  
fertur: eoque fit, ut minus celebre scriptoribus habeatur. In quocunque ta-  
men tractu terna sunt mellis genera: uernum, ex floribus constructo fauo,  
quod ideo uocatur anthinum. Alterum genus est mellis æstiuū, quod ideo  
uocatur horæum à tempestiuitate præcipua ipso syrio explendescente, post  
solstitium diebus triginta fere: nam ab exortu syderis cuiuscunque, sed no-  
bilibium

*Mænomenon  
mel.*

*Mel anthinū.*

*Horæum mel.*

**A**bilium maxime, aut cælestis arcus si nō sequantur imbres, sed ros tepescat solis radiis, medicamenta non mella gignuntur, oculis, ulceribus, internis- que uisceribus, dona cælestia. Quod si seruetur hoc syrio oriente, casūque congruat in eundem diem, (ut sēpe) Veneris aut Iouis Mercuriūve exortus: non alia suauitas uis- que mortalium malis à morte uocandis, quàm diuini nectaris fiat. Tertium genus mellis minime probatum, syluestre, quod ericeum uocant: conuehitur post primos autumnii imbres, cum erica sola floret in syluis, ob id arenoso simile. Gignitur id maxime arcturi exortu, à pridie idus Sepembris. Hæc Plinius. Varro quoque, Eximendorum, inquit, fauorum primum tempus esse putant, uergiliarum exortum. Secundum æstate exacta antequam totus exoriat arcturus. Tertium post uergiliarum occasum. Præstantissimum, ut ait Dioscorides, uernum, dein-

*Mel syluestre.*  
*Mel ericeum.*

**B**e æstiuum. hybernū uero deterrimum est: ut quod iusto crassius est. Aristoteles uero mellis cōficiendi duo tempora prodit, uer atque autumnū.

**3** Sed uernum, inquit, suauius, candidius & omnino præstantius autumnali est. Rufum deformius faui uicio redditur: quippe quod perinde ut uinum à uase uicietur: probatur mel, cui est color aureus. Quod autem albicat, nō syncro thymo confectum est: sed id oculis atque ulceribus cōmodius applicatur. Mellis natura, inquit Galenus, acrimoniam dulcedini cōiunctam habet: ut præstātissimum id iudicetur, quod notis hisce duabus insigne sit. Colligitur enim & mel tum ex plantis aliis, tum etiam ex Cytiso, quod dulcedine uel cum Atrico certet, aut etiam superet, acrimonia tamen careat, statimque gustātes auertat: atque si paulo liberalius capiatur, nauseam cō-

**C**citet: præcipua igitur bonitatis argumenta hinc sumuntur. Sequēs probatio à colore, substantia & odore. Quod enim colore fuluo est, & odore suauis, tum purum adeo ut totum pelluceat, ac gustanti subacre, tum substantia nec plane crassa nec liquida: præterea tam sibi cohærens, ut si digito attollatur, continuum sibi nec intercisum ad humum defluat longissima quasi linea sibi continuatum, id omnium est optimum. Si uero abrumpitur, nec demissum ad terram usque continuitatē seruat, id crassius iusto est, aut tenuius, aut partes habet non usquequaque similes: deprehendas autem id si diligentius inspicias, aut crassitudines aut humiditates habere innatanteis, quæ nec inter se sint similes, nec etiam toti. Itaque ad ceræ naturā propius

*Mellis optimi*  
*nora.*

**D**accedit mel quod & crassius est, & cui tales quædam partes innatant crassiores. Excrementosum uero ac perfici concoquique difficilius, tum quod totum humidum est, tum in quo multæ in partibus sparæ apparēt humoris guttæ. Porro in quo uel ceræ qualitas uel propolis, uel id genus alia gustu deprehēditur, adeo non est optimum, ut etiam malum sit. Quippe nullam penitus alterius cuiusquam rei insignem in se continere qualitatē debet. Quocirca quod thymum plane redolet, non probō, inquit Galenus: quanquam non ignoro à quibusdam id laudari: eoque fieri ut nonnulli uēditores incisa thyma post illi iniiciant, quo id redoleat, uideaturq; optimū. Ipse tamen quod tam improbe thymum olet, non laudo: multoque minus si iniectum thymum sit: quod tamen exiguam quandam qualitatem odo-

re gustuue præfert, id nō uitupero. Malum item mel iudicatur, quod inter E  
coquendum multam egerit spumam: quo etiā diutius coqui debet: opti-  
mum uero, ut breuissimo tempore coquitur, ita minimū spumæ euomit.  
Non omnibus similiter hominibus, æqualis ex melle gignitur bilis copia:  
siquidem qui iam in flore sunt, potissimū si calidiore natura sint, ac uitam  
degant laboriosam, in iis totum mel uertitur in flauam bilem: senibus uero  
& quibuscunque pituitosam naturam habentibus, admodum est accom-  
modum: utpote quibus non in bilem, sed in sanguinem conuertatur. Postu-  
lat nāque quò in sanguinis naturam mutetur, naturam hominis frigidam,  
ætatemque frigidam: sicuti in iis qui calida natura sunt, & ætate florētibus  
prompte in bilem uertitur: nō ab re igitur censuit Hippocrates mel bilio-  
sis naturis non esse ex usu, ut pote qui calidiore sint temperie. Ad eundem F  
modum morbis quoque quos amara excitauit bilis, mel inimicum esse, nō  
solum Hippocrates, sed etiam omnes medici affirmant: sicuti & iis qui ex  
pituita nascuntur amicum: unòque uerbo, calidis quidem corporibus, siue  
ea naturæ ratione, siue morbi, siue ætatis, siue temporis anni, siue regionis,  
siue conditionis uitæ talia sint, bili generandæ causam præbere. Abstinen-  
dum itaque quoad fieri potest in hæcticis febribus à melle est (atque idcir-  
co etiam à mulla) quippe protinus uertitur in bilem, & sicciore acriorisq;  
caloris febres reddit. Aliàs uero, ubi uenter siccus frigidusque sit, dandum  
uberius unā cum lacte mel est, sed detracta prius spuma, quo & minus sit

*Mel despumatum.*

excrementosum, & magis nutriat. Quinetiam mel ipsum despumatū per-  
coctū uel per se, optimum nutrimentū frigido uentriculo est, ita ut calido G  
aduersissimum: adeo ut nihil frigido corpori melle potius expectere, neque  
ad calidum magis respicere oporteat. Ergo plurimum huic affectui, ventri-  
culo inquam frigido, pro nutrimento mel optimum est: sed quod prius su-

*Quomodo coqui debeat mel docet Galenus lib. 4. de sanitate tuenda.*

per prunas ex quercu uite uel ad summum candētes, aut ligna omnino ari-  
da (quæ etiam acapua Græci uocant) fuerit decoctum, & accurate despu-  
matum: quod ipsum tamen (quod omnium dulcissimum est) si plurimum  
percoquere uelis, ex dulcissimo reddideris amarissimum: coctione nanque  
amarelcit mel, sicuti & uetustate: nā inueteratum mel amarius redditur.  
Proinde quod bimum est uetustiori præfertur, sicuti & recētiori. Exsiccat  
mel calfacitque secundo ordine: insignem habet abstergendi uim, aluum  
ciet, ora uenarum aperit, in sordida ulcera sinūsque utiliter infunditur. Co H  
ctum minus acre mordāxque efficitur: minus aluum mouet, carnem glu-  
tinat. Et mellis præterea natura talis est, ut putrescere corpora nō sinat: fau-  
cibus, tonsillis, anginis, omnibusque oris desiderijs, collutū gargarizatū uel  
utilissimum. Iam uero peripneumonicis, pleureticis, decoctum: auxilia-  
tur tussi, urinam ciet, à serpente percussis medetur: & contra uenena fungo-  
rum, & rabiosi canis morsus linctum aut potum proficit. Crudum tamen  
aluum inflat, tussim lacescit, fastidium creat: quamobrem despumati usus  
aprior est. Mel auribus instillatum, cum rosaceo, ut inquit Plinius, ut uero  
Dioscorides cum fossili sale trito, aurium sonitui & dolori prodest. Lendes  
& fœda capitis animalia necat: & oculis per se inutile aliqui arbitrantur:  
rursus



A rursus quidā angulos exulceratos melle tangi suadent. Diximus mellis uenēnati genera: contra quod utuntur melle in quo apes sint inortuæ. Idē potum in uino remedio est uitiorū, quæ cibo piscium gignuntur. Mel item utilissimum oculis & auribus, in quo sunt apes mortuæ. Est in iis quæ circa Hircaniam sunt regionibus bestiola quædam uolucris (anthredonē appellant) ape paulo minor, cætera multum similis, quæ in montanis plurimum uiçitat, floribusque omnis generis alitur. In cauis autem saxi, aut arborū latebris fauos sibi construit, succūque nobilissimum ibi cogit: qui dulcedine melli nostro haud multum cedat.

*Anthredon.*

1 Aliarūque tum herbarum tum fruticum, &c. Quæ herbæ, qui frutices, quæq; arbores in apiariis cōscrendæ sint, ut mel fiat quam probatissimum, docēt rei rusticæ scriptores, ac in primis Palladius. 2 Optimum hybleū, &c. Plinius: Atticæ regionis hic, & Siculæ, Hymetto, & Hybla ab locis, mox Calydnæ. Mel corsicū, inquit Plinius, asperitimum habetur. 3 Aliiter lib. 5 histor. animalium habetur: melius mel autumnale est, nisi forte mendosa sint exemplaria.

De cera & propoli.

Cap. CCVII.

Mellis naturæ adnexa cera est. Fit expressis fauis, sed ante purificatis aqua. Omnis cera mollit, calfacit, modicēque explet corpora, recens melior. Vt uero Galenus docet, mediam habet temperaturā calfaciētium, refrigerantium, humectantium & exsicantium: estque aliorū medicaminum calidorum frigidorumque ucluti materia: crassiorum est pattium, atque emplastica, forisque imposita concoquendi uim habet exiguā quandam atque imbecillē & calidam. Et ut Paulus tradit, uim habet abstergendī. Datur in sorbitione dysentericis: fauique ipsi in pulte alicæ prius tostæ. Aduersatur lactis naturæ: ac milij magnitudine x. grana ceta hausta lac in nutribus non patiuntur coagulari, uti tradit Dioscorides: ut uero Plinius, non patiuntur coagulari lac in stomacho. Cera optima (Dioscoridi) est subfulua, subpinguis, odorata, & halitum quendam melleum referens & puri natione Pōtica aut Cretica. Secunda bonitas cādida, & quæ sua natura pinguis est. Hæc Dioscorides. Plinio uero authore, optima est quæ punica uocatur, & medicinis utilissima: proxima quæ fulua, odorifque mellei pura, nationēque Pontica: deinde Cretica (plurimū enim ex propoli habet) post has Corsica: quoniam ex buxo fit, & habere aliquantum uim medicaminis putatur. Nigrescit cera addito chartarum cinere: sicut anchusa admixta rubet: uariōsque in colores pigmentis trahitur, ad reddendas similitudines & innumeros mortalium usus. De propoli diximus in natura apum: calfacit secundo ordine, aut inchoante tertio, leuiter abstergit, euocat aculeos, & omnia infixā corpori extrahit. In ueteri tussi suffita iuuat, liehenas admota tollit, dura concoquit, dolores neruorum mulcet, ulcerāque desperatā cicatrice includit. Deligenda propolis, uti modo diximus, flaua, odorata, styracem referens, & in uehementi ariditate mollis ac quæ mastiches in morem ductilis sit.

*Cera, κηρός. Quomodo fiat ex fauis cera, docet Plinius lib. 21.*

*Propolis.*

1 Candida, ὀκλίνες. Cera candida quomodo fieri debeat, docet Dioscorides: & quomodo Pontica, Plinius.

De uespis, crabronibus &amp; tenthredone. Cap. CCVIII. E

*Vespa, σπύς.  
Crabrones.  
Αρ, Σπύρας.*

**C**ognatorum apibus animalium, ut uesparū crabronūque, quod ad generationem pertinet, similis quodāmodo ratio est: generatione uero coeundo inter se funguntur matrices: uisus est enim sæpe eorum coitus. Crabrones & uespæ si duce amisso aberrauerint, fauos suæ proli constituūt, crabrones in sublimi, uespæ in cauernis: sed si habeāt ducē, sub terra nidificant. Cellis saxangulis fauos extruunt omnes, ut apes: nō ex cera, sed ex materia corticea quadā & areneosa, longe tamen magis politus fauos crabronum quam uesparum est. Non in omnibus cellis simul inest & æquabilis fœtus, sed inæqualis & barbarus (inquit Plinius) & in aliis iam grandiusculus, ut uel queat uolare, aliis in nympha est, aliis adhuc in uermiculo. Excrementum uermiculis tantum, ut & in apum genere est: & manet fœtus im-

*Vespa, σπύς.  
Vespa fera.*

mobilis cum in nympha est, & mēbrana uelatur: apes unicolores sunt magis quā crabrones & uespæ. Porro uesparum duo sunt genera, alterum ferum, alterum placidius. Ferum illud genus rarū est, nascens in montibus, & pariens non sub terra, sed in quercu, grādus, porrectius, nigrius, uarium etiā aculeatūque est: aculeo enim maiore quā ex portione sui corporis spiculatur. Viuit hoc genus toto anno: & quidē tēpore hyberno, quercu cēsa euolare spectatur. Exigit hyemem in latebra, & semper in materie arboribus uersatur. Sunt eius aliæ matrices, aliæ operariæ, ut & in altero genere quod placidius est. Sunt enim huius quoque duo genera: alterum duces, quas matrices appellant, alterum operariæ, maiores mitioresque: duces sunt.

*Vespa mitior.*

Ætas operariarum annum non cōplet, sed omnes hyeme inualecente moriuntur: quod ea re constat, quia hyeme incipiente stupeſcāt: bruma autem nullæ omnino appareāt: duces uero qui matrices uocantur, tota hyeme uisuntur, atque sub terra latitant. Plerique enim cum per hyemem ararēt aut foderent, matrices uiderunt, operarias nemo. Est autem matrix latior, ponderosior, crassior & maior quā uespa: uolatūque haud plurimum ualet: præ pondere enim sui corporis, uolare longius nequit: quo fit, ut semper in uesparijs sedeant effingentes fauos, & munere fungentes cellatio. Insunt porro matrices nuncupatæ in uesparijs plurimis: sed aculeatæ sint, necne ambigitur. Videntur tamen & ipsæ, ut apum duces, gerere quidē aculeum, sed non extringere aut ferire. Vesparum autem aliæ carent aculeo, ut fuci, aliæ habent: minores imbecillioresque sunt quæ carent, neque se uindictæ repugnānt. Contrā, quæ habent maiores, robustæ atque pugnaces, quas nonnulli mares appellant: fœminas uero eas quæ carēt. Pleraque ex iis quæ aculeum gerunt, amittere cum putantur hyeme instante: sed nobis hætenus uidere non contigit. Si uespam ex pedibus cōperis, bombilareque si ueris, aduolant quæ aculeo carent: quod non faciunt quæ aculeatæ sunt. Itaque argumento quidam hoc utuntur, ut alteræ mares sint, alteræ fœminæ. Et ferarum nonnullæ coire uisæ sunt: & alteram gerere aculeum cōstitit: sed de altera incertum est. Et ex cæteris quoque coire nonnullæ uisæ sunt: sed an ambæ aculeo careant, an habeant: uel altera habeat, altera careat, nondum exploratum est. Sed fœtus tamen non partu provenire uidetur:

*Matrix, uel  
dux uesparum.**Fuci uesparū.*

FI

- A detur: statim enim auctior quàm partus uespæ patiatur, existit. Vespæ temporibus siccis, locisque asperis potius oriuntur: ortus sub terra agitur, uti diximus. Est autem ortus uespæ talis. Duces ubi locum sibi sub terra oportunum delegerunt, fauos ineunte æstate confingunt: & uespæ siue cel  
 6 lulas paruas (*σπουδαῖος* uocant Græci) constituunt quaternis foriculis aut prope, in quibus uespæ, non matrices nascuntur: quæ cum increuerint, rursus altera ampliora effingunt: quorum item proles cum creuerit, alia faciunt: ita ut postremo autumno plurima amplissimæque uespæ condita habeantur: in quibus dux, quæ matrix uocata est, non insuper uespas, sed matrices iam procreat, quæ quidem superne per summa uespæ uermiū specie multo grandiorum gignuntur in cellulis cōtinuatis quatuor numero, aut pau  
 7 lo pluribus: alioqui increscendi ratio ducibus, eadem quæ uespis est. Cæterum utrū duces anni superioris, nouellis iam procreatis ducibus, intereant unā cum uespis nouellis, idque simili modo semper eueniat, an amplius etiam temporis possint uiuere, nondum exploratum est. Fingunt suos fauos ex congerie terræque incipientes ab uno scilicet primordio, quasi ab radice unumquenque fauum conficiunt. Cibum autem & ex floribus quibusdam & ex fructibus petunt, sed quamplurimum ex carne: uespæ serpentes auide uescuntur, inquit Plinius, quo alimēto mortiferos ictus faciunt. Matrices æstate procedente apud ulmos colligunt lentam quandam & gummosam materiam. Sunt uespæ quædam ichneumones nūcupatæ, quæ minores quàm cæteræ sunt: phalangia uenantur & perimunt, (unum genus araneorum hoc est) & in nidos suos ferunt in parietinas aut aliquid tale foramine peruium: deinde illinunt luto, atque ex iis incubando suū genus procreant. Talis uespæ ratio est. Crabrones quoque magis uario colore sunt, quàm apes. Cum in genere apum careant aculeo & fuci & reges, atque etiam uespæ nonnullæ inaculeatæ sint, ut ante dixi, crabrones omnes aculeo armantur: sed de eorum duce considerandum accuratius est, an aculeum habeat: ducēs enim more apum uespæque crabrones habent, qui proportionem ad crabrones, maiores quàm uespæ ad uespas, & apum ad apes sunt. Degunt hi quoque intus, ut uespæ duces: sed duces non plures uno in singulis eorum alueariis oriuntur. Faciunt sibi alueum sub terra crabrones, terra egesta formicarum more: examinis enim emissio, ut apū, nulla eorum aut uespæ fieri solet: sed qui subinde oriuntur nouelli, ibidem manent: & alueum terra egesta, faciunt ampliorem. Amplificant maiorem in modum fauos, & iam ex ualentiori quodam examine qualli tres aut quatuor fauorum pleni excepti sunt. In cellis crabronum paululū mellis, quantum gutta è regione proli paratur. Sed si qui crabrones suo alueo aberrarint, colligunt se in aliquam arborem, fauosque ibi conficiunt in sublimi, qui uel sæpe conspicui apparent, in quibus unum procreant ducem: qui  
 8 cum adoleuerit, agmen abducit, & secum in alueo collocat. Crabronū syluestres, inquit Plinius, in arborum cauernis degunt: hyeme ut cætera insecta conduntur. Vita bimatium non trāsfit, ictus eorum haud temere sine febre est: authores sunt ter nouenis punctis interfici hominem. De coitu cra

*Vespæ,  
Σπουδαῖος.*

*Ex φαρμάκων  
καὶ γὰρ.*

*Alias, serpente.  
Matrices.*

*Ichneumo uespæ.*

*Crabro.  
Αὐτοὶ σπιν.*

# DE DIFFERENTIIS

brorum, nihil adhuc exploratum habeo, nec unde fortificet. Generationis E  
uero ratio quodammodo similis atque in apibus est, ut modo diximus. Ci  
bum crabrones non ex floribus colligunt, ut apes, sed carne magna ex par  
te uiuunt: unde fit, ut uersari uel in stercore sæpe soleant. Venantur etiam  
muscas maiusculas, quas ubi cœperint, abscisso capite, reliquum corpus ge  
stantes auolant: sed pomum etiam dulce appetunt. Et inter caniculæ & ar  
cturi exortum crabrones ante alucaria plerumque apibus obsidiantur pro  
deuntibus. Nec uero cibum ritu apum sibi recondunt: sed ieiuni latent per  
hyemem, quo tempore plurimi moriuntur: an etiam omnes, nondum cer  
tum est. Tenthredo non ab similibus crabronibus est, sed uaria, & latitudine  
similis apibus: gregalis est. Cupediosa hæc est, & ad culinam & pisces, & hu  
iusmodi delicias, singularis hæc aduolat. fortum sub terra edit, ut uespæ, in  
faus. amplum huius quoque tenthredenarium est, & lōge amplius quàm  
uespæ atque porrectius. Et hæc quidem gregalia sunt.

Plinius hæc,  
non crabroni  
bus sed uespis  
attribuit.

Tenthredo,  
παραπύρις.

1 Plinius ita habet, Vespæ in sublimi è luto nidos faciūt, & in iis ceras: crabrones  
in cauernis ac sub terra, rursus forte codices sunt mendosi, uel Pliny uel Aristot., ut infra  
uideas, in crabronibus. 2 Vespæ, inquit Varro, uocatur quæ similitudinem habet  
apis, neque socia est operi, & nocere solet morfu, quam apes à se secerunt, secundum  
genus apum forsitan intellexit. 3 Pseudosphecen uocant, inquit Plinius, uespam  
quæ singularis uolitat. 4 παραπύρις, hinc ab Aristotele, ni fallor, dicta est, id est  
uespæ annua. 5 Duces. Nec uesparum nec crabronum generi reges sunt, inquit Pli  
nius. 6 Ineunte ætate, ἡδύτης τῶ κέρου, Theodorus opere æstiuo dixit. 7 οὐρανὸν  
πύριον ἡδύτης τῶ κέρου, id est quaternis foriculis fere. 8 Crabronum syluestres,  
&c. Idem fortasse cū iis quos Aristoteles sub aluco aberrasse scripsit. 9 Tenthre  
do, &c. Teredo, perit Theodorus, παραπύρις ἀλγὴν dixit Nicæder in theriac. Hermo  
laus arthredonas uel anthredonas potius uocari censet, non παραπύρις, quemadmo  
dum corrupte legi dicit apud Aristotelem. De anthredone supra diximus, sed an idem  
sit cum tenthredone nondum constat.

Pseudosphece.  
παραπύρις  
Vespæ annua.

παραπύρις.  
Teredo.

Arthredo, uel  
Anthredo.

De sirene, bombylio, & bombycio.

Cap. CCIX.

Sirene, σιρῆναι.

Bombylius.

Βομβύλιος.

Apud ipsam  
terram, ὡς ἔ  
γινετο, non super  
ipsam terram.

Bombyx.

Βόμβυξ.

Βόμβυξ. Plin.

Βομβύλιος.

Ex eorum autem genere quæ fauos sibi faciūt, est sirenis uterque: minor,  
qui fuscus totus est: & maior, niger & uarius: uerum minime gregales  
sunt, sed solitarij. Minime gregalis & bombylius est ut apis & uespæ, sed so  
litarius ut sirenis uterque: uerum inter hæc, maximus hic est. Sub faxis a  
pud ipsam terram fortificant. Bombylij binis aut paulo pluribus cellulis: H  
mellis etiam prauis cuiusdam inchoatio in his reperitur. Bombycem uocat  
Nicander, aculeo ferit ut uespæ, & corpore nigro est. Aliud inter hæc genus  
est bombycum, in Assyria proueniens magis quàm supradicta. Nonnullæ  
ex bombycum genere (Βομβύκη uocat Aristoteles) nidos in acutum exeun  
tes è luto fingunt, salis specie applicatos lapidi, aut alicui tali, tam crassos du  
rosque ut spiculis perforari uix possint. Pariunt in his & uermiculos produ  
cunt candidos membrana obuolutos nigra: eorumque à membrana, cerā  
in luto faciunt, quæ multo pallidior sit, quàm cera apum. Ita Aristoteles.  
In iis nidis, inquit Plinius, & ceras largius quàm apes faciunt: deinde ma  
iorem uermiculum.

A 1 Gregalis & bombylius, &c. Theodorus bobyccen vocat. 2 *Βομβη* αὐτῶν: quod *Bombyx*. Plinius, falis specie, dixit Theodorus, quasi uiterq; illitos reddidit: *ἀποτρίπτει*. 3 Pariunt in his & uermiculos producūt, &c. Et alia horū origo, inquit Plinius, ē grandiore uermiculo gemina protēdens sui generis cornua erua fit: deinde quod uocatur bōbylis (uel bōbylius) ex ea necydalus, & hoc in sex mensibus. Bombyces telas araneorū modo texunt, ad uctem luxūmq; fœminarum, quæ bombycina appellatur. Hæc Plinius ex Aristotele fere: sed mea certe sententia, bombycem hoc genus, quorum aliam esse originem à priore, dicit Plinius, non ex hoc genere uolucrum insectorum est, quæ fauos sibi faciant: sed ex erucarum potius genere, (de quibus infra dicemus) uel saltem *χρυσῆς*, quæ ex erucis sunt.

*Bombylius*  
*Bombylius*  
*Necydalus*

## De formicis &amp; scorpionibus.

## Cap. CCX.

Vere & formicæ, ut apes, laborem communicant: Et sepeliuntur inter  
B se uiuentium solæ præter hominem. Et ciuile animal formica est: nulli tamen imperio subditum. Dentes habent formicæ, & aculeum gerunt, non in ore, sed parte posteriore. Formicarum negotia omnibus in pròptu habentur: ut quæ eadem semita semper ambulant, & cibaria recondunt uel in annum, & cellas promptuarias faciunt, nec interdiu solum, sed etiam noctibus plena luna laborem exercent, interlunio quiescunt, nemo est qui nō uideat. Gerunt onera morfu: maiora auersæ postremis pedibus moliuntur, humeris obnixæ. Silices itinere earū attritos uidemus, & in opere semitam factam: segniter & contra industriam suam formicæ absconditæ, uel concursantes, aut oua progerentes pluuiam præfagiunt. coeunt formicæ atque  
C ex animalibus sui generis oriuntur: coeunt autem hyberno tempore. Vermiculum pariunt nulli annexum, qui accrescens ex minutulo & rotundo, longiusculus fit, formamque accipit debitam. ortus eorum ueruo tempore agitur. Formicæ origani sulphurisque puluisculo insperfo relinquunt cauernas, aliòque migrant. Et contra formicas non minimum horrorem exitium si non sint rigui, remedium monstratur limo marino aut cinere obturatis earum foraminibus: sed efficacissime heliotropio herba necantur. Quidam & aquam diluto latere crudo inimicam eis putant. Est autem formicarum pars pennata, pars uero impennis. Non sunt in Sicilia pennatæ, inquit Plinius: Aristoteles uero, in Sicilia non  
1 sunt hippomyrmeces. Inuenio & formicas herculaneas appellatas: quibus *Ἡερκουλαικῆς*. tritis adiecto sale exiguo, plora, lepra, & lentigo sanentur. Formicæ quin-  
D que potæ contra omnium phalangiorum morsus auxiliantur. Utuntur & per se ouis fornicarum ad aurium grauitatem: nanque & huic animali est medicina: constatque urso ægros hoc cibo sanari. Ne sint malæ hirsutæ, formicarum oua pueris infricata præstant. Est formicarum genus uenenum, non eas nouere in Italia: Solifugas Cicero appellat, salpugas betica. A-  
2 nimal est perexiguū (ut Solinus refert) aranci specie, in Sardinia, in metal-  
3 lis argentariis plurima: oculum reptat, & per imprudentiam supersedentibus, pestem facit: solifuga dicta quòd diem fugiat. Sardinia est quidē absque serpentibus: sed quod aliis locis serpens est, hoc solifuga sardois agris. Telephus Cretensis mortiferum genus quoddam formicarum esse dicit, quæ lætæ nuncupantur: eodem nomine uespas quasdam appellarunt. Le-  
Laeta.

*Formica*  
*Μύρμηξ*

*Ἡερκουλαικῆς*  
*Herculanea*  
*formica*

*Solfuga*  
*Salpuga*

*Solifugae in le-*  
*guminibus.*

*κρίψ, uel*  
*σκήψ.*

*κνίπλος.*  
*σκηπλος.*

*Serphus,*  
*ἰβήφου.*

*Scorpius.*  
*Σκέρπιος.*

*Scorpius ter-*  
*restis.*

*Σκέρπιος χθρ*  
*σταύου.*

*Scorpionum*  
*genera.*

*Livido pallidó*  
*ne ἱμπίλον.*

*Melichloron.*

guminibus innascuntur bestiolæ uenenaæ, quæ manus pungūt, & pericu- E.  
lum uitæ afferunt, solifugarum generis. Aduersus has omnia eadē meden-  
tur, quæ contra araneos & phalangia demonstrantur. Formicarū paruārum 4  
generis sunt quæ κρίψις aut σκήψις uocantur. Mel appetunt ut apes, quod uel  
ē longinquo olfaciunt. Galenus nō formicas, sed uermiculos σκήψις uocat,  
qui uitibus ineunte uere innascuntur, cum germinare uites incipiunt: ea-  
rūque germina (quos oculos uocant) depascuntur: quamobrem agricola-  
rū, ut hos interimant, oculorum radices inungunt ampelide uocata ter-  
ra. A cnipe senipæue auicula quædam κνίπλος aut σκηπλος dicitur. Ser-  
phum quoque uocat animalculum formicæ speciei, quo & uescuntur auic-  
ulæ. Aculeum habent apes uespæque intus conditū: at scorpius extra pro- F  
mincentem gerit: & in cauda unus inter insecta longo armatur aculeo: is  
chelas habet, id est brachia bisulcis dentata forcipibus. Sæper cauda in ictu  
est, nullōque momento meditari cessat, nequādo desit occasione: ferit obli-  
quo ictu & inflexu. Aculeus illi perforatus est, qua uenenū effunditur: quod  
si forte hominis salua imbuatur, hebetescit redditūque inualidū. Venenū  
ab iis candidum fundi, Appollodorus author est, in nouem genera descri-  
ptis per colores maxime superuacuos. quoniam nō est scire quos minime  
exitiales prædixerit: Geminos quibusdā aculeos esse, marēsque sæuissimos:  
intelligi autem gracilitate & lōgitudine. Maculas item habet scorpio mas  
in uentre chelisque & aculeo. Mas uenenū habet infestius: fœmina mitius. 6  
Nicander octo describit genera: Primum albicat, & minime est letale. Se- G  
cundum ore rufescente: ex cuius ictu uehemens sequitur ardor & fitis in-  
tollebilis. Tertium nigrescit: cuius ictus inconstantem efficit mēbrorum  
motum, & risum uanum inducit, qualis solet esse stultorum. Quartum co-  
lore est ad uiride inclinante. Hic simul ac quempiam percusserit, frigus at-  
que horror inuadunt, adeo ut uel in calidissimo tempore, grandine se obrui  
percutsus existimet. Plura habet hoc genus caudæ internodia, septena scili-  
cet. Quintum livido pallidōue colore est, amplo uentre distentoque: herba  
nāq; uescitur & inexplēbilis est: qui ab hoc percussus fuerit, illi bubo intu-  
mescit. Sextum marino cancro litorali simile est: septimum paguro: chelas  
quoq; habet grādiore, ut pagurus, gignitūq; hoc genus ex paguris, in sic-  
co cauernā aliquā ingressis: quibus in locis si forte moriantur, gignūt in-  
de huius generis scorpiones: uel ut elegātissime de hac recinit Ouidius, H

Concaua litoræ si demas brachia cancro,

Cætera supponas terræ: de parte sepulta

Scorpius exibat, caudæque minabitur unca.

Octauum genus melichloron est, à colore melleo dictum: summæ caudæ  
nodus in hoc genere niger est: alas habet locustæ similes, obliquus huic in-  
cessus: hominibus infestissimum est. Constat, inquit Plinius, eos quibus se-  
ptena caudæ internodia, sæuiores esse: pluribus enim sena sunt. Venænum  
omnibus medio die, cum incandueret solis ardoribus: itēque cum sitiunt,  
inexplēbiles potu. Pestis importuna, & quæ graui supplicio, læta per triduū  
morte cōficit: uirginibus lætali semper ictu, & fœminis fere in totum: uiris

autem



**A**utem in matutino exeuntes cauis, priusquam aliquo fortuito ictu egerant venenum. Proprium scorpionum, quod manus palmam non feriunt, nec nisi pilos attingere. Scorpiones in totum nulli animalium nocere putant, quibus non sit sanguis. Vermiculos ouorum specie pariunt & incubant: mox ut prolem perfecterunt, pelluntur ab ea ipsa, sicut & araneis accidit, & interimuntur à suis liberis, magno quidem numero. Sapius enim undenos pariunt. Quidam & ab ipsis scetum deuorari arbitrantur: unum modo relinqui solertissimum, & qui se ipsius matris clunibus inponendo, tutus & à cauda & à morsu, loco fiat. Hunc esse reliquorum ultorē, qui postremo genitores conficiat superne. Hoc malum Africæ uolucres etiam Austri faciūt, pandentibus brachia ut remigia subleuantes. Apollodorus plane quibusdā inesse pennas tradit: quod & Nicandrum confirmare modo diximus. Et Paulus **B** sanias quoque refert nonnullis in locis scorpiones alas habere, quales sunt locustis. In India apud Prasios, pennatos, magnitudine insignes, prodidit Megasthenes. In Africa quoque & pennati sunt, & alij impēnes, septenis in cauda internodiis. Sæpe Pysylli in Italiam hos quoque importare conati sunt: sed uiuere intra Siculi cæli regiones non potuerunt: uisuntur tamen aliquādo in Italia, sed innocui, multisque aliis in locis, ut circa Pharum in Ægypto. Terra uiuunt scorpiones: in Altemio Cariæ monte Aristoteles tradit à scorpionibus hospites non lēdi, indigenas interimī. Scorpionibus cōtrarius maxime inuicem stellio traditur, ut uisu quoque pauorē iis afferat: & scorpionitrus stellionum ueneno aduersatur: scorpionem tritum & impositū, suæ plagæ mederi tradunt. Ad eadem quoque estur assatur: aut bibitur in meri **C** cyathis duobus. Conuenire etiam aiunt iis quos uipera momorderit: & homini ictō à scorpione, putatur esse remedio ipsorum cinis potus in uino, aut oleo merfus. Cinerem scorpionum in pane sumi iubent ad calculos pellen- dos: uel si quis cum locusta edit.

*An scorpiones pennatos intellexerit hoc in loco Plinius, an impennes?*

1 *ἰππομόγμυκας*, id est, formicæ quæ equites appellātur. Theodorus. 2 Nouere in Italia, &c. Aliās, non fere in Italia. 3 Solifugas, &c. Aliās, solipugas. Solifuga dicta, quodd diem fugiat. Solinus. Salpygam uocat Lucanus. Solpugam Plinius: eādem opinor, intelligit. 4 *Quæ xrispæ aut onisipæ*, &c. Culices muliones uocat hos Theodorus, & nonnunquam culices. 5 Vnus inter insecta, &c. Plinius: Insectorū solus scorpio brachia habet, & in cauda spiculum. 6 Sunt qui duo prima genera unum faciant: ut sit unum genus quod colore sit candidiore, nisi quod os illi rufescat: **D** cuius ictus sitim efficiat intollerabilem ardoremque, quod tamen minime letale sit.

*Solipuga*  
*Salpyga*  
*Solpuga*  
*Culex mulio*

De araneis & phalangiis.

Cap. CCXI.

**A**ranearum his non absurde iungatur natura. Plura autem horū sunt genera: omnibus internodia terna in cruribus, Estque caput minimum, toto quoque corpore paruo est:

*Aranearum*  
*Aranea*

In latere exiles digiti pro cruribus hærent,

Cætera uenter habet, de quo tamen illa remittit

Stamina.

*Phalangium*  
*Phalangium*

Phalangia ex iis appellantur, quorum noxij morsus. Phalangium uero mordax in duo distinguitur genera: alterum simile iis quos lupos appellant, est paruum, uarium, acuminatum, assultim ingrediens, *ψύλλα*, id est pullex nūcupatum

*Phalangium*  
*Phalanx*  
*ψύλλα*  
*Pulex*

cupatum. Alterum maius, coloris nigri, cruribus prioribus longis, tardum E  
& lente ambulans, nec uiribus ualens, neque saliens. Reliqua præter hæc ge-  
nera, partim nullum, partim certe exilem inferunt morsum. Aliud aranei  
genus est, quod lyci, id est lupi nomen accepit, & horum minimi non texunt:  
quod uero maius est, asperam prauamque telam apud terram aut sepes or-  
ditur, cauernarum exigua uestibula præpandens, & telarum primordiis in-  
tus positis obseruat, dum aliquid in tela offendens commouerit, mox accur-  
rit ut capiat. Quod autem in hoc genere uarium est, paruam uilemque te-  
lam sub arboribus facit. Tercium araneorum genus, quod sapientissimum  
lautissimumque est, & erudita operatione conspicuum, textit primum fila  
quoquo, uersus distendens in orbem, & stamina ducit, initio à medio acce-  
pto: nec certe inscite medium ipsum accipit: deinde subtegmina infert te-  
xitque stipans. Cubile uero & capturæ repositorium alibi sibi constituit, ue-  
nationem in medio sui operis obseruando. cum enim bestiola eò inciderit,  
motu medij excitus accurrit, deuincitque primum obuoluens araneis, dum  
defatiget infirmamque faciat: tum tollit ac deserit: & si forte fame tenetur,  
exugit (araneis enim exugere succum mos est.) Et hæc quidē fructio eius est:  
sin minus, recondito quod cæperit in repositorio, repetit uenandi negotium:  
sed prius confarcito quod per uenatum lacessitum est. Si quid uero inter me-  
dium & extrema inciderit, primum ipse in mediū currit: inde ad id quod  
inciderit, uelut à stato initio properat. Si quis telam lacerarit, texere iterū  
incipit oriente sole aut occidente. quoniam bestiolæ temporibus his potis-  
simum offendant. Araneorum istorum lautiorum duo sunt genera, alterū  
minus, alterum maius. Quod igitur longioribus est cruribus, pendens sub-  
tus obseruat, ne bestiolæ præ formidine sibi caueant, sed incaute incidant in  
partem superiorem: non enim facile occultari potest, propter sui corporis  
magnitudinem. At alterum, quod moderatius est, superne obseruat latens  
in quodam exiguo suæ telæ foramine. Fœmina, ut opinatur quidam, & te-  
xit & uenatur: mas comes fruendi, non laborandi est. At alij fœminam  
putant esse qui textit, marem qui uenatur, ita paria merita. Coniugio ara-  
nei conueniunt cruribus, sed auersis clunibus. Phalangiis quæ texunt coi-  
tus agitur hoc modo: cum fœmina deductam araneam traxerit, mas ean-  
dem mutuo trahit: quod ubi sapius fecerint, coeunt, & auersi clunibus co-  
pulantur: nam propter aluum orbiculatam, modus hic coniungendi iis cō-  
gruit. Pariunt aranei uermiculos primum paruos ouis similes, propter fi-  
guræ scilicet orbiculatam speciem: nam & rotundi iam inde à primo ortu  
proueniunt: cum pepererint, incubant, & triduo peragunt. Pariunt omnes  
in tela, sed alij in subtili & parua: alij in crassiore: & alij penitus in specu or-  
biculato: alij ita ut fœtui aliquatenus tela obducta sit. Præterea aranei in tela  
pariunt, & incubant eadem in tela atque uiuificant. Phalagia in rete quod  
crassum confecerint, pariunt, atque incubant magno numero. Cumq; ipsa  
proles increuerit, matrem amplexa interficit & eiicit: sæpe etiā & patrem  
si cæperit: adiuuat enim fœminam incubatu. Pariunt autem & trecentos.  
Cæteris lautioribus illis partus minoris numeri est. Aranei iusta sibi reci-  
piunt

Lupus, λύκος.  
ὄλιος.

Alius, crassus  
pro asperam,  
παχύς.

Araneus lautus.

Præterea ara-  
nei, ἀράχνη,  
ἀράχνη.  
Phalangia.

A piunt incrementa diebus quater septenis, à paruo sui ortus initio ad finem.

Aranei non statim cum editi sunt, hila mittunt: neque in trinfecus tanquam excrementū, ut Democritus ait, sed extrinfecus de suo corpore ueluti corticem, more eorū quæ suis uillis iaculatur, ut histricis. Maiora etiā animalia inuadit irretitque nonnunquā suis filis. Nāque & lacertarū catulos paruos aggressus circūdat os & filis obducit, donec cohibeat: mox accedens, morsum defigit. Librat & araneus se filo in caput serpentis porrecta sub umbra arboris suæ, tantāque ui morsu cerebrum apprehēdit, ut stridens subinde ac uertigine rotata, ne filum quidē desuper pendentis rūpere, adeo non fugere queat, nec finis ante mortē est. Sunt & ex araneis auguria: quippe incremento annium futuro telas suas altius tollunt. Idem sereno nō texunt, nubilo

*Aranea.  
Αράχνη.*

B texunt: idēq; multæ araneæ imbrium signa sunt. Ruinis quoq; imminētibus aranei cum telis primi cadūt. Est quoddam aranei genus, ut author est Dioscorides, quod candidā, tenuem densāq; telā necit: hunc in aluta ligatum & brachio adalligatū, quartanis circuitibus mederi narrāt: decoctū ex rosaceo & infusum, aurium doloribus auxiliari. Et aranei genus quoddā est, cuius morsum continēs dolor in mediis iliis comitatur: unde & tubor, & urinæ emittendæ difficultas sequitur: quandoque uero & suffocatio. Est

*Araneus marinus.*

Araneus quidam marinus, æque pestiferum animal atq; lepus marinus, spinæ in dorso aculeo noxius. Araneus quem ὀλκερ alij lupum uocant, (inquit Dioscorides) subactus & linteo illitus, frontique & temporibus impositus tertianos circuitus perfanat. Tela eius sanguinē sistit imposita, & à uulneribus quæ in summa cute consistunt, inflammationes arceat. Fracto capiti, Plinius ait, aranei tela ex oleo & aceto imposita, non nisi uulnere sanato abscedit: hæc & uulneribus constrinarum sanguinem sistit. Aranei muscarij telæ, & præcipue spelunca ipsa imposita fronti ad duo tempora mirabiliter epiphoras mederi dicuntur. Albugines quoque dicitur tollere inunctione araneus candidus, longissimis ac tenuissimis pedibus, contritus in oleo uetere. Sed is etiam cui crassissimum textum est in cōignationibus fere, adalligatus panno, epiphoras sanare traditur. Linguae ulcera & laborum sanant araneorum telæ candidæ, & quæ in trabibus parue textuntur. Araneus qui filum deducit ex alto, tritus atque admotus inhibet muliebres purgationes.

*Araneus muscarius.*

Aranei in oleo putrefacti contra omnium phalangiorum morsus auxiliantur. Phalangium est Italiæ ignotum, inquit Plinius, plurium generum: unum simile formicæ, sed multo maius, rufo capite, reliqua parte corporis nigra, albis intercurrentibus respersum guttis: acerbior huius quàm uestiæ ictus: uiuit maxime circa furnos & molas. In remedio est si quis eiusdem generis alterum percussio ostendat: & ad hoc seruantur cum mortui inueniuntur. Æque phalangion Græci uocant inter genera araneorum, sed distinguunt lupi nomine: uel, ut Nicandro placet, agrestes uocatur alius, lyco araneo, qui muscas uenatur similis: imbellem plagam infert, & quæ doloris sit expers. Tertium genus eodem phalangij nomine, araneus lanuginosus, grandissimo capite: quo dissecto, inueniri dicuntur intus uermiculi duo, adalligatique mulieribus ceruina pelle ante sobolis ortum, præstare no-

*Phalangiorū genera.*

*Λύκος.*

*Araneus lanuginosus.*

*Rhagion.* concipiant, ut Cæcilius in commentariis reliquit: uis ea annua est. Vocatur E  
 & rhagion acino nigro similis, ore minimo sub aluo, pedibus breuissimis 11  
 tanquam imperfectis, incessu tamen uelocissimo. Dolor à morfu eius, qua- 12  
 lis à scorpione, urina similis araneis textis. Idem erat alterion, nisi distin- 13  
 gueretur uirgulis albis. Huius morfu genua labefactātur: sopor hominem  
 corripit pariter & horror. Peior utroque est cæruleus lanugine nigra hir-  
 sutus, caliginem cōcitans, & uomitus araneosos, etiamnum deterior, à cra-  
 brone penna tātum differens: hic & ad maciem perducit. Tetragnathij duo 14  
 genera habentur: peior, medium caput distinguente linea alba, & trāsuerfa  
 altera. Hic oris tumorem facit. At cinereus posteriore parte candicās, len-  
 tior: minime autem noxius, eodem colore, qui telas muscis in parietibus la-  
 tissime pandit. Vti uero Aëtius tradit tetragnatus phalāgij species est, cor- 15  
 pore latiore & subalbido, pedibus scabris: duo illi in capite prominent tu- F  
 bercula, alterum rectum, alterum latum, ut uideatur quidem ora habere  
 duo, & maxillas quatuor. Locus ab hoc percussus subalbicans est, & uehe-  
 mens in eo dolor: mēbrum uero ipsum ad articulos usque gracilescit. Cor-  
 pus denique totum, ex alimento nullum sentit commodum: & post adeptā  
 quoque sanitatem, immodicæ infestant hominem uigiliæ. Dysderi uocāt  
 alij, alij sphecium, phalangij genus uehementer rufum, uespæ simile: huius  
 morsus tumorem excitat, genua labefactat, nonnunquam & tremorem af-  
 ferens, quandoque & mortem. Inueniuntur messis tempore in legumini-  
 bus, cum manibus colliguntur, phalangia quædam parua, specie canthari-  
 di similia, colore flammeo. Ab huius morfu excitantur pustulæ, quas Græ-  
 ci φλυκταρες uocant: mens perturbatur: linguæque incondita profert, & ocu- G  
 li subuertuntur. Nascitur phalāgius in eruo, inquit Plinius, bestiola aranei  
 generis, si hyems aquosa sit. Inuenitur & in Persea arbore phalangium, cui 16  
 nomen cranocolaptes. In Persea arboris frondibus (inquit Nicander) gi-  
 gnitur animalculum, phalænæ papilionis specie, capite semper nutabundo,  
 & uentre graui, spiculum in summo collo gestat. Hoc si quem percussit,  
 non longo post tempore certa sequitur mors. De phalangijs uero ita pro-  
 didit Aëtius, Plura quidem sunt phalāgiorum genera: sed quæ fere ab aliis  
 qui theriaca scribere traduntur, sex numero existūt: rhagium scilicet myr-  
 mecium, lycos lupus, cranocolaptes, sclerocephalus, & scolecium. Quod  
 rhagium uocatur, figura est rotunda, colore nigro, uua nigra acino similis, H  
 unde & nomen accepit rhagiū: pedes habet utrinq; breuissimos, & os sub  
 medio uentre. Qui uero lupo appellatur, inter araneorū telas inuenitur,  
 ubi muscas uenari solet, quibus pascitur. Corpus illi latum & rotundum:  
 quæ circa collum partes sunt, incisuram habent, & circa os tubercula tria 17  
 enascuntur. Myrmecion prægrandi formicæ similitimum est: colore fuligi-  
 noso atrouē. Huius corpori inserta sunt quasi astra, maxime uero circa dor-  
 sum. Cranocolaptes oblongus & colore uiridante, aculeum in collo gestat:  
 quod si in quem inciderit, ferit eas maxime quæ circa caput sunt partes.  
 Sclerocephalon caput habet, saxi duritie, & totius corporis lineamenta ani- 18  
 malculis illis quæ lucernas circunuolant similia. Scolecion longiusculum  
 est,

A est, & maculis quibusdam, præsertim circa caput, uariiegatum. Phalangiorum species è quibus periculum præcauere expedit, hæc sunt. Quæ autem eorum morsum sequuntur accidentia, communia sunt excessu defectuq; discrepantia. Morsus tenuis est, & qui conspici uix queat: tumor cum liuore, nonnullis & cum rubore: frigus circa genua lumbosque & scapulas: nonnquam & totius corporis grauitas. Hæc Aërius.

1 Acuminatum, &c. ὀφί, ὀφιδόμη. Theodorus, acutum, salax, sed mea quidem sententia, reatius atque apertius Plinius acuminatum assultimque ingrediens, reddidit.

2 Varium est, &c. Vetus Aristotelis interpret ita habet: Et inuenitur genus maculatum in uere sub arboribus. Hoc, ut arbitror, genus aranei pratense uocat Aristoteles.

3 Aranei isti lautiores & strigosiores in ultz munibus ingeniosiores sunt, inquit tensis. *Araneum pratense.*

B Aristoteles. 4 Texit primum, &c. Plinius hæc ita explicat: Texere à medio incipit, circinato orbe subtegmina adnectens, maculasque paribus semper intervallis, sed subinde crescentibus ex angusto dilatans, indissolubili nodo implicat. Latitudo telæ sæpe inter duas arbores cum exercet attem & discit texere. Longitudo fili à culmine, ac rursus à terra per illud ipsum uelut reciprocatio, subitque pariter ac fila deducit: cum uero captura incidit, licet extrema hæreat plaga, semper in medium currit, ex quo sic maxime totum cōcutiendo implicat. 5 Araneorum istorum lautiorum, &c. Araneorum lautiorum & telam spissiore texentium: ita reddidit Theodorus ex Græca lectione, (πυκνὸν) uetus autem interpres, quæ texunt textura debili. 6 In specu orbiculato, &c. ἐν κύπτῃ, Theodorus in sinu orbiculato. 7 Plinius hæc ita reddidit, Pariunt oua in telas expansa, qui saluunt atque ita emittunt: Phalangius tantum in ipso incubat, magno numero. 8 Tela eius sanguinem, &c. Hoc Galenus attribui scribit araneorum telis in genere. 9 Phalangiorum, &c. De his phalangiorum generibus, uide Hetmolaum in Corollar. 10 Aliiter ista expressit etiam Plinius ipse. Myrmecion formicæ similis capite, aluo nigra, guttis albis distinctis, uelut parum dolores torquet. 11 Rhagion, &c. ῥάγις à Nicandro (opinor) Myrmecion uocatur. 12 Dolor à morsu, &c. Signa morsus huius leges apud Nicandrum. 13 ῥάγις. Aferion, &c. Alij legunt apud Plinium asferion nel asfortion. 14 Hunc locum Hermodorus aliter distinguit, ut intelligatur hoc septimum genus esse, & aliud à cæruleo à crabrone penna tantum differens, deterius etiam num cæruleo, ut quod macie conficiat à se percussos. 15 Tetragnathum, &c. Tetragnathum Hermolaus ex Actio ita nobis descripsit, modice lato & subalbo corpore, pedibus asperis, duabus incisuris in capite, recta una, per obliqua altera, ut quaternas buccas habere uideatur, unde nomen. In Æthiopia (inquit) tam frequentes, ut quaternas buccas habere uideatur, unde nomen. In Æthiopia (inquit) tam frequentes, ut regionem in ea quandam prope Sillos Acridophagosque deseri coegerint. 16 Cranocolaptes, &c. κεφαλαιόκροτος etiam à κεφαλαιόκροτος quibusdam appellatur. 17 Corpus, aliàs os, σῆμα, rotundum, περιεσφῆς: uide an mensura sint hoc loco Aërij exemplaria. 18 Aliiter fortasse, lineas habet toto corpore, similes animalculis, &c. ut legatur, non ὡς ζῷον, sed potius ὡς χειμῶν ἔχει. 19 Alia quoque præter hæc signa uideas apud Dioscoridem lib. 8, & Paulum & ipsum Aëlium.

De scolopendra & aliis quæ multipedæ dicuntur.

Cap. CCXII.

Scolopendra item morsu perniciofa est, quam & ophioctenam uocant, & centipedam: & alij sepa, ex iulorū genere. Iulum autem uoco insecti genus prælongum & multipes, illam habens partem non simplicem sed multiplicem, quæ est inter caput & aluum, in qua continetur quod cordi proportionale est: quo fit, ut præcisum hoc genus uiuere possit. Millepedæ, quas & centipedas & multipedas alij uocant, duorum generum. Animal

*Scolopendra.*  
*Ophioctena.*  
*Centipeda.*  
*Sepe.*  
*Iulus.*  
*Millepæda.*  
*Centipeda.*  
*Multipeda.*

*Alias, tractū-* est millepeda, inquit Plinius, è uermibus terræ pilosum, multis pedibus ar- E  
*que.* cuatim repens tactūque contrahens se: oniscus Græci uocant, alij tilon. Il-  
*Oniscus.* lam autem quæ non arcuatur, sepa Græci uocant, alij centipedem, alij mil-  
*Tilos.* lepeda: alij scolopendram, minorem perniciosamque, oblongam, pedibus  
*Seps.* multis atq; pilosis, & qui ex utraque corporis parte in ingressu, remorū in-  
*Centipes.* star mouentur, pecori præcipue nocuam. Viuit scolopendra uel in plures  
*Millepes.* partes dissecta: & si pars aliqua à reliquo corpore abscindatur, in utrunque  
*Scolopendra.* se mouet extremum: nam & caput uersus ingreditur & in caudam, ideòq;  
 à nonnullis existimatur biceps esse. Huius morsum tumor insequitur, &  
*ἡ μὲν αὖτις*  
*σκολοπενδρᾶ*  
*Nicand.* putrescit locus atque in ambitu liuescit: sitque postea ulcus, quod à loco ip-  
 so exorditur, quod & permolestum est, nec facile curatur. Scolopendra ci-  
*Scolopendra*  
*marina.* micibus aduersatur suffitūque necat. Scolopendram terrestrem salua dif- F  
 rumpi ferunt. Sunt & scolopendræ marinæ terrestribus similes, magnitu-  
 dine æquales aut paulo minores, colore rubetiores, numero pedum copio-  
 siores, & crurum tenuitate graciliores: nasci locis saxosis solent, & modo  
 serpentum, non magna altitudine gurgitum. Hæc ubi hamum deuorarit,  
 euerit foras partes internas, donec hamum eiiciat: tum recipit intro, ac ua-  
 let eadem qua ante sanitate. Appetitus his quoque nidorulentorum, ut ter-  
 restribus est. uenenosa & hæc est. Morder autem non ore, sed tactu totius  
 corporis, ut quæ urtica uocantur. Et uti cecinit Oppianus,

-Si quis modo cominus illum

Attigerit, feruet fœda prurigne corpus,

Qualem urtica facit cognomine dicta doloris.

Oleo in quo scolopendra marina sit cocta, nonnulli ne pili euulsi renascan- G  
 tur, usi sunt. Verum alij cetaceum genus quoddam esse scolopendram ma-  
 rinam arbitrantur, aspectu horrendum, eamque spectari eminentem è ma-  
 ri, & marium pilos magna excelsitate apparere: eius caudam similiter atq;  
 locusta latam perspicere. reliquūque corpus conferri posse cum trireme iu-  
 sta magnitudinis, atque permultis pedibus utrinque ordine tanquam ex  
 scalmis appensis per summum mare natare. Millepeda centipedæque, quam  
 modo & oniscum uocari diximus, & tilon, efficaciter sanat auriū dolores,  
*Millepeda.* inquit Plinius, in cortice punici mali decocta & porri succo, addunt & ro-  
*Centipeda.* faceum, & in alteram aurem infundunt. Millepedam oniscum bibisse pro-  
*Oniscus.* dest urina. Medentur suspiriosis multipedæ, ita ut ter septenæ in Attico H  
*Tilos.* melle diluantur, & per arundinem bibantur: omne enim uas earum nigres-  
*Multipeda.* cit contactu. Quidam torrent ex his sextarium in patina donec candidæ  
 fiant, tunc mel immiscent: alij centipedam necant, & ex aqua calida dari iu-  
 bent. Onisci, qui & oni dicuntur, (uti prodidere Dioscorides & Galenus)  
*όνις, όνιον.* sub aquariis uasis reperi, animalcula sunt multis pedibus nitentia, quæ cō- 4  
*Asellus.* tacta manu contrahuntur in orbem, fiuntq; ubi se contraxerint, fabis escu-  
 lentis non dissimiles, ac proinde à nonnullis κύματι, id est fabæ uocati, colore  
*κύμας, faba.* fusco. Hi ex uino poti, inquit Dioscorides, urinæ difficultati, quæ disuria  
*Colore fusco,*  
*φακοί.* dicitur, & regio morbo auxiliantur: cum melle anginis illinuntur. Triti &  
 in malicorio unā cum rosaceo calfacti in aurium doloribus utiliter instil-  
 lantur.



Alantur. Hæc Dioscorides. Et Galenus, quidam his usi sunt, inquit, ad aurium dolores, in oleo coctis.

1 Iulus uermis est multipes: mille nanque pedibus uritur, ut scolopendra. Quidam & ipsas scolopendras iulos uocant. Hæc Theon. 2 Animal est, &c. Iulon hanc speciem (ut opinor) uocauit Nicander in Theriac. interpres uero *μυρμιρίδα* appellat. 3 Paulo minoris. Suspectus mihi certe uidetur hic Aristotelis locus: uetus interpres habet, quod est in mari, est minus agreste. 4 *ὄροι πλὴν ἁλῆς* forsitan Aristoteli. an prior *ὄροι πλὴν ἁλῆς* multipeda?

De iis quæ promuscidem & ueluti aculeum in ore gerunt: ut, de muscis & culicibus. Cap. CCXIII.

**L**ingua siue promuscidem habent muscæ, qua uel cruorem ex animalium corpore extrahant: qua & gustum habent omnium saporum, & omniuoræ sunt: hæc euident fistula est. Cocunt quidem ut & alia insecta & generant muscæ, uerum non animal sui generis, sed uermiculum: & muscæ ubi pecorum ulceribus infederunt, uermes creant, inquit Columella. Neque ab animalibus ipsi generantur, sed ex uermiculis ex forde humida aut sicca putrescente genitis. Principium autem ipsorum uermiculorum exiguum est, atque ex immobili quasi hærens adhuc, moueri incipit: mox uermiculus immobilis redditur: qui cum postea motus est, rursus immobilis fit: demumque generatur musca, quæ flatus aut solis beneficio moueatur. Nullum animal minus docile existimatur minorisue intellectus quam musca. Mons est Carina in Creta, 1 x milliū passuū ambitu, intra quod spatium muscæ non reperiuntur: natumque ibi mel nusquam attingunt. Hoc experimento singulare medicamenti eligitur. Alopecias replent muscarum capita recentia, prius folio ficulneo asperatas: alij sanguine muscarum utuntur, alij decem diebus cinerem earum illinunt cum cinere chartæ uel nucum, ita ut sit tertia pars è muscis: alij lacte mulierum cum brassica cinerem muscarum subigunt, quidam mel ratum. Apud Macedonas circa fluuium Astræum, qui inter Berocam & Thessalonice medius fluit, uolat muscarum genus, quas, cum ad summam aquam accesserint, pisces quidam qui in eo flumine gignuntur, uariis distincti coloribus, arripiunt atque deuorant, indeque uictum sibi comparant. Has equiseles uocant indigenæ: quæ uulgarium harum quæ ubique reperiuntur muscarum, quod ad formam datinet, nihil simile habent. Nec apum uespærumque similitudinem gerunt: harum tamen cuiusque aliquid referunt, uespærum colorem reddunt, magnitudine apibus æquales: & similiter atque apes bombitatione strepunt: atque in audacia quiddam simile cæterarum muscarum habent. Et culicibus lingua fistulosa est & ad suctum, & aculei loco ad pungendum. Corpus his minimum, alius fere icuina, crura prælonga, & uox pro corporis ratione maxima, animalculum sanguinis & potissimum humani audissimum. Infestant culices hortos, inquit Plinius, riguos, præcipue si sunt arbusculæ aliquæ. Hi galbano accenso fugantur: culicum uaria sunt genera. In culicum genere, muliones non amplius quam uno die uiuere feruntur. Apes impugnant (ut scribit Plinius) è culicum genere muliones. Apes quoque ex-

*Muscæ, μύρμι*

*Equiseles.*

*Culex.*

*Mulio.*

*Oestrus,*  
*οἰστρος.*

*Tabanus.*

*Asilus.*

*μύαψ.*

*Asilus, οἰστρος.*

gitant æstri, uti suprà diximus: sed fœtus apum hic est amplioris magnitudinis q̃ sint cæterarum. Sunt & æstri quibus lingua siue promuscis pro aculeo est, qua sanguinem exugunt, & tergora etiam quadrupedum penetrant, sicuti & tabani, siue alilos dici placet, promuscide siue lingua ipsa adacta, cutem hominum. Oestrum nonnulli etiam asilum interpretantur teste uel Vergilio.

- Cui nomen asilo

Romanum est, æstrum Graij uertere uocantes,

Asper acerba sonans, quo tota exterrita syluis

Diffugiunt armenta, furit mugitibus æther

Concussus.

Tabani ex uermiculis quibusdam impenni-

*Tabanus.*

*Oestrus.*

bus ex arbore lignœ natis procreantur: æstri è latiusculis quibusdam bestiolis quæ in fluuiis super aquam currunt, enascuntur. Quamobrem magna æstrorum copia prouenit circa aquas, ubi id genus bestiolarū est. Itaq; primum in humore uiuit bestiola, quæ *ἐμπίς* uocatur: deinde forma immutata foris uitam agere incipit. ex iis enim æstri proueniunt, quorum generatio ita habet: ex ascaridis generantur empides. Porro ascarides fere in puteorum limo, & ubicunque se aqua colligit, terrena subsistente cōcretionē oriuntur. Fit ut principio fex ipsa putrescens colorem candicantem trahat, mox nigricantem: postremo cruentum. Talis cū fuerit, minutissima quædam & rubra prodeunt, quæ ad tempus hærentes suæ origini mouentur: deinde absoluuntur, itaque feruntur per aquam quæ ascarides nuncupantur: tum paucis post diebus erigunt se super aqua duræ atque immobiles. Mox disrupto putamine empis emergit ac supra insidet, donec uel sole uel G flatu moueatur, deinde uolat. Copiosius autem ac celerius fiunt ascarides in aquis, quarum sedimentum uarium ac promiscuū sit, quale in agro Megarico & in operis solet misceri. putrescit enim hoc facilius. Et autumnō quoque uberius generantur: minus enim humoris esse tunc accidit. Hæc de empide Aristoteles. Alij uero empida animalculum esse produnt, in aquis aut circa aquas natum conopi simile, sed maius, alba linea mediū corpus cingente. Conopes (culicum genus) ex uermiculis qui in fece acetogi gnuntur, originem trahunt. Hi ad dulcia non accedūt, sed acida petunt: lingua sua acriter pungunt. Conopas quoque nonnullos ex igne generari ferunt: ex flamma scilicet & scintillis, quemadmodum uermes in niue. Ficarios culices caprificus generat suis pomis: fit primum uermiculus, mox rupta cute euolat: mutataq; sede petit ficus immaturas: quibus sese insinuans, facit ne decidant: quamobrem agricolæ appendere ficis caprificus, & iuxta easdem caprificos serere assolent. Sunt & quædam culicum genera aliquibus fructibus molesta, ut glandibus, fico, qui uidentur ex humore nasci, tūc dulci subdito corticibus.

*Culex ficarius*  
*ψω.*

*Culex palustris.*

*Culex mulio.*

*κνίψ.*

*Tipula.*

1 οἰστρος μύαψ ἢ ὀψιχελος, inquit Suid. ἡ ψιλὸν ὄντα ἐν τῷ καύματι πῆρ βροχὶ ἐμπιὸν σκεῖλαι ὠνιδαι. 2 Quæ *ἐμπίς* uocatur. *ἐμπίδα* Theodorus modo culicem palustrem uocat, modo culicem mulionem, quanquam & *κνίπα* quoque culicem mulionem uertit, nonnunquam culicem: unde cnipologos auis dicta ab eo culicilega est, ut suprà dictum est. 3 Ex ascaridis. Ascaridas, tipulas uertit Theodorus. 4 Empida, &c. *ἐμπίδα*

*Αμπίδες ἐφ' ὧν μὲν* dixit Aristophanes in auibus, *ἐφ' ὧν δὲ ὕδρως*. & in *μεφ' ὧν*, sonoras esse empidas ait. 5 Qui in fece, &c. Theodorus modo culicem uinarium uertit, modo culicem. Plinius: Culices acida petunt, ad dulcia non aduolant, dixit: & genera cu- *Culex uinari*.  
licum accescens natura gignit. *Culex*.

De cicadis.

Cap. CCXIIII.

**C**icada ex omni animalium genere una, ore caret: uerum membrum *Cicada*.  
quoddam quod usum tum oris tum linguæ præstet in pectore consti- *τίσις*.  
tutum aptissime habet, quo ueluti radice, cibū ex humoribus trahat. Pro-  
lixum hoc compactum, indiuisumque gerit, simile ei quod linguæ spe-  
ciem refert in iis quibus aculeus in ore est: eoque ipso rorem haurit, ali-  
mentum unum & peculiare. Oculos Nigidius cicadis inesse negat: uerum  
oculos habent, inquit Aristoteles, sed hebetes: & si quis digitum contrahēs  
**B** ac remittens subinde appropinquet, magis sustinent quàm si ilico extēdat.  
Et quidem transire in digitum alliciuntur: quod enim oculis hebetes sunt,  
quali frons aliqua moueatur, digitum ita admotum conscendunt. Penna-  
rum illis natura quæ apibus, sed pro corpore amplior. Isdēmque solis nul-  
lum ad excrementa corporis foramen: neque enim excrementum cicadis  
ullum in aluo reperitur. Nam cum omnia insecta minimo alimento con-  
tenta sint, omnium maxime cicadarum genus ieiunum est. Excitata cum  
subuolant, quandam reddunt humorem modo aquæ: quam obrem rustici  
eas mingere, & excremento non carere, rorēque ali asseuerant. Nasci non  
possunt cicadæ ubi arbores defunt: loca etiam frigida aspernantur. Est quē-  
dam & in iis locorum differentia: in Milesia regione paucis sunt locis: sed  
**C** in Cephallenia amnis quidam penuriam earum & copiam dirimit, cuius ci-  
tra alterum, latus est cicadarum copia, ultra alterum nullæ. In Rhegino a-  
gro silent omnes, ultra flumen in Locris canunt. Procreantur cicadæ ex ani-  
malibus sui generis: & coeunt tam maiores quàm minores supinis admo-  
tis partibus: māsque inserit in fœminam, non sicut & cætera insecta agunt.  
Genitale fœmina habet rescissum, quo recipit id quod à mare iniicitur. pa-  
**2** riunt in aruis cessantibus, terram excauantes parte sui posteriore quam a-  
cutam habent. Quinetiam in arundinibus, quo adminiculo uites eriguntur,  
nidum fœturæ excauant, & in caulibus squillæ interdum pariunt: proue-  
niunt large copia imbrium. Crescit primo in terra uermiculus, deinde fit  
**D** ex eo quæ tettigometra uocatur, (quo tempore suauissimæ sunt ante quàm  
cortex rumpatur:) postmodum circa solstitia noctu exeunt cicadæ ex ma-  
trice illa cicada, quam modò tettigometram dixi, nigra protinus & du-  
riusculæ & maiusculæ. Vbi uero eruperunt, oleis aut arundinibus insidunt:  
& cum rupto operculo exeunt, parum quiddam in eo relinquūt humoris:  
nec multo post uolant & incipiunt canere. Mares sunt in utroque genere,  
(tam scilicet maiorum quàm minorum) qui canunt, fœminæ quæ silent. *Cicadarum*  
Cicadarum genera uaria sunt, quæ magnitudine & paruitate differunt: & *genera*.  
præterea quod aliis incisura est sub septo præcinctiue, membranamque in *Tettigonia*.  
aperto gerunt, qua sonus editur, ut iis quas achetas appellant: aliæ non ita *τίττινία*.  
habent, ut quæ tettigonia, id est cicadastæ uocantur. neque enim ita diui- *Tettigonia*.  
*Cicadastæ*.

*Cicada muta.**Achetæ.**Ἀχέτης.**Τιτρίωνα.**Cicada muta.**Cicada furcu-**laria.**Cicada frumē-**taria.**Cicada auena-**ria.**Ἰσχυρίων.**Cicada mari-**na.*

sum illis corpus est, neque membranam habet adeo manifestam. Sunt ita- E  
que cicadarum duo genera: alia minores quæ primæ proueniunt, quæque  
sunt mutæ, & nouissima pereunt: sunt autem multæ: alia maiores, quæ ca-  
nunt, præcinctu diuiduæ, ut modo diximus, siue minores, siue maiores sunt.  
Quæ autem non canunt, indiuiduæ constant. Vocant nonnulli grandiores  
illas & canētes, achetas: minores tettigonia, id est cicadas mutas. Sed cane- 3  
re uel in hoc secundo genere possunt paululum quæ præcinctæ prodierint, 4  
sed priores illæ magis canoræ sunt. Mares cātant in utroque genere, fœmi-  
næ silent, uti modo diximus. Quidam duo alia genera faciunt earum: fur-  
culariam, quæ sit grandior: frumentariam quam alij auenariā uocant: ap-  
paret enim simul cum frumentis arefcētibus. Gentes uescuntur iis ad oriē- F  
tem, etiam Parthi opibus abundantibus: ante coitū mares præferunt, à coitu  
fœminas: quippe quæ oua candida gustu habeat grata. Cicadas dant nō- 5  
nulli iis qui colico dolore afficiuntur, cum paribus numero granis piperis,  
tribus scilicet aut quinque aut septem. Cicadę, inquit Dioscorides, si assatæ 6  
edantur, uescit doloribus auxiliantur. Est & cercope animal cicadæ simi- 7  
le, ut Pscusippus author est. Est etiam cicadarum genus marinum, quarum  
maxima parui carabi speciē habet: uerūtamen cornua nō similitet atq; ille  
magna, nec aculeos habet. Pinnæ ipsius exiguæ, terrenarū alis similes sunt.

*Arguta cica-**da.*

1 Plinius: Pro eo quiddam aculeatum linguis simile, & hoc in pectore, quo rorem  
lambat. 2 Quam acutam habent. Theod. asperitate præacuta quam parte habent  
posteriore. Ex Plinio forsitan. Plinius: Asperitas præacuta in dorso qua excauant fœ- G  
turæ locū in terra. 3 Achetas: Theod. argutas uertit. 4 Apertius atq; magis ex-  
plicate ita legeretur apud Arist. mea quidē sentētia, τράπισσις uerbis, ἄδουσι & ἡ πτωρ  
ἐκ πτωρὶ διαφυλάσσει. 5 Quæ oua candida, &c. Plin. Ouis eorū corruptis quæ sunt can-  
dida. 6 Si assatæ edantur, &c. Cicadas in patellis tostas edisse, prodest uesciæ dolori-  
bus, inquit Plin. 7 Cicadæ simile, &c. ὁ κυνὸς τῆς ἡγῆς (inquit Athenæus) καὶ τῆς ἡγῆς  
ubi fortasse legendum erat τῆς ἡγῆς.

De locustis.

Cap. CCXV.

*Locusta.**Ἀχέτης.**Spina caulem**uocat Plinius.*

Cum insectorum maxima pars perexigua sit, locustæ magnitudinem  
Caliquam habent effatu dignam. Crura habent parte posteriore ad gu-  
bernaculorum effigiem condita, & mediis lōgiora, quibus saliant pulicum  
more. Oculos Nigidius nullos locustis inesse dicit. Ventrem intus habent  
& intestinum replicatum. Maribus fœminæ maiores sunt, quarum caudæ H  
adnascitur cauliculus, quo in terra fixo pariūt: eo mares uacant. Procrean-  
tur locustæ ex animalibus sui generis: & coeunt eodem modo quo cætera 2  
insecta quæ coeunt, mare scilicet fœminā superueniente, & in eum fœmi-  
næ ultimo caudę reflexo, tardōque digressu. Pariunt fœminæ in terra fixo  
cauliculo illo qui caudæ adnascitur: ac uniuersim, & loco eodem sœrū de-  
ponunt, ita ut quasi fauus esse uideatur: hinc uermiculi speciem oui geren-  
tes oriuntur: qui terreno quodam prætenui tanquā membranula ambiun-  
tur: qua dissecta, emergunt locustæ ac euolant. Tam mollis fœtura hæc est,  
ut ad tactum leuissimum cōteratur: non summæ telluris partus committit-  
tur, sed paulō altius: duratque hyeme sub terra. Hic concoctione peracta,  
subsequenti

- A** subsequenti anno exitu ueris, exeunt ex illo terreno amiculo parua locustæ & nigrantes, ac sine cruribus pennisque reptantes: deinde maiores statim efficiuntur. Pariunt exitu æstatis, & statim à partu moriuntur, uermiculis *Pariunt autem tempore. Plin.* circa collum innascentibus tempore partus, qui eas strangulent. Tam friuola ratione morientes, serpentem cum libuit necant singula, faucibus eius apprehensis mordicus. Vernis aquis intereunt oua, in sicco uere magnus prouentus: alij duplicem earum fœtum, geminũque exitũ tradunt, uergiliarum exortu parere: deinde ad canis ortum obire, & alijs renasci: quidam arcturi occalu renasci. Est & alius earum obitus: gregatim sublata uento, in maria aut stagna decidunt: lōginqua quoque maria ab iis trāfiri feruntur, continuata plurium dierum profectio. Nanque & grandiores cernuntur, & tanto uolant pennarum stridore, ut aliæ alites credantur, **B** solẽmque obumbrent. Italiam ex Africa magna cohorte infestant, omnia morsu erodentes, & fores quoque tectorum. Locis montanis aut tenuibus locustæ non fiunt, sed planis rimosisque: pariunt enim in riuis sua oua. In India ternum pedum longitudinis esse traduntur, cruribus & fœmoribus ferrarum usum præbentes cum inaruerint. Locustæ suis gubernaculis atterentes sonant, inquit Aristoteles: uerum Plinio uox earum proficisci ab occipitio uidetur. Eo in loco in commissura scapularum habere quasi dentes existimantur: eosque inter se terendo stridorem edere, circa duo æquinoctia maxime, sicut cicadæ circa solstitium. Pars quædam Æthiopum locustis tantum uiuit fumo & sale duratis in annua alimenta, atque ob eam rem acridophagi nomen habent. urinæ angustis quas disurias uocant & stranguriæ, maxime mulierum, suffitu prosunt locustæ. Est quoddam genus locustæ, asiracus aut axirachus dicitur, aut *Asiracus. Axirachus. Erat, asellus.* id est asellus, sine alis, crassioribus cruribus: recens hic & exsiccatu contra scorpionis morsus magnopere iuuabit si ex uino bibatur. Hac in frequenti cibo utuntur Afri, qui Leptin incolunt. In locustarum genere censentur attelabos, siue brucus, attaces, ophiomachus, mastace, moluris, & parnops. Attelabi (ut Aristoteles prodidit) pariunt in aruis cessantibus, quo modo & cicadæ. Pariunt autem, & cum pepererint moriuntur, pari modo atque locustæ. Intereunt oua eorum aquis autumnalibus cum nimis incesserint: at sicco autumno largior prouentus attelaborum est, quoniam minus oua intereant. Est autem attelabos locustarum minima sine pennis. Est animal, inquit Plinius, locustæ simile sine pennis, quod tryxalis græce uocatur, Latinum nomen nō habet, ut aliqui arbitrantur authores: nec pauciores hoc esse quod gryllus uocatur. Ex his uiginti torrer iubent, ac bibi è malsa contra orthopnoeas, sanguinẽque expuentibus. Tryxalidum cinis illitus cum melle, purgationes mulierum adiuuat. Margines quoque ulcerum duos aufert cum melle. Magnam autoritatẽ gryllo perhibet Nigidius, maiorem magi, quoniam retro ambulet terramque terebret, & stridat noctibus. Venantur enim formica circunligata capillo in cauernam eius coniecta, efflato prius puluere ne sese condar, & ita formicæ complexu extrahitur. Auribus prodest gryllus cum sua terra effossus & illitus. Lenit

& tonsillas gryllus infricatus: aut si quis manibus quibus cum contriuerit, E tonsillas attingat.

*Apteros.*

1 Crassioribus cruribus, *μαχρόκωλος*, id est, prælōgis cruribus, ut uertit Ruellius.

Hunc Paulus apreron uocauit, quia pēnis careat. Hermolaus. 2 In locustarum genere, &c. In Leuitica lege, in iis quæ crura habent ad saltum idonea, numerantur Brucæ & quæ illi similia sunt: attaces, & quæ illi similia sunt: ophiomachus, & quæ illi similia: locusta, & quæ illi similia. Locustarum speciem illam, quam onon appellant, etiam brucum uocari putant, uti refert Hermolaus, rodentem sata. Et attacen in sacris literis appellatam, Nicander mastacen appellat pro bruceo, Aristoteles attelabon. Clitarchus in Ambracia locustas omnes mastacas dici uoluit, ut molurin, quæ frumenta depopularur. Molurides in pratis uicitant, ut uideatur ex Nicandro, locustis similes.

*Tetrapelyridas.*

*Cornops.*

*Parnops.*

*Pornops.*

Ionica locustas à numero pennarum tetrapelyridas nominat: alij cornopas & parnopas aut pornopas: unde cognomen Herculi & Apollini quoque in Æolia, quod locustas abigat, *κορνοπιός*. Hæc Hermolaus fere. Parnopius Apollo ab Atheniensibus dictus est, (ut scribit Pausanias) quoddam parnopas eorum agro infestas propulsauerit. Iones (ut Hesichius auctor est) brucum locustæ speciem dixere, Cyprij locustam uiridē, brucum uocarunt, Tarentini attelabon: alij *ὑποερσίας μάστιγιν*. Est autē attelabos locusta parua. Hæc Hesichius. Parnops locustæ species est, ut scribit Aristophanis interpres, quæ se manui facile tractandum præbet. Marcellus Vergilius de locustis ita prodit, Vixit admirabili artificio locustas natura: quis enim tot primum in eodē corpore colores facile descripserit? quis tam diuersas corporum formas? quis ingressus, saltus, uolatus earum? Sunt enim quæ uirides, quæ nigræ, quæ liuentes, quæ aliqua parte hunc aliqua illum colorem offendant. Sunt quæ uolantes tantum, latentem antea colorem aliquem proferant. Sunt quæ simplicibus, quæ pluribus alis uolent: quæ alis carentes saltent: quæ utroque hoc motu priuatæ ingredientur tantum. Sunt quæ longioribus, quæ breuioribus cruribus sint: & in his pluribus breuioribusque, & paucioribus longioribusque internodiis. Sunt quæ canant, quæ mutæ sint: quæ per diem, quæ in tenebris tantum audiantur. Sunt quæ nihil homini in re rustica noceant, innocentēsque à pueris se capi patiantur. Sunt contra quæ pestem & calamitatem satorum omnium totis regionibus afferant: utque plura sunt in natura genera, sic etiam pene infinita ueteribus earum nomina fuerunt. Hæc Marcellus.

De uaginipennibus, quæ Græci *κεντιπτεæ* uocant.

Cap. CCXVI.

E Volucris insectis quædam membranas ipsas quibus uolant, crusta superueniente quasi uagina, tutelæ gratia inclusas gerunt, unde *κεντιπτεæ* dicuntur, quasi uaginipennia dixeris. Horum tenuior fragiliorq; pen-

*Κεντιπτεæ.*

*Vaginipennia.*

*Scarabeorū ge-*

*nera.*

*Locum hic Plinij suspectum ui-*

*detur, consen-*

*tiunt tamē exē-*

*plarum.*

na: his negatus aculeus est. hæc & senectutem exuere solent. In iis scarabeus est, cuius plura sunt genera. uolitant enim alij magno cum murmure aut mugitu. alij focos & prata crebris foraminibus excavant, nocturno stridore uocales. Quoddam rursus eorum genus, qui è fimo ingenteis pilas auer si pedibus uolunt: paruósque in iis cōtra rigorem hyemis uermiculos for tus sui nidulantur. Hæc Plinius. Propter hūc scarabeum qui pilulas uoluit, Ægypti magna pars scarabeos inter numina colit, curiosa Apionis interpretatione, qua colligit Solis operū similitudinē huic animali esse ad exu- sandos gentis suæ ritus. Scarabei, inquit Theophrastus, rosarum odore ne- cantur, Græci cantharum uocāt. Canthari, inquit Aristoteles, in fimo, quē uoluunt, conduntur per hyemem, paruósque uermiculos pariūt, ex quibus ipsi procreantur. ubi metuerint, hi motu cessant, totoque corpore indure- scunt

*Scarabeus.*

*Κανθαρος.*

*Plin. Scarabeus*

*rosarum fugantur.*



- A scunt sese contrahentes: id quod patet maxime cum tanguntur. Melolonthæ (quas scarabæos uirides & galerucas uocant nonnulli) uermibus fimo bouis aut iumentis creatis gignuntur: & inter uolandum sonitū edunt. Scarabei uiridis natura, inquit Plinius, contuētium uisum exacuit: itaque gemmarum sculptores contuitu eorum acquiescunt. Carabo (quem Theodorus modo taurum uocat, modo fullonem) antennæ ante oculos præteduntur, ut papiloni. Gignitur hic ex uermibus qui in lignis aridis nascuntur. Et primum quidem uermes ipsi immobiles sunt: mox disrupto putamine carabus exit, aliorum more qui ex uermibus gignuntur. Tauri uocatur scarabei terrestres, inquit Plinius, ricino similes: nomen cornicula dedere: alij pediculos terræ uocant. Ab iis terram egestam illinunt strumis & similibus uitis, & podagris, triduo non abluunt: prodēstque hæc medicina in an-
- B num. Fullo scarabeus uocatur albis guttis. In quodam genere scarabeorū grandi, cornua prælonga, bifulcis dentata forcipibus, in cacumine cum libuit coeuntibus. Infantum remediis etiam ex ceruice suspenduntur. Lucanos uocat hos Nigidius. Scarabeorum cornua denticula adalligata, ad infantium urinam cohibendam, amuleti naturam obtinent. Fodiunt rutili & prægrandes scarabei tellurem aridam, fauōsque paruas & fistulosas modo spongiæ medicato melle fingunt. Eriphiam herbam multi prodidere: scarabæum hæc in auena habet sursum deorsum decurrentem cum sono hædi, unde & nomen accepit. Et è leguminum uermiculis nascuntur animalia pennata. Est & cantharis dictus scarabeus paruus frumenta erodens. Cocunt quidem cantharides & generant, uerū non sui generis animal,
- C sed uermiculos tantum: neque ex animalibus procreatur, sed ex putrescente humido aut sicco. nascuntur enim ex uermiculo in spongia cynorhodi cynacanthésue, id est, sentis caninæ, quæ sit in caule: ex erucis item fici, piri, pini, fraxini & rosæ. Fiunt enim in his omnibus uermes, sed fecundissime in fraxino: in alba rosa minus efficaces. Ad medicamenta cæteris præstant è tritico collectæ. Potentissimæ inter omnes uariæ luteis lineis, quas in penis transuersas habent, oblongo corpore crassæ, ac blattarū modo pingues: præsertim si super acetum per lintecolum uaporentur. Inertiores minutæ, latæ, pilosæ: inutilissimæ uero unius coloris macræque: uis earum adurere corpus, & crustas obducere: uel, ut Dioscoridi placet, erodere exulceratæque;
- D & calorem incitare: qua de causa admiscuntur medicamenti quæ lepras ferāsque lichenas, & canceri naturam habentia sanant. Ad ungues itaque psorodeis cum ceratis aut emplastris idoneis impositæ, ita illos auferunt ut toti cadant. Admiscuntur quoque iis quæ clauos auferūt: aliqui alopecias cantharide trita illinūt cum pice liquida, nitro præparata cute. caustica uis earum, cauendūque ne exulceret alte. Postea ad ulcera illa facta, capita murium, & sel murium & simum cum elleboro & pipere illini iubent. Cantharides mixta calce pauos scalpelli uice auferunt: nonnulli paululū quiddam earum iniicere solent in medicamenta, quæ urinam cient: uerum in iis magna quæstio, quoniam ipsæ uenena sunt potæ, uesicæ cum cruciatu perpetuo. Cossinum equitem Romanum amicitia Neronis principis no-

Μελολόνη.  
Scarabeus uiridis.  
Galeruca.

Carabus,  
αγλαξος.  
Taurum.  
Fullo.  
Taurum.

Pediculus terræ.

Fullo.

Lucanus.

Scarabeus rutilus.

Scarabeus in eriphia herba.

Cantharis.

Quæ è frumento colliguntur, inquit Dioscorides.  
Mulum pingues, inquit Plinius.

tum, cum is lichene correptus esset, uocatus ex Ægypto medicus ad hanc E  
 ualitudinem eius à Cæsare, cum cantharidum potum præparare uoluisset,  
 interemit: uerum illitas prodesse non dubium est cum succo taminix uuæ  
 & seuo ouis uel capræ. Ipsarum cantharidum uenenum in qua parte sit, nõ  
 constat inter authores: alij in pedibus & capite existimant esse, alij negant.  
 Conuenit tamen pennas earum auxiliari in quacunque parte sit uenenum,  
 quibus demptis lethale est. Hæc Plinius. In medicamenta quæ urinâ cieât,  
 nonnulli solas alas cum pedibus iniiciunt, quæ alexiteria esse dicunt iis qui  
 corpora ipsarum cantharidum ebiberint: alij contra. At nos, inquit Gale-  
 nus, totas cantharidas iniicere solemus. Menses ciunt & urinâ: ideo & Hip-  
 pocrates hydropicis dabat: ita Plinius. ut uero Dioscorides, Menses ciunt F  
 pessariis emollientibus additæ. Aliqui cantharidas antidotis impositas hy-  
 dropicis auxiliari prodiderunt, ut quæ urinam moueant. Olfactu picem li-  
 quidam referunt: gustu cedrum, ut Nicæder prodidit. Easdem uires habet  
 & buprestis, animal cantharidi simile: uel, ut Dioscoridi placet, è canthari-  
 dum genere buprestis est: animal rarum in Italia, similitimum scarabeo lon-  
 gipedi, ut Plinius tradit. Fallit inter herbas bouem maxime, unde & nomē  
 inuenit: deuoratūque tacto felle, ita inflammat ut rumpat. Hæc cum hir-  
 cino seuo lichenas illita ex facie tollit sine cætica ui. Reponuntur eodem mo-  
 do buprestes quo cantharides. Eadem quoque uis quæ cætharidi, & pityo-  
 campis est, erucis scilicet in picea nascentibus. Pinorum quoque erucas pi-  
 tyocampas uocant: è quibus uermiculi postea nascuntur, qui acceptis alis G  
 euolant, quemadmodū & in ficu & cynorhodo siue camina sente, cantha-  
 ridum genus, uti modo diximus. Pityocampe in oleo coquantur, quo utun- 4  
 tur nonnulli, ut ne pili renascantur euulsi. Hippocampus marinum ani-  
 mal est exiguum, cuius cremati cinis cum pice liquida aut axungia seu a-  
 maracino unguento illitus, alopecias replere fertur: uisūque habere dige-  
 rentem pariter & extenuatē. Leporis marini ueneficiū restringunt poti-  
 hippocampi: lateris dolores leniunt hippocampi tosti sumpti: & urinæ in-  
 continentiam quoque hippocampi tosti, & in cibo sæpius sumpti emen-  
 dant. Alopecias replet hippocampinus cinis, nitro & adipe suillo mixtus,  
 aut syncerus ex aceto. Lichenas & lepras tollit hippocampi & delphini ci-  
 nis ex aqua illitus. Hippocampi necantur in rosaceo, ut perungantur ægri  
 frigidis febribus: & ipsi adalligantur ægris. H

*Buprestis.**Buprestis.**Scarabeus lon-**gipes.**Pityocampa.**Hippocampus.**Scarabeus pi-**lularius.**Coprius.**Lucanus.*

1 Cantharum uocant. Scarabeum pilularium uertit Theodorus, coprius ab Hip-  
 pocrate uocatur. 2 Nomen cornicula dedere. Scarabeum quendam dicit esse Pl-  
 nius, cui sunt cornicula reflexa: an hunc forsitan intelligat, an illum qui Lucanus uo-  
 catur, an alium quempiam? 3 Si super acetum, &c. Quonam modo ita parentur  
 cantharides, docent Dioscorides, Plinius & Galenus. 4 Hippocampus, &c. Nar-  
 rantur à Plinio Nereides à scopis in marmore sculptæ, supra delphinos & ceteros & hip-  
 pocampus sedentes, ut uideatur forsitan hippocampus grandius esse animal. 5 Poti  
 hippocampi, &c. Hippocampi quomodo sint ueneni & iterum quomodo saluta-  
 res, ad canis rabidi morsum, legas apud Aelianum. lib. ii.

- A De crucis, & quæ ex iis gignuntur, ut papilionum generibus, & de pennatis quibusdam aliis quæ ex uermibus gignuntur.

Cap. CCXVII.

- Eruca, dirum uel ipsis arboribus animal: eroduntque aliæ frōdem, aliæ *Eruca.*  
flore: ac depastam arborem turpi facie relinquunt. Nascitur hoc ma- *καμω.*  
lum tepore humido & lento: atque in primis ex rore. Insidet hic uirentibus *Alia, tem-*  
foliis maximæ brassicæ, raphaniue, ut Plinius tradit. Primum minus quid *pore.*  
milio consistit in folio spissatum sole. Mox uermiculi inde contrahuntur &  
accrescunt: deinde intra triduū erucæ parua afformantur: quæ auctæ mo-  
tu cessant, suæque forma immutantur, appellanturque tantisper chrysal- *χρυσαλίς.*  
lides, quasi aurelias dixeris, duro intectæ putamine, ad tactum mobiles, a- *Aurelia.*  
B raneolis quibusdam inuolutæ: non os, non aliud ex membris quod conspi-  
cium sit, possident. Longo post tempore, putamine obrupto, enolant inde  
animalia pēnata, quas *ψύξ.* id est papiliones uocamus. Itaque primū dum *Papilio.*  
erucæ sunt, cibo aluntur, atque excrementum emittunt: at uero cū in chry-  
sallidas dictas transferint, nihil uel gustant uel excernunt. Erucas Ouidius *Eruca.*  
tineas agrestes uocauit, *Tinea agrestis*

Quæque solent canis frondes intexere filis

Agrestes tineæ, res obseruata colonis

Ferali mutant cum papilione figuram:

- Papiliones antennis ante oculos prætensas habent: papiliones & quæcun- *Papilio.*  
que ex erucis orta, sibi colorem à sua eruca trahunt. Sunt & erucæ quæ un-  
C dent ingressu: parte enim innitentes priore, contrahunt sese adduentes po- *πλωίν, το*  
steriorem, arcuatimque incedunt: ex iis generantur quæ uocantur *Acie.*  
*πνία &*  
*πνία,* id est acie & superæ. In brassicæ caule gignuntur uermiculi quidam: *Superæ.*  
ex quibus immutatis orfodacnæ creantur quas mordellas appellem. Erucas *Orfodacnæ,*  
è tithymalo nascentes, aculeatas esse prodidit Hippocrates. Erucis quæ in *Mordella.*  
oleribus nascuntur cum oleo peruncti à uenenatis bestiis feriri negantur: *Eruca tithy-*  
Papilionē qui luminibus accēsis aduolitat, Nicander phalēnam uocat: alas *mali.*  
habet mēbranosas, siccas, & quæ tangenti ueluti cinere aspersæ appareant. *Eruca olerū.*  
Hæc & pfora nuncupatur, & à posterioribus *φωλαία.*  
*καυθλοστίς:* qui lucernarum *φωγ.*  
luminibus aduolat, Aristoteles hepiolum uocat. Papilio, inquit Plinius, lu- *καυθλοστί-*  
cernarum luminibus aduolans, inter mala medicamenta numeratur: huic *στ.*  
D contrarium est iccur caprinum. Hippanis fluuius apud Cimeriū Bospho- *Hepiolus,*  
rum, sub solstitio desert ueluti folliculos acinis maiores, quibus quadrupe- *ήπιον.*  
des uolucres crumpunt: quod genus animalis in postmeridianum usq; dici *Ephemerus:*  
tempus uiuit & uolat: mox descendēte sole macrescit & languet, donec oc-  
cidente moritur, uita non ultra unū diem peracta: unde hemerobion, id est *Hemerobion,*  
diarium appellatum est. Quatuor pēnis totidēque pedibus mouetur: at- *Diarium.*  
que ita simul & quadrupes & uolucres est. Fit ex quodam uerme grandiore  
qui ueluti cornua gemina protendit, sui generis est, primū toto immu-  
tato eruca: deinde quæ bōbix aut bombilis bombiliusue appellatur: ex quo  
necydalus. Quæ uaria formarum successio in sex mensibus completur. Ex  
hoc animalis genere bōbicina illa mulieres nonnullæ torquendo in filum

*Alías, Plinius  
Pamphila Pla-  
tis filia.  
Bombyx.*

deducunt: deinde texunt. Prima texisse in Co insula Pamphila Latoi filia di-  
citur. Bombycas & in Co insula nasci tradunt: cupressi, terebinthi, fraxini,  
quercus florem imbris decussum terræ halitu animante. Fieri autem pri-  
mo papilionum paruos n uodōsque: mox frigorū impatiētia, uillis inhorre-  
scere, & aduersus hyemem tunicas sibi instaurare densas, pedum asperitate  
radentes foliorum lanuginē in uellera: hāc ab iis cogi subigique unguium  
carminatōne: mox trahi inter ramos, tenuari cū pectine: postea apprehē-  
sam corpore inuolui nido uolubili. Tunc ab homine tolli: hētilibusque ua-  
sis tepore & furfurum esca nutriri, atque ita subnasci sui generis plumas,  
quibus uelitis ad alia pēsa dimitti. Quæ uero cōcepta sunt lanificia, humo-  
re lente scere, mox in fila tenuari iunceo fuso. Nec puduit has uestes etiam  
uiros leuitate usurpare, propter onera æstiuā: in tantū à lorica gerenda dis-  
cessere mores, ut oneri sint etiam uestes. Lucent ignium modo noctu late-  
rum & clunium colore lampyrides, id est, cicindelæ, nunc pennarum hiati  
refulgentes: nunc uero compressu obumbratæ (fulgor nanque ille igni simi-  
lis alarum compressu tegitur) non ante matura pabula, aut post delecta cō-  
spiciunt, pygolampidas uocat Aristoteles. Earum aliæ pēnatæ sunt, aliæ im-  
pennæ, non aliter atque in formicis. Erucis enim quibusdā corpore piloso  
non grandi, primum pygolampides fiunt, non tamen uolucres: quibus de-  
inde mutatis, pennigera animalia gignuntur, quos *βοτρυχοί* uocant, hoc est  
cirros. Nascitur uermiculus quidā, cui nomen xilophthoro (ac si ligniper-  
dem appelles). Caput suo putamine exerit uarium, pedes in suprema parte  
cernuntur: reliquum corpus tunica araneosa integitur, suoque tegumento  
hærentes festucas gerit, ita ut forte eas casūque sibi contraxisse dum ambu-  
laret uideatur: uerum ipsæ natiæ hærent tunicæ: & ut limacibus testa, sic  
rotum id uermiculo huic adhæret: nec decidit unquam, sed euellitur ut na-  
tiuum. Quod si hanc eius tunicam detrahas, expirat pari modo, atq; limax  
testa detracta hebetescit: processu utique temporis id quoque in chrysalidē  
transit, ut eruca, atque immobile uiuit. Sed quidnā ex eo animalis pennati  
oriatur, compertum non adhuc est.

*Lampyrides,  
Cicindela.*

*Pygolampidi-  
des, ἢ πυγο-  
λαμπιδες.  
Nitidula.  
Βοτρυχοί.  
Cirrus.  
Xilophthorus.  
Ligniperdis.*

1 Papilionem habet Plinius inter morbos apum (uri suprà diximus) ignauum &  
inhonoratum, qui luminibus accensis aduoliter, apibus nō uno modo pestiferum: sed  
an eundem intelligat cum Nicandri phalæna, considera lector. 2 Aliter. Lucent ue-  
spere per arua cicindelæ: ita appellant rustici stellatæ uolatus: Græci uero lampyridas. H  
3 Erucis enim, &c. Ita legit Theodorus: uerū exemplaria Græca nostra ita habent,  
Erucis quibusdā nigris corpore piloso. &c. 4 Nascitur uermiculus, &c. Plinius  
hoc animalculum in tinearū genere reponere uidetur, sed absque nomine. 5 Pedes  
in postremo habet, uertit Theodorus. (ἰν' ἀκρῶ.)

De Bestiolis quibusdā quæ in lignis aut arboribus nascuntur.

### Cap. CCXVIII.

*Acari.  
Cosses.  
Cossi.*

**I**n ligno gignitur animal candidum, quod omnium animalium esse mi-  
nimum existimatur, nomine acari. Sunt & cosses in uermiū genere qui  
in ligno nascuntur: hos & cossos quoque uocant nonnulli. Vermiculantur  
enim imagis minuscule omnes fere arbores: idque aues, caui corporis sono ex-  
periuntur.

- A**periuntur. Jam quidem & hoc luxuria esse cœpit: pregrandesque roborum  
 delicatiore sunt in cibo, coffos uocant, atque etiā in farina saginati, hi quo-  
 que alites fiunt. Maxime autem arborum hæc sentiunt, pyri, mali, fici: mi-  
 nusque quæ amaræ sunt & odoratæ. Coffes qui in ligno nascuntur, sanant  
 ulcera omnia: nomas uero combusti, cum pari pōdere anisi & ex oleo illiti. *Vermes rubri.*  
 Vermes ex arboribus rubri cū oleo triti, exulceratis & ruptis auribus præ-  
 clare medentur. Eorum autem uermiū qui in ficis existunt, alij ex ipsis na-  
 scuntur arboribus: alios parit qui uocatur cerasstes: peculiare enim est quod *Cerasstes.*  
 de eo notatur quem cerassten appellant. Cum enim uermium magna pars *keresstos.*  
 specie formæ inter se differunt, discrimen tamen præcipuum in his est,  
 quod in alia arbore fructūue pati, translati in aliud genus seruari nequeūt.  
**B** Cerassten autem & in olea nasci, & in fico parere asseuerant. Habet itaque  
 & ficus suos uermes: & illos quoque emittit, quos alienos receperit: omnes  
 tamen in cerassten figurantur, sonūmq; edunt ceu paruuli stridoris. Et sor-  
 bus arbor infestatur uermiculis rufis, pilosis, atque ita emoritur. Mespilā  
 quoque in senectā, obnoxia ei morbo est, uermiculationi scilicet. Aliqui *Voluoces.*  
 uoluocem appellant animal prærodens pubescentes uuas. Inuoluulum uo- *Inuoluulur.*  
 cat Plautus nequam bestiam & damnificam quæ in pampini foliis intorta  
 implicat se eaq; erodit. M. Cicero tradit animalia byturos uocari, qui uites *Byturus.*  
 in Campania rodant. Genus est animalis, inquit Columella, uolucra appel- *Volucra.*  
 latur: id fere prærodit teneros adhuc pāpinos & uuas. Apud erithræos mi-  
 liuntis incolas (inquit Strabo) Ipoctonus colitur, quod ipas, qui uitibus infē- *Ips.*  
**C**stissimi sint, interficiat: nam ex erithræis omnibus solum inter illos hæc be-  
 stiola non gignitur. Olea ubi quercus effossa sit male ponitur: quoniā uer-  
 mes qui ranæ uocantur in radice quercus nascuntur, & transcunt. Anima- *Rana, uermis.*  
 lia quædam exilia in esculis nascuntur, appellanturque galbæ. Materiā ca- *Galba.*  
 sam infestantium quatuor genera. Tereidines capite ad portionem grauissi- *Teredo,*  
 mo, rodunt dentibus, perforantque robora, uel sono teste. Hæc tantum in *Teredon.*  
 mari sentiuntur, nec aliam putant tereidinem proprie dici. Terrestris, tinc- *Tinea?*  
 as uocāt: culicibus uero similes, triphas. Quartum est & è uermiculorū ge- *Thrips.*  
 nere. Hęc Plinius: Theophrastus uero ita habet, Quæ mari putrescere aptæ *Oelid.*  
 sunt, erodi à tereidine solent (teredo enim non nisi in mari enasci potest) *Teredo,*  
 3 quæ autē terra, uermiculis quos *σφάλμας* uocant, & iis quos triphas: est autē *σφάλμας.*  
**D** ipsa teredo corpore parua, capite magno & dētribus. Qui uero thripes dicū- *Σφάλμας*  
 4 tur, uermiculis similes constant, quibus paulatim materies perforatur: sed *Thrips.*  
 hæc curari facile possunt. Nam si offensa materies trahatur in mare, durare  
 nimirum ualet: quæ uero tereidinem senserit, curari hæc minime potest.  
 Vermium autem qui nasci in materie solent, alij putrescente ipsa materia *Σφάλμας.*  
 generantur: alij parientibus aliis uermibus. Pariunt enim uel in cæsa mate- *Vermes qui in*  
 rie uermes (quemadmodum in arboribus, qui cerasstæ uocantur) cum scili- *ligno nascun-*  
 cet tam eroderint atque excauauerint, ut se circūagere possint. Fugiūt uer- *tur.*  
 mes ligna odorata, amara, duræque: quoniā hæc erodere nequeant, ceu bu-  
 5 xum & cupressum. Laricem in maritimis nauibus obnoxiam tereidini tra- *Teredo.*  
 dunt: & omnem materiem tereidinem sentire affirmant præterquam olea-

strum atque oleam, quas amaritudinis causa, neque teredo neque uermicu-  
lus rodit. Dicunt & pinum plusquam abiete corrodi à teredine posse: hanc  
enim esse amaram, pinum uero dulcedinis non nihil habere. *Tinea*, quæ  
græce τῆς uocantur, in lanis & quibusuis lanitio confectis, præsertim pul-  
uerulentis, oriuntur: atque etiam magis si araneus unâ includatur: si quid  
enim humoris inest, hic absorbens exsiccatur. Nascentur autè & in tunicis hoc  
uermiculi genus: & in cera quoque uetusta. Necnon in chartis librisue gi-  
gnuntur bestiolæ perquâ parua, partim similes iis quæ in ueste: partim ue-  
ro scorpionis, sed sine cauda. Gignitur enim in libris bestiola scorpionis simi-  
lis, quæ & chelas brachiæue forcipibus bifulcis dentata habet.

1 Sunt & colles, &c. *κελλυκας* λέγει *Ανδρῶν*, Theodorus Collos uertit. Pascitur Picus  
Martius colliis: Et cum collos uenatur, tam uehementer excauare, ut sternere arbores  
dicatur. Huius generis uermium meminit & Galenus inter alimenta, lib. 3 De alimēt. **F**

2 Theophrastus, &c. Tria tantum genera posuit Theophrastus. 3 Quos Theo-  
phrastus *σφάλμας* καὶ *σπίρας* dixit, Theod. uermiculos & tinea uertit. Plinius: Tinea  
& thripas uocauit. & culicibus similes thripas dixit: thripes etiam uermiculos signifi-  
care uidentur qui radices siccas erodunt: underadices *σπίρας* dicuntur apud Theo-  
phrastum. 4 Nam si offensa materies, &c. Græce ita habetur *παρακινῆται γὰρ  
ὅταν οἷς τῶν θηλαστικῶν ἰλανθῇ*, πύγ. 5 Teredinem, &c. In uestibus quoque & in car-  
ne sunt teredines. Plinius lib. 8. cap. 48 de Seruij Tullij prætextu, Mirum nec teredini  
iniurias sensisse, &c. lib. uero 28. cap. 11. Carnes nullas teredinē sentire, inquit, luna de-  
crescēte induratas sale. 6 In lanis quibusuis, &c. *Tinea lanaria* recte dicitur, ut alte-  
ra lignaria, mea certe opinione.

De nonnullis quæ in aliis stirpibus, aut fructibus creantur,  
bestiolis. Cap. CCXIX.

**N**on in arboribus solum atque lignis aliisque quæ inanima sunt, ani-  
malcula gignuntur specie uaria, sed in fructibus quoque iis qui be-  
stiolas creant (nonnulli enim quia sicci sunt, uel quod amaritudinem quā-  
dam aut acredinem habent, nulla animalia contrahunt) singula pro suo hu-  
more peculiare animal creant: ceu triticum atque ordeum *τῆς κῆας*, id est  
curculionem: fabæ, quod aliqui *μύδαν*: & simili modo lens, lenticula, & pi-  
sum, & alia. De curculione hæc tradunt. In reponendo tritico curat, inquit  
Varro, ne humor aut aer tangere possit, nisi cum promitur ad usum: quod  
enim spiritus non peruenit, ibi non oritur curculio. Sic conditum triticum  
manet, uel annos quinquaginta: milium uero plus annos centum. Pura fru-  
menta, inquit Columella, si in annos reconduntur, repurgari debent: nam  
quanto sunt expolitiore, minus à curculionibus exeduntur. Multi tamen  
frumenta ventilare quoque uetant, quia magis miscentur animalia totis  
aceruis: quæ si non moueantur in summitate intra mensuram palmi, subsi-  
stent: neq; ultra prædictam mensuram noxia animalia posse generari aiunt.  
Et gurgulionem, inquit Plinius, non descendere infra quatuor digitos tra-  
dunt, nec amplius periclitari frumētum. Factis granariis, amurca luto mi-  
sta parietes linuntur: Hæc res, inquit Palladius, gurgulionibus & cæteris no-  
xiis animalibus inimica est. Est in farre uermiculus teredini similis, quo ca-  
uis dentium cera incluso, cadere uiciati dicuntur. Vermiculationem poma  
ipfa

*Tinea, τῆς.*

*Tinea.*  
*οείψ.*

*Tinea lanaria*

*κῆς.*  
*Curculio.*  
*μύδα.*  
*Curculio.*

*Farris uermi-  
culi.*  
*Vermiculatio  
pomorum.*



**A** ipsa per se quibusdam annis sentiunt. mala, pyra, mespila, punica, oliuæ, sed in oliuâ ancipiti euentu: quando sub cute nati uermes, fructum adimunt: augent si in ipso nucleo fuere erodentes eum: caro enim non tangitur. Gigni illos prohibent flatus & pluuia: quæ sunt post æsturum: eadem si austruina fuere, generant. In fruticis cuiusdam pomo cui *κάρκος* nomen est, nascitur bestiola, quæ cum fructus ad maturitatem peruenierit, euolat conopi similis: antea uero quàm maturifcat, fructum colligunt, & animalculi sanie lanas inficiunt. Inueniuntur in gramine uermiculi, qui adalligati collo continent partum. Detrahuntur autem sub partu, aliàs eniti non patiuntur: cauendum etiam ne in terram ponantur: conceptus quoque causa dantur in potu quini aut septeni. Is uermiculus qui in herba quæ Veneris labrum appellatur, inuenitur, cauis dentium inditus, mire prodest ut facile excidant. Sunt uermiculi in spinosis herbis asperi, lanuginosi: hos adalligatos, protinus mederi tradunt infantibus si quid ex cibo hæreat. Galedragon uocat Xenocrates leucacantho similem, palustrem herbam & spinosam, caule ferulaceo alto, cui summo capite inhæreat simile ouo. In hoc excrecente ætate, uermiculos nasci tradunt, quos pyxide conditos adalligari cum pane brachio ad eam partem qua dens doleat, mirèque ilico dolorem tolli. Valere non diutius anno: & ita si terrâ non attigerit. Sicuti thrips lignarius uermis, & cis triticarius uocatur, & ordearius, uti modo diximus: sic ipsi cornicularius, sic uestiarius & ix uitiarius appellatur, ut Phocion author est.

**I** De curculione. Populârque ingentem farris aceruum gurgulio, inquit Vergilius: Cidem opinor qui curculio. *Gurgulio.*

De bestiolis quibusdam, quæ in igne, niue, aut terra ipsa gignuntur.

Cap. CCXX.

**I**N Cypro insula ætariis fornacibus, ubi chalcites lapis ingestus pluribus diebus crematur, bestiolarum in medio igne nascuntur pennatæ: paulo multis grandioribus maiores, quæ per ignem saliant atque ambulant. Volat pennatum quadrupes, inquit Plinius, appellaturque pyralis, à quibusdam pyrausta. Quandiu est in igne, uiuit: emoritur autem hoc genus, cum ab igne dimotum est, longiorèue paulo uolatu euasit. At uero aliis pyrausta, cum flamma uel maxime uiget, aduolat: atque delapsus uiuus comburitur. In niue uetustiore gignuntur uermes qui & hirti sunt & rubidi: quoniam & ipsa nix uetustate rufescit. In alia etiam niue & candidi & grandiores inueniuntur. Torpent omnes, ac difficulter mouentur. Emoritur & hoc genus si à niue dimoueatur. Apollonides *σκολιαντες*, id est uermes. Theophrastus *βερμς*, bestiolas uocauit in niue prognatas, in quibus & aquam puram & potabilem inueniri tradunt. Nec aliter in niue hæc animalcula procreari quàm in fornacibus metallicis *κέρκας*, id est culices, ut uocant, ex flamma & scintillis. In luto, humescentèque humo sponte proueniunt, quæ *γῆς* & *γῆρας*, id est, intestina terræ uocantur; & uermes terreni atque lumbrici. Vermis hæc habent naturam, corpus uero anguillarum: oculi his nulli. Ita ingrediuntur, ut præcedente parte priore, quod reliquum est corporis ad illam contrahant, atque hoc pacto ex uno loco in alium feruntur. Oriuntur autem

*Cocci uermiculus.*

*Vermiculi graminis.*

*Thrips.*

*Cis.*

*Ips. Sû, Zû.*

*Ips, ut Strabo*

*niplacet, uiti-*

*rius est uermi-*

*culus.*

*Bestiola i igne genita.*

*Pyralis.*

*Pyrausta.*

*Pyrigon.*

*Vermes in niue.*

*σκολιαντες, orispi*

*κέρκας ex*

*igne.*

*γῆς γῆρας.*

*Intestina terra*

*Vermes terre-*

*ni.*

*Lumbrici.*

tum in mari, cum etiam in fluuiis stagnisque, putredinis maxime ratione, E sed in mari qua algæ fiunt in stagnis autem & fluuiis iuxta ripas. Terreni uermes tritici præcisos nervos glutinant impositi: uulnera uero recetia adeo conglutinant, ut nervos quoque abscessos illitis, solidari intra septimū diem Democritus persuaserit: itaque in melle seruandos censet. Cinis eorū margines ulcerum duriores absumit cum pice liquida uel simblilio melle. Quidam arefactis in sole ad uulnera ex aceto utuntur: nec soluūt nisi biduo intermisso. Igni sacro terreni uermes ex aceto illiti medentur. Capilli ne canescant, eorum cinere præstari, admixto oleo tradunt. Ad aurium uitia uel deplorata, terreni uermes adipe anseris decocti infunduntur. Ad dentium dolores in oleo decocti, infusi que auriculæ cuius è parte doleant, præstant leuamentum: uel si in contrariam aurē instillantur, uti docet Dioscorides. Eorundem cinis exsiccatis dentibus coniectus, ex facili cadere eos cogit: integros dolentes illitus iuuat: comburi autem oportet in testa. Profunt & cum mori radice in aceto scyllite decocti, ita ut colluantur dentes: uermes terreni illiti in ceruices & scapulas, ne nervi doleant, præstant. Gravidis secundas pellunt in passo poti. Idem per se impositi mammarum suppurationes concoquunt & aperiunt extrahuntque, & ad cicatricem perducunt. Lac deuocant poti cum mulso: podagras lenit eorum cinis cum melle, ita ut tertio die soluantur: & pernionibus imponitur eorum fauilla cum oleo. Clauos pedum sanant uermes terreni ex oleo. tritici & ex passo poti urinā ciunt. Iubent & uermes terrenos bibi ex uino aut passo ad comminuendos calculos. Morbo regio resistit in aceto mulso cum myrrha: tertianas discutunt decocti cum anserino adipe & illiti. Multa & alia ex his remedia sunt, propter quæ in melle seruantur. G

*Iuli, ιουλος.*

1 Pyralis, &c. Pyrigona hunc uocat Aelianus. 2 τῆς ὀνύχα, &c. Iulos uocat uir hos Numenius. 3 Corpus, hoc est corporis formam, opinor.

De bestiolis quibusdam, quæ intra animalia aut eorum partes gignuntur. Cap. CCXXI.

*Lumbricus, ἑλμῖς.*

**I**N excrementis adhuc intra animal contentis oriuntur lūbrici, (ἑλμύνθες Græci uocant) aliorum uermium more, qui ex putredine ortum habent, ex cruda scilicet & crassa pituita. Tria horum genera, latum, teres, & quod ascarida appellatur. Sunt porro ascaridæ paruuli quidā lumbrici, qui parte potissimum inferiore plenioris intestini, quæ podici proxima est, gignuntur, uehementem pruritum loco afferentes: apparentque plurimi in iumentis qui male cibum concoquunt. Sentiant hoc malum homines præcipue ante pubertatem: uehementioraq; medicamenta ad earum curationē desiderant, quàm lumbrici teretes. Ex ascarida nihil aliud procreari potest: latum autem genus solum intestino adhærens, parit simile cucumeris semini: quo indicio medici id genus lumbrici inesse intelligunt. Est uero latū illud genus ueluti pellicula intrinsecus intestina cōtegens, in corpus quoddā uiuum permutata. Longissimus hic lumbricus, & qui sæpe per tota protenditur intestina. Egeriturque nonnunquam integer, tricenum pedum, aliquando

*Ascarida, Ἀσκαρίδης.*

*Lumbricus latius, ἑλμῖς πλάγιος, ὡς αἰτέριον.*

A quando & plurium longitudine. Nonnunquam particulatim eicitur. Dicitur & *καρία* & *πυρία*, quod fasciis insititue similis sit. Rarior hic uisitur. At *καρία*, lumbricus teres frequentior, ac proinde nulli non cognita forma eius est. *Ταρία*. In superioribus maxime intestinis gignuntur teretes adeo, ut ad uentriculum ipsum nonnunquam ascendant, & per os quandoque aut nares effertur. In pueris multi, & frequentius quàm Ascarides procreantur: faciliusq; medicamentis amaris deiciuntur quàm alij. In cruribus frequenter, nonnunquam uero & in brachiorum musculis, lateribusque ipsis nascuntur uermes qui dracunculi uocantur: specie terre uermibus similes, quãdoque magni, nonnunquam uero minores. In Æthiopia Indiãque, & quæ supra Egyptum sunt locis, frequentius hoc malum contingit. Estque eorum generatio lumbriciuentris quos latos uocant, non dissimilis: sub cute nãque mouentur uiui, nihil dum afferentes molestiæ: procedete deinde tempore, ad alterum eius finem suppuratur locus, cutisque aperitur, & dracunculi caput exeritur: quem si in curando traxeris, dolor uehemens excitatur, præsertim si intra trahendum rumpatur dracunculus: quod enim relinquitur dolores affert molestissimos. Hæc Leonides. At Soranus animal esse dracunculum hunc negat: sed neruofam quandam substantiam esse affirmat, quæ non mouetur, sed motum quandam habere uidetur. Est uermiculus in lingua canũ, qui uocatur à Græcis lytta: quo exemplo infantibus catulis, nec rabidi fiunt, nec fastidium sentiunt. Quem infestat uermiculus, qui in ipso discrimine ungulæ nascitur, cum idem locus tuberculum habet, cuius media fere parte, canino similis extat pilus, eique subest uermiculus. Ferro caustissime tuberculum circumsolari oportet, ne dum amputatur, etiam quod infra est animal uulneremus: id enim cum sauciatur, uenenatam sanie mittit, qua respersum uulnus insanabile facit, ut totus pes amputandus sit. Piscibus (ut supra dictum est) innascuntur quædam minuta animalia quæ partum expellunt. Narrant & bestiolas quasdam uelut lumbricos intra spongas consistere atq; ali, quos & euulsis spongiis pisciculi saxatiles deuorant.

1 Intra animal, &c. Intestinorum animalia uocat hæc Plinius. 2 In iumentis qui male, &c. Solent uiculis, inquit Columella, nocere lumbrici, qui fere cruditatibus nascuntur. 3 Dicitur & *καρία* & *πυρία*, &c. Plinius: Tineam uocat, nisi codices sint mendosi: pro tænia.

D De iis quæ carnis uiuæ humore aluntur, ut pulice, pediculo, rincino, & similibus. Cap. CCXXII.

QVæ ex numero insectorũ, non carne uiuunt, sed carnis uiuæ humore aluntur, ut pediculi, pulices, cimices: hæc per coitum generant ea quæ lendes uocantur, ex quibus nihil præterea nasci potest. ex iis enim neque ea quæ generarint, proueniunt, nec aliud ullum animal: sed id quod sunt, sordes tantum persistunt. Vnda maris lendes capiti deducit iniquas, inquit Serenus. Gignuntur pediculi in uiuentium hominum capillo (ueluti in capite) non in superficie ubi furfures consistunt, sed in profunda cute, ex humoribus quibusdam calidioribus quidẽ, sed qui minus acres sunt. Pediculi etiam ex ipsa carne oriuntur, quibus futuris emergunt ceu pu-

stulæ quædā sine pure exigua, quas si pungas pediculi exeunt. Accidit moribus hic nonnullis hominibus præ nimio corporis humore : & quidem aliquos hac fœditate obiiisse proditum est, ut Alcanem poetam : Pherecidē Syrium, & Scyllam præterea dictatorem. Diodorus pediculos facere ocy-mi cibum prodidit. Gignuntur & ex uestis genere pediculi: sunt enim ouiu quas lupus occiderit uellera, & facta ex his uestis, longe quàm cætera aptiora ad pediculos procreandos. In quibusdam item morborum generibus, copia nascitur pediculorū. Genus pediculi serum uocatū est, durius eò quòd in plurimis gignitur, & corpori detrahi difficilius. Pueris pediculi in capite magis proueniunt, uiris minus: omnino fœminæ magis quàm mares pediculum sentiunt. Quin & ex cæteris animalibus complura pediculo infestantur, ut aues: & phasianæ quidem ex eis intereunt, nisi se puluerēt. Pilos habentium, asinum tantum immunem hoc malo credunt: qui non pediculo tantum, uerum etiam ricino immunis est. Boues utrunque id habent: oues & capræ ricinos habent, pediculis uacant: suibus quoddam pediculi genus grande ac durum familiare est: canibus propriū est ricinus, qui ab eodē animalī nomē cynorrhæstæ accepit. Est uero ricinus (κρότων. Græci uocāt) animal, ut inquit Plinius, fœdissimū, infixo semper sanguini capite uiuens atque ita intumescēs, unum animalium cui sibi non sit exitus, dehiscitque nimia facietate, alimento ipso moriēs, cum diutius in fame uiuat: septenis ita diebus durasse tradunt: at in facietate paucioribus dehiscere. Nunquam in iumentis gignitur: in bubus frequens: in canibus aliquando: in quibus G omnia: in ouibus & capris hoc solum. Genus unum quodque pediculi ex corpore ipso sui animalis enascitur. Proueniunt largius pediculi mutatione aquarum, quibus lauare se solent ea quotum natura pediculum patitur. In mari etiam pisces hoc malum infestat: uerum nō in piscibus ipsis, sed in limo gignitur simile a fellis multipedibus, nisi quod caudam hoc ampliusculam habeat. Genus pediculi marinum unum est ubique proueniens: sed maxime in foraminibus & cauernis. Quibusdam uero piscibus ipsis innascuntur, quo in numero chalcis accipitur. Vocant & in mari pediculos, inquit Plinius, eosque tritos instillari ex aceto auribus iubent. Item, rigor ceruicis mollietur cum marinis qui pediculi uocantur, drachma una pota. Pisces uel manu caperentur dum dormiunt, nisi pediculis & pulicibus appellatis sollicitarentur: nunc uero si somno dati immorentur, noctu ab innu- H mera multitudine illarum bestiolarum occupati absumerentur. Gignuntur hæ in profundo maris tanta fœcunditate, ut etiam escam de pisce emolitam, si diu in imo manserit, totam corrodat atque absumat. Et quidem sæpenumero piscator escam demissam, glomeratis undique his bestiolis, perinde ut pilam recipit. Habent thunni & gladij circa canis exortum circa pinna, ceu uermiculū quem æstrum uocant, effigie scorpionis, magnitudine aranei. Infestat hoc tāto dolore, ut interdum gladius ē mari exiliat: unde fit ut sæpenumero in nauigia incidat. Pulices minima quadam putredine gignuntur: sed eiq; sui ortus, sordes obtinent aridas. Lendes procreāt 5 oui speciem referentes: crura habēt posteriora mediis longiora, quibus sa- 6 liunt.

*Pediculus ferus.*  
*Φθὶρ ἀγριος.*  
*Pediculorum genera.*

*Cynorrhæstes.*  
*Cynomya.*  
*Ricinus.*  
*κρότων.*

*Pediculus marinus.*  
*Φθὶρ θαλάσσιος.*

*Pulex marinus.*  
*Ψύλλα θαλάσσιος.*

*Oestrus.*  
*Σιγρος.*  
*Asilus.*  
*Pulex, Ψύλλα.*

**A**liunt. Cimices genus animalis foetidissimum, & dictu quoque fastidiendū, *Cimices.*  
 ut inquit Plinius, ex uapore quodā humidior ab animalium corporibus *K: par.*  
 foris collecto gignūtur. Cimices qui in lectis nascuntur, acri facultate præ-  
 diti sunt: & cum uino aut aceto epoti, adhærentes hirudines abigere dicun-  
 tur. Fabarum cauis inclusi profunt, si ante accessionem septeni deuorentur,  
 iis qui febre quartana laborant. Percussis uero ab aspidē, etiam citra fabas  
 sumpti: olfactu, strangulationibus uulū concidentēs reuocant. Triti & u-  
 rinariæ fistulæ impolitæ, urinæ angustiam quam disuriam dicunt, leuant.  
 Hæc Dioscorides. De cimicibus, inquit Galenus, prodidere nonnulli, quod  
 si ex aceto bibentur, hirudines epotas eiiciāt: nobis uero, cum eas perpetuo

**B**ex allij esu abegerimus, minime opus cimicibus fuit. Quæ de cimicum na-  
 tura dicuntur (ut Plinius refert) tanta authorum assueuatione cōmendā-  
 tur, ut quauis pudenda dictu, ea præterire fas non sit. Hæc contra serpen-  
 tum morsus & præcipue aspidū ualere dicitur: item contra uenena omnia:  
 argumento quod dicunt gallinas quo die id ederint, nō interfici ab aspidē:  
 carnes quoque earum percussis plurimum prodesse: ex iis quæ tradunt hu-  
 manissimū est, illinere morsibus cum sanguine testudinis. Item suffitu co-  
 rum abigere sanguifugas adhærentes, haustāsque ab animalibus restinguere  
 in potu datos. Quanquam & oculos quidam his inungunt tritis cum sale  
 7 & lacte mulierum: aurēsque cum melle & rosaceo ammixtis. Eos qui a *Cimices agre-*  
 gresses sint & in malua nascātur, crematos cinere permixto rosaceo, infun- *des.*  
 dunt auribus. Cætera quæ de his tradunt, uomica & quartanarum reme-  
 dia, aliorūque morborum: quanquam ouo, aut cera, aut faba inclusos cē-  
**C**sent deuorandos, falsa nec referenda arbitror. Lethargi tamē medicina: cū  
 argumento adhibent, quoniam uincatur somnifica uis, septenos in cyathis  
 aquæ dantes, puerilibus annis quaternos. Et stranguriæ fistulæ imposuere:  
 adeo nihil illa rerum omnium parens, sine ingentibus causis genuit. Cimi-  
 cibus aduersatur scolopendra, suffitūque necat.

1 Carne oriuntur. Nascuntur quoque, inquit Plinius, in sanguine ipso hominis a-  
 nimalia exesura corpus. Pustulæ, *10: des.* 2 Cynorrhæstæ, à quibusdam cynomyz di-  
 cuntur, ut notat Hermolaus. 3 *κρότων* Theodorus redium uocat, forsitan ex  
 Columellæ autoritate lib. 6. Verum considerandum ne deprauata sint quædam Co-  
 lumellæ exemplaria, rediui pro ricini habentia, uti in aliis legitur. 4 Crotones

**D**in gramine oriuntur, inquit Aristoteles. An idem sit animalis genus an corrupta sit *Rediui.*  
 litera? 5 Sordes aridas, *u: des. fues.* Generantur sordibus aridi soli, inquit Plinius: in  
 quibusdam exemplaribus Plinianis, non aridi soli, sed à radiis solis, legitur. 6 Pu-  
 lex apud Columellam in horto, pro uermiculo aut eruca quadam accipitur, herbas *Pulex.*  
 erodente. 7 In malua, &c. Plinius. E malua cimices infundūtur auribus cū rosaceo. *E malua cimi-*  
*des.*

De blattis.

Cap.

CCXXIII.

**H**oc quoque animal inter pudenda est: sed propter admirationem na-  
 turæ pilcorūque curam, totum in hoc loco explicandum. Tenebra-  
 rum alumna: blattæ sunt, lucēque fugiunt: in balneis maxime humido *Blattæ.*  
 uapore prognatæ. Est quædam pinguitudo blattæ si caput auellatur: hanc *z: in qu.*  
 tritam unā cum rosaceo, auribus mire prodesse dicūt: sed lanam qua inclu- *Alias, prijs co-*  
*rumque cura.*

serint, post paulum extrahendam. Celerime enim id pingue transire in animal, huius uermiculum: alij binas ternasue in oleo decoctas efficacissime auribus mederi scribunt, & tritas in linteolo imponi contusis. Blattæ quæ in pistrinis inueniuntur (ut scribit Dioscorides) interanea trita cum oleo aut decocta, aurium dolores instillata mitigant. Galenus totum animal in oleo coctum hæc efficere nonnullos affirmare prædicat. Plura earum genera fecerunt: molles, quas in oleo decoctas uerrucis efficaciter illini experti sunt. Alterum genus, mylæcon appellauere, circa molas fere nascens. Hæc capite detracto attritas, lepras sanare Musa & Picton in exemplis reliquerunt. Tercium genus, & odoris ædio inuisum, exacuta clune, cum pissileo sanare ulcera tradunt, aliàs insanabilia: strumas, pauos, diebus xxi impositas, percussâ, conuulsâ, cacoëthe, scabiem, furunculósque detractis pedibus & pennis. Nos etiam hæc auditu fastidimus: at Hercule Diodorus & morbo regio & orthopnoicis restitisse tradit cum resina & melle: humanissimi eorum, cinerem crematarum referuandum ad hos usus in cornea pyxide censuere: aut tritas clysteribus infundendas orthopnoicis aut rheumaticis. Infixa utique corpori illitas extrahere constat. Cunilago tertium genus est quæ à Græcis mascula, è nostris cunilago uocatur: manipulo eius abiecto, omnes etiam à tota domo blattas conuenire ad eam tradunt. Est similis uerbasco herba quæ sæpe fallit pro ea capta. Hæc abiecta, blattas in se contrahit: ideoque Romæ blattariam uocant: & insectorum quidem ratio talis est.

*Reg. Græci.*

Blattæ. *reg. Græci.* Blattas interpretatus est Theodorus. Verum eo in loco mendosa esse opinor exemplaria Græca. Neque *reg. Græci* eo in loco, neque *reg. Græci* legendum censet Hermolaus, sed *reg. Græci*, ut sit sensus *reg. Græci* in brassica gigni apertum est, quæ & ipsæ pennatæ sunt. Vocantur autem prasocurides (ut ille ait) uermiculi porros, brassicam, lactuæque infestantes, & alia quædam olerum. 2 Mylæcon, aliàs mylacin.

*Mylacin.*

G



# A DE ANIMALIVM DIFF- FERENTIIS LIBER X.

Continet exanguium aquatiliū differentias, scilicet mollium, crustaceorū, testatorum, & quę zoophyta appellantur, quę omnia à nonnullis etiam piscium nomine uocantur.

De his quę mollia dicuntur.

Cap. CCXXIII.

B



Equitur natura molliū, Græci *μαλακία* & *μαλακίαι*, nos mollia appellamus animalia quę sanguine carent, & foris carne cutēq; ut homines, molli obducta, solidum intus, modo sanguinei generis continent, quale sepia est. Partes eorum quę mollia nominamus, exteriores, pedes uulgarī nomine, siue brachia, barbę aut cirri: Græci *πλακταίαι* dicūt: & iis adiunctum caput: tum alueus siue sinus ( *λύττος* Græci dicunt) corporis ipsius molē

*Mollia:*

*μαλακία*

*μαλακίαι*

*Brachia.*

*Barbæ.*

*Cirri.*

*πλακταίαι*

complectens, quem pinnulę ambiunt in orbem: caput cum nonnulli minus recte appellarunt. Caput uero omnibus contra quā ceterorum animalium inter crura. A polypo differunt cetera mollia, eo quod alueus polyporum paruus breuīque & crura pręlonga, ceteris ediuerso, alueus amplius & procerior, crura breuia, ita ut potestas nulla sit ingrediēdi: sunt itaq; crura omnia in priore corporis parte, circum caput, infra oculos, circa os & dentes. Sed cum cetera animalia, quibus pedes, aut parte priore postero

reque eos habeant, aut latere, ut ea quę multis pedibus innituntur & sanguine carent, hoc unum genus pedes parte, quam priorem in eo capimus, omnes continet. Pedes octoni omnibus, modo tamen dissimili: sepię enim atque lolligines pedes habent supra dentes senos exiguos & breuiiores, eorūque nouissimos duos maiores: reliquos autem octonorum duos infra dentes, omnium maximos: polypus longos obtinet, & medios quatuor habet maximos. Promuscides habent binas pręlongas & asperas sepię & lolligines, quibus ueluti anchoris innitantur, seque stabiliant, ne æstu maris tempestatęque exturbentur saxis: utque de longinquo cibum ori admo-ueant: at iis polypi carent, quoniam pedes ad eundem usum commodos habeant. In cruribus geminum habent acetabulorum ordinem, à capite in extremos usque cirros cetera omnia præter unum polypī genus quod hēledona uocant: quod unum ex mollium numero simplicem acetabulorum ordinem habet. Caput omnibus (ut modo diximus) inter crura continetur. Huius pars os est, in quo dentes duo. Lingua nullis in hoc genere data est: sed pro lingua carnosum quiddam, quo uice linguę utuntur: quo scilicet uoluptatem esculentorum discernant. Supra hæc oculi bini grandiusculi:

quibus discrimen exigua quædam præstat cartilago continens cerebrum B  
 paruulum. Fistulam ante alucum, supra caput & brachia gerunt, qua mare i  
 transmittunt, quantum suo admiserint aluco quoties ore aliquid capiunt,  
 eamque modo in dextram partem transferunt, modo in sinistram. Et hac  
 eadem fistula polypi suum quoque atramentum fundere assolent. Pinnu-  
 lam habent hæc omnia circundantem alucum, ut narent & se dirigant,  
 (quemadmodum pisces sua cauda pene cartilaginata) sed non omnia codé  
 modo. Natant mollia tum pedibus ipsis tum pinnis. Quantum uero ad in-  
 teriora atinet, omnibus mollibus cerebrum datum est: quod tamen mini-  
 me cerebrum dicitur, nisi per proportionē. os gula excipit angusta & lon-  
 ga, quam sequitur *πύλωσις*, id est, ingluuies ampliuscula, non absimilis aui-  
 bus: cui iungitur uentriculus tanquam abomasum, forma clauiculæ bucci- F  
 norum. Intestinum ab eo tenue (quod crassius tamen quàm gula est) partē  
 repetens superiorem, ad locum fertur ori uicinum, sed paulo infra: sunt nā-  
 que in hoc mollia turbinatis similia. finis enim ad principia flectitur, con-  
 trario quàm in omnibus aliis modo, ut in descriptione conspicitur. Visce-  
 ra mollium nullis, sed habent quam *μύτην*, id est mutem appellant: & præ-  
 terea atrum quendam humorem habent sibi peculiarem, cui nomen *χίλος*,  
 id est atramentum, tunica contentum membranea, quod plurimum in se-  
 pia est. Et hoc sane præsidij salutisque gratia possident: effundunt enim suū  
 id atramentum omnia metu percussa, sed præcipue sepia. hoc enim effuso  
 humore, aquam infuscant, sibi que nigrorem uelut septū præponunt & tur-  
 bulentiam, quasi quo se abscondant. Accrescitque hic humor denuo post- G  
 quàm emiserunt, ut nunquam copia desit atramenti. Mutis in mollium ge-  
 nere, id est, quod ei parti proportionatur, quæ in sanguineo genere cor ap-  
 pellatur: id membrana continetur humidū, sub ore, & per eam gula in uen-  
 trem pertendit, ad mota potius tergo. At uero atramentum infra contine- 3  
 tur, tunica etiam contentum membranea: polypis quidem & lolliginibus 4  
 prope mutim potius positum, sepia uero infra ad aluum & qua intestinū  
 petere incipit superiora: meatūque suum eadem obuolutum habet mē-  
 brana qua intestinum: atque idem foramen emittendi atramenti extremē  
 ti que est: ea scilicet parte quæ fistula uocatur, quæ in spinis posita est. Ha-  
 bere scēminas omnes in hoc genere membrum uuluale apertum est: mem-  
 branas scilicet in quibus oua tanquam in uulua continentur. habent enim  
 ouum primo indiscretum, mox discretum in plura: & pariunt omnia im- H  
 perfecta more ouiparorum piscium. In sepiis & lolliginibus uulua ita arti-  
 culata est, ut bifida cernatur: at polyporum ouum simplex uidetur, ob uteri  
 formam, quæ specie rotunda conglobatæque est. Differunt scēminæ à ma-  
 ribus, quod in mare meatus quidam subditus gulæ à cerebro in ima aluei  
 pertendit, idque ipsum ad quod fertur speciem mammæ imitatur: in scēmi-  
 na duplex idem illud supràque positū habetur. utroque tamen in sexu cor-  
 puscula quædam subrubra parti eiusmodi subiuncta spectantur. Mollia se-  
 re tota carnosa & tactui cedentia sunt: nihil enim ossis, nihil fere terreni ha-  
 bere discretum uidentur, quod dignum effatu sit: ne tamen corpus eorum  
 facile



*Μύτις.*  
*Μυτίς.*  
*Ούλος.*  
*Ατράμεντιον.*

*Μυτίς.*  
*Μύτις.*

*Ατράμεντιον.*  
*Ούλος.*

A facile pereat, naturam inter carnem & neruum obtineat. mollis enim ut caro, sed intēdi potest ut neruus. Filialis autem caro eorum est, uerum nō per directum, sed in anfractum: cutēque omnibus intēcta est, uti modo dictū est: quādam etiam ueluti capillamenta in corpore omnium habentur. Sepiæ quoque & lolligini & lollio partes duræ ac solidæ intus per dorsum & corporis prona continentur, quas non eodem appellant nomine: sed quod inferius sepiis est, sepium uocāt, quod lolliginibus & lollis, *ἰσος*, id est, gladiolum, uti infra explicabitur. At polypis nihil huiusmodi solidū intus, sed circa caput cartilaginofum quiddam est, quod senescētibus indurefcit. Mollia omnia eodem modo cocunt: oribus enim inuicem admotis, complexūque mutuo brachiorum libidinē explent. sic enim coniungi necesse est, quoniam natura exitum excrementi prope os insecēdo adduxerit, ut antea dictum est. Pariunt ea sui corporis parte, quæ fistula dicitur, qua & coire ea nonnulli arbitrantur. Polypi in terram uerso capite cocūt: reliqua mollium tergo, inquit Plinius, ut canes. Verno tempore pariunt, & sepiæ in primis. pariunt autem oua imperfecta: quæ ut tucantur, plurimum lentoris unā cum foetu emittunt. augentur oua omnium, & accrescunt more uermium. Ouum habent omnia candidum, quod tempore arenidum euadit, ueluti & illud quod crustata edunt. Sed cum genus omne crustatum sibi iuncta contineat oua, itaque foueat, polypus & sepiæ & reliqua generis eiusdem, oua quæ pepererint, absoluta fouent. Huius generis mas sub partu oua quæ foemina ediderit, persequitur suum semen aspergens: reddunturque eorum oua tanquam glutino coherentia, (id quod non nisi in sepiis uisum adhuc est, uerum in reliquis eiusdē generis id fieri ratio est): & quæ uitale id uirus contigerint, ex iis enascuntur animalcula, quemadmodum de piscibus dictum est. Mollia sensibus prædita esse omnibus constat: iam enim sepiæ & polypi odore escarum allectati capiuntur: neque eisdem saporibus omnia delectantur. E genere mollium nullum est, quod uel uocē uel sonum emittit naturalem. Mollia omnia carniuora sunt, & sola carne uescuntur. Lolligines nanque atque sepiæ pisces uel maiores euincunt. Polypi conchulis maxime uescuntur. Præstant mollia cum grauida sunt, ut lolligines, sepiæ, polypi. Duræ carnis hoc genus est, concoctu difficile, nonnihil falsedinis particeps. At si probe concoquatur uberius alimētum corpori præbet, sed crudi humoris plurimum creat: succūque crassum & tenacem. Venerem concitare mollia in cibo, prodidit Diocles, maximo uero polypos.

1. *Fistulam, &c.* Videtur Theodorus in hoc Aristotelis loco, atque etiam Plinius, fistulam hanc polypo tantum tribuere, & sane perobscure pronuntiat hæc Aristoteles: sed longe aptius eadem in lib. de respiratione explicat, ubi aperte mollibus omnibus fistulam ante cerebrum inesse ostendit. 2. Hunc humorem pro sanguine his inesse sentit Plinius. 3. Admota potius tergo, *πρὸς τὰ πρὸν μαλλόν*. 4. Contineatur tunica, &c. Tunicam hanc in polypo *μύκων* uocat Athenæus.

*μάκων*.

De polypo.

Cap. CCXXXV.

POLYPUS ē molliū genere animal, ab aliis mollibus hoc præcipue differt, quod eius alueus (quem caput polypi uocāt nonnulli) paruus est & cru-

*Πολύψυς.*  
*Πολύψυς*.

ra prælonga: cum cæteris ediuerso, alueus amplus est, crura breuia. Hæc po E  
 lypo, ut & aliis, octona (sed quatuor quæ in medio sunt maxima) quibus ma  
 num loco pedumque utitur. Nam duobus quæ supra os sita sunt, cibū ori 2  
 admouet: ultimo uero, quod & acutius & solum albicās est, & parte sui ex  
 trema bifurcatum dorsoque adnexum in coitu utitur. Polypus enim mas,  
 ut nonnulli affirmant, in hoc suo brachio, in quo duo amplissima habentur  
 acetabula, id gerit quod genitalis speciem refert: quod quasi neruo constat  
 album, porrectum ad medium usque brachium. Promuscide carent poly-  
 pi, quoniam pedes ad eundem usum commodos habet. Pinnulam quæ al-  
 ueum circumdat parua habent minimèque conspicuam. Fistula his caua, 3  
 ut & aliis in anteriore aluei parte sita supra brachia geritur. Caput polypo  
 quādiu uiuit prædurum est, & quasi inflatum. Tangunt ac tenent brachiis  
 supinis: membranamque pedibus interiectam totā extendunt. Polypis ni- F  
 hil solidum intus, quemadmodum sepiis sepium est, sed circa caput carti-  
 laginosum quoddam est, quod senescentibus durefcit. Membranam illam  
 quæ atramentum polypi continet, *μύκων* uocāt quidam: quæ in polypo su-  
 pra uentriculum apud mutim sita est: continet humorem in se nō nigrum  
 ut in sepiis, sed subrufum, quo, ut diximus, in metu utitur. Mas à femina  
 discrepat eò quòd capite est productiore: & quod genitale piscatores appel-  
 lant albidum illud suo in brachio continet. Vescuntur maxime conchylio-  
 rum carne polypi, quorum conchas complexu crinium frāgunt: quo fit ut  
 eorum cubilia cognoscant qui uenantur, congerie testarum. Treblius quo-  
 que Niger prodidit, auidissimos esse concharum polypos: illas ad tactum cō  
 primi præcidentes brachia eorum. Insidiantur ergo polypi apertis, impossi- G  
 tōq; lapillo extra corpus, ne palpiratu eiiciatur, ita securi grassantur, extra-  
 hūntque carnes: illæ se contrahunt, sed frustra discuncatæ. Tanta solertia  
 animalium hebetissimis quoque est. Hyeme tempestuosa in cauemis lati-  
 tat polypus, & crura sibi ipsi erodit, ut tradit Oppianus. Aristoteles autem  
 falso hoc à nonnullis creditū affirmat. id enim à congris euenit ei: nam cō-  
 gri polypos superant & edunt: unde fit ut aliqui capiantur qui brachia à cō 4  
 gris corrofa habeant. Polypi odore escarum allecati capiuntur: ita enim  
 quandoque adhærescunt, ut auelli inde non possint, sed truncari porius pa-  
 tiātur: at uero pulicaria herba admota, protinus ab odore eius resilire dicū-  
 tur. Fronde quoque oliuæ capitur polypus: & in terrā oliuæ desiderio egre-  
 ditur. Polypis coitus cum alter capite uulgo appellato in terram uerso ni- H  
 tibundoque explicat, porrigitque sua brachia, alter superuenit, passisq; bra-  
 chiis singulis ad singula subiacentis acetabulorum complexu mutuo adhæ-  
 rescit. Marem nonnulli aiunt gerere, quod genitalis specie referat uno bra-  
 chiorum, uti modo diximus, in quo duo amplissima acetabula habentur:  
 idque quasi neruo constare, porrectum ad medium usque brachium con-  
 firmant: totūque nari feminae adnecti. Hyberno tempore coit polypus,  
 uerno parit. Latet circiter menses duos. Ouum edit uel in cubili suo, uel in  
 figulino, simile labruscæ racemulis, aut fructui arboris populi albæ: quod  
 foris quidem unū, simplexq; incomptum & grande est: intus humore can-  
 dicantē

Μύκων.

Alias, comple-  
 xum crurum.

**A** dicantem concolorem totum, atque æquabilem continēs. Perquam fecūdum hoc animal est: nam de eo quod ediderit, copia innumera prouenit: 5 Tantæque fecunditate pendent oua per cubile, ut collectis uas impleatur longe amplius quàm caput sit quo continebantur. Polypus scemina modo incubat ouis, modo in ore sui cubilis assidens, brachium super oua exporrecum tenet: uel ut Plinius refert, modo in cauernis sedet, modo cauernam cancellato brachiorum implexu claudit. Polyporū itaque ouis diebus post quinquaginta maxime ruptis, polypuli modo arancorum perquam multi exserpunt, quorum natura sigillatim nondum in omnibus membris cōspiciua est, quanquam forma satis nota apparet: sed ob exiguitatem imbecillitatemque copia interit. Iam nonnulli adeo spectantur exigui, ut nulla par-

**B** tium consistit distinctione, quanuis ad tactum moueantur. Dum fouet polypuli oua, deterrimi efficiuntur: haud enim pastum prodire patiuntur. Bicinio non amplius uiuit polypus magna ex parte: sua enim natura tabi obnoxius est: indicium autem ne bimatum compleat esse uidetur, quod ab ortu eorum (qui æstate fit) ad autumnum, non facile grandem polypum uideris, cum paulo ante id tempus prægrandes spectentur: à partu ita senescere debilitarique tam marem quàm feminam ferunt, uel ut à pisciculis deuorētur, & facile à suis detrahantur cubilibus: cum antea nihil tale his usu eueniat: tum uero paruos nouellōsque quanuis recens natos, tamen nullo eiusmodi malo affici narrant: quinimo ualidiores esse quàm grandes confirmant. Polypus fatuus quidem est, cum ad manum hominis demissam accedat: sed prudens rei familiaris, cum omnia colligat, & suo in domicilio recondat: cūmq; consumpserit quantum utile sit, abigit testas, & cæcorum crustas, & putamina conchularum, & spinas pisciculorum. Sui etiam mutatione coloris uenatur pisces: trahit enim colorem similem iis quibus appropinquaret: quod idem etiam cum metuerit facit. Mirum quod de huius ingenio prodidit Ouidius: polypum hamos appetere, brachijsq; cōplecti, non morfu: nec prius dimittere quàm escam circumferat, aut arundine leuatum extra aquam. Trebius niger prodidit, nullum esse atrocius animal ad conficiendum hominem in aqua: luctatur enim cōplexu, & sorbet acetabulis, & numerofo suctu detrahit eum. In naufragos urinantēsue impetum capit: sed si inuertatur elanguescit uis: exporrigunt enim sese re-

**D** supinati. Morfu non lædit polypus, sed sanie quadam noxia quæ è corpore eius effluit, ut prodidit Oppianus. Mollium unus polypus exit in siccum, graditur per asperiora, uitat leuia. In cibo datus, uenere in cōcitā omnium mollium maxime: iurulentus aluum reddit humidam, si uehementer coquatur. De polypo & hæc traduntur: muriā ipsum ex sese emittere, & ideo non debere addi in coquendo: secari arundine: ferro enim infici uitiūque trahere. Polyporum genera plura sunt: unum cōspectius & maximum: cuius generis qui prope terram degunt, maiores sunt quàm pelagij: alterum corpore exiguo uariōque est, cibo ineptum: aliud quod heledonam uocat, *Heledonā.* crurum prolixitate diuersum (crura enim habet longa) & quod unum ex mollium numero simplicem in brachijs acetabulorum ordinem habeat.

*Boletena.*  
*Ozolis.*  
*Ozæna.*  
*Osmilian.*

*Nautilus.*  
*Nauticus.*  
*Onum polypi.*

*Inter duo pri-*  
*ma brachia.*  
*Plinius, ut in-*  
*fra.*

*Nautilus.*  
*Pompilus.*

*Nauplium.*

*Χιλιδών.*  
*Hirundo.*  
*Χιλιδών Πα-*  
*λαιοστ.*

Ad hæc polypi genus est quod alij boletenam, alij ozolim dicunt, Plinius o- E  
 zenam dictam à graui capitis odore putat: ob hoc maxime murenis eam cõ-  
 sectantibus, Pollux & ozonā & osmylian uocari tradit, polypi genus quod  
 inter caput & cirros brachiāue, fistulam gerit, qua tetrum emitit odorem:  
 quod manulas sepiolāsque uenatur, ut inquit Aristophanes. Duo item ui-  
 suntur genera conchis indita, quorum alterum nautilum & nauticum uo-  
 cant: alij ouum polypi: forma polypo simili. Testa iis ut pectunculis concua,  
 nec ita tam en destinata ut ei inhæreant. Sæpius hi iuxta terram pascun-  
 tur: unde euenit ut fluctibus iactati, in aridum elidantur, testa dilapsa nudi  
 capiantur, aut in terra emoriatur. Constat exiguo corpore, facie simili bo-  
 letenis: polypus hic nauticus, natura & uitæ muneribus singularis est: nauigat  
 enim per maris summa elatus de imo gurgite: effert se testa inuersa, ut  
 ascendere possit facilius, & inani scapha enauiget: ubi uero emerferit, cõ- F  
 cham reuertit. Habet inter sua brachia membranulam quādam annexam  
 similem iis quæ digitis insertæ palmipedum continentur: uerum illæ cras-  
 siusculæ sunt, hæc prætenuis est, & aranæ speciem imitatur: hac uelificat  
 cum aura inspirat: cirrōsque pro gubernaculis utroque demittit latere: si  
 quid metuerit, concham protinus mari replet, atque ita demergit. De gene-  
 ratione incrementoque eius cõchæ, nihil adhuc exploratum habemus, in-  
 quit Aristoteles: uidetur tamen non ex coitu gigni, sed ut cæteræ conchæ  
 prouenire: nec uero an concha solutus uiuere possit, certum adhuc est. Est  
 & alius polypus, qui cochlearum more siliceo tegmine ita muniatur, ut  
 nunquam egredi soleat, suāque interdum brachia exerat. Hæc Aristoteles.  
 Nautilon Plinius ab aliis pompilon uocari tradit. Supinushic, inquit, in G  
 summa æquorum peruenit, ita se paulatim subrigēs, ut emissā omni per fi-  
 stulam aqua, uelut exoneratus sentina, facile nauiget: postea duo prima  
 brachia retorquens, membranam inter illa miræ tenuitatis extendit: qua  
 uelificante in auras, cæteris subremigantibus brachiis, media cauda ut guber-  
 naculo se regit: ita uadit alto liburnicarum gaudens imagine: si quid pauo-  
 ris interueniat, hausta se mergens aqua. Nauigerā similitudinem & aliam  
 in Propontide uisam sibi prodit Mutianus: concham esse acatij modo cari-  
 natam, inflexa puppe, prora rostrata: in hac condi nauplium, animal sepiæ  
 simile ludendi locietate sola: duobus hoc fieri generibus: tranquillo enim  
 uectorem demissis palmulis ferire ut remis: si uero flatus inuient, easdem 6  
 in usu gubernaculi porrigi, pandique concharum sinus auræ: huius uolu- H  
 ptatem esse ut ferat, illius ut regat: simulque eadem descendere incluso si-  
 nu, fluctu hausto territam uisu forte tristi. Polypo similis chelidō est, id est, 7  
 hirundo, inquit Diphilus: humentibus membris uolant in mari hirundi-  
 nes, ut ficcis inter recta uespertilio. Volat hirundo sane perquam similis uo-  
 lueri hirundini, ut inquit Plinius: Sublimisque adeo uolitat cum maiorem  
 piscem metuerit, ut haudquaquam mare attingat: altiusque in uolatu sese  
 attollit quàm miluus, non tam alte tamen quàm lolligo. Et pinnis stridere  
 sentiuntur hirundines in uolatu: sunt enim his pennæ latæ & longæ. Acu-  
 leum quoque gerit hirundo uenenosum, inquit Oppianus: In cibo humo-



A rem corpori præbet chelidon, qui colorem reddit bonum, sanguinisq; excretionem mouet, ut author est Diphilus. At Xenocrates chelidonas uiroso sapore esse prodidit, malumque procreare succum.

1 Crura breuia, &c. Crura polypi, crines uocat nonnunquam Plinius. 2 Vltimo uero, &c. Hunc polypipedem, ni fallor, Plinius caudâ uocat. lib. 9. Cauda, inquit, utitur, quæ est biscula & acuta in coitu. 3 Fistula his, &c. Est polypo fistula in dorso, inquit Plinius. 4 Polypos superant, &c. Oppianus quoque deficiunt pugna polypi & murenæ: & polypi, & carabi. 5 Pendent oua, &c. Pariunt oua tortili uibrata pampino, inquit Plinius, tanta fecunditate, ut multitudine ouorum occisi non recipiant cauo capitis, quo prægnantestulere. 6 Easdem in usu, &c. Si non eadem sint, at certe similiter nauigare uidentur conchæ quæ ueneriz dicuntur. De quibus Plinius: Nauigant ueneriz, præbentisque concauam sui partem, & auræ opposites, per summa æquorum uelificant. In nonnullis eodicebus habetur, nauigant ex iis nerites, &c. 7 Chelidon est, &c. Sunt qui existiment chelidona, hirundinem uocari Aristoteli & Plinio piscem significare. Athenæi uero chelidona alterius esse generis: id quod mihi quidem nullius ueteris scriptoris autoritate constar. Præterea quo modo piscis intelligi potest, si uolueri hirundini perquam similis uoluerit scribit Plinius: Sati us ira que uisum nobis est hirundinē polypis coniungere, quàm piscium generibus: maxime cum Aristoteles ipse hirundinem à piscibus separare uideatur eam, quæ sublimis uolat, & uolatu stridorem emittit.

De sepia.

Cap. CCXXVI.

E Mollium genere sunt & sepia, lolligo, & lollius, quæ à polypo differunt, eo quod eorum alueus amplius sit, crura breuia, ita ut potestas nulla sit ingrediendi. Ipsa autem inter se discrepant, quatenus lolligo longior, sepia latior est: lolligine uero longe grandior, qui lollius nominatur: sed sepia quoque aliquas in bina augeri cubita notum est. Sepiæ, lolligini, & lollio durum quiddam, ut diximus, ac solidum intus per dorsum & corporis prona continetur, quod non eodem appellant nomine: sed quod insertum sepiis est, sepium uocatur: quod lolliginibus id ipsum, id est, gladiolum. Differunt enim quia sepium robustum latumque est, inter spinam & os mediam præ se ferens naturam, fungosam intra se complectens & friabilem corpulentiam. Gladiolus arctior & cartilaginiosior est. Forma etiam discrepant, pro alueorum modo quibus inserta continentur. Sepiæ quoque lolligines & lollij peculiaries binas sortiuntur promuscides, lōgas, asperiusculas, quibus capiunt & ad ora admovent cibos: iis etiam quoties tempestates urgēt, D ad saxa aliqua adherentes, se ueluti anchoris iactis stabiliunt. Non simili ut polypi modo constant, quoniam uim nandi tantummodo habent, cum polypi uel ingredi possint: habent enim pedes exigui & breues, supra dentes, senos, eorumque duos nouissimos maiores: reliquos autem octonorum duos infra, omnium maximos. Pinnula quæ alueum circumdat, sepia angusta, quæ lolligini latior est. Inter marem & feminā tam in lolliginum quàm in sepiarum genere, hoc interest, quod femina intestina continet duo ueluti mammas, quæ si aluo dissecta inspecies, facile uideris: mas omnino iis caret. Et præterea sepia mas uariis magis quàm femina, dorsoq; atriore est: & partes omnes asperiores habet quàm femina, & lineis interuenientibus uarias, & caudam quoque acutiorem. Mas quoque iuuantior & fortior est,

## DE DIFFERENTIIS

constantia:que maioris.cum enim sepia icta est tridente,mas fœminâ adiu-  
uat:fœmina mare percusso,fugam arripit.Fœminæ uulua ita articulata est,  
ut bifida cernatur,& propterea oua gemina apparent. Oua habet sepia can-  
dicantia,grandini similia,multa:atramentum quod uocant,sepia plurimū  
habet:quod in sepia aliter atque in aliis,infrâ continetur ad aluum, & quâ  
intestinum petere incipit superiora:meatūque suum eadem obuolutum  
habet membrana qua intestinum:atque idem foramen emittendi atramē-  
ti excrementique est,ea scilicet parte quæ fistula uocatur,quæ in supinis po-  
sita est,uti antea dictum est. Coeunt sepia & lolligines ora applicantes, &  
brachia inter se complectentes natantesque in aduersum:narem etiam di-  
ctam in narem inserunt.Parit fœmina ea sui corporis parte quæ fistula di-  
citur:qua & coire eas nonnulli arbitrâtur. Fert uterum sepia uerno tempo-  
re, & cum primis uerno tempore parit. Parit & omnibus anni temporibus. F  
autem,perseuerâtque in edendo ouorum numero dies quindecim. Quoties  
autem ediderit oua,mas è uestigio sequēs humorem fœtificum ouis super-  
infundit:atque ita efficitur ut solidescant:incedere nanque coniugatim so-  
lent.Parit sepia iuxta terram fere inter algas & arundines, & si quid agge-  
stum tale iniectum sit,ut farmenta aut lapides, aut quælibet alia materiei  
congeries.Et quidem piscatores de industria fascēs farmentorū disponunt.  
Enititur aluum per interualla reprimens,inspergitque atramentum inter-  
posita quiete,utpote cum non nisi cum labore emittat. Oua quæ sepia e-  
dunt,magnitudinem myrtorum magnorum,aut acinorum uuē minorum  
mox intra diem decimum capiunt & nigrescunt:emisso enim atramento  
parentis inficiuntur.Cohærent etiam inter se ad speciem racemi cuncta,nec G  
facile alterum detrahi ab altero potest:mas enim humorem quandam mu-  
cosum mittit,cuius lentore tenaciter oua sibi cohærescunt,ac rescunt etiā  
ex hoc,cum primum edita candida sint atque exigua:mox atramento per-  
fusa,nigra maioraque redduntur. Cum proles iam intus constiterit,tū ru-  
pta oui membranula,sepiolæ excluduntur:quæ si quis prole iam perfecta  
disciderit oui membranam,stercusculum emittunt,suumque præ metu co-  
lorem immutant ex candicante in rubriusculum. Sepiis uiuendi spatium  
breue:nam,exceptis paucis,biennium non complent. Sepias tamen non-  
nunquam in bina augeri cubita notum est. Mollium astutissima sepia est.  
sola hæc suo utitur atramento non modo cum metuit,uerum etiam absco H  
dendi causa: & cum progressa paululum se ostenderit,redit in atramentū:  
uenatur etiam suis illis prælongis prætenturis,non solum paruos piscicu- 3  
los,sed mugiles etiam sapius:& maiores quoque nonnunquā cuincit. Sūt  
qui sepiam quoque polyporum more,colorem sibi contrahere similem lo-  
co in quo uersatur,confirmant. Morfu non lēdit sepia, sed noxia quædam  
sanies è corpore eius effluit.Sepia,inquit Diphilus,elixa,tenera efficitur,o-  
ri grata,concoctu facilis & aluum leuiter mouet. In cibo dātur sepia,cum  
oleo & sale & farina decoctæ.Succum gignit sepia, qui sanguinē extenuet,  
& hæmorrhoidum fluxum proritet.Sepia coctæ atramentum,inquit Dio-  
scorides,ægre concoquitur,& aluum emollit. Oua sepia: urinam mouent,  
renūmq;

*Fistula,  
quæ in nare,*

**A**renumque pituitas extrahunt, ipsosque renes purgant. Sepium quod in iis durum & testaceum est, uiribus simile est ostrearum testis, sed partium magis tenuium: exsiccat itaque & abstergit. Quocirca collyriis ex eo formatis palpebrarum scabricia quæ sycofes uocantur, perfricatur. Dentes quoque splendidos reddit. In alopeciis præparant cutim sepiarum crustæ farina medicamentis. Oculorum tumorem ruboremque sepiæ cortex cum lacte mulieris illitus sedat, & per se scabricias emendat: inuertunt itaque genas id agentes, & medicamentum auferunt post paulum, rosaceoque inungunt, & pane impositio mitigant nocte. Eadem cortice & nyctilopes curantur in farina trita, & ex aceto illita. Visto sepio utimur, inquit Galenus, ad **B**uitilignes & ephelin, furfures & scabiem: sali uero fossili admixtum, ungues oculorum eliquat: uel, ut habet Dioscorides, elotum in medicamenta oculorum additur. Contra albugines, in oculos iumentorum efficaciter insufflatur: pterigia oculorum absumit cum sale fossili tritum & impositum. Medetur lentigini cæterisque uitiiis ex ossibus sepiarum cinis. Idem carnes excrecentes tollit, & humida ulcera.

1 Intestina duo, forsitan, internas partes duas, *σέρρα*, quasi *δυσέρρα*. 2 Sepia mas uariis. Sepiarum generis mares, uarij & nigriores, inquit Plinius. 3 Venatur etiam, &c. Quibus artibus captet pisceiuclos sepiæ, explicat Oppianus. 4 Visto sepio, &c. Dioscorid. Vistum in sua testa donec id quod crustosum est abscedat, postea tritum.

De lolligine & lollio.

Cap. CCXXXVII.

**E**T nigrum niueo portans in corpore uirus  
**C** Lolligo. E molliu genere, sepiæ fere similis est: sed discrepat, quod *Lolligo, τὸ δὲ σέρ.*  
 sepiæ latior est, uti modo diximus, lolligo longior, & toto corpore mollior  
 quàm sepiæ. Præterea gladiolus, qui in lolligine est arcior & cartilaginosis  
 est quàm in sepiæ, quod sepium uocari diximus. Pinnulam habet non  
 angustam adeo, sed latiore quàm polypus aut sepiæ: neque per totum al-  
 ueum circumactam, sed de medio orsam. Promuscidem habet eam quæ in  
 dextra parte est, longiorem. Bina habet uentris conceptacula, ut & alia, sed  
 alterum minus ingluuiem imitatur. Atramentum illud suum supra conti-  
 net apud mutum, cum sepiæ infrà ad aluum habeat: idque non atrum, sed  
 subrufum potius habet. Hoc metus causa emittit ut polypus. Quin & me-  
 tus causa uolat lolligo, & longius altèque extra aquam sese effert. Lolli-  
 gines euolare ex aqua traduntur, tanta nonnunquam multitudine, ut nau-  
 gia demergant. lolligo uolitans, tempestatem prænūtiat. Inter lolliginem  
 marem & sceminam hoc interest, quod scemina intestina continet duo *Intestina, σέρ-  
 ρα, uti supra.*  
 luti mammas: quæ si aluo dissecta inspectes, facile uideris: mas omnino iis  
 caret. Cocunt lolligines, ut de sepiis dictum est: pariuntque in alto. sola e-  
 nim ex hoc genere pelagia est lolligo: consertumque ac continuum iis ouū  
 quale sepiis est. Et uiuendi quoque spatium, ut sepiis breue: nam, exceptis  
 paucis, bimatum non complent. Lolligo, ut Diphilo placet, concoctū faci-  
 lior est quàm sepiæ, atque ori grata. Lolligine uero longe grandior est, qui  
 lollius nominatur: quippe qui uel in cubita quinque excreseat. Facie quo-  
*Lollius, τὸ δὲ σέρ.  
 τὸ πρῶτον ἀνι-  
 σταν, inquit A-  
 thenaus.*

que à lolligine diffidet: pars enim lollij quæ exiit in acutum, latior est: pin-  
nula etiam circumdantes illa totum in lollio ambiunt; funtæ perpetuæq;  
cum in lolligine partem aliquam relinquant. Colore subrufo est: dentem  
habet utrumque nigrum, & accipitris rostro figura non dissimilem, maiore  
suprà, infra minorem. Discisso alueo uetriculus suillo similis uidebitur: pe-  
lagius est non alio modo quàm lolligo.

1 Hoc in loco πωδὶς habetur, non πωδὶς in exemplaribus Græcis. 2 Lollius  
à lolligine an specie differat, an solo sexu, quod scilicet lollius mas sit, lolligo fœmi-  
na, considerandum: uidebitur certe eadem species ex Aristotele tā lib. histor. 4, quàm  
quarto de part.

De lepore marino.

Cap. CCXXVIII.

F

*Lepus marin⁹.  
λαπὼς θαλάσ-  
σιος..*

Lolligini parua similis est lepus marinus, ut Dioscorides author est: ut  
luero alij, specie similis est cochlea tegmine nudata. animal paruum, fe-  
re inter lolligines aut lollios, aut certe sepias repertum: sepe etiam una cum  
apuis capitur, odore tetro. In nostro mari, inquit Plinius, ossa informis, co-  
lore tantum lepori similis: in Indis & magnitudine, & pilo duriore tantū.  
Magni maris lepus (nam alterum qui in alio mari nascitur, antè dixi, in-  
quit Ælianus) ex omni parte ad terreni similitudinem accedit, præter pi-  
los. Nam terrestris pili & molles sunt, & ad tactum haudquaquam resiste-  
tes: contra huius spinosi & erecti, hūc qui tetigerit, læditur. In lumina aqua  
natat ipsum, non in altitudinem demergi dicunt: celeri autem & cōcitata  
natatione uti: ad capiendum eò difficillimum esse, quod neque in rete inci-  
dit, neque ad lineæ escam accedit: cū morbo afficitur, natat nequit, simul  
& funditus expellitur atque eiicitur: quisquis tum manum ad eum admo-  
uet, nisi medicamen adhibeat, perit: ac si hunc bacillo tetigerit, hoc idem  
periculum ei procreatur, quod basiliscus baculo tactus affert. Quem lepo-  
rem marinum uocant, ut prodidit Apuleius, cum sit cætera ex ossis, x i t nu-  
mero ossa ad similitudinem talorum suillorum in uentre eius connexa &  
catenata sunt: quod soli illi, quod sciam, proprium est. Venenum est aliis  
in cibo datus lepus marinus, erodendūque interim: aliis etiā uisus. Siqui-  
dem grauidæ si omnino aspexerint fœminam duntaxat, confestim nausea  
& reduntatione stomachi uitium fatentur: ac deinde abortum faciūt. Re-  
medio est mas ob id induratus sale, ut in brachialibus habeant. Eadem res

*Diphilus pro-  
didit, scariū pi-  
scem nonnun-  
quam marino  
lepore pasci.*

in mari & tactu quidem nocet: uescitur eo unum tantum animalium, ut H  
non intereat nullus piscis, & tenescit tantum: & ingrator uiliórque fit.  
Homines quibus in pastu est, piscem olent: hoc primo argumento uenefi-  
cium idprehenditur. Cætero moriuntur totidem diebus quot uixerit le-  
pus: incertūque temporis ueneficium id esse author est Licinius Macer. In  
India affirmant non capi uiuentem: inuicemque ibi hominem, illi pro ue-  
neno esse: ac uel digito omnino in mari tactum mori: esse autem ampliorem  
multo sicut reliqua orbis eius animalia. Oleum in quo incoctus sit mari-  
nus lepus, ne pili renascantur efficere nonnulli prodidere. Ita Galenus. Dio-  
scorides hoc efficere leporem ipsum marinum, aut per sese tritū atque im-  
positum,

A positum, aut cum urtica marina, prodidit. Lepus marinus, inquit Plinius, ipse quidem uenenatus est: sed cinis eius in palpebris pilos inutiles euulsos cohibet: & ad hunc usum utilissimi minimi. Enterocelæ lepus illinitur tritus cum melle. In leporis marini sanguine & felle uis psilothri est: uel si in oleo lepus hic necetur. Sed de mollium generibus satis dictum iam est.

## De crustatis.

## Cap. CCXXIX.

**C**rustata in genere animantium exāgui sunt, quæ cutis loco crustis tenuibus, duriusculis tamen & testæ similibus, operiuntur: intus autem molle carnosumque continent, durumque illud eorum tegmen non tam fragile quàm collisile est: quale cancerum genus & locustarum est. Summa eorum genera quatuor numero sunt. Genus unum καρκίνος, id est, locusta est: alterum, quem αστακός, id est, gammarum uocant: tertium genus squilla est, καρίδα appellant: quartum cancer, καρκίνος Græci dicunt. Ita Aristoteles: uerum aliter alij crustatorum genera enumerant. Plinius, Cancerum generā (hoc etenim nomine, arbitror, pro crustatorum genere abutitur) carabi, astaci, mæx, paguri, heracleotici, leones, & alia ignobiliora. xxx nanque eorum species esse tradit. Galenus malacostraca, inquit, id est, crustata, astacus, pagurus, cancer, carabus, squilla, cammarides. Specusippus similes esse dixit, astacum, carabum, cancrum, pagurum, nympham & arcton, id est, urfam. Diphilus ostracoderma uocat astacum, carabum, carida, id est, squillam, cancrum, leonem. Singula hæc crustatorum genera, inquit Aristoteles, in plures species distinguuntur, quæ non modo forma, uerum magnitudine etiam multo inter se differant: alia enim magna, alia parua admodum sunt. Genus igitur cancrarium & locustarium (quod καρκίνος dicitur) similia inter se sunt, eò quòd utrunque brachia forcipibus denticulatis habeat, χέλας uocant: sed hæc non ingrediendi causa habentur, sed ut iis quasi manibus capiant & retineant: orisque quod ceperint, admoueant. Quamobrem contrā quàm pedes ea flectere solent: hos enim in cauum, illa in orbem flectunt & circumagunt: sed interest, quòd carabi caudam habent, cancri non habent. Squillæ à cancrario genere differunt, eò quòd caudam habeant: à locustario uero, quòd forcipe careant, & plures habeant pedes. Crustatorum partes supinæ & quæ circa caput sunt, ita se habent, ut ad recipiendam reddendamque aquam branchiarum specie conditæ sint. Fistula etiam his data est, qua humorē quoq; unā cum cibo admissum reiciant. Quæ uero inferiores sunt partes, in locustario præsertim genere, scæminis tabellatioris sunt, in quas & oua deponunt cum pariunt, ubi & oua ipsa seruantur: at cancerum scæminæ operculum illud applicabile (quod επιπύγμα uocant) in quod oua deponunt, & quæ egerunt excrementum, amplius & interioribus partibus magis hirtum quàm mares habent. Crustata omnia ingredi possunt, itaque pedes complures obtinuerunt: pedes omnibus in obliquum flectuntur, eodem quo insectis modo: at denticulati illi forcipes, quibus saltem adsunt, interne flectuntur. Oculi iis omnibus duri, & apti tum intro tum foras, tum etiam in obliquum moueri: pal-

pebram uero ex iis nullum habet. Aquam omnia eius generis ore accipiunt, E  
 quam per partes illas asperiusculas, quas branchiarum specie conditas esse  
 diximus, rursus egerunt: quæ partes omnibus quidem insunt: sed locusta  
 plures habet. Dentes omnibus primores bini, & in ore caruncula quædam  
 linguæ effigie constituta est: tum stomachus ori continuo iunctus, exiguus  
 pro portione suorum corporum magnitudinis, & in cætris brevis adeo, ut  
 protinus uenter os excipere uideatur. Hunc excipit uenter; in quo locustæ  
 & cancrorum nonnulli dentes alios habent: quoniam superiores illi non  
 satis secare queant. Mox à uentre, intestinum simplex rectum, quod locu-  
 staceis & squillis recta in caudam finit, qua extremèta emittunt, & oua pa-  
 riunt: cancris autem, qui operculum illud applicatum gerunt, in medio ap-  
 plicaminis ipsius: uerum iis quoque parte exteriori qua oua pariunt deli-  
 nit. Habent in hoc crustaceo genere mares tenues genitales meatus: fœmi-  
 næ uuluas membranas ad intestinum, bifidas fissasque hinc atque inde, in  
 quibus gignitur ouum. Fœminis enim huius generis, locus uis deputatus,  
 iuxta intestinum omnibus est. Et quam *uenter*, id est, mutem appellant am-  
 plius parciusue habent hæc omnia genera. Humida corpulentaque ea pars  
 est: tenditque per eam mediam stomachus siue gula: ei que parti propor-  
 tionatur, quæ in sanguineo genere cor appellatur. Quæ crusta operiuntur,  
 etiam olfactum sensus habere constat: odore enim elscarum allectata, non-  
 nunquam capiuntur: nullum crustatum uel uocem, uel sonum aliquem e-  
 mittit naturalem. Cocunt crusta aperta, ut locustæ, astaci, & squillæ & hu-  
 iusmodi reliqua, more quadrupedum retro mingentium: scilicet ut fœmi-  
 na caudam supinam exponat: mas suam superponat & applicet. Coire solent  
 ineunte uere iuxta terram: iam enim coitus omnium id genus uisus est: in-  
 terdum etiam cum ficus maturescunt, coire incipiunt: cancri autem parte  
 priore copulantur, sua illa opercula mutua consertione componentes: mē-  
 brum autem quod mas in fœminam inserat, nullū omnino habetur. Cru-  
 stata ueluti locustæ cum per coitum conæperint, oua gerunt fere tribus  
 mensibus his, Maio, Iunio, & Iulio: tum deinde sub aluo in rugas oua depo-  
 nunt, putamine duriusculo intecta: quo in loco more uermium augentur:  
 incrementum enim eorum oua foris recipiunt, sicut piscium. Fit igitur lo-  
 custarum ouum arenidum in partes octo deductū: totumque quali species  
 uua consistit: sunt autem oua maxima, non quæ iuxta meatū, sed quæ me-  
 dia sita sunt: minima quæ nouissima continetur. Magnitudo minimis quā-  
 ta granis sicuum est: nec meatum ipsum ulla contingunt, sed per medium  
 hærent cartilagineis quibusdam appendicibus quæ per id tempus augentur,  
 atque ouorū capaces redduntur: partus enim in iis quasi in sarmentis qui-  
 busdam recipitur. Locustæ ad hunc pariunt modū: mox ubi ea sui corporis  
 parte intra diem uigesimali maxime oua concoxerint, abigunt uniuersa,  
 in idemque glomerata eodem modo quo foris congesta apparent: tum ex  
 iis locustæ proueniunt, intra diem maxime decimum quintum, & sæpe mi-  
 nores quàm ut digiti magnitudinem expleant, capiuntur. Excludunt igitur  
 oua ante arcturum: abigunt iam concocta atque absoluunt ab arcturo.

Squillæ

De his plura  
 uideas lib. 4.  
 histor. anima-  
 lium Aristo-  
 telis.  
 Mutis, Mutis.



**A** Squillæ gibbæ uterum menses circiter quatuor ferunt. Locustæ asperis saxosisque proueniunt: astaci leuioribus. Neutrum genus limosa amat. Litora potius uernis hybernisque temporibus expetunt: conferunt se in altum ætate: uidelicet cum aliàs calorē, aliàs frigus persequuntur. Natant omnia suis caudis, celerimēque retrorsum, pinnarum caudæ adiunctarum beneficio. Conduntur hyberno tempore: & locustæ quidem & cancri crusta sua exuuntur per uer, quemadmodum angues membrana uernationis quāam fenectutem uocāt: cum uerō exuunt, mollis admodum crusta subnascitur. Crustacea omniuora sunt: quippe quæ & lapillos & limum, & algam deuorent, atque etiam sterces (ut cancri saxatiles) & carnes etiam nimirum appetunt. Omnia eius generis hyeme leduntur, autūno & uere pinguescunt, & plenilunio magis. Quæ crusta intacta sunt, tunc optima sunt cum grauida, ut in locustaceis & reliquis eiusmodi patet. Duram omnino carnem habent, ut testacea, & quæ concoctu difficilis sit, multumque nutriat, nec facile corrumpatur. Non parū falsi in se continent succi: ut testacea, minus tamen quā illa: quin & caro eorum non aliter atque testatorum in aqua si coquatur, succum illum falsum exuit, aluūmque sistit: assa tamē, ut Mnesitheo placuit, elixis meliora sunt.

1 Fragile, *σπασθῆναι*, collisile, *θλασθῆναι*. Plin. uero locustas crusta fragili muniri dixit.

2 Fistula etiam, &c. Locus hic apud Aristotelem mihi quidem suspectus est: tum quòd neque in libro De respiratione, ut hæc apertius tradūtur, nec usquā alibi (quod equidem meminere) ullam crustaris attribuat fistulam: tum etiā uetus interpres hoc in loco nihil habet de fistula. Perpende lector.

**C** De locusta. Cap. C C X X X.

**1** Crusta insectorum genus unum locusta est, *καρχῆδος* Græci dicūt: cui simile genus alterum est, quem astacum uocant. Differt is à locusta, che- *Locusta:*  
larum uarietate, atque etiam quibusdam aliis discriminibus, quanquā non multis. Locusta omnis forcipem dextrum grandiorē ualentiorēque ha- *καρχῆδος*  
bet: astaci uero non certum, sed alterutrum æque (ut fors tulerit) forcipē ha- *Carabus.*  
bent grandiorē, tam mares quā fœminæ. Pedes locustis utroque ex la- *Astacus.*  
tere quini, ultimis illis adnumeratis, qui in forcipem exeunt denticula- *Locusta,*  
tum. & in his, quæ brachia chelæūe dicuntur longa sunt, pedes uero par- *Carabus.*  
ui. Corpus totum his longum est, & cauda quoque, & in cauda pinnæ  
**D** quinx adsunt. Hac natat, & in natando illi quasi remo innititur. Cornua  
ante oculos bina, longa & aspera, quibus alia minuta & leuiora cornicula  
**3** subiacent: corpus denique totum aculeatū habet, & asperum. Differt mas  
locusta à fœmina: quòd fœminæ primus pes bifidus est, mari simplex. Pin-  
næ etiam quæ in his parte supina geruntur, fœminæ, maiores, & quæ collo  
proximæ sunt minores habentur: mari omnes æque minores, nec usquam  
per diminutionē dissimiles. Ad hæc mari in nouissimis cruribus uelut cal-  
caria maiuscula prominēt acuta, quæ fœmina parua habet & leuiora. Par-  
tes illas quæ branchiarū species referunt, locustæ plures habent quā alia.  
Dētes in ore locustis primores bini, magni & caui, in quibus & humor cō-  
tinetur. Caruncula est inter dentes, linguæ representans effigiem, quæ &

A ternis, bifurcis. Præterea brachia duo, binis articulis, singulisque forficulis denticulatis.

1 Carabus, Astacus dictus est ab Arcestrato, & à Diphilo *καρχαρίον*. 2 In cau- *καρχαρίον*.  
da pinnæ, &c. Carabi, inquit Plinius, à cæteris canceris cauda distat. 3 Corpus de-  
nique totum aculeatum, &c. Hinc crudele Tiberij Cæsaris facinus apud Suetonium,  
qui locusta os piscatori cuidam lacerari iussit. 4 Maiores euincere possunt, &c. Lo-  
custa dimicationem cum murena depinxit Oppianus, lib. 2 De piscibus.

De astaco siue cammaro.

Cap. CCXXXI.

- 1 **A**stacus locustæ similis est, uti modo diximus: differt autem à locu- *Astacus*  
sta, tum aliis quibusdam discriminibus, quanquam non multis, tum  
chelarum brachiorumque forma. astaci enim non certum, ut locustæ, sed al-  
B terutrum æque, (ut fors tulcrit) forcipem habent grandiore, tam mares  
quàm fœminæ. Pectus his corpusque totum læue est, nō more locustatum  
2 aculeatum & asperum: in pedibus tamen illis magnis, partes exteriores a-  
culeos habent maiores. Color, quod ex toto dixerim, nitet, nigrisque macu-  
lis dispersis, euariat. Pedes inferiores ad grandes usque dispositi octo, quo-  
rum pars scissa in extremo bifurcatur, pars definit indiuisa. quatuor enim  
bifurces sunt, reliqui quatuor simplices ex toto pertendunt. Tum grandes  
ipsi, longe maiores, extremæque parte latiores quàm locustæ habentur: sed  
nec hi eadem specie: dexter enim extremum suum latum, oblongum & ten-  
nue habet, sinistèr crassum & rotundum: uterque tamen scissus in extremo,  
perinde ut maxilla tam infrà quàm suprà dentatus est: uerum dexter pusil-  
C los serratosque dentes continet omnes: leuissimos, & qui extimi sunt, ser-  
ratos: intimos uelut maxillares, parte scilicet inferiore quatuor & conti-  
nuos, superiore autem tres non continuos: uterque tamen partem mouet  
superiorem, ad inferiorēque deprimat adstringitque. Blesus item uterque  
situ inferiore, tanquam nati ad capiendū premendūque. Supra uero gran-  
des illos habentur alij duo hirtiuseculi, paulo ab ore inferiores, quos etiam  
in os adducit. Mox ueluti branchiæ os circundant frequentes & hirsutæ,  
quas assidue mouet: furculi etiam appendicēsue graciles geruntur à pedi-  
bus, qui oti proximi habentur. Dentes huic quoque duo, ut locustæ: supra  
quos cornua, breuiora tenuioraque quàm locustis. Quatuor item alia ad-  
sunt cornua, specie quidem duobus illis similia, sed tenuiora & breuiora.  
D Supra hæc oculi constituti sunt, parui crassiusculi, non ut locustæ maiuscu-  
li. Supra oculos extat deinde quasi frons quædam acuta & aspera, maior  
quàm locustæ. Denique facies acutior & thorax latior multo quàm locu-  
3 stæ: totūque corpus mollius & carnosius. Quod autem collum appellat,  
(Græci *στέχλον*) quinque partium foris est, & sextum latius illud situm lo-  
co nouissimo habetur, tabellis cōtinuatum quinque. Interiora uero in quæ  
fœminæ foras pariunt, ouaque deponunt, hirtiusecula quædam quatuor cō-  
tinent. In singulis autem eorum quæ foris esse diximus, spinæ singulæ bre-  
ues rectæque eminent. Fœminam hoc in genere nullum discrimen à mari  
distinguit: nam & mari & fœminæ forceps alteruter grandior more incer-  
to est: parem uero utrunque, neuter habere uisus est. Exiunt senectutem &

astaci, aut uere aut autumnō, & leuioribus locis proueniunt, ut apud Hellespontum & circa Thasum, sicuti locustæ asperis saxosisque: neutrum genus limosa amat. Gignuntur & in fluminibus astaci quidam pusilli.

*Astaci flumini  
tilu.*

*Gammarus.*

*Cammarus.*

1 Astacus, &c. *ἄστακος* gammarum interpretatur Theodorus. Athenæus gammarum larine dici genera quædam *καρίδων*, id est, squillarum scribit. Columella quoque & Plinius fere cammarum uocant, non gammarum. 2 *Λιμνογένησι τῶν γαστρῶν*, concolor in nostra cammare lanæ rubes, inquit Martialis. 3 *τρεχέλος*, id est, collum, (ut uidetur) eam partem significat, quam caudam supra in locustis uocauit Aristoteles, nisi forte locus hic sit mendosus. 4 His similes esse tradit Aristoteles, bestiolas quasdam, quæ in cochleis quibusdam reperiuntur, sed quæ præmollem habent carnē.

De cancrorum generibus.

Cap. CCXXXII.

*Cancer,  
καρκίνος.*

*Longi, aliæ  
parui, μικροί.*

*Vetus interpret  
Non sunt ap-  
plicata sicut  
maris opercu-  
cula.*

**C**ANCERIS inter crustacea solis corpus rotundum est, & cauda deest: cum locustis squillisque oblongum corpus sit. Pedes his omnes cum forcipibus deni. Omnibus uero magna ex parte grandior ac ualidior forceps dexter quàm laeuis est: & superiorem forcipis partem mouent, non interiorem. Crura iis breuia, quia parum mouetur. Alueus totius corporis indistinctus est: nec etiam caput distinctum, nec aliud quicquam. Oculi uero omnibus, sed aliis è latere supra, continuo sub prono, amplo distantes discriminati in medio, breui discrimine, ut heracleoticis & maiis. Os oculis subditum, in quo dentes duo ut locustis: uerum non rotundi, sed longi: & tegmina hos operiunt duo. Inter hæc talia interiacent quædam, qualia locustarum dentibus adnecti diximus. Humorem quem ore accipit, tegminibus illis depellit. Emitterit uero meatibus quibusdam superioribus, qui statim sub oculis positi sunt. Quoties ergo aqua acceperit, utroque tegumento os obturat, atque ita respuit humorem. Gula post dentes breuis admodum est, ita ut protinus uenter os accipere uideatur. uenter bifidus gulæ subiungitur: cuius ex medio, intestinum simplex & tenue procedit, quod sub operculo illo exteriori applicato definit, quod caudæ loco habetur: in quod & fœminæ oua pariunt. Humor intus in alueo pallidus, & minuta quædam oblonga albida continentur: rufa etiam alia, maculis dispersis. Differt à fœmina mas, magnitudine, crassitudine, & applicatili illo operculo: id enim amplius in fœmina est & distatius: & interiora habet hirtiora amplioraque, in quæ & oua pariat: aliàs cauda hæc in cancris minimi est usus: quandoquidem prope terram uitam agere cauernasque subire solent, nec plurimum natant. Et qui ex iis pelagij sunt, ij pedes habent longe tardiores ad ambulandum: sunt enim cæteris ipsi nantiores, ut maiæ, & qui heracleotici appellantur. Fœminæ quoque primus pes, inquit Plinius, duplex est, mari simplex. Ex omnibus animalibus cancrorum genus unum, non in priorem mouetur partem, sed in latus. Et cum cætera animalia ducibus binis pedibus incedunt, cancer unus quaternis regi solitus est. Cum cætera crustacea uersa cœant, cancri parte priore copulantur, sua opercula loculosa illa rugosaque mutua conseruione componentes. Latent cancri quinque mensibus, & crusta sua ueris principio exuuntur, quemadmodum locustæ: molliores quidem perspicue, sed etiam duriores exuere aiunt, ut maias: & tunc quidem

- A** quidem præ teneritate non satis ambulare possunt. Ostrea uenatur cancer;  
 1 iniectoque inter testas lapillo, exedit. Cancrorum genus multiplex, nec facile enumerandum: maximum quas maias appellat. Durior his crusta est, *Maias, μαϊας*  
 & crura exiliora: oculique paruo distant interuallo, sicuti in heracleoticis. Secundum magnitudinis locum paguri occupant. Qui heracleotici uocantur, *Pagurus;*  
 crusta quoque firmiore muniuntur ut maias: & oculos habent paruo  
 2 distantes interuallo, sed crura illis breuiora sunt quam maiis. Aliud genus *Cancer fluuiatilis,*  
 3 est fluuiatilium cancerum: ceteri minutiores, & nullis pene nominibus  
 annotati. Genus cancrorum in litoribus Phœnice fert, tantæ uelocitatis ut  
 4 uix consequi sit unde *ἰσχυρὸς*, id est, equites illos appellarunt: iis nihil fere in-  
 5 tus propter inopiam pabuli. Genus item aliud est, quod magnitudine can- *ἰσχυρὸς.*  
**B** crum non excedit, facie astacis simile. Edulium graue cancer est, & ægre *Equites cæcri.*  
 concoquitur: contra serpentium ictus medetur. Cancri fluuiatiles triti cru- *Cancer.*  
 6 di potique ex asinino lacte remedio sunt contra serpentium phalangiorum- *Cancri fluuiatiles.*  
 7 que morsus & scorpionum ictus. Elix & cum suo iure in cibo sumpti phthi-  
 8 sicis tabidisque profunt, & iis qui leporem marinum hauserint. Nihil æque  
 aduersari serpentibus aiunt quam cæcos: suesque percussas, hoc pabulo mederi.  
 Rupta cõuulla cæcri fluuiatiles triti in asinino lacte maxime sanant: triti ue-  
 9 ro cum ocymo atque admoti, scorpiones necant. In cataplasmatibus modum imposi-  
 ti aculeos infixos extrahunt. Cancrorum fluuiatiliu succus cum farina ordeacea  
 auriu uulneribus efficacissime prodest. Exustorum cancrorum fluuiatiliu cinis  
**C** non aliter atque echinorum cochlearuque exsiccandi facultate pollet.  
 Substantia autem proprietate, mirum quam canis rabidi morsibus prodest,  
 1 & solus, & multo magis cum gentiana & thure, ut sit thuris pars una, gen-  
 2 tianæ quinque, cineris cancrorum decem: Bibendum hoc medicamentum  
 dant, alij quotidie diebus quadraginta, cochlearij magni mensura, aut (si  
 non statim detur, sed aliquot post dies quam uulnus acceperint) duorum  
 cochleariorum aquæ admistum. Alij cineris duo cochlearia, uno radices gen-  
 3 tianæ adiecto, triduo cum uino exhibent. Cinis hic cum decocto melle, pe-  
 4 dum sedisque rimas, perniones & carcinomata mitigat. Aduersus canis  
 morsum minime ualere marinos cæcos alij prodidere: at Dioscorides ma-  
 5 rinos eadem omnia posse, uerum minus efficaces esse prædicat: utuntur &  
 6 cancrorum cinere ad dentium dolores: & ad lepras cum oleo Andreas usus  
**D** illo est. Quem cancellum & *καρκίνιον* appellant, principio ex terra limoque *Cancellus.*  
 7 consistit: mox conchulas ingreditur uacuas: ubi cum excreuerit, transit in *καρκίνιον.*  
 8 concham ampliorem, uidelicet aut nerites, aut turbinis, aut alicuius simi-  
 9 lis: sæpe etiam paruam buccinam subit: ingressuque ampliorem illam, ge-  
 10 rit pari modo, & uiuit in domicilio capaciore: rursumque excrescens, aliam  
 petit ampliorem. Specie similis locustaceis est, nascique seorsum per se so-  
 11 litus: uerum quod testam deinde petit, uitamque in ea traducit, hinc simi-  
 12 lis testa contactis animalibus est: quapropter is in ancipiti esse, genusque sibi  
 13 uendicare utrumque uidetur: forma tamen, quod simplicius dixerim, simi-  
 14 lis araneis est, nisi quod partem capiti & pectori subditam, ampliorem quam  
 aranei habet. Cornicula duo tusa tenuia gerit, quibus oculi totidem subia-

# DE DIFFERENTIIS

cet: qui nunquam intro recedant, ut cancerorum, neque claudantur, sed semper eminentes appareant. Os sub his est, quod uelut capillamentis quibusdam pluribus circumdatur. His pedes subiuncti duo bifurces, quibus cibum ori admovent: bini item utrique adhærent lateri, & tertius paruus. Quod sub thorace est, molle totum est: quod dissecto pallidum intus cernitur. Meatus unus ab ore ad uentrem pergit: foramen excrementi perspicere nullum potest. Pedes ac thorax duritiem præ se ferunt, sed minus quam cancri: nexu nullo adhæret testæ purpurarum modo & buccinarum, sed absolutus liberque uagatur. Pinnothera hunc uocat Plinius, Pinnother, inquit, uocatur minimus ex omni cancerorum genere, ideo opportunus iniuriæ. Huic solertia est inanum ostrearum testis se condere: & cum accreuerit, migrare in capaciores. Genus cancelli diuersum est, quod in nerite degit, ab eo quod in turbine: oblongior enim est qui in turbine uiuit: qui uero in nerite, cetera quidem illi non absimilis: sed dextrum bifurcatum pedem, paruum habet, & læuum grandiusculum, & ingredi eodem ipso grandiore potissimum solet. Hic nunquam in turbine hospitatur, sed in neritis tantum. Sunt inter cochleas quæ intra se bestiolas habent similes astacis pusillis, qui uel in flumine gignuntur: sed ea differentia, ut præmollem intra suam testam carunculam habeant. Cancelli, qui perquam exigui inter pisciculos reperiuntur, pedes nouissimos latiusculos habet, ut ad nandum utiles sint, quasi pro pinnulis aut remis pedes haberentur. Inter spongiarum cubilia bestiola gignitur aranci similis, quæ pinnophylax dicitur, & squilla parua. hæc concham ingressa, apertiendo claudendoque pisciculos capit: aperit autem antequam ingrediantur, claudit & contrahit cum ingressi sunt. Nascuntur & in nonnullis testæ operi generis cancelli, colore albedo, corpore admodum parui: & plurimi quidem in mitulis, qui in alto gurgite degunt: mox in pinnis, quos pinnotheras uocant: quinetiam in pectunculis atque ostreis: uerum nullum conspicuum capiunt incrementum. Piscatores cancris eius modi nasci confirmant unà cum illis quorum testam inhabitant, & ex eodem quasi seminio gigni. Et in pinna quidem carni eius ita adnascitur, ut ueluti carneam quandam radicem in eam demittere uideatur.

*Pinnother.*

*Cancelli.*

*Μικροὶ καρκίνοι.*

*Pinnophylax.*

*Squilla parua.*

*Pinnother.*

*Πινθόθες.*

*Πινθόθες.*

*Πινθόθες.*

*Pinnoter.*

*Hippoe.*

*Κυρφοὶ καρκί.*

*Κυρφοὶ καρκί, uel*

*καρκί, καρκί.*

*καρκί.*

1 Ostrea uenatur. Cancris astutia in ostreis exedendis describitur ab Oppiano. 2 Fluuiatiliu cancerorum. Viuunt cancri, inquit Galenus, in utroque humore, marino scilicet & dulci. 3 *ἵπποι*, &c. Hippoe uocantur, inquit Plinius. Cursores cancri, uti alij referunt, quod longe latèque uagantur, modo circum litora errant, modo longius proficiscuntur. 4 Eundem hunc pinnophylacem Aristoteles, *καρκί, καρκί* quoque uel *καρκί* uocauit, & *καρκί*. Theodorus pro utroque squillam parua reddidit, Plinium secutus. Hæc apertius infra explicantur in pinna.

De squillarum generibus, & cammaro, leone & arcto.

Cap. CCXXXIII.

*Squilla, καρκί.*

SQUILLAS (quas καρκί Græci uocant) à cæcario genere differre modo diximus, eo quod corpus his longum sit, & caudam habeant: à locustario uero, quod forcepe careant, & plures habeant pedes. Quæ tam ex mari ueniunt,

**A** niunt in Gangem squille, forcipes maximas & tangētibus asperas habenti: quæ uero in Indum ascendunt, leues aiunt habere spinas, & forcipibus carere. Squillas ouium clauiculâsque intra se similem in modum habere cum locustis certum est: intestinumque his sicuti & locustis & astacis recta in caudam finit, quâ excrementa emittunt, & oua pariunt. Squillæ colorem mutant: uere enim nigrescunt, post uer albedinem suam recipiunt: Indicæ squillæ locustis maiores sunt. Squillarū plura sunt genera: gibbæ, quas Græci

2. ci  $\chi\iota\phi\alpha\tau$  uocant, crangones. Et paruum genusearum quæ maiores nūquam *Squilla parva.*

3 effici possunt. Gibbae parte prona similes sunt locustarum: supina uero par. Gibbae, u. q. m.

te, tabellæ (ταβέλλαι) vocat his nullæ. Quinos utrinque pedes capiti proximos habent acutiores, & ad ventrem utrinque alios, quorum extrema latiuscu-

B la sunt. Squillis etiam gibbis cauda & pinnæ quaternæ: quarū quod in medio est, spinosum est, & acutius quàm quod in crāgone reperitur. est enim latius in crangone. Squillæ gibbæ utrum circiter menses quatuor ferunt. Crangones contrā quàm gibbæ, primos habent utrinque quaternos: tum deinde ternos habent utrinque paruos. Reliqua corporis pars (quæ maior est) pedibus caret. Crangonis quoque lateri caudæ utrinque pinnæ adnexæ sunt: quarum quod medium est, sicuti & in gibbis, spinosum est: uerum in crangone latius, in gibbis acutius est. Caridon quoque, hoc est, squillarum

4 generis est cāmarus (ut author est Athenæus) eoque nomine uocatur à La- *Cammarus*,

5 tinis. E crustatorum genere & leo est, astaco minor: cuius brachia cācris si- Καλλιμαχος.

milia sunt, reliqua pars locustæ. Leonem matinum Ælianus scribit locustæ *Leo*.

C speciem similitudinēque gerere: sed corporis tenuitate & gracilitate ha- *Zeo marinus*.

bitus maiori esse: brachiaque habere tum maxima, tum cancris similia: cœ <sup>Αἶμα</sup>

ruleo colore esse: & subnigris maculis distingui. lis quas nomine urse ar- *Arctos.*

Etos appellant, idem variendi tempus natura statuit, quod locustis: quocirca Vr̄a.

ca per hyemem & uere priusquam ova excludant, cibo laudatur. Cum excluderint deterriamur sunt. Quae crusta operiuntur, ita se habent Reliquum iam est, ut de testatis disseramus.

1 Squillas, &c. Scyllam Plinius, ni fallor, hanc uocauit, lib. 32. 2 *reginæ* Theo- Scylla.  
dorus crangines uocat. 3 Gibba, &c. Vetus interpres. Genus quod dicitur gibbo- Crangina.

sum, habet x i. pedes, in utraque parte sex pedes: & pedes qui sunt uersus caput, sunt

acutiusculae: & extrema aliorum pedum qui sunt in ventre, sunt lara: & ventres eorum *Camarum* in-  
assimilantur ventri carabi. 4. *Camarum* marinum dixit Plinius. Columella in- *pitius*.

ter animalia (ut uidetur parui incrementi) cammaros numerauit. Gammaros alij uo- *Gammarm.*  
cant. (ut Theodorus pro astaco gammarum reddit) Iuuenalis:

Si tibi dimidio constriatus gammarus ouo

Ponitut.

ialis lib. 13

Immodici tibi flaua reg

Concolor in nostra gammate lance rubes.

o apparet ignobile esse gāmarum, siue camr

est astaco minor. In Arhenzi exemplaribus habetur *μαζαρίστis* ὁ ἀστὴρ τῶ ἀστῆκος: quo in loco equidem conicio legendum esse *μαζαρί* pro *μαζαρί*: itaque (minor) reddidi: atq; hanc meam opinionem confirmat, & quod nobis tradidit ex *Æliano* Gillius. Plinius leonem inter crustacea nobiliora numeravit.



## DE DIFFERENTIIS

De testaccis.

Cap. CCXXXIIII. E

*Testatum.*  
*Testaceum.*  
 ὀστρεὺς & ῥαυτός  
 ὀστρεῖος.  
 ὀστρεός.  
 ὀστρεός.  
*Ostreum.*  
*Concha.*  
*Conchilium.*  
*Turbinatum.*  
 ἰσφομοκόλεις.

Binalne,  
 Δίνιστορ.  
 Vnimalne.  
 Μορόνιστορ.

Decebat,  
Gaudere.

*Turbines.*

**T**Estacea ea sunt quibus pars carnea intus est, nihil durum intra se habes, solida foris, testæ aut lapidi similis, quale genus concharum & ostrearum est. Huius generis aut nullum in terra gignitur, aut omnino pauca, ut limacum genus, & si quid eiusmodi aliud sit, sed rarum: at in mari similisq; humore multa & uaria gignuntur. Hæc inter se numerosa discrepant differentia tum testæ, tum carnis ratione: aliis enim in hoc genere nulla est caro, ut echinis: aliis est, sed quæ penitus inclusa nec ulla ex parte conspecta est, excepto capite, ut limacibus, purpuris, buccinis, & reliquis turbinatis. Sunt uero turbinati generis (quod *specimen* dicunt) alia quidem in anfractum intorta, ut buccina: alia in globum tantum circumacta, ut echinorum genera: nerites quoque testam habet rotundam. Carterorum quædam duplici constant ualuula, quædam simplici: ut genus alterum *st. super* aut bialue: alterum unialue uel *auris super* possit nuncupari. Bialue appello, quod gemina testa clauditur: unialue quod testa singulari continetur: cuius altera pars detecta carnem ostendit, ut lepas. Bialuis generis pars clusilis est & reseratilis, ut pectunculi & mitili: eiusmodi nanque omnia, parte altera ligata, altera soluta constant, ut & concludi possint & aperiri. Alia binis quidem conclusa ualuis sunt, uerum utroque latere connexa, ut unguis siue digiti. Sūt & quæ testa tota occultentur, ita ut nulla ex parte carnem detectā habeant, ut quæ tethya siue uertibula appellamus. Ipsarum etiam testarū magna uarietas: nam alia leues habent testas, ut unguis, mitili, & concharum quædam, quas alij galadas appellant: alia scabras, ut ostrea pinna, & conchæ nonnullæ & buccina. Atque horum quædam etiam pectinatim diuisas striatæ sunt: ut pectunculi & conchæ quædam: alia non ita striatas, ut pinna, & concharum nonnullæ. Crassitudine quoque differunt & tenuitate tum totius, tum partis, uelut laborum: aliis enim labra tenuia, ut mitili: aliis crassa, ut ostreis. Item alia modo quodam se mouēt, ut omne quidem turbinatorum genus mouetur & serpit: & pectines, quos & uolare nonnulli aiunt: alia ita natura immobili sunt, ut nunquam sedem in qua hærent sponte ipsa mutare ualeant, ut pinna. Et quæ ex testaceis loco mouentur, eo tantummodo mouentur quo pedestria aliqua pedibus mutilata moueri dicimus, & parū modum progrediuntur: sed uelut stabilia & hærentia mobilia sunt: ut progredientia uero, stare uidentur atque adhærere. sunt enim animalia ueluti mīca deprauatæque. Commune testacei generis omnibus est, ut testa intus equalis læuisque sit. Et caro bialuis & unialuis generis ita testæ adhæret, ut nisi per uim nequeat detrahi: at turbinati laxior continetur & absolutior. Cui generi peculiare est, ut testæ ea pars quæ à capite remotissima habetur in anfractum clauiculæ torqueatur. Mouentur eadem omnia parte dextra, non ad clauiculam, sed in aduersum. Operculum etiam eadem iam inde ab ortu naturæ omnia fere gerūt. Est autem hoc crusta quædam prætenuis, qua tanquam operculo quodam congenito, carni patulæ appposito, sese quasi concludendo tumentur, ne facile offendantur ab iis quæ extrinsecus incidunt. Testatorū corpus quàm paucissimis constat ex partibus: sunt enim

**A** enim omnia aut immobilia, aut parum omnino motus adepta, ut modo diximus: quæ autē mobilia sunt, hæc plures habeant partes, necesse est. partes exteriores huius animalium generis differentis iis variantur. Interiorū natura similis quodammodo in omnibus est, maximèque turbinatis. Differunt enim inter se magnitudine, & quæ excessu constant affectibus: nec uero multum dissident inualue & bivalue genus, quāquam longe ab immobilibus discrepent, quod latius postea parebit. Natura ergo turbinatorū *Turbinata.* fere similis constat, nec nisi magnitudine uariat, ut modo dixi: aliis enim partes maiores atque euidentiores, aliis minores obscuriorèsq; sunt. Quo enim maiora sunt quæcunque testatorum genera, eò partium conspectum præbent euidentiore. Ad hæc discrimen illud duritiæ, mollicitæ, cæterarūque generis eiusdem affectionum. Turbinatorum omnium caro penitus testē inclusa est, nec ulla fere ex parte conspecta, excepto capite. Hanc primo extimòque in ore testæ, maxima quidem ex parte, omnia torosiusculam habent, alia magis, alia minus. Caput eius ex medio partis prominulum extat & cornicula duo, quæ pro magnitudine animantis plus minus capiunt incrementi: in maioribus enim magna, in minutis uero animalibus admodum parua conspiciuntur. Exerunt caput more omnia eodem, idemque per metum retrahunt intro. Est illis & os: nonnullis etiam dentes, ut cochleis, breues, acuti, duri & tenues. Promuscidas item gerunt modo muscarum: quod quidem mēbrum partim linguæ effigiem præ se fert, & partim aculei. Venter os protinus excipit, similis auium ingluuici, habentque infra uentrem duo quædam albida firma, & torosa, mammis simili *Раравер. микры.* Clia, cuiusmodi uel in sepiis esse aduertimus, sed hæc torosiora sunt. Meatus à uentre duplicatus longus porrigit se usque ad id, quod papauer appellatur, quod *μικρον* Græci uocant, quod fundo commissum est. Hæc ergo in purpuris & buccinis & *κόχλεις*, id est, umbilicis sunt conspicua, & in clauicula testæ continentur, sicuti & in reliquis turbinatis omnibus. Est autem *μικρον*, id est papauer, quasi excrementitium quoddam membrana contentū magna sui parte in omnibus testaceis generibus, quod uel esculētum esse præcipue sentitur, quāquam in quibusdam echinis cibo minime idoneum est. Meatum illum excipit intestinum illi continuum simplèxque ex toto usque ad exitum: estq; eius initium circa anfractum papaueris, quo etiam latius **D** est: hinc sursum uersus replicans, carnosam illam partem repetit, finitq; ad caput, unde eiicitur excrementum ex meatu quodam ori uicino, quod in omnibus perspicitur turbinatis tam aquaticis quàm terrestribus. Mēbrana in grandiusculis umbilicis sub uentre, gulæ illi siue meatui artexitur continua, per quem meatus prolixior albicans, colore similis superioribus illis mammillaribus carunculis tendit. habet etiam incisuras, quales in ouo locustarum habentur: uerum hoc albidum, illud rubidum est: nullus exitus huic, nec foramen ullum patet, sed prætenui membrana cōtinetur, cauum quoddam angustum in se habens. Tendunt ab intestino ad imum nigricantia quædam aspera atque cōtinua, qualia uel in testudine uisuntur, sed minus nigra. Cæteræ quoque cochleæ umbilicicæ hæc habent eadem: sed quo

*Uniuersalia.  
Bimalia.*

*Ouum.*

*Cordis propor-  
tionale.*

minores, & minutiora: & in iis ipsis alia explanatius, alia obscurius, ut di-  
 ctum est. Uniuersalium autem & bimalium genus, partim iis simile est, partim di-  
 uersum. caput enim & cornicula & os obtinent, atque etiam quod linguæ  
 speciem gerat: uerum hæc in minutioribus sensum præ sua exiguitate effu-  
 giunt: nonnulla etiā in exanimatis, aut non mouentibus percipi nequeunt.  
 Papauer illud omnia habent, sed non loco eodem, nec par, nec ex eoque ma-  
 nifestum: sed uniuersalia suo fundo, ut patellæ: bimalia quā mutuo testarum  
 complexu nodōue ligantur. Quibusdam etiam quasi capillamentis, in ex-  
 tremis oris, hæc omnia circundantur. Quod autem ouum uocatur tem-  
 pore quo gigni solet, altero tantum latere, dextro scilicet, bimalia habent:  
 altero latere ostium excrementi continent. Sed errore ouum hoc uocatur, quippe  
 quod nihil ad generationem conferat, sed tale sit quale est pingue in  
 sanguineo genere cum uiget, & quod bona animalis nutritione alimen-  
 tiæque proueniat: quamobrem sapore per id tempus præstant, cibōque lau-  
 dantur, scilicet uere & autumnō. Laborant enim testata omnia per frigus  
 & æstum, atque exuperantiam temporis ferre nequeunt. Est autem ouum  
 hoc in testatis, quibus datum id à natura est, carni ipsi intumescēs, nullum  
 habens ad eius exitum foramen, sicuti albidum illud in umbilicis: id enim  
 illis simile intelligimus. Sed huiusmodi partes (ut dixi) cum conspicuæ in  
 magnis habeantur, in paruis tamen aut nullo pacto aut uix sentiuntur.  
 Quamobrem in magnis pectunculis præcipue patent. Ostium excrementi  
 cæteris quidem à latere est: at uero patellæ feræ parte ima testæ excernitur,  
 quā foramen in testa habetur. Et uniuersalia quidē atque bimalia ita se ha-  
 bere cernuntur. In uniuersum autē, nullum ex testaceis est, quod capite ca-  
 reat: cæteræ corporis partes nomine uacant, præter linguam, quæ omnibus  
 etiam inest. Caput omnia testata infrā habent plantarum modo: ut quæ ci-  
 bum de imo capiunt, ut plantæ radicibus suis hauriunt. In testatis omnibus  
 id etiam est quod cordi proportionetur, eodem modo quo & in crustatis  
 & mollibus, quod mutis uocatur, sed minus patet: attamen in medio qua-  
 rendum hoc est, aut scilicet inter partes quæ cibum recipiūt, & quæ excre-  
 mentum emittunt, si fixa degunt: aut inter dexteram partem & sinistram,  
 si incessalia sunt. Quæ siliceo tegmine operiūtur omnia, quibus saltem in-  
 grediendi facultas est, olfactum gustumque habere constat argumento e-  
 scarum: accedunt enim ad escam à longe, utpote odorantes. Sensus item sa-  
 porum iis inesse hac eadem ratione patet. sapore enim rerum earundem  
 quæque delectantur, ad quas ueniunt odoribus inuitata. De uisu & auditu,  
 quanquam nihil certi manifestū habemus, inquit Aristoteles: ungues ta-  
 men ad strepitū se subtrahere, inferiūsque subsidere cernūt, quoties fer-  
 ramentum sentiunt admoueri: pectines quoque ad moto digito dehiscunt,  
 mox comprimunt se ut cernentes. Neritas item qui capiunt, non aduerso  
 flatu, sed secundo adeunt, quoties esca persequuntur: nec uoce ulla, sed silē-  
 tio agunt, utpote cum & olfaciant & audiāt: nec fieri posse aiunt, quin sub-  
 terfugiant, si uox proferatur. Hæc Aristoteles. In marinis ostreis, inquit Pli-  
 nius, auditum esse non est uerisimile: sed ad sonum mergere solent: ideo &  
 silentium

- A** silentium in mari piscantibus. Vniuersum autem testatorum genus, plantæ simile respectu gradientium animalium est. Sexus diferimen in iis quæ testa integuntur nullum omnino perspicuum est. Et plurima quidem non coire apertum est: sed an ulla cocant & per coitum generent, incertum est: sed quemadmodum in genere stirpium, aliæ fructum ferunt, aliæ sterilem sortiuntur naturam: ita etiam in his quod quidē pariat & generet, est: quod autem maris fungatur officio, deest. Vnum saltem ex his genus cochlearū coire perspectum est: sed an ortus earum per coitum sit necne, nōdum exploratum satis habetur. Est sane totum hoc animalium genus modo quodam inter animalia & plantas ambiguum, & uelut in ambobus constitutū
- B** generibus: munere neutrius fungitur. Nam ut planta, sexu maris & scēminæ caret, nec in altero generat: & ut animal, nullum ex se fructū affert modo plantæ: sed consistunt & generantur ex terrena & humida quadam concretionē. E limo nanque & materia putrescente, sponte naturæ oriuntur prope dixerim omnia: diuersa tamen pro limi differentia: nam in cœnoso, ostreis origo consistit, conchæ, chamæ: ungues & pectines locis arenosis sui ortus initia capiunt. Rimis cauernisq; saxorum tethya generantur & glandes, & quæ per summa adhærent, ut patellæ & natices. locis enim nascuntur hæc uariis, ut alia uadis, alia gurgite, alia duris locis atque asperis, alia arenosis. Omnia uero id genus celeri incremento augentur. Quæ ex iis fauificare solent (qualia sunt, inquit Plinius, quæ durioris testæ sunt, ut murices, purpuræ) non alio modo quàm cætera testis inclusa generantur: uerum melius atque uberius quories præexistent aliqua quæ eiusdem sunt
- C** generis. Condunt enim aliqua, ut purpuræ uerno tempore eundem in locum sese colligentes, quam *μυλινὰ* aut fauaginem uocant, quæ uelut fa- *μυλινὰ* *φαγο*.  
uus est apum: uerum non ita elegans, sed quali è putaminibus ciccerum alborum multa inter se composita, struem unam suā cohæsiōe coagmentarint. Nullum iis patet foramen, neque ex his purpuræ ceteræue testacea enascuntur: sed coagmentatio illa fauo similis tanquam purgamentum iis est. emittunt enim, cum suos ordiuntur fauos, mucorem quēdam (faliuarium lentorem uocat Plinius) ex quo putamina illa coagmentata consistunt. Hæc ergo rupta diffusâque omnia, humorem quem cōtinebant, in terram demittunt: mox eo quo effuderint, loco gignuntur animalcula testacea, ut
- D** purpurulæ, exordio admodum exiguo. Buccina quoque & mituli fauificare solent. Itaque ne hæc quidem quæ inter testacea fauos faliuant, alio modo quàm cætera generantur: sed sponte naturæ omnia è limo materiâque putrescente. Quod ad generationem pertinet, res ita habet. Aluntur autē quæ ex iis immota manent humore dulci & potulento, qui per spissâ trāsmittitur. Quæ autem mobilia eadēque carne uescētia sunt, iis uictus ex pisciculis est, ut purpuris: alia uero iis quæ in mari pullulant, uescuntur. Latent testata omnia, ut in mari purpura, buccinum, omnēque id genus, uerū non eodem modo, sed absolutorum latibulum euidentius est: conduntur enim secessu: aliqua uero leuiore quodam tegmine superimposito delitescunt, ut limaces. At earum quæ adhærent, non est tam manifesta latita-

tio. Quæ uero latent, non eodem tempore omnia latent, sed limaces hyeme, purpura & buccina: canis exortu dies circiter triginta conduntur. Pectines etiam tempore eodem: sed eorum plurima sane latent, & algore urgente & æstu. Testaceo generi anni pluuij profunt, præterquam purpuris: cæteris squalor incommodus est. nam & minora redduntur & deteriora. Conducunt autem iis imbres, propterea quòd mare dilutius redditur: sed frigus facit profecto, ne uel in Põto uel in fluuijs gigni possint, exceptis biforibus paucis. Genus nãque uniualue potissimum rigore induratur & interit. Iam uero & lunari potestate ostrearum conchiliorumque & concharum omnium corpora augeri & rursus minui constat. In mari rubro testata omnia mira quadam magnitudine augentur. Quæ testa intecta sunt omnia, ut pectines, tunc optima sunt cum grauida: sed quanquam testa intecta grauida dicimus, tamen nullum eorum, uel coitum uel partũ uidemus. uerno tamen tempore & autumnò, ut dictum est, habere cernuntur ea quæ oua appellant, exceptis echinis qui cibo idonei sunt. Caro non æque omnium esculenta est: & excrementum quod papauer uocatur, quibusdam cibo idoneum, quibusdam non idoneum est. Modice collui debent omnia testacea in cibis, quia saporis gratia perit. Testaceis omnibus commune hoc est, ut salsum quendam in sua carne succum habeant, quo aluum citare nata sunt: id quod unicuique magis minusue datum est. Quæ enim dura carne cõstant, minus hoc habent quàm ostrea, quæ sane omnium mollissimam habent carnem: parua uero chama, sphondili, solenes, purpura buccinaque & alia id genus, duram. Itaque ostrea minus quidem nutritur, & aluum facilius mouent: quæ autem duriora sunt, uberius alunt, & difficilius concoquuntur. Purpura buccinaque duriora sunt carne, succumque efficiunt crassiores: sed caro in alijs, præsertim in ostreis humidior tenaciorque est. Præterea quæ duram habent carnem, ut concoctu difficilia, ita corruptioni minus obnoxia sunt. Qua quidem ratione sæpius ea exhibere solemus iis, quibus ex malorum succorum copia cibus in uentre corrumpitur: siue eò ex iccinore adfluant, seu in ipsius uentriculi tunicis contineatur. Dantur autem, inquit Galenus, iis quibus cibus in uentre corrumpitur, in optima aqua bis tẽrue decocta, ita ut cũ salsa prior iam sentiat, in aliam quæ pura sit transferatur: ex iis quæ duram carnem habet, succus procreatur quem crudum uocant, sicuti quæ mollem pituitosus. Quemadmodum uero ea quæ succum illum salsum exuerunt, carnem habent corruptiõni repugnantem, & quæ aluum sistat, ita si (cum sale & garo condita fuerint) eorum cibaberis iusculũ, uenter quidem abunde mouebitur, corpus uero nihil fere sentiet alimenti. at caro ipsa solidior, & difficilius concoquitur, & crudum crassumque ac frigidum gignit succum: maximaque ex parte lentum ac pituitosum: quamobrem senibus maxime incõmoda est ostrearum, & testatorum omnium caro. Mnesitheus Atheniensis de testatis hæc prodidit, Ostrea, chama & mituli cæteraque id genus, carnẽ habent, quæ ob salsum quem in se continent succum, ægre concoquitur: & si cruda edantur, aluũ cient. Quòd si concoquantur, uel in quouis humore, magnam.

**A**gnam falsuginis partem in eo relinquunt: quo fit ut eorum iuscula aluum turbent: caro uero ipsa, falsi illius sucei iam experts, minime uentrē perturbet. Quod si probe assentur eonche, maxime tum falsa euadēt, ut quæ succum iam habeant ab igne ueluti sucecsum, & prope dixerim absumptum. Ad aluum urinamue ciendam cæteris præstant mituli, ostrea, peccunculi & chama, ut author est Diocles Caristius.

1 Sed errore ouum hic uocitur, &c. Xenocrates humorem album uocat & lactem: Plinius etiā lac, ut de ostreis, quod circa initia ætatis sint multo lacte prægnantia. 2 Emitunt enim, &c. Et nuper, inquit Plinius, cõpertum in ostreariis humorem iis sœtificum lactis modo effluere. *Lactem humorem. Lac.*

**B** De turbinatis. Cap. CCXXXV.

**S**unt testacei generis, ut nuper diximus, alia turbinata, alia biualuia, alia uniuualuia. Turbinato generi hoc fere peculiare est, ut testæ ea pars quæ à capite remotissima habetur in anfractum torqueatur. Mouentur eadem omnia parte dextra, nō ad clauiculam, sed in aduersum. Opereculum etiam eadem iam inde ab ortu naturæ omnia fere gerunt: naturæque omniū, maxima quidem ex parte, in eorum partibus similis constat: nec nisi magnitudine uariat, ut modo diximus. Turbinati generis alia in anfractū intorta, ut cochlearum genera: alia in globum circumacta, ut echinorum genera.

De cochleis. Cap. CCXXXVI.

**T**urbinati generis cochlea est, & in anfractum intorta cochlearum omnium earo testis penitus inelusa continetur, nec ulla ex parte conspiciua est, excepto capite. Quod si testam detraxeris hebetescit cochlea atque expirat. Exerunt se domicilio, binæque ceu cornua prætendūt contrahuntque: oculis earent, ideo corniculis prætentant iter. Caput in iis modo quodam equinam speciem præ se fert. Os habent & dentes acutos, duros, breues: indicio est à minimis earum derosas uites. Ex testatis, unum cochlearū genus coire perspectum est: sed an ortus earum per coitum sit necne, nodum satis exploratum habemus. cochleæ pariter omnes, autumno & uere sua oua habere uisuntur. Varia sunt cochlearum genera: sunt oblongæ quibus tubæ loco utuntur tibicines: (echinophoros uocāt aliqui, aut eclinophoros) Sunt & rotundæ in oleario usu, quibus scilicet oleum effunditur, & *τὸν* *ἀντιπλοῖς*, & quibus clauicula in acutissimum acumen intorquetur: iterum **D** sunt aquatiles, sunt & terrestres. Aquatilium aliæ marinæ sunt, stomacho utiliores: aliæ fluuiatiles, quæ uirus habent. In terra gignitur cochlea terrestris, in testaceo genere pene sola, quæ & limax dicitur. Sūt ex cochlearum generibus quæ aceratæ uocantur, latæ, multifariamque nascentes: sunt enim & è terrestribus quedā, quæ latæ & minutæ passim inueniuntur. Sunt etiam cochleæ quedam nudæ, in Africa maxime: & passim quoque oberantes minutæ quedam longæque & candidæ. Sunt & quos scillos uocant, aut seselitas, genus syluestre uepribus frutetisq; cohærens, & quasi agglutinatum. Præterea sunt in Liguria albis quæ *πυμαλλία* ab opereculo illo suo appellantur, quo ueluti tegmine superimposito latent (quandō omnes etiā limaces leuiore quodā tegmine sibi superimposito, hyeme latent.) Genus

*Turbinatum.*  
*ἰσοουκοῦς.*  
*ἰσοουκό.*

*Cochlea.*  
*κοχλίας.*  
*κίχλος.*

*Echinophori, uel*  
*Eclimophori.*  
*Cochlea rotunda*  
*πυμαλλία.*  
*Cochlea terre-*  
*stris.*  
*Limax.*  
*κοχλίας ἰσπ-*  
*σαι.*  
*κοχλίας.*  
*Aceratæ.*  
*Cochlea lata.*  
*Cochlea nuda.*  
*Cochlea candida.*  
*Longa.*  
*Seseli, seselita.*  
*πυμαλλία.*



*Cauaticæ co-  
chleæ.*

*Quo pacto co-  
chleas præpa-  
rare oporteat,  
docet Plinius  
lib.30.*

hoc minus uulgare est. Adhærēt operculo eiusmodi testē se operiētes, obru-  
tę terra semper. Hæ circa maritimas tantum alpes quondā effossæ, corpore  
iāruī & in Veliterno. In Balnearibus insulis cauaticæ appellatæ (quoniā  
in speluncis nascuntur) non prorēpūt ē cauis terræ, neque herba uiuunt,  
sed uix modo inter se cohærent. Cochlearum aliæ aliis præstant: marinæ  
stomacho utiles sunt, & facile aliō excernuntur. Fluuiatiles & albæ uirus  
habent: terrestres uero stomacho utiles sunt. In his autē laudatissimæ sunt  
Sardonicæ. Aphricanæ, & in his Solitanæ, Astipaleicæ, & quæ in Chio gi-  
gnūtur: & Siculę, modicæ, quoniā magnitudo duras facit & sine succo. Ba-  
learicæ quoque quas cauaticas uocari diximus: & quæ in Liguriæ alpi-  
bus pomatiæ. Laudatæ & ex insulis Caprearum. Syluestres autem, quas se-  
sifilos appellauimus, & uentrē & stomachum turbant: uomitiones excitant, & al-  
uum soluunt. Illyricis magnitudo præcipua est, Aphricanis fecūditas, So-  
litanis nobilitas, albæ in Reatino agro nascuntur. Strabo cochleas prædicat  
Linusias. Cochleę quoque altilis ganeam impleuere: quę in eam magnitu-  
dinem perductæ sunt, ut octoginta quadrantes caperent singularum cali-  
ces: author est M. Varro. Cochleæ crassum procreant succum: sūtque duræ  
& concoctu difficiles. Quæ rotundæ sunt, earum grandiores, carnosæ sunt,  
uirusque habent, & choleram gignunt: at minores nonnullis in usu cibario  
sunt cum aceto mulso cōditæ rutæque uiridi & pipere. At uero qui eclino-  
phori aut echinophori dicuntur, pētadactylique, & quibus in acumen cla-  
uicula intorquetur, graciliore quidem sunt carne, sed saturitatem citius quā  
aliæ pariunt, stomachoq; innatant. In cochleis marinis omnibus, quod col-  
lum uocatur suauius est: sūtque, si cum terrestribus conferantur, leues, fra-  
giles, bonique succi, nec facile corrumpūtur. Terrestres uero cochleæ (quas  
limaces appellauimus) sicuti & aliæ, duram habent carnem, cōcoctioni re-  
nitentem: quæ tamen si recte concoquatur, uberrime alit, & meatu exi-  
guos obstruit: qua de causa cum aceto & lasere ad esum cōdiri solent. Suc-  
cus etiam ipsis inest, ut & aliis testatis, qui uentrem citet: qui si coquendo  
eximatur, reliqua caro aluum sistet, egregieq; alit, & stomacho idonea est.  
Et cochlearū cibus, inquit Plinius, stomacho medetur: in aqua eas subfer-  
uefieri intacto corpore earum oportet: mox in pruna torrerī nihilo addito,  
atque ita ē uino garōque sumi, præcipue Africanas. Nuper hoc cōpertum  
plurimis prodesse. Id quoque obseruant, ut numero impari sumant: uirus  
tamen earum grauitatem halitus facit. profunt & sanguinem excreantibus  
dempta testa tritæ, in aquæ potu: asperitatem faucium & distillationes le-  
niunt cochleæ. Coqui debent in lacte: demptoque tantum terreno cōteri,  
& in passo dari potui. Cochleæ crudæ tritæ cum aquæ tepidæ cyathis tri-  
bus si sorbeantur, tussim sedāt. Et cochleę in cibos iis quos linquit animus,  
aut quorum alienatur mens: aut quibus uertigines sunt, ex passi cyathis tri-  
bus singulæ contritæ cum sua testa & calefactæ in potu datæ diebus pluri-  
mum nouem. Aliqui singulas primo die dedere: sequenti binas, tertio ter-  
nas, quarto duas, quinto unā: sic & suspiria emendant & uomicas. Cochleæ  
uiuæ corpus & præsertim Africanæ, cum aceto deuoratum stomachi dolo-

**A**res mitigat: trita unā cum testa uino & myrrha, si exiguū inde bibatur, colliculicæque cruciatus sanat. Et cochleæ nudæ (de quibus diximus) in Africa maxime inueniuntur, utilissimæ dysentericis. quinā combustæ cum denarij pondere dimidij acatiz, exque eo cinere dantur cochlearia bina in uino myrtite aut quolibet austero, cū pari modo calidæ. Cochleas bibi iubent exemptas testis tritasque treis in uini cyathis: sequenti die duas, tertia die unam, ut stillicidia urinæ emendent: testarum uero inanium cinerem, ad calculos pellendos. Cochleæ in cibo sumptæ accelerant partum: item conceptum impositæ cum croco. Eadem ex amilo & tragacantho illitæ profluvia sistunt. Profunt & purgationibus sumptæ in cibo: & uulvam auersam corrigunt cum medulla ceruina, ita ut uni cochleæ denarij pondus adda-

**B**tur & cyperi. Inflationes quoque uulvarum discutiunt exemptæ testis, tritaque cum rosaceo: ad hoc Astipaleicæ maxime eliguntur: alio modo Africanæ binæ cū sceno Græco, quod tribus digitis capiat, additis mellis cochlearibus quatuor illinuntur, aluo prius irino succo perunctæ. Sūt & minutæ longæque candidæ cochleæ passim oberrantes: eæ arefactæ sole in tegulis, tulaq; in farina, miscetur lomento æquis portionibus: candoreq; & leuorem corpori afferunt. Scabendi desideria tollunt minutæ & latæ cū polenta. Præcipiūt & cochleæ crudæ carnē tritam bibere ex aqua calida in tussi cruenta. Quartanis cochleæ fluuiatiles mederi dicuntur in cibo recentes.

Quidam ob id adseruant sale, ut dent tritas in potu. Ictibus scorpionū carnes fluuiatiliū cochlearum resistent crudæ uel coctæ: quidam ob id falsis

**C** quoque adseruant imponunt & ipsis plagis. Cochlearum terrestrium triū caro quamoptime trita, adiectis uini nigri cyathis tribus, hepaticis bibenda datur calida: quam uim à totius substantiæ proprietate habere eas docet Galenus: in febribus tamen cū aqua calida. Capitis doloribus remedio sunt cochlearum, quæ nudæ inueniuntur nondum peractæ, ablata capita, ex his duritia lapidea exempta (est autem ea calculi latitudine): quæ alligantur & minutæ illinuntur fronti trita. Item limacis inter duas orbitas inuentæ officulum per aurem cum ebore traiectum, uel in pellicula agnina adalligatum, idem præstat: quod remedium pluribus semperque prodest. Inueniuntur in corniculis cochlearum harenacæ duritiæ: eæ dentitione facillè præstant adalligatæ. Limacis quoque lapillum siue officulum quod inuenitur

**D** in dorso adalligatum dentitioni prodesse confirmat. Cochleæ quæ sunt in usu cibi cum myrrha aut turris polline auriū dolores sanant. Item minutæ & latæ fracturis aurium illinuntur cum melle: è naribus fluentem sanguinem sistunt cochleæ contritæ fronti illitæ. Et recentia uulnèra conglutinantur & impositæ, & nomas sistunt. Arúðnes & tēla, quæque alia extrahenda sunt corpori, cochleæ ex iis quæ gregatim folia sectantur contusæ impositæq; cū testis: & eæ quæ manduntur exemptæ testis. Cochleæ unā cum testis trita aqua intercute laborantibus, toti uentri, in arthriticis autem, articulis ipsis imponuntur, quousque sponte decidant: agere nanque diuelli poterunt. Desiccant admodum, etiam si in alto crassius lentusque infederit humor. Quapropter idem agendum quoque in iis quæ ex ictu orti sunt tu-

*Trita ex aceto, inquit Dioscorides.*

moribus, etiam si ægre dissolui patiantur, & aurium cõfusionibus. Carnes earum aut sole aut cum thure & myrrha illitæ, cum uulnera alia, tum maxime quæ in neruis, etiam si cum contusione euenerint, conglutinant. Cochlearum humor qui *μύξα*, id est, mucus uocatur, uel sola absque carne unâ cum thure, aloë, & myrrha, uel horum uno quopiã, uel omnibus simul usq; ad cerati consistentiam, medicamentum fit, quod tenaciter adhæret, auriumque tumores quibus mucosus humor inest, efficaciter exliccat: frontiq; impositus oculorum fluxiones sistit. ubi uero mucii copiã colligere uoles, cochlearum carnem stilo pungito: ita nanque humoris plurimũ emittunt, præsertim si nuper captæ fuerint. Idem humor palpebrarum pilos agglutinat. Testem si descenderit cochlearum spuma illi uolunt. Cochleæ usq; uehementer exsiccant, & modice calciscentis sunt facultatis. Dysenteria mirifice profunt, ubi locus nondum putredinem senserit: quatuor scilicet partibus cineris, adiecta piperis albi parte una, & duabus gallarum. Tollit ex facie uitia cochlearum quæ latæ & minutæ passim inueniuntur, cū melle cinis. Et omnium quidem cochlearum cinis, inquit Plinius, spissat, calfacit sinectica ui: & ideo causticis commiscetur, psoriasisque & lepris & lenticini illinitur. Testæ cochlearũ omnium, ut author est Dioscorides, crematæ excalfaciendi & urendi facultatem habent: purgant lepras, uutiligines, dentesque, oculorum cicatrices emendant, & uitia cutis in facie (*τὰ ἐν τῇ* uocant) albugines, ac uisus hebetudines, si unâ cum carne sua usq; tritæque illinantur. Strombos turbinæ sue sunt, qui modo aquatiles cochleas, modo 7 marinas uocent. Strombi, inquit Oribasius, duri sunt, concoctũque difficiles: & quo maiores, eò duriores euadunt. Cũ sinapi eduntur, & ex aceto: at uero strombi in aceto putrefacti, lethargicos excitât odore. Profunt & car diacis: strombi quoque carnes tritæ & in mulsi tribus hemlinis, pari modo aquæ, aut si febres sunt ex aqua mulsa datæ proficiunt. 8

*κοχλῆω μύξα.*

*Mucus.  
μύξα.*

*στρόμβος.  
Turbo.*

*κόχληα.  
Umbilicus.*

*Πιτάδα ἑστῆλης.  
Melicēbales,  
uel Melicem-  
bales.*

*κόχληος,  
κοχλῆος.  
Umbilicus.*

*κοκκαλίος,  
κικκαλίος.  
Abrotone.  
Limax.*

1 *κόχληος* & *κοχλῆος*, Theodorus nonnunquam umbilicos uerit: quasi sit umbilicus genus quoddam testaceum aliud à cochleis: uti sentit etiã Massatinus. uerum quod umbilicus, quem Theodorus pro *κοχλῆα* dixit lib. 5. histor. animalium, idẽ sit quod cochlea, uidetur ex Athenæo. lib. 2. Sed de *κοχλῆα* & *κοχλῆα* infra peribitus agetur. 2 Cochleæ, &c. Theodorus *κοχλῆος* hoc in loco umbilicos uerit. 3 *πριτάδα ἑστῆλης*, uel πετάδα ἑστῆλης. His adduntur à Plinio melicēbales, uel melicēmbales. 4 Sunt & quos sepiolos. &c. Hæc forsitan sunt de quibus Plinius lib. 30. Cochleæ ex his quæ gregatim folia sectantur. 5 *Λινούσα*, ab agro cui nomen Lino est iuxta Pityuntem. Hæc Hermolaus. 6 Quis coquendo, &c. Quoniam modo coqui debet cochlea conditq; doceat Galenus & Oribasius. 7 Strombos turbinæ sue, &c. Cancellus qui turbinem subit, inquit Aristoteles, oblongior est: *πῶς ἐν πῆρε ὁ γινόμενος*. Strombum alium esse à cochlea, uel ex Plinio manifestum est lib. 32. Theodorus turbinem interpretatur. 8 Confunduntur apud Græcos, uel ipsum Aristotelem, *κοχλῆος* & *κοκκαλίος*: scire tamẽ Aristoteli *κοχλῆος* umbilicum, id est, cochleam marinam significat: *κοκκαλίος* uero terrestrem cochleam. *κοκκαλίος* nonnunquam etiam generale est, ut Pansanius in Laconicis: *κοκκαλίος* ad purpuræ tincturam maxime idoneos ferunt Laconicæ maritimæ. Est apud Aristotelem & *κικκαλίος*: & Athenæum *κικκαλίος* (nisi in aliterro codicum insin menda) cochleæ genus, & ut uidetur terrestre genus testaceum, à limacæ diuersum. Abrotone, ut Hermolaio placet, limacis genus est: quanquã sunt qui locustam putent item qui apẽ, alij qui piratã in eo uocabulo intelligant. Limacem Hesiodus *κικκαλίος* uocauit, quasi domiportã

A domiportam dixeris. In symposiis etiam proponi solitam quæstionem ludicram (χαί-  
 ρου uocant) de limace scribit Athenæus, ὃλο γὰρ ἐστὶν αἰνέειν ὅτις, ἀναιμάτος, ὃ γὰρ οὐκ ἔστιν ὅτις. Ad  
 cuius exemplum, ut uult Hermolaus, Cicero limacē ita finit, Terrigenā, herbigradā,  
 domiportam, sanguine cassam. Teucer uero ita, Animal sine pedibus, sine spinis, sine  
 ossibus, crustatum

De muricum generibus, ut purpura, buccino, & reliquis.

Cap. CCXXXVII.

**C**oncha turbinati generis purpura est, canaliculatum è testa procurrat il  
 li rostrum, & canaliculi latus introrsus tabulatū seu lēue est, quā pro-  
 feratur lingua: præterea clauata est ad turbinem usque, aculeis in orbem se-  
 ptenis fere. Totidem autem in testa clauiculæ reperiuntur orbes quot ha-  
 bet purpura annos. Lingua purpuræ (quam promuscidem uocant) digito  
 longior, firma & torosa est, duritia tanta ut tum conchulas, tum etiam sui  
 generis testas perforare possit, quæ & pascitur. Florem illum suum tingen-  
 dis expetitur uestibus, inter papauer dictum & collū in candida uena con-  
 tinet, supra eam partem quam uentrem appellant, in quibusdam nigrum,  
 in nonnullis rubidum: tingit hic pressus cum extrahitur, & inficit manum.  
 Quod ouum uocatur, semper habet purpura. Genera earum plura, pabu-  
 lo & solo discreta. Lutenæ putri limo, & algæ enutritum alga, uilissimū:  
 utrisque melius Teniense in Tenei maris collectum. Est & quod cal-  
 culosum uocatur, & dialutenæ aliud. Et nonnullæ magnitudine augentur  
 insigni, ut quæ ad Sigeum & Lectron Idæ promōtoria gignuntur. Ad Car-  
 teiam inueniri traduntur & purpuræ & buccinæ *κακόνυλοι*, id est, quarum  
 testæ decem cotularum sunt capaces: aliæ paruæ sunt, ut quas Euripus fert  
 & Caria. Pelagiæ magnæ scabræque sunt, paruæ ad litora & oras reperiun-  
 tur. Partes item aquiloniæ nigras, austrinæ rubras magna ex parte ferunt.  
 Capiuntur, inquit Aristoteles, tempore uerno cum fauos extruunt: canicu-  
 læ tempore fere nullæ capiuntur: non enim tantisper pascuntur, sed se ab-  
 condunt & latent circiter triginta dies. Plinius capi eas post canis ortum,  
 aut ante uernum tempus utilissimum censuit: quoniam cum fortificauere  
 fluxos habent succos. Fauificantes uerno tempore generant hyeme abeūte,  
 eo quo diximus modo. celeri deinde incremento augentur, quippe quæ  
 anno perfici possunt: uiuunt purpuræ annos circiter sex, uel cum plurimū  
 septem: incrementum earum patet per orbes. Totidem enim, ut modo di-  
 ximus, in testa clauiculæ reperiuntur orbes, quot habent purpuræ annos.  
 Purpurarum caro, sicuti & cæterorum testatorum, dura est: ac proinde iis  
 exhiberi solet, quibus ex malorum succorum copia cibus in uetriculo cor-  
 rumpitur. Et harum quidem & buccinarum caro durior est quàm aliorū,  
 succumque gignit crassiorē, minus tamen glutinosum tenacemque: sed  
 in earum partibus discrimen est. Quod collum nanque appellatur, præ du-  
 ritie dentibus ægre conficitur, concoquiturque difficulter, nec facile corrū-  
 pitur: parcioremque succum generat & stomacho gratum est. Partes uero  
 inferiores, & quæ *μύκωτε*, id est, papauera uocantur, molles sunt ac facilius  
 quàm colla conficiuntur: aluum mouent, & urinam sudorēque ac saliuam

*Purpura.*  
*ροσφύεα.*  
*Alias, canicu-*  
*latum, & cuni-*  
*culi.*

*Alias, tubula-*  
*tum.*

*Purpurarum*  
*genera.*

*Pelagiæ, αἱ ἐν*  
*τῇ πρὸς ὑάλη*  
*ταῖς.*

*Purpura maio-*  
*res dura sunt,*  
*inquit Xenoc-*  
*rates.*

cient. Harum frequentior usus choleram gignit. Proprium his atque solentibus hoc contingit, ut eorum iusculum cum coquuntur, crassius reddatur. Purpuræ testa cremata exsiccandi uim possidet, dentes abstergit, carnem excrecentem reprimat, ulceribus malignis conuenit: & ulceribus quoque putridis si cum aceto aut posca aut uino mulso aut oxymelite imponatur. Purpurarum opercula in oleo cocta capillorum defluuium sistit: cum aceto epota lienis tumorem comprimit: suffocationes quæ ab utero oriuntur, suffitu prohibet, secundasque eiicit. Buccinum concha etiam turbinata & in anfractum intorta est, sed quàm purpura minor (unde & à quibusdā filius purpuræ dicitur) ad similitudinem eius buccini quo sonus editur: unde & causa nomini, rotunditate oris in margine incisa. Testa illi non est aculeis clauata quemadmodum purpuræ, sed scabra tamen. Et totidem etiam in clauiculæ testa reperientur orbes, quot habet buccinum annos. Promiscidem siue linguam habet, ut purpura, firmam & torosam, qua pascitur, qua etiam testas perforare potest. Quod in eo ouum uocatur, semper continet, sed aliàs maius, aliàs minus. Ad muricatum purpureum uero colorem etiam ut purpura exquiritur, sed buccinum per se damnatur, quoniã phycum, id est, rubidi coloris splendorem, remittit. Buccinis etiam idem modus gignendi qui purpuris, tempusque idem est: iis namque & fauiscare in more est, & uere generantur hyeme abeunte. Latitant etiam canis exortu circiter triginta dies: non nisi petris adheret buccinum, circaque scopulos legitur. Buccina lunæ incremento sunt pleniora: æstate uero gracilescunt. alendi facultate purpuræ simile buccinum est, uerum durius est. Quod in his collum uocatur, aluum mouet, difficiliter concoquitur: stomacho idoneum est, nec facile corrumpitur & mediocriter alit. Ex sinapi conditur in cibum, aut aceto, succo cyrenaico, aut pipere. Totum uero buccinum si unà cum papauere uocato coquitur, sistit potius aluum & sitim facit. Quod papauer appellatur ac parte inferiore reperitur, mollius est, & facile corrumpitur. Oleum in quo decoctum fuerit uiuum buccinum, dolores sedat auribus infusum. Buccinorum testa cremata non aliter atque purpurarum, exsiccat egregie, & ut mordacitatis omnis experta, ulceribus malignis prodest, & putridis quoque cum aceto aut uino mulso, aut oxymelite. Eadem purpuris præstant concremata buccina (inquit Dioscorides) sed uehementius urunt. Si quis testam sale plenam fictili crudo comburat, dentifricio conuenit, ambustis utiliter illinitur, ubi solui medicamentum minime oportet: nam postea quàm ulcus cicatricem duxerit, sponte sua decidet. Muricum etiam generis sunt, quæ uocant Græci colycia: alij corychia uel coryphia, turbinata æque, sed minora multo, & oris halitum custodientia. Con generum omnium, quæcūque scilicet turbinati sunt generis suauissima iudicatur coryphia. Suntque & ori & stomacho grata, aluumque & urinam cient, atque oris bonum reddunt odorem. Copiosius alunt iurulenta, assa uero dura sentiuntur. Horum papauer buccinorum more aluum stringit potius.

Buccinum.

Kæf.

Murex.

Purpura filius.

Suffricta hoc  
in loco uidetur  
Ombasy exem  
plaria.

Colycia.  
Corychia.  
Coryphia.

Murex.

1 De muricum. Murex & si unam speciem significet, scilicet buccinum, generale tamen

A tamen est, ut recte admonet Hermolaus, sicuti & conchylium: purpuram enim comprehendit murex & alia, ut infra uidebitur. Muricum cinis, inquit Plinius, dentifriciū est. Muricum uel conchyliorum testæ cinis maculas in facie mulierū purgat cū melle illitus, cutemque erugat, excrenditque septenis diebus illitus, ita ut octauo, candido uorum foueantur. 1 Est & apud Athenæum ἡ δὲ περὶ φένης, sed alia à purpura, uel saltem genus quoddam à purpura diuersum. 3 Buccium & buccina etiam dicitur instrumentum illud quo sonus editur: cuius formam præclare descripsit Ouidius, -Cava buccinā sumitur illi Tortillis, in latum quæ turbine crescit ab imo.

Conchylium.

ἡ δὲ περὶ φένης.  
Buccina.

## De strabelo &amp; nerite.

## Cap. CCXXXVIII.

1 Strabelus concha est purpure & buccino similis, cuius testa idonea nonatur, ut ex ea sonus edatur. E turbinatorum genere nerites siue natex  
B est magnitudine exigua: testam habet læuem, amplam, rotundam: forma illi buccinis proxima est, papauere tamen non nigro, ut illa, sed rubro. Testæ adnexam corpus medium eius firmiter est. Pascuntur natiæ mari trāquillo, absolutæ saxis: at quoties flatus urgent, saxis adhærescūt more lepadum & aporrhaidum, ac cæterorum generis eiusdem: nec sine tegmine dimoto adhærent, quod uelut operimentum sibi possident. Et modus hic idem est purpuris, buccinis & omnibus generis eiusdem. In saxis ad imam maris sedem adhærescens nascitur nerites: & eò maris ubi sordium uacuitas est & tranquillitas, uiget. Olfaciunt natiæ & audiūt, adeo ut fieri nō posse aiūt, quin subterfugiant piscatores si uox proferatur. Concha est, quam Mutianus muricem esse arbitratur, latiorē purpura, neque aspero, neque rotundo ore, neque in angulos prodeunte rostro, sed simplice, concha utroque latere sese colligente: quibus inhaerentibus plenam uētis sterisse nauim portantem nuntios à Periandro, ut castrarentur nobiles pueri, conchisq; quæ id præstiterunt, apud Gnidiōrum Venerem cōli. Porro de conchis quæ ueneriæ dicuntur, ita refert Plinius, Nauigant ueneriæ, præbentēsq; concauam sui partem & auræ opposcentes, per summa æquorum uelificant.

στράβελος.  
ἡ στράβελος.  
Nerites.  
Natex.  
Nerites.

Murex.

Concha ueneriæ.

1 An idem sit strabelus cum echinophoro, uel echinophoro cochlea: de quo supra inter cochleas. 2 Nerites siue natex. Νερίτις καὶ ἀνερίτις, καὶ ἡ ἑρτίς apud Athenæum, ut opinor. 3 Rotundam. Rotundiorē esse nerites testam quā siturbinis, hinc apparct: oblongiorē enim formam recipit cancellus ille cōcharum: hospes à turbinis testæ forma, qui turbinem subit quā qui neritem. 4 Periandri historia quonam modo nobiles Corcyrensiū pueros Sardas miserit exsecandos, habetur apud Herodotum lib. 3. 5 Nauigant ueneriæ, &c. In nonnullis codicibus habetur nauigant nerites, &c.

Ἀνερίτις.  
ἡ ἑρτίς.

Turbo.

Nerites.

## De echinis.

## Cap. CCXXXIX.

Echinus testaceorum omniū maxime à natura munitus est: quippe cui testæ (quam habet in globum circumactam) undique spinis frequentibus circumuallata celetur: id quod soli inter testata peculiare est: atque hoc item peculiare echinis est, ut nullam intus carnem contineant: sed uice carnis nigra quædam circum ab ore fusim sparguntur, nomine adhuc nullo appellata. Quod caput echini appellant & os, uersum in terram est: quod uero ad excrementi exitum deputatum est, id supra habetur. Dentes quini

ἐχίνος.



A

De balano.

Cap. CCXL.

Balanus.

**B** Alanus aut glans nomē habet à similitudine glandium quercinarum. E genere est testatorum immobilium: testa leui. olfactū nullum habere cernitur. Nascuntur balani circa rimas cauernāsque saxorum. Carnem habent duram: in cibo laudantur præcipue qui iis nascuntur locis ubi marina admiscetur fluuiatilis aqua, saxis adhærentes: sunt nanque ij dulces & habitiores plenioresque: copiosum præbent succū, quo & abunde nutriunt aluūque mouent: ori stomachoque grati: teneriorem habent carnem, & urinam ciunt. Decoctum quoque eorum aluum ciet epotum: quæ uero saxis non adhærescunt, acres sunt & medicamentosi, magisq; aluum perturbant, sed urinam minus citāt. Hæc Xenocrates: Athenæus uero, Alocis, inquit, discrimina fortiti sunt balani: quandoquidem in Ægypto optimi gignuntur & suauissimi: tenelli, orique ac uentriculo grati: qui & succum & alimentum præstant copiosum, urinam atque aluum mouent: in aliis uero locis sapore inueniuntur magis salso.

Balanus.

Balanus.

Glans.

Habituores pl.

nioresque, di-

fusi.

<sup>1</sup> Balanus, &c. Sphōdylus apud Galenum & Columellam: Plinius uero tāquam diuerſa animalia enumerat. Est apud Paulū cōdylus concharum genus, forſitā idem.

Sphondylus.

Condylus.

De uniuersibus, ut de lepade &amp; aure marina. Cap. CCXLI.

**E** X uniuersibus genere lepa siue patella est, eorum scilicet quæ simplici ualuula constant: singulari enim testa cōtinetur lepa, & ea quidē læui: altera uero eius pars superficie detecta carnem ostentat. Saxis testa in dorsum data adhæret: fitque alieno septo quodammodo bialuis, ut eo modo se concludendo tueatur. Os habet, & post os uentrem esse in hoc etiam genere patet: & illa præterea quæ oua uocantur: quod etiam papauer appellatur, in imo continetur. Excrementum quoque eius parte ima testæ excernitur, qua foramen in testa habetur. Gignitur lepa circa cauernas rimasque saxorum. Et quauis saxis adhærendo uiuat, saxis tamen quandoque etiam absolui, in pastumque ferri solet, aliisque transire. Magna quidem ex parte, paruulæ gignuntur lepades: quæ tamen nonnunquam ostrearum magnitudinem æquant: maxime autem in Indico mari: ut & alia omnia inueniuntur. Carnem habet lepa duram, concoctu difficilem, paucique succi: elix, condimento redduntur gratiores. Eiusdem generis cum lepade & aporrhais est: & more lepadum saxis adhæret. Quæ ὅππῃ, id est, auriculæ dicuntur, saxis adhærent. Hæc neque palato neque stomacho grata sunt: frixa tamen eduntur: neque enim aliter placebunt: nutrimenti plurimum exhibet, nec facile excernuntur. Circa Pharum insulam Alexandria uicinam multa proueniunt: in Illyrico uero & sinu Ionico gignuntur magna. Sūt & pholades apud Athenæum, quæ & nutriunt plurimum: sed uirus olent, prauisque succi sunt.

Λαπίς.

Λαπίς ἁλῆος.

Λαπίς ἁλῆος.

ἁπλῆ.

ἁπλῆ.

ἁπλῆ.

Φολὰς.

Patella.

Patella fera.

ὅππῃ ἁλῆος.

πειος.

Auris marina.

Murex.

<sup>1</sup> Aristoteles Λαπίδα & Λαπίδα ἁλῆος appellat, & ὅππῃ ἁλῆος. Theodorus patellam, patellam feram & aurem marinam. <sup>2</sup> Concoctu difficile, &c. ἐνυατὸς βασι, in Athenæo, id est, concoctu facilis, sed forſitan menda est in exemplaribus. <sup>3</sup> Aporrhais, &c. Theodorus muricem interpretatur. <sup>4</sup> Quæ ὅππῃ, &c. Vti Antigonus Caristius

ὅυς ἀφροδίτης. tradidit, ὅς ἀφροδίτης uocatur Æolice. 5 Videntur & φολᾶδες apud Athenæum ex E eodem esse genere cum his.

De biualuibz, & primo de ostreis.

Cap. CCXLII.

ὄστρεον.  
ἀμφὶ ὄστρεον.  
ὄστρεον.  
ὄστρεον.  
ὄστρεον.  
ὄστρεον.

**E** Biualuium genere ostrea est, testa illi aspera scabrâque crassioribus labris. Quod ouum uocatur, non semper, sed uere habent ostrea: mox enim tempore procedente, minuitur: demumque totum prope aboletur: in cœnoso maxime limo gignuntur. Gaudent dulcibus aquis, & ubi plurimi influunt amnes: ideo pelagia parua & rara sunt. gignuntur tamen in petrosis carentibusque dulcium aquarum aduentu. Gignuntur etiam quandoque & in fluuijs & paludibus stagnantibusue locis. uerum optima sunt ostrea marina, quæ prope paludem aut fluuium nascuntur: maiora enim sunt & dulciora, meliorisque succi. Quæ uero ad litus aut inter saxa gignuntur ubi f deest limi aut aquæ dulcis copia, parua sunt, dura, & gustu amara atque mordacia, idcircoque neque in cibo grata. Grandescunt syderis quidem ratione maxime, ut diximus: sed priuatim circa initia æstatis, inquit Plinius, multo lacte prægnantia, atque ubi sol penetrat in uada. Hæc uidetur causa quare minora in quibusdam locis reperiuntur: opacitas enim prohibet incrementum: & in tristitia minus appetunt cibos. Vere, inquit Athenæus, & circa æstatis initia optima sunt plenæque & tumentia: atque unâ cum dulcedine quadam marinum referunt saporē: stomacho quoque grata sunt. Variant coloribus: rufa in Hispania, fusca in Illyrico, nigra & carne & testa in Circeiis. Præcipua uero habentur in quacunque gente, spissa & salua sua lubrica: crassitudine potius spectanda quam latitudine: neque in luto capta neque G in arenosis, sed solido uado: spondylo breui atque non carnosio, nec fibris laciniosis, ac tota in aluo. Addunt peritiores notam, ambiente purpureo crine fibras: cōque argumento generosa interpretantur calliblephara appellantes. Gaudent & peregrinatione, transferrique in ignotas aquas: sic Brudusina in Auerno compasta, & suum retinere succū, & à Lucrino adoptare creduntur. Hæc sunt dicta de corpore. Discrimen etiam ostreorum fecere nationes & litora, sicuti & in aliorum aquatiliū generibus: ut & ostrea ali- 6 ubi atque aliubi meliora inuenirentur. Sergius orata Lucrina nobilitabat ostrea, qui eorum uiuaria prius omnium inuenit, cum nondum Britannica seruiebant litora. At Mutianus Cyzicena, maiora Lucrinis: dulciora Britannicis: pleniora Lucensibus, teneriora Istricis: candidiora Circeiensibus: sed his neque dulciora neque teneriora esse ulla, author est. In Indico mari H Alexandri rerum authores, pedalia inueniri prodidere. Necnon inter nos quidam tridacna appellauit: tantæ magnitudinis intelligi cupiens, ut ter mordenda essent. Est ostrei quoddam genus, quod pictoribus usui est: crassitudine plurimum excedit, & florem illum, non intra testam, sed foris habet: comperiri id genus locis Caria potissimum solet. Ostreorum dos in medicina in hoc loco tota dicetur: nec potest uideri satis dictum de his, cum palma mensuram diu iam tribuatur illis. Ostrea testatorum omnium molissimam habent carnem, sed glutinosam, stomacho idonea sunt, minus nutriunt, magisque aluum cient. Et cum cætera omnia elixa dantur aut assa, ostrea

Calliblephara.

Tridacna.

- A** ostrea uel cruda mandi solent: quidam in sartagine frixis utuntur. Contra leporis marini uenena ostrea aduersantur. Ostrearum testæ crematæ uires habent buccinarum similes, nisi quòd minus crassarum sunt partium. Faciei sordes abstergunt, splendidos reddunt dentes. Elotæ, humida ulcera cauâque replent, atque ad cicatricem ducunt: excrescentem in ulceribus carnem reprimunt. Stomachum, inquit Plinius, unice reficiunt ostrea, fastidiis medetur, molliunt aluum leniter. Eadem cocta cum mulso, tensusmo qui sine ulceratione sit, liberant: uescicarum ulcera quoque repurgant: *Alias, urina distillationibus.* in conchis suis cocta, uti clausa uenerint, mire distillationibus profunt. Testæ ostreorum cinis uuam sedat, & tonsillas admixto melle. Eodem modo patotidas, pauos, mammarumque duritias, caput ulcera ex aqua, cutemque mulierum extendit. Inspergitur & ambustis: & dentifricio placet. Pruritis quoque & eruptionibus pituitæ ex aceto medetur. Crudæ si tundantur strumas sanant, & perniones pedum.

1 Ostrea, &c. ὄστρεον etiam quandoque dicitur: quanquam ὄστρεον fere generale est omnia complectens quæ testa integuntur, ut satis explicat Galenus 11. lib. de simplic. medic. Et ὄστρεον quoque nonnunquam æque generale est ad omnia testata. Aliquando uero ea sola comprehendit, quæ sua natura immobilia sunt.

De chamis seu conchis.

Cap. CCXLIII.

- 1 **C**oncharum siue chamarum genera, chame trachæa, id est aspera: chame leios, id est leuis. Glycymerides, uel, ut alij uolunt, glycyamerides, & pelorides, bivalues sunt, & generis uarietate inter se distantes, & figuræ *Χάμη. Κόψη. Κόψη. Chame. Concha. Χάμη Τραχέα. Κόψη Φυκτία. Χυμίοις μαινοί.*
- 2 rotunditate. Chame trachæa (quæ & à nonnullis glycymerides dicitur) ab *Χυμίοις.*
- C**aliis generibus differt, quòd non solum aspera scabrâque sit eius testa, sed striata & quasi uirgulas quasdam prominentes habens per testæ longitudinem extensas. Caro illi intus maris salsuginem sapore refert, & duriuscula est: & ut Iecilius tradit, mali succi, parumque nutrit, & facile excernitur: ut *Χυμίοις.*
- 3 uero Diphilus, stomacho grata est. Ab hac differt chameleios, quod testam habet leuiorem, latiore & pellucidam: carnemque intus suauiore, quæ concoctu facilis est, bonique succi, uberius alit, stomachoque grata est. Huic suauitate præfertur glycymerides: uerò à peloride uincitur. Pelorides reliquas magnitudine superant, sed glycymerides maiores sunt quàm pelorides. Glycymerides carnem habent duram, quæ non parum alimenti præstat: & trachæas succi bonitate superant, sed peloridibus inferiores sunt: *Glycymerides Chame, glycymerides. Pelorides. Ρυαελίς. Chama pelorides.*
- D**stat: & trachæas succi bonitate superant, sed peloridibus inferiores sunt: urinam magis cient glycymerides quàm pelorides. Emolliunt aluum pelorides. Discrimen his etiam ex loco est, (quanquam chamæ omnes locis arenosis sui ortus initia capiunt:) quæ enim in Dicearchia siue Puteolis, aut Lucrino lacu, aut circa Alexandriam nascuntur in paludibus, optimæ sunt. Quæ uero supra Diolum & Pharon atque Pontem, quo Pharos Alexandriæ iungitur, oblongæ sunt glandium quercinarum instar, & hirtæ similiter atque fagorum glandes quos echinos uocant, & candidiores, carnemque intus duriore pariter & acriore. Chamas, sunt qui ita diuidunt, ut alia chame trachæa dicatur, alia basilica regiæue, quæ & pelorides dicitur. Quæ basilicæ à nonnullis dicuntur, ab aliis peloriæ, inquit Diphilus, copiosum cre-

Chame.

ant alimentum, (præcipue quæ grândiores sunt) bonumque gignunt succum, & stomacho gratæ sunt, nec facile excernuntur. Chamæ cum coquuntur, duriores euadunt, & suaves si rite condiantur. Chamarum, inquit Dioscorides, in exigua aqua coctarum ius aluum ciet, id cum uino assumitur.

κάρνα  
αργός.  
γάλακτος.  
Concha.

1 Chame, &c. κάρνα, forsitan dicta ἀπὸ τοῦ καλῶναι. 2 Chame trachæa. Maces dones hanc κάρνα, Attici uero κάρνα dixere. 3 Ab hac differt chameleios, &c. Has, ni fallor, Aristoteles galadas uocauit, concham scilicet læui testa, an uero sui generis concha sit? 4 γάλακτος ἀπὸ τοῦ γάλακτος. 5 Conchæ nomen unam speciem significat, nempe chamen, ut apud Aristotelem lib. 4. histor. animalium: sed & priuatim chamen trachæam, ut lib. 5. & apud Oribasium lib. 2. Plinius conchas appellauit, non quæ testa adeo fragili clauduntur atque cochleæ, pectines, digiti: sed quæ firmiore, ut purpuræ, buccina, pinna. Concha & quibusdam non minus generale est quàm ostreum: continet enim omnia quæcunque testa intacta sunt. Nonnunquam etiam pro F testa ipsa accipitur, ut Columella in horto, Implicitus conchæ limax: & Cicero libro secundo de natura deor. de pinna, Duabus parula conchis: &, comprimit conchas.

De mitulis siue musculis &amp; tellinis.

Cap. CCXLIII.

Mitulus.  
Musculus.  
Mys, ὁ  
μύς.

Mitulus qui & musculus è testaceorum bivaluium genere est testas habens cluiles & reseatiles, leuésque, labris tenuibus. Connectuntur inter se mituli, fauiscant & aceruantur muricum modo: nascuntur enim more ceparum, ut minores subinde oriantur iuxta principium. Viunt in algosis, gratissimi autumno, & ubi multa dulcis aqua miscetur mari: ob id Ephesij, & qui in Ægypto inueniuntur, laudatissimi. Procidente hyeme, amaritudinem trahunt, coloremque rubrum. Iuba in iis uoluminibus quæ G scripsit ad C. Cæsarem Augusti filium de Arabia, tradit mitulos marinos ternas heminas capere. Musculorum duæ sunt species: maiores qui salem 2 uirumque resipiunt: ideoque gustui ingrati. Duri item sunt & concoctioni 3 renitentes, sanguinem procreant crassum, & pituitæ multum: & succum denique non adeo probum. Copiose alunt, uentrémque & urinam ciet. Hi si assentur sitim uehementem excitant: si uero elixentur, & acrioribus quibusdam, ut sinapi nasturtiõe condiantur, nõ adeo uirum resipiunt. Minores, rotundi magis sunt, & externis testarum partibus hirti, tenuiori- 4 busque testis, carne & molliore & dulciore, bonique succi: uerum minus alunt & urinam ciet magis. Ora mandentium atque fauces acri mordacitate uexant, gulam arteriamque exasperant: tussim quoque siccam & rau- H cedinem efficiunt, uocémque obtundunt. Deteriores sunt qui in locis arenosis, aut inter testas figlinas gignuntur, iis qui in algosis proueniunt. Myaces, inquit Dioscorides, id est, mituli laudatissimi in Ponto: caro eorum ad 6 canis morsus utilissime imponitur. Crematis eundem buccinis effectum præbent: priuatimque plumbi in morem eloti, oculorum medicamentis cum melle utiles sunt: palpebrarum nanque crassitudinem & albugines, cæteraque quæ oculorum claritati officiunt, exterunt. Atque in aliis partibus sordida ulcera capitisque pustulas sanant. Qui circa Ephesum gignuntur mys, id est mituli, inquit Athenæus, pectunculis meliores sunt: chamistamé inferiores: urinam magis quàm aluum citant. Myacum ius, inquit Plinius, traditur

Hæc Plinius non uni speciei, sed myacum, id est, mitulorum generi tribuit.

- A** traditur aluum & uellicas exinanire, interanea distringere, omnia adaperire, renes purgare, sanguinem adipemque minueres: itaque utilissimū sunt hydropicis, mulierum purgationibus, morbo regio, articulari, inflationibus: item prodesse felli, pituita: & pulmonis iocineris splenisque uitiis, rheumatismis. Fauces tantum uexant, nocēsque obtundunt. ulcera quæ ferunt aut sint purganda sanant: item carcinomata. Cremati autem ut muri-ces, & morsus canum hominūque cū melle, lepras, lentigines: cinis eorum potus emendat caligines. Gingiuarum & dentium uitia, eruptiones.
- 7** pituita, & contra doricinium aut opocarpathon antidoti uicem obtinent. Tellinem à Romanis mitulum etiam uocari existimauere nonnulli. Telli-
- B** ne circa Canopum insulam in Canopico ostio sitam frequentes sunt: & locis arenosis gignuntur, & in litoribus quæ saepe fluctibus agitantur. Quarū quæ tenuiores exiliorēsque sunt, basilicas, hoc est, regias appellant. Quæ uero fluuiatiles, ut quæ in Ægypto & Nili superioribus partibus gignuntur, maiores sunt & suci pleniores dulcioresque. In uere optimæ sunt tellinæ.
- 8** Recentes bonam faciunt aluum, sed præcipue ius earum: salsas uero tellinas uistas, adeo urentem efficere cinerem ferunt, ut si cum cedria mixtus instilletur, auulsos palpebrarum pilos renasci non patiatur.

Τέλλινα.  
μίτυλος.  
Ἐφύθρου.  
Basilica tel-  
lina.

1. Connecuntur inter se mituli, &c. Mituli, inquit Plinius, spōte naturæ in arenosis proueniunt. 2. Musculorū species. Plinius ita: Degenerant myaces in duas species. 3. Hos Plinius mitulos, Oribasius myacas, Athenæus μύες ἐκινάδεις uocat, μύες αὐτὸν & μύες in genere masculino. 4. Minores, &c. Hos Plinius myrseas, Oribasius & Athenæus, μύες in genere fæmineo appellant. 5. Molliore, ita Oribasius, & Athenæus. Plinius uero dunore carne esse scribit. 6. Hæc Plinius alteri myacum generi tribuit, nempe priori & quod maius diximus, mitulos uocat Plinius. 7. Tellinem, &c. Romæ circumscribi narrat Hermolaus pusillas quasdam cœchulas: quas qui uendunt, tellinas prædicant, uulgaribus cœchis minores & leuiore, candidasque nec stricatas: quas Veneti piscatores à capparibus similitudine capparoculas appellant. 8. Quæ Dioseorides tellinis, eadem Plinius pectunculis attribuit: nec quicquam πηδύχων, id est, de pectunculis apud Dioseoridem habetur.

Μύρσεια,  
μίς, ὄ.  
Mitulum.

De pinna.

Cap. CCXLV.

**P**inna concharum generis est, duabus grandibus patula conchis, scabris, nec tamen striatis, labris tenuibus: nunquam sine comite est, sed custodem intra se continet, aut squillam parua, aut cancellum, pinnotherem uocant & pinnophylacem: quo quidem custode priuata, perit breui tempore: neque enim absque mutua opera uiuere possunt. Pandit se pinna, luminibus orbem corpus intus minutis piscibus præbens. Assultant illi protinus: & ubi licentia audacia creuit, implent eam: hoc tempus specularis index, morsu leui significat: tum admonita squilla morsu pinna, comprimit conchas, & quicquid inclusit, exanimat, partemque socio tribuit. Nascitur pinna in limosis arenosisque locis ex bysso, id est, uillo siue lana quadam pinnali, subrepta, semper radice innititur, neque sedem unquam mutare solet, neque euulsa uiuere potest. Quod ouum uocatur, semper habet, sed aliàs maius, aliàs minus. Pinnæ copiosum præbent alimentum: uerum argre & concoquantur & digeruntur: urinam cient. Pinnæ optimæ sunt te-

Pinna, Plin.

*Limosus herbo-  
sisq. τῶν κιν-  
δύων.*

nellæ, plenæ carnosæ uel, quæ in limosis herbofisq. uadis gignuntur: & u-  
bi mari dulcis aqua miscetur, & locis tranquillis ac uento carentibus: te-  
neriores enim hic nascuntur, quàm ubi fluctibus agitantur. Grandioribus  
paruæ: & quæ uere & æstate capiuntur, aliis præstant: sunt enim & suauio-  
res & pleniores. Quæ magnitudine media sunt, carnem quidem habent  
mollem, candidam ac dulcem: collum autem durum concoctu difficilem,  
corruptionique renitentem: collo nanque corpus reliquum facilius cor-  
rumpitur. Elixis assæ duriores euadunt, præsertim si uino fuerint aspersæ.  
Earum autem caro quæ in uino & aceto macerata sunt, mollior est, sed fla-  
tus generat. Pinnam esse concham illam celebrem in qua gignuntur mar-  
garitæ nonnulli prodidere. Theophrastus in eo libro qui de lapidibus in-  
scribitur, non pinnam, sed pinna similem esse prodidit. Androsthenes uel <sup>F</sup>  
ro, prorsus aliam, quæ apud Indos berberi dicitur. Hæc pectunculo forma  
similis est, sed neque striata ut pectunculus, neque ita aspera: neque duas ue-  
luti auriculas habet, quemadmodum pectunculus, sed unicam. Chares Mi-  
tylencus, ostreo similem concham esse prodit, sed oblongâ & crassam, car-  
ne intus ampla, candida & odorata. In nostro mari, inquit Plinius, reperiri  
solebant margaritæ: crebrius circa Bosphorum Thracium, rusæ ac paruæ in  
conchis quas myas appellant. at in Acarnania quæ uocatur, pinna gignit.  
Quo apparet nō uno genere conchæ nasci: nam & Iuba tradit Arabicis cō-  
cham esse similem pectini insecto, hirsutâ echinorum modo: ipsi uniō-  
nem in carne ipsa esse grandini similem. Indicus maxime has mittit occa-  
nus. In Britānia quoque paruas atque decolores nasci certum est. Præcipue <sup>G</sup>  
autem laudantur circa Arabiam in Persico sinu maris rubri,

*Concha mar-  
garitifera.*

*Berberi,  
n. ὁ βέρβη.*

<sup>1</sup> Ex bisso. ita legit Theodorus apud Aristotelem, sicuti etiam nostra habet exem-  
plaria Græca. uerum Athenæus, & τῶν βίσσων habet, id est, ex profundo. <sup>2</sup> Quo pa-  
cto in concha & generetur, & incrementum capiat margarita, uariæ sunt auctorū sen-  
tentia, ut uidere est apud Plinium & Athenæum & Solinum.

## De pectunculo.

## Cap. C CXLVI.

*Pectunculus.  
Pecten.  
κτείν*

**P**ECTUNCULUS testacei generis bivaluis est, testas habens fragiliores, sca-  
bras, & quali uirgulis quibusdam striatas. & reseratiles, ut quæ altero  
latere nodo ligantur. Binas in testis ueluti auriculas habet. Id quod ouum  
uocatur, non semper, sed uere continet: mox tempore procedente minui-  
tur: demumque totum aboletur. Pectunculi inueniuntur & nigricantes, & <sup>H</sup>  
albi, & rufi. Nigricantes alij præferunt, ut cādidos alij: sed squalore trahunt  
rufum colorem: & locis quibusdam etiam defecerunt propter siccitates. lo-  
cis arenosis sui ortus initia capiunt: celeri incremento augentur: quippe qui <sup>6</sup>  
anno perfici possint. Latent aliquandiu in arena. Latent fere & circa canis  
ortum, & magnis frigorebus: pectines admoto digito dehiscunt, mox com-  
primunt ut cernentes. De ferramento quo capiuntur sæpe exiliunt, ita ut  
uolare uideantur. Plinius, extra aquam, inquit, uolitant sagitta modo. Qui  
candidi sunt atque lati, dulciores habentur: sed candidi: duri, rufi, uirosi: ua-  
rij, mediocres sunt. Hæc Xenocrates: Sed candidi molliores sunt Diphilo  
autore: neque uirosum quippiam habent, & alium citant. Ex nigris autē  
& rufis



**A** & rufis maiores, atque uerni sapore sunt iucundo. Pectunculi omnes facile concoquuntur, stomachoq; & uentri grati sunt, si cimino & pipere condiuntur. Pectunculi eò præstantiores sunt quo maiores, testæque magis cōcaua, & colore nigriores. Vere optimi sunt & æstate: atque his potissimum temporibus augentur plenioresque fiunt: sed pro lunari potestate maxime. Cæteris præstant & magnitudine & succi probitate, quæ Mitylenæ capiuntur. Numerosos fert Pontus, sed exiles, & qui non temere in magnitudinē crescunt. Pectunculi alimentum uberius corpori exhibent quàm chamæ: sed succum & deteriorem procreant, & qui non tam facili aluum faciat. Concoctionem facilius admittunt quàm ostrea. Sapore sunt dulciore: at nimiam illam dulcedinem per cocturam exuunt. Aluum magis mouent iurulenti assis: & quo magis assentur, eò minus succi cōgeniti erit reliquum, minufque aluum tentabunt: si in suis testis assentur, magis nutriunt. Pectunculi in cibo urinam cient: & ea quæ circa uesicam sunt, ulcera uel fordida iuuant, etiam si escaram contraxerint. Purgatur uesica, inquit Plinius, pectinum cibo. Pectunculi falsi triti cum cedria pilos in palpebris inutiles euulso cohibent.

De dactylis siue unguibus, & pernis.

Cap. CCXLVII.

**C**oncharum è genere sunt dactyli unguësue ab humanorum unguum *Dactylus.* similitudine appellati. binis clauditur unguis ualuib; leuibus, fragilibusque, uerum utroque latere connexis. Exigua corporis parte extat: reliquo autem toto corpore, perinde ac in cubili occultitur. Ad strepitū se subtrahit, inferiusque sublidit, quoties ferramētum sentiat. Permanet immobilis in locis arenosis, nulla innixus radice: qui si è testa euellatur, uiuere nequit. Ex his mares alij donacas, alij aulos uocant: fœminas onychas, mares liuidas quasdam ceu uirgas in testa cōtinent, colorēmque habent cælestē. Dulciores fœminæ sunt, & unicolores: urinam mares mouēt, calculosos iuuant, & quicumque aliàs difficulter urinā reddunt. Dactylis natura, inquit Plinius, in tenebris remoto lumine alio fulgore clarere: & quāto magis humorem habeant, lucere etiam in ore mandentium: lucere in manibus, atque etiam in solo atque ueste decidentibus guttis. proprium hoc solenibus atque purpuris est, quod cū in iusculo coquuntur, id crassius reddant. Copiosum, *Donax.* *Aulos.* *Onyx.* *Cochæ longa.* *Perna.* sed malum succum procreant solenes & glutinosum. Innocui maxime si cum sale edantur & aceto: nam cum oleo & sale deteriores sunt. Quo grādiore eò præstantiores sunt, uigent æstate maxime. Conchæ longæ carnes, inquit Plinius, ex multo potæ cū aquæ pari modo iocineris doloribus profunt: aut si febres sint, ex aqua multa. Pernæ concharum generis circa Pontias insulas frequentissimæ. Stant ueluti suillo crure longo in arena defixæ, hiantesque quā limpitudo est, pedali non minus spatio uenantur. Dentes in circuitu marginum habēt pectinatim spissatos, intus pro spondylo grādis caro est. Testatorum genera hæc traduntur.

1 Conchæ longæ carnes, &c. Digtos, ut ego sane arbitror, conchas longas uocauit Plinius.

# DE DIFFERENTIIS

De zoophytis, & primo de tethyis uertibulísue.

Cap. CCXLVIII.

E

*Zoophyta.*

*Tethys.*

*Tethos.*

*Tethyon.*

*Tethya.*

Sunt animalia quædam exclusa omnino iis quæ in genera diuisimus: quæ scilicet ancipiti natura sunt: neque enim in iis perfectum animal est, neque planta. Quæ enim holothuria uocantur atque pulmones & plura eiusmodi, alia in mari, parum à plantis differunt sua ipsa absolutione: uiuunt enim sine ullo manifesto sensu perinde ac plantæ absolutæ. In his tethya parum sua natura à plantis differunt, ut uideantur plantæ quæpiam marinæ, aut fungi. propius tamen ad animalium naturam accedunt quam spongia. In hoc certe cum plantis conuenit: quia non nisi adhærendo uiuit. sed cum aliquid habeat carnis, sensum aliquem habere uideri potest: sed olfactum tamen minime habere cernitur. Inter testata, tethya peculiarem sortita sunt naturam: his enim solis corpus totum tegumento includitur, nequaquam striato, sed leui: cuius durities inter testam & coriû est, adeo ut modo præduri bubuli tergotis secetur. Adhæret id genus saxi sua testa: duoque seposita inter se foramina exigua admodum habet, & uisum uix patientia, quibus humorem cibo accommodatum accipit: & quantum humoris remaneat, reddit: alterum scilicet & quasi os sit, alterum uero ueluti excrementi ostium: excrementum enim in eo nullum spectatur manifestum, quale in cæteris ostreis uel echineum, uel quod appellant papauer cõtinetur: sed neque quod ouum appellatur, in eo ullo tempore minuitur aperte aut augetur. Dissecto, primum membrana carnosum ambiens partem ostenditur, quæ uertibuli caro ipsa continetur, nulli è cæteris similis, in omnibus tamẽ sui generis eadem. Adhæret caro hæc utroque ex latete membranæ circumdanti & corio: & quæ adhæret, artius utranque in partem est tethyon, uidelicet ad meatus illos duos, quorû alter crassior, alter tenuior est. Cauum intus utrinque exiguo quodam interueniente continuo, in quo uitæ principium continetur: humorq; in altero cauo consistere solitus est. Tota corporis eorum natura carnosæ est. nam pars alia quæ uel instrumentalis uel sensuæ sit, nulla omnino percipitur: color tethyis aut pallidus aut rubidus est. Tangentium manus qualitate quadam ita afficiuntur, ut uix elui possit. Generantur in rimis aut cauetnis saxorum, maxime tæro in cæno, & litoribus quæ phyco algæque marina abundant. Inueniuntur & in musco marino, aut aliis in herbis foliisue marinis. Præstantissima in Smyrna Asiæ: in Ægypto nulla inueniuntur. plurimum dant alimentum, renibus profunt & stomachicis, tenasimumque patientibus atque ischiadicis. Lateris dolores leniunt tethya similia ostreæ in cibo sumpta: torminibus & inflationibus succurrunt: cachecticis quorum corpus macie conficitur, tethya utilia sunt cum ruæ ac melle.

*Vertibulum.*  
*Callus.*

1 In his tethya, &c. Theodorus modo uertibulum uertit, modo callus. 2 Hæc (ut zoophyta alia) inter testacea numerat Aristoteles, non quod testa includuntur si licet: sed (ut eequidem arbitror) quia minimum habent & sensus & motus, quemadmodum testata. Præterea nihil duri intra se continent, quod aut osseum aut cartilagineum sit, sed mollia penitus sunt: ortusq; sui initia à limo solo habent ut testacea: ideoque testatis natura similia. Et quidem Plinius tethya ostreæ similia dixit. 3 Inueniuntur

A ueniuntur & in musco marino, &c. Inueniuntur tethya, inquit Plinius, in foliis marinis sugentia, fungorum uerius generis quàm piscium. 4 Tenaismumque patien-  
tibus, &c. Eadem & tenaismum dissoluunt, renumque uitia, inquit Plinius.

De holothurio, stella, & pulmone marino. Cap. CCXLIX.

1 **Q**Uæ holothuria uocantur, non ut tethya adhærendo, sed absoluta ui-  
uunt: mouere tamen se nequeunt, sicuti nec ostrea. uiuunt quidē sine  
ullo sensu, perinde ut plantæ absolutæ (ut epipetron): ut eadem  
fere sit natura quæ fruticibus, à quibus parum differunt, sua scilicet absolu-  
tione. Quæ stella uocatur, neque animal perfectum, neque planta, sed am-  
bigit atque ancipiti est natura, quemadmodum & urtica. Forma eius stel-  
lis quæ pinguntur, similis est. Parua admodum caro est illi intus, extra du-  
2 riore callo. Conchas aggressa eas exugit, omnemque cibum statim peragit:  
adeoque natura calida est, inquit Aristoteles, ut omnia in mari cōtacta de-  
coquat & adurat. Draconis marini scorpionumque ictus carnibus earum  
impositis: item araneorum morsus sanantur. In lumina, contra omnia ue-  
nena uel potu uel ictu uel morfu noxia, succus earum ex iure decoctarum  
3 efficacissimus habetur. Inter hæc & pulmo naturam habet pene fruticis:  
sponte enim prouenit, uiuuntque absque ullo sensu: non tamen adhærendo,  
sed absolutus, perinde ac planta absoluta. Pulmo marinus recens, tritus at-  
que illitus, podagris permionibusque auxiliatur: aiuntque pulmonem ma-  
rinum decoctum in aqua calculosis prodesse epotum. Pulmonis marini ci-  
nis adalligatus egregie mulierum profluvia purgat.

*Holothuria.*

*Stella, Ἀστὴρ.*

*Pulmo.*  
*Πολύμων.*  
*Πολύμων ὁ πα-  
λαιοὶ.*  
*Pulmo mari-  
nus.*

C 1 Quæ holothuria, &c. Tubera uocat Theodorus. 2 Copchas aggressa eas e-  
xugit. Quā utatur astutia in exugendis ostreis, legas apud Oppianum. 3 Inter  
hæc, &c. Halipleumon, ni fallor, est apud Plinium lib. 32.

*Tubera.*

*Halipleumon.*

De urtica.

Cap. CCL.

**U**RTICA item ancipiti natura est, ambigens & plantæ & animali. Nulla  
huic testa, sed corpus omni ex parte carnem præ se fert: urtica etenim  
ipsa quasi interna ostrearum caro esse uidetur. Sentit & manum admotam  
corripit adhærescitque, perinde ac polypus suis brachiis. Atque dum admo-  
ueri sibi manum sentit, colorem mutat, inquit Plinius, & contrahitur. Os  
medio in corpore cōtinet: hoc in maioribus urticis euidentius est: & de saxo  
D quasi de testa uiuit: & si forte in eam inciderint pisciculi, eos excipit, reti-  
nētque: atque in hunc modū deuorat quæcunque nacta est esculenta. Hæc  
Aristoteles. Plinius, Contrahit urtica se, inquit, quammaxime rigens, ac  
prænatante pisciculo frondē suam spargit: (carnosæ nanque frondis his na-  
tura) complectensque deuorat: aliàs marcenti similis, & iactari se passā algæ  
uice, contactos pisces attritūque petræ scalpentes pruritum inuadit. Ex-  
crementum nullum in urtica esse conspicitur: sed in hac re signilis stirpibus  
est. Maiores tamen meatum, ut ostrea, quo excrementum secedat, tenuem  
scilicet fistulam habet parte superiore. urtica enim ipsa, uti modo diximus,  
quasi interna ostrearum caro esse uidetur: saxo uero utitur perinde ut testa:  
saxo enim adhærere more nonnullorum testa intectorum solet urtica: & ta-  
nenit.

*Urtica.*  
*Ἰκταλίσκη.*  
*κρίδη.*

*Locus hic A-  
ristotelis mihi  
quidem suspen-  
ditus est: neque  
sane uetus in-  
terpres cū exē-  
plaribus no-  
stris Græcis cō-  
uenit.*

men quoties libeat absolui, absolutumque uagari quoddam urticarum genus notatum est, quod & echinos & pectunculos in quos offenderit, corrodit. Quæ enim in cavis sinuosisque adhærent, nunquam à saxis absoluuntur: quæ uero in saxorum planis marginibus uiuunt, absoluta sedibus uagantur. Duplex genus percipitur urticarum: alterum corpore paruo, quod cibo aptum est: alterum maiusculo duroque, quale circa Euboiæ Chalcidem gigni scimus. Sunt omnes hybernis mensibus carne constante atque rigidiuscula: quamobrem per id tempus capiuntur, ciboque idoneæ sunt. At æstate deteriores fiunt: præmadent enim & marcent, ut si tetigeris, facile discerpantur atque dispereant. Denique nulla tantisper euelli integra potest: ac æstus impatientia, saxa subire interius solent. Vrticis idem gignendi modus est, atque iis quæ testa includuntur. Mordent urticæ non ore, sed tactu totius corporis: uis enim in his pruritu mordax, eadémque quæ terrestribus urticæ. Vrtica (ut author est Diphilus) & uentri & stomacho grata est, aluum atque urinam ciet, parciulque nutrit: ut uero Xenocrates tradit, urticæ gustui suauis, sed stomacho admodum ingrata sunt. Assæ elixis ad aluû mouendam magis idoneæ: quæ lapillis adhærent, urinam magis ciet: quæ passo aut uino mulso condiuntur, facile concoquuntur, aluûmque mouet: quæ autem coquuntur in passo unâ cum oleo, lubricum quidem illud retinent, aluûmque ciet: sed uentrem replent, & difficulter in uentriculo conficiuntur. Vrticam marinam in uino potam calculosis prodesse aiunt. In oleo coquuntur urticæ: quo ne pili renascuntur, nonnulli sunt usi.

De spongia.

Cap. C C L I.

G

*Spongia.*  
*av. nos.*

**S**pongia nullam habet carnem, sed similis omnino plantis est: præsertim cum adhærendo tantum uiuere possit, absoluta uero minime. At paruû aliquod discrimen est. Spongia nanque sensum aliquem habere creditur, argumento quod multo difficilius abstrahuntur, nisi clanculum agatur, ut aiunt. Præterea ad auulsoris accessum contrahuntur, ita ut euelli difficile sit: quod idem etiam faciunt quoties status tempestasque urget. Plinius, Spongiam, inquit, animal esse docuimus, cruore petris in hærente. Aliqui narrat & auditu regi eas, contrahique ad sonum, exprimentes abundantiam humoris, nec auelli petris posse, ideo abscindi & saniem emittere. Quin & eas quæ ab aquilone sint genitæ præferunt cæteris: nec usquam diutius durare spiritum medici affirmant: sic & prodesse corporibus, quia nostrû suo miscant: & ideo magis recètes magisque humidas, sed minus in calida aqua, minusque unctas, aut unctis corporibus impositas: & spissas minus adhærescere. Oppianus quoque tradit, à spongiis euulsis distillare saniem, quæ si spongiatoris forte naribus adhæreat, sepiissime hominem suffocat. In saxorum rimis & cauernis oriuntur spongiæ, non aliter atque ea quæ testis in tecta sunt. Aluntur conchis, pisce, limo. Et uiuere spongas esca manifesto conchæ in his repertæ ostendunt: & aperiendo claudendoque pisciculos capit spongia. aperit autem antequam ingrediantur: claudit & contrahit cû ingressi sunt. Adhæret nec parte una nec toto: (inter sunt enim fistulæ quædam

- A**dam inanes) sed pluribus passim particulis hæsitæ, & quasi membrana extenta subesse radicibus earum uidetur. Superne autem cæteri meatus concreti propemodum latent. At uero inferne quaterni aut quini patent, per quas pasci existimantur. Color illotis uiuisque nigricans est: candidæ autē *Quoniam modo candida sunt docent Plinius & Dioscorides.* cura hunt. Spongiarum tria genera accipimus: sunt nanque aliæ raræ, aliæ spissæ, aliæ quas nominant achilleas. In genere illo spisso quæ præduræ sunt atque asperæ, hirci nomine tragi nuncupantur: minus spissum & mollius manos. Tertium quod achilleum uocatur tenuissimum & spississimum & *Τραγος, Τραγος, Μανος. Μανος. Αχιλλεια σπῆγια.*
- 2** ualidissimum est. Genus hoc inuentu perquam rarum est. Ex hoc penicilli.
- 3** Mollissimum uero genus spongiarum penicilli. Trogus author est penicillos mollissimos circa Lyciam nasci in alto, unde ablata sunt spongiæ. Si enim euenerit forte ut sponsia cum euellitur, abrumpatur: residuo item nascitur & completur. Magnitudine amplissima sunt solutæ illæ & raræ spongiæ: sed mollissimæ spissæ & tenuissimæ, quæ scilicet altis tranquillisque nascuntur gurgitibus: flatus enim ac tempestates, spongas quoque ut cætera altitia, reddunt duriores, & incrementum impediunt. Genus item aliud est, quod nomē aplysiæ inde accepit, quod elui non possit: habet hoc ampliores illos meatus, sed reliquo corpore densum est: nihilo tamē densius quam quæ ante numerauimus genera, quamquam lentius est, & ex toto pulmone simili: pessimum omnium hoc genus est. Sensum id genus habere diuque uiuere inter omnes præcipue conuenit: cognosci præ cæteris spongiis cō facile potest documento, quod cum illæ albicent, limo inter lauandum subsciente, id semper nigrorem ostendit. Quidam spongas ita distinguunt, alias ex his mares existimauere tenui fistula spissiorēque: quarum quæ duriores sunt, tragos appellant: alias fœminas, maioribus fistulis ac perpetuis. *Τραγος.* Medici inscitia quadam ad duo nomina eas rede gere: Africanas, quarum firmitus sit robur: Rhodiacasque, ad fouendum molliores. Nunc autē mollissimæ circa muros Antiphelli urbis reperiuntur. Sponsia noua non sicut lana aut linamentum materia duntaxat est, qua applicantur medicamenta ad irrigationes idonea, sed & manifeste desiccatur, uulneraque enāma conglutinat ( si noua sit, & maris odorem adhuc referat) si eam cum aqua aut uino aut posca pro corporis ratione imponas. Quod si uetus sit, & maris odorem amiserit, non æque desiccatur: immo inutile esse sentit Dioscorides.
- D** Mollissimum genus earum penicilli oculorum tumores leuant ex mulso impositi: item abstergenda lippitudini utilissimi. Imponuntur spongiæ ipsæ epiphoris ex posca: ex aceto calido ad capitis dolores. De cætero recetēs discutiunt, molliunt, mitigant: ueteres conglutinant uulnera, inquit Plinius. Vfus earum ad abstergenda, fouenda, operienda à fotu dum aliud imponatur: ulcera quoque humida & senilia impositæ siccant. Fracturæ & uulnera spongiis utilissime fouentur: sanguis rapitur in secando, ut curatio perspicui possit. Et ipsæ uulnerum inflammationibus imponuntur, nunc sicca, nunc ex aceto inspersa, nunc è uino, nunc ex aqua frigida: ex aqua uero cælesti impositæ, sceta recentia non patiuntur intumescere. Imponuntur & integris partibus, sed fluxione occulta laborantibus quæ discutienda sit: &

iis, quæ apostemata uocât, melle decocto peructis. Item articulis aliàs aceto falso madidâ, aliàs è posca, in uulnerû curatione & succidâ lanæ uicem implent. Differētia hæc, quòd lanæ emolliunt, spongiæ coercent, rapiūtq; uitia ulcerum. Circunligantur & hydropicis sicca, uel ex aqua tepida poscâue. Imponuntur & iis morbis quos uaporari oporteat, feruenti ex aqua perfusâ expressâque inter duas tabulas. Sic & impostæ stomacho profunt, & in feбри contra nimios ardores. Sed spleneticis è posca, ignibus sacris ex aceto: imponi oportet sic, ut sanas quoque partes spatiosè operiât. Liuorem ab ictu recentem ex aqua salsa calida sapius mutata tollunt: testium tumorem dolorēmq; ex posca. Sorgia usta acris est, uimq; habet digerēdi. Cum bitumine aut pice cremata, sanguinis eruptiones in uulneribus cohibet, præsertim si feruens apponatur. Aliqui raras tantū ad hoc cum pice urunt: & oculorum causa comburuntur in cruda olla figulini operis, plurimum proficiente eo cinere contra scabrias genarum excrescētisque carnes, & quicquid opus sit ibi destringere, spissare, explere: uilius in eo usu lauare cinerem.

1 Quod multo difficilius, &c. Quanta cum difficultate, quantoque periculo colliguntur spongiæ: & quibus modis auelluntur, ostendit Oppianus lib. 1 de piscibus. 2 Tenuissimum, λεπτότατον: fortasse (minimum) uerti potuisset: quanquam Plinius tennue etiam dixit, uel intelligitur tenuissimū, id est, tenuibus fistulis, ut legitur apud Dio scoridem λεπτόσπινον. 3 Ex hoc penicilli. Ex hoc spongiarum genere fiebant penicilli uulnerarij, quibus scilicet uulnera ulcerâue stipabant abstergebântque, ut clarissime explicat Plautus in Rudente, Ego iam te hic itidem, quasi penicillus nouus exugete solet, ni hunc amittis, exugebo quicquid humoris tibi est.

G

## Epilogus seu caput C C L I I.

*Phrygianion.* PRÆter hæc quæ diximus animalia, sunt purgamenta aliqua relatu indigna, & algis potius annumeranda quàm animalibus. Chrysippus quoque philosophus tradidit phrygianion adalligatum remedio esse quartanis: quod esset animal, nec ipse descripsit, nec nos inuenimus qui nouisset. *Herpes.* Herpes quoque animal à Græcis uocatur quo præcipue sanantur quæcūq; serpunt. *Protegeuste.* Protegeuste animalia sunt Indica, quæ gustū habet acutissimum. *Τερχεζάνης.* Τερχεζάνης animalculum quod setas uillosue concutiat. Hæc duntaxat nominauerunt authores, sicuti & sirulugū, quod nec quale esset animal, nec ubi nasceretur, tradiderunt. Et Euphorion in commentariis scriptum reliquit, *Sirulugus.* in Samo bestias olim fuisse feras maxima magnitudine nomine neades, quarum sola uoce terra discederet: earum ossa maxima, uel sua ætate extitisse. Sunt etiam in mari nonnulla animalia effigie insolenti & sui generis: quæ quoniam inuentu rara sint, constitui in genus non possunt. Iam enim piscatores uidisse se retulerunt quædam trabunculis proxima, pullo colore, tereti figura, pari ex toto crassamento. Item alia scutorum effigie, colore rubeo, pinnulis crebris. Ad hæc alia quæ genitale uiri imitarentur, tum specie, tum magnitudine, sed pinnis subnexus binis loco testium. In magnis etiam imbribus multa apparent animalium genera, quæ ante uel nunquam uel raro uisa fuerint. His igitur mihi satis admonuisse saltē uideor, quæ de animalium



A nimalium differentiis ab Aristotele, Dioscoride, Plinio, Galeno, aliisque ueterum multis sunt dicta. neque enim omnia in hunc librum transferenda censui, quæ ab illis accuratissime sunt scripta. Tantum uero de singulis solum dixi, quantum legentis ad antiquorum euoluenda scripta, nisi sint omnino rudes aut auersi, excitet: ac quo facilius cum his uersentur, auxiliū præstet

1 Ad hæc alia quæ genitale. Est piscis nomen, inquit Hermolaus, xdocon, quod & nos genitale nuncupamus marinum, à nonnullis halefursion græce dictum. Quamquam halefursion sunt qui pro callyonimo pisce capiunt. *Αἰδῆϊος* quoque *Θαλάσσιος*, καλοῦμαι uocauit Epicharmus, ut Nicander tradidit.

*Ædocon.*  
*Αἰδῆϊος Θαλάσσιος.*  
*Genitale marinum.*  
*Halefursion.*  
*καλοῦμαι.*

τίλος σὺν Ἰγ.




IMPRIMEBAT MICHAEL

Vascofanus Lutetiæ Parisiorum,

Ann. M. D. LI.





# ANIMALIVM, QVAE IN HOC OPERE CON- TINENTVR NOMENCLATVRAE ET INDEX.

<b>A</b> ΒΑΙΤΗΣ	148.h	Αλουρος	68.c	Altinz uaccæ	72.b
ΑΒΡΟΤΟΝ	162.c	ΑΙΜΥΝ	92.c	Aluco	122.f
Abrotonc	211.h	ΑΙΝΙΔΕ	151.c	ΑΙΜΑ	12.f
ΑΓΓΕΛΙΦΗ	118.c	ΑΙΣΚΥΔΡΑΠΕΣ	79.d	ΑΙΜΑ	167.b
ΑΚΑΝΘΙΣ	146.d	ΑΙΣ ΑΥΙΣ	118.d	ΑΜΜΟΑΤΙΣ	100.b
Acanthis	126.f	ΑΙΟΛΙΑ	157.h	ΑΜΜΟΔΥΤΗΣ	100.d
ΑΧΥΝΘΙΛΛΙΣ	126.h	ΑΙΟΛΟΣ	151.h	ΑΜΠΛΙΣ	128.2
ΑΧΥΝΘΙΦΑΝ	106.h	ΑΙΣΚΩΠΗΣ	122.g	ΑΜΠΛΙΩΝ	ibidem
Acari	193.h	ΑΙΩΔΕΣ	1.d	ΑΜΠΛΙΩΝ	128.2
Acarna	160.c	ΑΙΩΔΙΑ	129.h	ΑΜΦΙΒΑΤΑ	102.d.8ce
Acarne	ibidem	Æthya	ibidem	Amphibazna	ibidem
Accipenser	120.f.121.d.151.d.	Æthnæus piscis	191.g	Anas	133.f
c.154.h.155.b.c		ΑΙΤΗΣ ΑΥΙΣ	118.h.119.h	Anatum genera	ibidem
Accipiter	120.f.g.121.a.b.	ΑΙΤΗΣ ΠΙΣΚΙΣ	45.h	Anates Ponticæ	ibidem
d.c.f		ΑΙΤΙΩΝ	127.f	Anatoria aquila	119.e
Accipiter Ægyptius	120.g	ΑΓΑΞΟΣ	61.a	ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ	12.a.b.14.c.173.h
Accipiter Æthiopicus	111.c	ΑΓΓΟΣ	154.c	ΑΝΤΙΡΤΗΣ	213.c
Aceratæ cochleæ	79.h	Agnus	ibidem	ΑΝΤΙΛΥΦΑ	175.e
Achainæ ceruæ	79.h	Agnus quadrupes	77.g	ΑΝΤΙΡΤΗΣ	213.c
Acharnas	160.d	ΑΓΥΛΟΙ	165.h	Anguis	95.h.103.a
ΑΧΑΡΝΑΣ	ibidem	ΑΓΡΙΟΦΑΓΑ	183.e	Anguis Thebanus	263.a
ΑΧΑΡΝΟΣ	159.h	ΑΓΡΙΠΠΑ	40.a	Anguis Æsculapius	101.h
Acharnus	ibidem	ΑΓΡΩΝΕΣ	187.d	Anguilla	148.b
Acheta	190.e	Alabes	170.b	Anguillæ Macedonicæ	148.f
ΑΧΙΤΗΣ	ibidem	ΑΛΑΒΕΣ	ibidem	Animal	1.b.c
Achillæa sponsia	219.a	Alauda	117.c	Anser	132.c
Acia	192.c	Albardeola	130.h	Antacæus	169.b
ΑΧΙΜΕΝ	62.d	Alba Ardeola	ibidem	ΑΝΤΑΚΙΩΣ	168.h
ΑΚΙΡΤΙΩΣ	101.b.101.h	Albicilla	119.d	Anthias	154.c
ΑΚΙΡΣ	190.g	Albicula	129.b	Anthiarum species	ibidem
Aculeatus	148.h	Alburnus	169.g	Anthracides	163.c
Acus	148.h	Alces	86.h.87.a	Anthredon	183.a.144.g
Addax	99.b	ΑΛΚΕΣ	128.d	ΑΝΤΡΕΝ	184.c
ΑΔΑΦΟΙ	6.c	Alce	162.g	ΑΝΤΡΟΠΙΛΩΤΗΣ	125.f
ΑΔΩΣΙΣ	158.c	Alceula	163.c	Anthus	123.b
Adicæ aues γαμψύρονα	107.b	Alex	163.c.166.d	ΑΝΤΙΛΟΓΕΝΕΙΣ	142.c
Ædocon piscis	120.a	ΑΛΛΑΤΩΡ	111.h	Aper quadrupes	84.g
Ægythus	126.g	ΑΛΛΑΤΩΕΙΣ	109.g.112.a	Aper piscis	163.f
Ægolios	121.f	ΑΛΛΑΓΡΩΝ	111.h	ΑΦΕΡΤΗΣ	161.d.g
ΑΙΣΚΩΠΗΣ	122.g	ΑΛΛΑΓΡΩΝΙΑ	ibidem	ΑΦΕΡΟΣ	ibidem
Æmys	91.d.92.c	ΑΛΙΠΗΛΙΜΩΝ	218.c	ΑΦΩΝ	162.2
Æfalo	100.h	Alopeceides canes	19.h	ΑΦΩΝ ΦΑΛΕΡΕΑ	161.f
Æfalon	ibidem	ΑΛΟΠΕΚΙΝΕΣ	146.d.g	ΑΦΩΝΙΟΙ	162.2
ΑΙΔΩΙΩΝ ΠΑΛΛΑΔΙΩΝ	220.a	ΑΛΩΠΗΦΙΣ	66.h	ΑΠΙΑΣΤΕΡ	117.e
ΑΙΩΛΙΟΣ	136.g	ΑΛΩΠΗΦΙΣ ΠΙΣΚΙΣ	146.g.148.d	Apica ouis	76.f
ΑΙΩΛΟΦΑΛΟΣ	118.d	ΑΛΩΠΗΦΙΣ VOLUCRIS	71.g	Apis	177.g
ΑΙΩΛΟΦΑΛΟΣ	118.d.g	Alofa	162.d.e.f	Aplua	162.a
ΑΙΩΛΟΠΙΣ	120.b	ΑΛΦΕΥΣ	155.a	Aplysia	219.b
ΑΙΩΛΟΦΑΛΟΣ	127.d	ΑΛΦΕΥΚΕΣ	ibidem	Apodes	123.h

# ANIMALIUM NOMENCLATURA

Apolectus	165.a	Ascalopax	ibidem	Aues volaces	108.a
Apolectum	ibidem	Ascalaphus	112.c	Aues graues	ibidem
ἀπολεκτός	214.d	Afellus minor	87.h	Aues nocturnae	122.b
Aprica ouis	76.f	Afellus dosuarius	88.g	Aues Seleucides	134.c
Apteros	191.a	Afellus piscis	155.g.h.156.a	Aues Diomedae	133.c
Apua	141.d.h.142.a	Afellus multipes	188.h	Aues Herciniae	134.d
Apua Phalerica	162.d	Afellus locusta	190.h	Aues Mennonides	ibidem.e
Aquarilia	25.g.h.26.a	Afilus auis	127.h	Aues Caspiae	135.a
Aquila auis	118.h	Afilus infectum	189.c.196.h	Aues nouae	118.b
Aquila piscis	145.b	Afilus in thynno	164.c.196.h	Aues fidipedes	109.a
Aquila louis	110.a	Afilus marinus	ibidem	Aues digitatae	ibidem
Aquila pulla	119.h	Afinus vulgaris	88.g	Auis iberis	103.c
Aquila fulua	119.f	Afinus degener	ibidem	Auis rarda	105.c
ἀετὴν	186.d	Afinus admissarius	87.h	Auis Scythica	139.e
ἀετὴν λευκὴν	186.h	Afinus syluestris	88.c.e	Aulos	217.c
Araneus	186.d.187.a	Afinus Indicus	ibidem.d.e	Aulopios	135.a
Aaranea	ibidem	Afini marini	173.c	Aulopos	154.h
Araneus pratensis	188.a	Asio	115.g.122.d.123.a	αὐλῶπος	ibidem
Araneus laurus	186.c	Asiorion	188.c	Aurata	156.f
Araneus marinus	187.b	Asiraeus	191.c	Aureliae	176.h.193.a
Araneus muscarius	177.e	ἀσιν	71.d	Aureus lupus	62.a
Araneus lanuginosus	187.d	Aspargus	170.c	Auris marina	214.d
Arbor belua marina	173.a	Aspis	98.g	Auriuinctis	126.g
Arborarius picus	125.c	Aspis Chelidonia	99.a	αὐρίνκτις	163.h
Arborum cauator	ibidem	Aspis Chersia	ibidem	Auxuuiæ	164.h
Archaneus	152.h.160.d	Aspis pyras	ibidem	Auxiracæus	191.c
ἄρκτος quadrupes	83.pcr tot.	Astacus	105.a	Axis	71.g
ἄρκτις cœstatus	233.h	Astacus fluuiatilis	ibidem.e		
ἀρκτοῦν	69.f.g.h	ἀστὴρ	118.a	Bacchus	155.g.156.a
ἀρκτοῦν	69.h	Aster	ibidem	βάκχος	155.h.159.c
Ardea	110.f.g	Asterias stellaris	121.a	βακχιστῆς	96.f
Ardeola	ibidem	Asterias ardea	130.h	βακίς	118.d
Ardeola candida	130.h	Asterius piscis	146.h	Bæus	ibidem
Ardeola alba	ibidem	ἀστερία βαλῆς	144.c	βακίς	161.c
Ardeola pigra	ibidem	Asterion	187.c	βάκχος	150.c
Argathilis	123.g	Astomi homines	50.e	Balagri	169.h
Argura cicada	190.g	Astortion	188.c	Balanus	214.a
Aries quadrupes	77.g	Astrabelus	218.a	βάλανος	ibidem
Aries marinus	173.b	ἀστράβελος	ibidem	Balearicæ grues	131.d
Arista	164.f	Asturcones	86.c	Balena	172.f.g.h
ἄρις	77.g	Atherine	161.f	Baletus	169.h
ἀρίων	165.c	ἀθήρινη	163.g	Banchus	150.c
ἀροονθισμός	68.g	Atrapilla	127.d	Barbata auis	120.e
ἀρπυίης lupus	62.c	Ataces	191.c	Barbus	169.f
ἄρπυια	33.a	Attagea	117.b	Bardones	89.c
Arctedo	184.g	Attagen	ibidem	βαρδόνες	169.h
Ascaridæ intestinorū uermes	195.h	ἀττάγεν	ibidem	βαρδόνες auis	127.h.128.d
ἀσκαρίδης	ibidem	ἀττάγια	ibidem	βαρδόνες auis	127.b
Ascaridæ uermiculi	189.f	ἀττάγας	ibidem	Basiliscus auis	ibidem
ἀσκαρίδης	ibidem	ἀττάγας	ibidem	Basiliscus piscis	170.c
Ascalabus	94.g	Attagenus piscis	170.d	Basiliscus serpens	101.c
Ascalabores	93.a	Attelabos	191.c	Basilicæ tellinæ	216.b
Ascalopas	117.c	Attilus	169.c	βάσις auis	127.h
		Aues carnivoræ	106.h	βάσις piscis	145.h

# ET INDEX.

Βάπτε piscis	145.h	Bos unicornis	72.d	Cacabis	106.e
Βάπτερος	92.f.145.e	Bos tricornis	ibidem	Cæci serpentes	103.b
Βάπτερος λιμναίος	92.h	Bos Ægyptius	ibidem.e	Cæcilix serpentes	ibidem
Βάπτερος ἑλός	93.b	Bos Æonius	ibidem.d	Calamitz rana	93.f
Βάπτερος πηλματῶν	92.h	Bos Aonius	88.g	Calidris	149.b
Βάπτερος ἁλίας	145.e	Bos Apennineus	72.h	Callarias	155.g
Βάπτερος	149.d	Bos Campanus	ibidem	Callibios	167.e
Βάπτερος	162.b	Bos Caricus	ibidem	Caliblephara	214.g
Βάπτερος	ibidem	Bos Epiroticus	72.g	Callichthys	154.e
Βάπτερος	161.c	Bos Erythæus	72.c	Callionymos	ibidem
Βάπτερος	148.h	Bos Herciniæ sylæ	72.d	καλιώνυμος	ibidem
Βάπτερος	ibidem	Bos Indicus	88.g	Callitriches	58.f
Βάπτερος	162.b	Bos Lybicus	72.d	Callus	217.h
Βάπτερος	184.h	Bos Mæoticus	ibidem	Camelus	81.h
Bembyx	ibidem	Bos mæoticus	ibidem.f	καμέλος	ibidem
Bzon	161.c	Bos pellicus	72.e	Camelopardalis	82.e
Βίρδης	216.f	Bos Phrygius	ibidem	Cammarus marinus	205.e
Bestiolar in igne genita	195.c	Bos Phœnicus	ibidem.g	Cammarus	205.e.206.b.
Bæus	118.d	Bos Pæonius	72.f		
Bisontes	74.h	Bos Scyticus	72.c		
Bistones	75.c	Bos Syriacus	ibidem		
Bisulea animalia	33.e	Bos Trogloditicus	75.c	καμμίτιος	207.b
Bualua	207.f	Boscas	133.g	καμμίτιος	7.d.193.a
Blatta	197.d	Boschides	ibidem.h	Cancer	203.b.205.f.206.a
Blatta mollis	ibidem.e	Βόσχορος	193.f	Cancer fluviatilis	206.a.b
Blemmyes	50.d	Βόσχος	145.h	Cancri cursores	206.h
Βλίος	161.c	Βούκαλος	80.g	Cancellus	ibidem.d
Βλίος	ibidem	Βουκαλός	ibidem	κατὰ δὲ δὲ δὲ	193.c
Βλίος	160.d	Βούκαλος	50.d	Caniceps	58.f
Boa	102.c	Βουκαλός	69.d	Canicula piscis	146.d
Bouf	163.b.g	Βουκαλός	192.f	Canicula Galeus	ibidem
Boca	ibidem.b	Βούκαλος	72.c	Canis pinguis	146.h
Bocas	ibidem	Βούκαλος	130.d	Canis marinus	ibidem.h
Bactus	170.a	Βούκαλος	163.b	Canis Careharias	146.e
Βάπτερος	ibidem	Βούκαλος	ibidem	Canis quadrupes	60.a
Bogpyrus	170.c	Brex	129.e	Canis uillaticus	ibidem
Bolercna	200.e	Βρέγος	170.c	Canis pastoralis	ibidem.a.c
Βομύλιος	184.h	Brinthus	134.b	Canis pecuarius	60.a.c
Bombylis	185.a	Βρέλαιο	113.f.173.f	Canis domesticus	59.h
Bombylius	184.g	Brucus	191.c	Canis uenaticus	59.h.60.d.e
Βομύλιος	ibidem	Bubo	122.d.e.f	Canis alopecis	59.g
Bombyx	184.h.185.a	Bubalus	80.g.h	Canis acarnan.	60.f
Bombyx altera	193.e	Bubalis	95.d	Canis acyrus	60.g
Bombilius	184.g	Buccina	213.a	Canis Ætolicus	ibidem
Bombilis	ibidem	Buccinum	ibidem	Canis Athamanicus	ibidem
Bombyx	ibidem	Bufo	93.g	Canis Arcadicus	59.g
Bonnafus	52.c.74.e	Buglossus	150.d.151.b	Canis Britannicus	ibidem
Βόπτερος	ibidem	Bunga	130.d	Canis castorius	ibidem
Βόπτερος	163.b	Buprestis	192.f	Canis fluviatilis	70.g
Βόπτερος	161.h	Butco	120.h	Canis gelonus	60.f
Bospiscis	145.g	Byas	130.d	Canis Hircanus	60.g
Bos quadrupes	72.c	Byturus	194.b	Canis Indicus	ibidem
Bos sylvestris	74.f			Canis Læonicus	59.g
Boues lucæ	57.g			Canis Iquerarius	61.h
				Canis Lycaon	60.f

# ANIMALIUM NOMENCLATURA

Canis Medus	<u>60.f</u>	Castorides marinez	173.c	καρκώπια	190.f
Canis Melitenfis	<u>61.e</u>	Caspiz aues	135.a	Cercitias	100.d
Canis Meliteus	ibidem	Caracata	133.c	Cereuros	147.c
Canis Menelais	<u>59.f</u>	Catarracta	130.e	Cercytos	ibidem
Canis Moloficus	<u>19.f.61.e</u>	καταρράκτης	ibidem	καρσός	<u>67.a</u>
Canis Petronius	<u>59.f.60.g.h</u>	Caroblepa	<u>72.a</u>	Cetis	155.a
Canis Perfes	<u>60.f</u>	Catretus	135.b	καίς	ibidem
Canis Phereus	ibidem	Catus syluestris	<u>68.e</u>	κάβρις	212.c
Canis Salentinus	<u>59.f</u>	Cauaticz cochlez	210.e	Cerrhus	163.c
Canis Seres	<u>60.f</u>	Caulos serpens	100.b	Certhia	<u>126.d</u>
Canis Sicamber	<u>60.h</u>	καυλόν	160.h	Certhius	ibidem
Canis Tufcus	<u>61.a</u>	Cebus	<u>58.g</u>	καρθίος	ibidem
Canis Vmber	<u>60.g</u>	κάβρος	ibidem	Certuus	<u>79.e</u>
Cancerii	<u>85.g</u>	Cæci serpentes	102.g	Ceruus palmatus	<u>81.a</u>
Cantharis	192.b	Cætiliz serpentes	ibidem	Ceruz Achainz	<u>79.h</u>
Cantharus piscis	154.a	καίσις	<u>196.a</u>	Cerylus	<u>128.f</u>
Cantharus infestum	192.b	Cela	135.c	κέρυλος	ibidem
καὶ θύρος	<u>154.a.191.h</u>	Celphus	<u>59.d</u>	κέρυλος	ibidem
Capella quadrupes	<u>78.e</u>	καλός	<u>116.c</u>	Celtra	<u>149.a</u>
Capella anis	118.d	Cemas	<u>81.a.b</u>	κατράς	159.b.c
Capet	78.e	κίμας	ibidem	Cetacei pifces	142.d
Capito	160.e.d.169.f	κίμας	ibidem	κεττάκιος ἰχθύς	ibidem
Capra	<u>77.h</u>	Cenchris serpens	<u>101.a</u>	Cete	171.b
Capra syluestres	<u>79.a</u>	κίγχις	ibidem	Cetus	ibidem
Capra ferz	ibidem	Cenchrias	100.d	κίπτις	ibidem
Caprez	ibidem.b	Cenchris auis	121.c	Ceuze	72.h
Capreoli	<u>79.d</u>	Cenchrine	101.a	Ceyx	<u>128.g</u>
Capriceps	118.d	Cenchrites	ibidem.b	Chalceus	162.f.g.170.h
Caprimulgus	ibidem	Cenchramus	116.d	Chaleis quadrupes	<u>94.e</u>
Caprifcus	157.b	Centipes	188.e	Chalcis auis	<u>111.a</u>
καὶ πτερος quadrupes	84.g	Centipeda	188.d.g	Chaleis piscis	<u>162.c.f</u>
καὶ πτερος ἰνάλιος	<u>83.h</u>	Centrine serpens	100.b	Chame	<u>215.b</u>
καὶ πτερος piscis	<u>163.f</u>	Centrine pifcis	146.e	Chameleios	ibidem
Caprus	109.g.110.e	Centris	100.b	Chame glycyamerides	<u>215.c</u>
Carabus scarabeus	<u>192.a</u>	Cephalus	159.b.f.g.h.160.d	Chame pelorides	ibidem.d
Carabus crustatus	<u>204.c</u>	Cephalus fluuiatilis	160.c	Chameleo	<u>95.c</u>
καρχαρόδοντα	<u>52.b</u>	Cephalus trāsitoranus	<u>159.h</u>	χαμαιλιός	ibidem
Carcharias	146.e	Cephalus περσικός	ibidem	χαίμψις	90.d
καρχήριος	205.f	Cephalus φεργικός	ibidem	χαίμψις	157.e
καρχήριος	<u>206.d</u>	Cephalinus	160.d	χαίμψις	ibidem
καρχήριος μικρός	<u>205.f</u>	καφαλοκρούς	188.c	Chaonides canes	<u>61.a</u>
Carduelis	<u>126.g</u>	καφίλις	178.c	Charax	153.g
Carduelis	ibidem	Cephus	<u>58.d.g</u>	Charadrius	<u>129.f</u>
καρίδιον	<u>206.h</u>	Cephus	<u>129.f</u>	χαράδριος	ibidem
Carinus	169.h	κέπφος	ibidem	Chartilaginea	143.d
καρίς	<u>203.b.206.h</u>	Cepus	<u>58.g</u>	Chartilaginata	ibidem
Carniuora	<u>106.h.28.b</u>	κίπτις	ibidem	Chartilaginei pifces plani	144.d
καρπιόφάγα	<u>107.a</u>	Ceramides	<u>131.a</u>	Chaus	<u>62.h</u>
καρπιόφάγοντα	ibidem	Ceraftis serpens	100.b	χαίμψις	157.e
Cartafonos	<u>71.h</u>	καρσίς	ibidem	χαυλιόδοντα	52.h
Carulus	<u>129.d</u>	Cerastes vermiculus	<u>194.a</u>	χαρπαγίλιος	<u>69.g</u>
Castor	<u>70.a</u>	Cerchnes	<u>126.e</u>	χαλιόδον auis	123.b
Castorides canes	59.g	Cereio	135.c	χαλιόδον piscis	152.g
Castorini	ibidem	Cereopithecus	<u>58.d</u>		



# ET INDEX.

χελιδὼν polyopo similis	<a href="#">100.h</a>	Cicada frumentaria	<a href="#">ibid.e</a>	κέκκαλον	<a href="#">ibidem</a>
χελιδὼν θαλάσσια	<a href="#">ibidem</a>	Cicada Aucnaria	<a href="#">ibidem.f</a>	Cochlea	<a href="#">152.f</a>
Chelidonia lepus	<a href="#">67.h</a>	Cicada marina	<a href="#">ibidem</a>	κοχλίας	<a href="#">211.g.h</a>
Chelidonia piscis	<a href="#">165.b</a>	κίχλυ αἰς	<a href="#">117.h</a>	κέχλος	<a href="#">ibidem</a>
χελιδὼν	<a href="#">91.d</a>	κίχλη piscis	<a href="#">157.a</a>	Cochlea terrestis	<a href="#">210.d</a>
χελιδὼν πετρώμια	<a href="#">92.d</a>	κίχλη	<a href="#">117.h</a>	κοχλίας χερσαίος	<a href="#">ibidem</a>
χελιδὼν θαλάσσια	<a href="#">91.e</a>	Cicindelæ	<a href="#">193.f</a>	Cochleæ latæ	<a href="#">ibidem</a>
χελιδὼν χερσαία	<a href="#">ibidem.h</a>	Ciconia	<a href="#">131.g</a>	Cochleæ cauaticæ	<a href="#">ibidem.e</a>
χελιδὼν ὀρνίθι	<a href="#">92.f</a>	Ciconia montana	<a href="#">119.g</a>	Cochleæ πετρωμαίαι	<a href="#">ibidem.d</a>
Chelonophagi	<a href="#">100.d</a>	Cicumæ	<a href="#">123.b</a>	Cochlea nuda	<a href="#">ibidem</a>
χελιδὼν	<a href="#">159.b</a>	Cimices	<a href="#">197.a</a>	Cochlea candida	<a href="#">ibidem</a>
Chelydrus	<a href="#">98.d</a>	Cimices agrestes	<a href="#">ibidem.b</a>	Cochlea longa	<a href="#">ibidem</a>
χέμιν	<a href="#">215.d</a>	Cimices é malua	<a href="#">ibidem.d</a>	Cæruleus auis	<a href="#">118.f</a>
χέμιν τετραχίτη	<a href="#">ibidem.e</a>	Cinclus	<a href="#">129.e</a>	Cæruleus uermis	<a href="#">149.g</a>
χέμιν λαίη	<a href="#">ibidem</a>	Cinereus Tetragnatus	<a href="#">187.e</a>	Cæruleus phalangij genus	<a href="#">187.f</a>
χέμιν βικαλιανή	<a href="#">215.d</a>	Cinnamomus	<a href="#">134.h</a>	Colaris	<a href="#">122.f</a>
χομολομύρον	<a href="#">ibidem.c</a>	Cinnamolgus	<a href="#">ibidem</a>	Coleos	<a href="#">126.e</a>
χέμιν	<a href="#">117.f</a>	Cinnamulgus	<a href="#">ibidem</a>	κολιός	<a href="#">ibidem</a>
χέμιν	<a href="#">132.c</a>	κίρκος	<a href="#">62.c.120.h</a>	Colias	<a href="#">166.h.167.a</a>
χοιναλώπις	<a href="#">132.h</a>	Circus quadrupes	<a href="#">62.c</a>	κολίης	<a href="#">ibidem</a>
Chenalopec	<a href="#">ibidem</a>	Circus auis	<a href="#">120.h</a>	κολίος	<a href="#">126.c</a>
Chenerotcs	<a href="#">133.e</a>	Citrus	<a href="#">193.f</a>	κίλλις	<a href="#">161.h</a>
Chersine	<a href="#">91.h</a>	Cis	<a href="#">195.b</a>	κολοίος	<a href="#">124.h.125.b</a>
Cherfydrus	<a href="#">97.g</a>	κίς	<a href="#">ibidem</a>	Collostrati infantes	<a href="#">51.a</a>
χίμαρος	<a href="#">79.e</a>	κίππαρος	<a href="#">150.g</a>	κολωδότης	<a href="#">94.g.95.a</a>
χίμαρος	<a href="#">ibidem.d</a>	κίππαρος	<a href="#">ibidem</a>	Colora	<a href="#">ibidem</a>
Chirogtyllus	<a href="#">69.g</a>	κίππαρος	<a href="#">ibidem</a>	Colos	<a href="#">81.d</a>
χιορβίος	<a href="#">123.a</a>	κίππαρος	<a href="#">ibidem</a>	κέλος	<a href="#">ibidem</a>
Chloreus	<a href="#">115.e</a>	Cirharus	<a href="#">ibidem</a>	Coluber	<a href="#">98.d</a>
χλωρίς	<a href="#">127.g</a>	κίττις	<a href="#">125.g</a>	Colubra	<a href="#">ibidem</a>
Chlorion	<a href="#">118.f</a>	Ciuiles animantes	<a href="#">26.h</a>	Columbus	<a href="#">113.b</a>
χλωρογαύρος	<a href="#">94.b</a>	Claderinchus	<a href="#">123.c</a>	Columba	<a href="#">ibidem</a>
χλωροπιδνός	<a href="#">58.e.g</a>	Clamatoria auis	<a href="#">135.e</a>	Columbarum genera	<a href="#">114.b</a>
χλωρός	<a href="#">84.f</a>	Clangus	<a href="#">119.e</a>	Columba agrestis	<a href="#">113.c</a>
χλωρός πετρώμιος	<a href="#">163.f</a>	Claria	<a href="#">170.c</a>	Columba saxatilis	<a href="#">ibidem</a>
Chordus	<a href="#">75.g</a>	Clerus	<a href="#">181.b</a>	Columba domestica	<a href="#">ibidem</a>
Chremes	<a href="#">154.b</a>	κλίτρος	<a href="#">ibidem</a>	Collurio	<a href="#">118.e</a>
χέμιν	<a href="#">ibidem</a>	Cluina auis	<a href="#">135.c</a>	καλυνέω	<a href="#">ibidem</a>
χέμιν	<a href="#">ibidem</a>	Clupea	<a href="#">162.d</a>	καλυνέω	<a href="#">220.a</a>
Chremps	<a href="#">ibidem</a>	Clypea	<a href="#">ibidem</a>	Colyca	<a href="#">212.h</a>
Chromys	<a href="#">153.h</a>	κίππη	<a href="#">218.c</a>	Colymbis	<a href="#">133.g</a>
Chrysaetos	<a href="#">119.h</a>	κίππη	<a href="#">107.a</a>	Colymbus	<a href="#">ibidem</a>
χρυσαίτης	<a href="#">176.g</a>	κίππη	<a href="#">126.d.185.e</a>	Concha	<a href="#">215.b.c</a>
Chryseos lupus	<a href="#">162.c</a>	κίππη	<a href="#">189.h</a>	κίππη	<a href="#">ibidem.b</a>
Chryseos piscis	<a href="#">156.h</a>	Cobio	<a href="#">160.h</a>	κίππη τετραχίτη	<a href="#">ibidem.c</a>
χρυσόμυθος	<a href="#">126.g</a>	Cobius	<a href="#">ibidem</a>	κίππη	<a href="#">ibidem.b</a>
χρυσόσφον	<a href="#">156.f</a>	κώβιος	<a href="#">ibidem</a>	κίππη	<a href="#">ibidem.b</a>
χρυσόσφον	<a href="#">139.f</a>	Cobio fluuiatilis	<a href="#">ibidem</a>	Conchæ longæ	<a href="#">117.d</a>
Ciboris	<a href="#">161.h</a>	κωβίσιος	<a href="#">160.d</a>	Conchæ uenetricæ	<a href="#">201.a</a>
κίβρις	<a href="#">ibidem</a>	κωβίσιος	<a href="#">ibidem</a>	213.c	
Cicada	<a href="#">190.a</a>	κωβίσιος	<a href="#">ibidem</a>	Concha margaritifera	<a href="#">216.f</a>
Cicadastra	<a href="#">ibidem.d</a>	Coccyx auis	<a href="#">121.f</a>	Conchylum	<a href="#">207.c.213.a</a>
Cicada muta	<a href="#">ibidem.e</a>	Coccyx piscis	<a href="#">151.f</a>	Condylus	<a href="#">214.b</a>
Cicada surcularia	<a href="#">190.d</a>	κοκκυβίος	<a href="#">211.h</a>	Conger	<a href="#">148.f</a>

# ANIMALIUM NOMENCLATURA E

καρίδας	196.d	Crangines	ibidem	Cynorrhastes	196.f
καίτα-†	189.g	καρχηδόνα†	187.g	Cynosdextra	170.c
καίτα-†	195.d	κρηός testaceus	215.c	κυνόσθιμα	163.a.b
Cophias	103.b	Cremys	154.b	κύνος άνα	ibidem
Cophion	192.h	Crex	130.e	κύνος quadrupes	58.g
καύ†	122.g	κρηός aries marinus	173.f	κύνος piscis	146.d
κρηόκηνος	124.h	κρηός quadrupes	77.g	κύνος κρηόκηνος	ibidem.e
Coracinus	157.b.158.b	Crocodilus	90.d	κύνος γαλιός	ibidem.f
κρηόκηνος	161.h	κρηόκηνος	ibidem	Cyperinus	169.g
κρηόκηνος	124.c	Crocodilus terrestris	ibide.f.h	κύνος piscis	153.c
κρηόκηνος piscis	158.b	Crocota	63.f	κύνος squilla	207.a
κρηόκηνος	ibidem	κρηόκηνος	ibidem	Cyprianus	169.g
Cordus	75.g	κρηόκηνος	196.f	Cyprinus	ibidem
Cordulus	158.c	Crustata	203.a	Cypseli	123.b
Cordula	163.h	Crustacea	ibidem	Cyrogryllus	69.h
Cordyla	ibidem	κρηόκηνος	216.g	Cytharia	151.a
κρηόκηνος	158.e	Cuculus auis	105.c.121.		
κρηόκηνος	ibidem	f.g.122.a		D	
κρηόκηνος cimices	197.a	Cuculus piscis	152.f	Dacnades	134.h
κρηόκηνος piscis	151.a	Cucumis	170.h	Dactylus	217.b
Cornix	124.f	Culex	189.d	δάκτυλος	217.b
Cornix fusca	ibidem.g	Culex palustris	ibidem.h	Dama	79.b
Cornix marina	130.a.134.a	Culex Mulio	186.g.189.h	δαμάλη	75.b
Cornops	191.f	Culex uarius	190.a	δαμάλη	ibidem
Cornuta	173.c	Culex ficarius	189.b	δαμάλη	160.c
κρηόκηνος	124.f	Culicilega	126.d	Dasyllus	ibidem
κρηόκηνος θαλάσσιος	124.a.134.f	Cuniculus	67.c	Dasytus	67.b
Coruus	124.c	Curculio	194.g	δαμάλη	ibidem.a
Coruus aquaticus	134.a	Curfiones	140.f.173.f	δαμάλη	127.b
Coruus marinus	ibidem	Cutfores	ibidem	Delcanus	167.e
Coruulus piscis	158.c	Curfores cancri	206.h	Delichnus	170.c
κρηόκηνος	215.c	Curuca	127.g	Delici	84.f
κρηόκηνος	117.c	κύνος	188.h	Delphin	171.f
κρηόκηνος	ibidem	κύνος auis	118.f	Delphinus	ibidem
κρηόκηνος	ibidem	κύνος phalangium	187.c	Delphis	ibidem
κρηόκηνος	165.c	κύνος	ibidem	Diarium	193.d
Coryphia	212.h	κύνος	165.e	Dicerus	135.c
Corythia	ibidem	Cychramus	116.d	Dicæus	ibidem
Coffes	193.h	Cycenia aquila	120.d	δικακύνος	159.c
Cofsi	ibidem	Cycnus	133.b	Dilichnus	170.c
κρηόκηνος auis	118.b.c	Cygnus	ibidem	Diomedæ aues	133.c
κρηόκηνος piscis	157.a	Cygnus	ibidem	Dipfas	100.a
κύνος	160.h.161.c.170.b	κύνος	22.f	διπλάς	53.c
κύνος	161.c	Cymindis	121.a	Dysideri	187.f
κύνος	170.b	Cynchramus	116.d	δυσίδη	ibidem
Cottus	ibidem	Cynedus	155.a	δυσίδη	207.f
κύνος auis	118.b.c	κύνος lupi	62.b	Donax	217.c
κύνος piscis	157.a	Cynocephalus homo	50.d	Dorcadæ Lybicæ	81.b
Coturnix	161.b.c	κύνος	38.e	Dorcalis	80.h
κύνος	175.c.191.g	Cynoglossus	150.c	Dorcas	ibidem
κύνος	67.c	Cynomya	196.f	Darcus	ibidem
κύνος	158.f	Cynoprofopus	50.d	Dorx	ibidem
Crabrones	183.c	Cynops	170.c	Draco serpens	101.g
κρηόκηνος	207.b	Cynopus	ibidem	δράκων	ibidem
				δράκων	ibidem

# ET INDEX.

Dracæna	101.g	Elcginus	170.d	Equus matinus	173.c
Draco marinus	ibidem	ελαιός	<u>69.d</u>	Erica	162.g
Draco uerus	ibidem	ελαιόφυκος	<u>93.b</u>	Erinaceus	<u>66.c</u>
Draco Epidaurius	ibidem	Elgos	ibidem	Erinaceus terrestris	ibidem
Dracunculus piscis	158.g	Elephas	<u>56.f</u>	ερεφός	<u>79.d</u>
Dracunculus uermis	196.a	Elephantus	ibidem	Erithrotaon	115.e
δρακύντιος	ibidem	Elephantus marinus	mon-	Eritimus	162.d
Drepanis	123.g	strum	173.b	<u>ερεθίς</u>	130.g
Dromades quadrupes	<u>82.f</u>	Elephantus crustatus	<u>204.h</u>	ερεθίσταλον	ibidem
Dromadarij	ibidem	Elcotris	170.c	ερεπτα	<u>97.f</u>
δρומάδης	140.c.173.c	Ellops piscis	154.g	ερεπτα	ibidem
Dromades	ibidem	ελμύς	195.g	ερεπτα	ibidem
Dromones	173.a.c	ελμύς παλαιοί	ibidem.h	Eruca	193.a.b.c
Dryinus	98.d	ελμύς στρογγύλη	196.a	Erucæ olerum	ibidem.c
δρυνοκλάπτης	<u>125.c</u>	Elops serpens	102.f	Erucæ Tithymali	ibidem
<u>126.b</u>		Elops piscis	154.g	Erythacus	127.g
δρυόφυκς ranæ	93.f	εμπεροκίτες	ibidem.c	Erythinus	152.g
Dryophytes	ibidem	εμπερος	158.b	Erythrinus	ibidem
Dryophytes ranæ	ibidem	εμπερος	<u>88.g</u>	Erythrinus fluuiatilis	ibide
Duces apum	<u>177.g</u>	εμπίς	189.f	ερυθρίνος oues	<u>76.c</u>
E		ελός	92.c.f	Efalo	<u>120.b</u>
Eale	<u>81.g</u>	Eucrafilochus	161.f	Efalon	ibidem
Echeneis	149.b	Encraulus	162.b	εραχός	151.a
εχηνίς	ibidem	Engraulis	161.h	Esos	169.c
Echineæ ceruæ	<u>81.a</u>	Enhydrys serpens	98.a	Esox	ibidem
Echenatis mus	<u>69.c</u>	Enhydrys quadrupes	70.g	Etclis	170.d
εχιδνα	<u>99.d</u>	ενυδρίς quadrupes	ibidem.f	Æthya	129.h
εχίς	99.d	ενυδρίς ζώον	25.g	Exanguia animalia	173.h.
εχίς	<u>69.d</u>	ενυδρίς	175.a	174.g	
εχίς quadrupes	<u>54.b</u>	επιμαφοκίς ζορτα	<u>25.g</u>	Exocactus	158.c
εχίς χερσίων	<u>66.c</u>	επιμας	153.b	εξοκακτός	ibidem
εχίς testaceus	213.d	Ephemerum	193.d	εξοκακτός	154.c
Echini ouarij	ibidem.h	επιμας	127.h	εξοκακτός	<u>80.g</u>
Echini candidi	ibidem.f	επιμας	193.d	F	
Echinometra	ibidem	Epitragæ	138.f	Faba	188.h
εχινάμυς	ibidem	Epodes	151.a	Faber	160.g
Echinophori	210.c.d	Errops	<u>134.b</u>	Falcua	<u>123.g</u>
Echinophori	ibidem	Ersetus	161.g	Fario	170.b
εχινόφωρος	<u>213.a</u>	εφίς	ibidem	Farris vermiculi	<u>194.h</u>
εχινός	148.b	Equicernus	81.h	Felcs	<u>68.c</u>
εχινός	ibidem	Equifels musca	165.c.	Fiber	<u>70.a</u>
εχινός αλγος	161.f	Equites cancri	<u>206.a</u>	Ficcdula	127.e
εχινός αλγος	ibidem.h	Equus	<u>84.h</u>	Fidipedes	109.g
Ægolijs	122.f	Equus sylvestris	81.f	Florus	<u>128.b</u>
αλγος	2.c	Equiferi	<u>87.g</u>	Flutz	<u>148.a</u>
Elacatena	167.f.g	Equi Celtiberiæ	ibidem.c	Fœmina	<u>23.a.25.d.c</u>
Elacatenæ	ibidem	Equi Lybici	<u>86.c</u>	Forda	72.d
ελακατίνης	ibidem	Equi Mozotici	ibidem	Formica	<u>185.a</u>
ελακός	<u>79.c</u>	Equus Indicus	ibidem	Formicæ quadrupedes	<u>64.a</u>
Elaps serpens	102.f	Equus generosus	<u>86.a</u>	Formicæ Indicæ	ibidem
Elaps piscis	155.b	Equus vulgaris	ibidem	Formicæ Herculanæ	185.c
ελας	<u>127.c</u>	Equus Mularis	ibidem	Formicæ equites	ibidem
Elca	128.d	Equus fluuiatilis	<u>81.f</u>	Fringilla	<u>127.c</u>
ελας	ibidem				

# ANIMALIUM NOMENCLATURAE

Fringillago	127.d	Gallinæ fecundæ	110.f	Gracculus auis	<a href="#">124.h</a>
Fringillarius	121.e	Gallinæ Hadrianæ	ibidem	Gracculus piscis	<a href="#">158.c.g</a>
Frugilega	<a href="#">125.a</a>	Gallinago	117.g	Græcum pecus	<a href="#">76.d</a>
Fuca	157.e	Gammarus	205.e	<i>ῥαῖου</i>	98.f
Fucus	178.c	<i>καὶ λαινῶς</i>	104.b	<i>ῥαῖου</i>	<a href="#">205.a</a>
Fucus vesparum	183.g	Ganze	132.f	Griphes	<a href="#">135.c</a>
Fulica	<a href="#">129.f</a>	Gantæ	ibidem	<i>ῥεῖ</i>	ibidem
Fulix	ibidem.f	Garus	166.c	Gromphæna	131.f
Fullo piscis	<a href="#">170.a</a>	Gania	<a href="#">129.f</a>	Grus	ibidem.f
Fullo scarabeus	192.b	<i>εὐκρίαι</i>	155.h.156.c	Grus marinus	<a href="#">168.a</a>
Fuluia aquila	119.f	<i>εὐκρίαι</i>	152.b	Gryllus piscis	<a href="#">148.f</a>
Fur	178.f	<i>εὐκρίαι</i>	151.h	Gryllus infectum	191.d
Fufanei pisces	139.f	Genitale marinum	<a href="#">220.a</a>	Gurgulio	195.b
Fufca cornix	<a href="#">124.g</a>	<i>εὐκρίαι</i>	131.c	<i>εὐκρίαι</i>	119.g
G		Gerres	163.d	<a href="#">161</a>	ibidem
		Gerini	93.g	Gyrini	<a href="#">92.g</a>
<i>ῥεῖ</i>	155.h		195.d	H	
<i>ῥεῖ</i>	215.e	Gibbæ squillæ	<a href="#">207.a</a>	Hadrianæ gallinæ	110.f
Galba	194.c	Gibbæ pisces	<a href="#">206.a</a>	Hæmatopus	<a href="#">131.b</a>
Galû quadrupes	<a href="#">68.a</a>	Ginnus	<a href="#">89.a</a>	Hæmorrhus	100.f
Galû piscis	<a href="#">146.a</a>	Gladus piscis	<a href="#">169.a</a>	Hemorrhoids	ibidem
<i>ῥεῖ</i>	<a href="#">68.c</a>	Glanis	168.d	Halcedo	<a href="#">128.d</a>
<i>ῥεῖ</i>	ibidem.a	Glanus	169.b	Halcyon	ibidem
<i>ῥεῖ</i>	146.b.167.h	Glanus	63.a	Halcyone	ibidem
<i>ῥεῖ</i>	146.h	Glanus	<a href="#">214.a.219.a</a>	Halecula	162.f.g
Galeus levis	ibidem	Glauciscus	<a href="#">156.c</a>	Halecula riuallis	ibidem.g
<i>ῥεῖ</i>	ibidem.f	Glaucium	133.g	Halefurion	155.b.220.a
Galeus canicula	ibidem	<i>ῥεῖ</i>	ibidem	Halærus	<a href="#">119.g</a>
Galeorum genera	146.c.d	Glaucus	156.c	Halæctus	ibidem
<i>ῥεῖ</i>	167.h	<i>ῥεῖ</i>	<a href="#">122.a</a>	Halipleumon	<a href="#">218.c</a>
Galeotes	<a href="#">94.6.95.a</a>	<i>ῥεῖ</i>	ibidem.b	Hamia	167.b
<i>ῥεῖ</i>	146.b	Glis	<a href="#">69.d</a>	Hammodytes	100.d
<i>ῥεῖ</i>	ibidem	Glottis	130.f	Harpa	<a href="#">129.f</a>
Galerita	117.e	<i>ῥεῖ</i>	ibidem	Halacatenes	<a href="#">167.g</a>
Galeruca	<a href="#">192.a</a>	Glycyamarides	215.c	Heladona	200.d
<i>ῥεῖ</i>	147.a	Glycyamarides	ibidem	Helops	154.g
Galexias	ibidem	<i>ῥεῖ</i>	ibidem	Hellops	ibidem
Galgulus	126.g	Glympicus	<a href="#">61.a</a>	Hemero-bion	<a href="#">193.d</a>
<i>ῥεῖ</i>	155.h	<i>ῥεῖ</i>	170.b	Hemero-cætos	154.f
Gallinaceus	109.g	Gnaphalus	135.d	Hemimeros	<a href="#">158.b</a>
Gallus	ibidem	<i>ῥεῖ</i>	119.h	Hepatus	<a href="#">153.a</a>
Gallus gallinaceus	ibidem	<i>ῥεῖ</i>	165.h	Hepiolus	181.b.193.c
Galli Tanagrici	110.f	Gobio	<a href="#">160.g.h</a>	Hercinæ aues	134.d
Gallinacei Indici	113.a	Gobius	ibidem	Herculanæ formicæ	<a href="#">185.c</a>
Galli Chalcidici	ibidem	Gobio fluuiatilis	ibidem.h	Herinæus	<a href="#">66.c</a>
Galli Medici	ibidem	Gobio saxatilis	161.c	Herodius	130.g
Galli Melici	ibidem	Gobius spinosus	ibidem.a	Herpes	219.g
Gallina	109.g	Gobionaria	<a href="#">162.a</a>	Hiaticola	129.f
Gallinarum genera	ibidem	<i>ῥεῖ</i>	<a href="#">148.f</a>	Hiatula	157.c
Gallina cohortalis	ibidem	Gonger	ibidem	Himantropus	131.c
Gallina uillatica	ibidem	Gorgon	77.f	Hinnus	<a href="#">89.b.c</a>
Gallina rustica	112.c	<i>ῥεῖ</i>	ibidem	Hinnulus	ibidem.b
Gallina Africana	ibidem	Gortinensis ouis	<a href="#">72.c</a>	Hinus	<a href="#">89.c</a>
Gallina Numidica	ibidem	Gouyus	<a href="#">160.h</a>		

# ET INDEX.

Hinnularia	119.d	ἰχθυὶς τρυκτηί	168.a	λαγυρίδες	67.h
Hippagros	81.f	ἰχθυόκελλα	ibidem.c	λαγυρίδα χαείρα	ibidem
Hippardium	ibidem.e	Ictinus quadrupes	62.d	λαγυρίδες	115.f
Hippilaphus	ibidem	Ictus γαπίος auis	121.c	Lagopus	116.d.e.f
Hippidium	165.d	Iccorinus	153.b	Lagopus altera	ibidem
Hippocampus	192.g	Iciunus mugil	159.c	λαγυρίδες aquila	119.f
Hippoë	206.h	ἰεργή auis	110.f	λαγυρί	67.b
Hippopotamus	85.h	ἰεργή piscis	152.g	λαγυρί	ibidem
Hippurus	165.c	ἰεργή ἰχθύς	155.h	λαγυρί θαλάσσιος	202.f
Hippus	ibidem.d	Ignaria	115.c	Λαλιφiones	88.d
Hircus quadrupes	78.c	ἰλιάς	118.a	Lamia	145.h.146.c
Hircus piscis	123.b	ἰλλας	ibidem	λαίμα	146.b
Hirudo	149.d	Iliacus Turdus	ibidem	Lampyrides	193.f
Hirudines ru fax	ibidem.f	ἰλιπταῖ	2.c	Lamyrus	170.d
Hirundo auis	123.c	Immutulus	120.d	Langa	62.h
Hirundo rustica	ibidem.f	Incendiaria auis	135.d	Languria	ibidem
Hirundo agrestis	ibidem	ἰνδιμύς auis	88.d	Larus	129.c
Hirundo sylvestris	ibidem	Insecta	175.a	λαίρος	ibidem
Hirundo riparia	ibidem	Intestina terræ	195.b	Latax	70.f
Hirundo marina	200.h	Intestinatorū animalia	195.g.h	λαοδιπεφύλας	131.c
Hirundo piscis	152.g	ἰονλας	188.d.195.c	λαίρος	168.g
Hirundo polypo similis	201.b	ἰονλίς	157.a	Latus	ibidem
Histrix	66.d	Iulis	ibidem	Laurices	76.f
Holothuria	218.a	Ioniscus	156.h	Lezna	64.b
Homo	34.a.44.f.45.d.f.	Iopes	170.d	λαβίς	153.b
48.a		ἰορκας	81.a	λαβίς	167.g
Homo marinus	173.e	Iouis aquila	120.a	Λαδus	126.g
Horda	72.d	ἰππὸς cancri	206.a	λαοβεντ	144.c
Horion	131.e	ἰππὸδιον	165.d	λαός accipiter	121.a
Hyæna quadrupes	63.a	ἰππερ	84.h	λαός γαλιός	146.h
Hyæna piscis	163.g	ἰππεμύρμυκας	185.c	Leudes	196.d
Hyæna monstrum marinum	173.c	Ips	194.b.195.b	Leo	63.g.101.a.172.c
Hybris	121.f	Iulus	189.a.195.g	λίον	ibidem
Hycca	153.d	ἰονλάς	ibidem	Leo quadrupes	64.c
Hydra	98.a.f	Iunco	129.b	Leo serpens	101.a
Hydrus marinus	97.g	Iuencus	72.c	Leo crustatus	207.b
Hydrus	98.c	Iuencua	ibidem	Leobelua marina	206.c
Hypnale	99.c	Ix	195.b		207.c
Hyltrix	66.d	lynx	127.c	Leantophoni	64.h
I		L		λαίος	214.b
Iaculus	101.b	Labeo	160.c	λαίος ἄγρια	ibidem
Ibis	132.a	Labrus	ibidem	Lepidion	170.d
Ibyces	79.a	λαβέρξ	155.c	Lepidorus	ibidem.b
Ichneumo quadrupes	70.f.g	Lacertus piscis	167.b	Leporaria aquila	119.f
Ichneumo uelipa	184.b	Lacertus quadrupes	93.h	λεπίτιος λαβίος	167.c
ἰχθύς	136.c	94.a		Lepus	55.c.67.b.c.g
ἰχθύς γαπί	139.f	Lacerta quadrupes	ibidem	Lepus marinus	202.f.g
ἰχθύς κυπρί	142.d	Lacerta uirides	94.a	λεβερσθίος	130.h
ἰχθύς ἀπυλός περκοι	ibidem.c	Lacerta, ferrugineas macu-		λεβερσθίος	160.b
ἰχθύς μαλακὸς περκοι	ibidem	las habentes	ibidem.b	Leuciscus	ibidem
ἰχθύς σκληρόσ περκοι	ibidem	Lacerta Chalcidica	94.f	Leucomenides	163.c
ἰχθύς φουρόπες	163.c	Ladanium	78.b	Leucocula	81.d
		Lædus	126.c	Leuocola	ibidem
		Laçitæ	185.d	Leuis accipiter	121.a

# ANIMALIUM NOMENCLATURA

Leuis mustelus, uel Galeus	Lytra	70.h	Mendesiuss	170.d	
146.		M	Mergus	130.a	
Leuriraia	144.c	Machlis	86.a	Mergus marinus	ibidem
Libella	149.b	Maia	206.a	Merops	117.e
Liberides	67.h	μαῖα	ibidem	Merula auis	118.b.c
λίβιδες	162.e	Maiales	83.f	Merula altera	ibidem
Ligniperdis	193.f	Μαῖνα	162.h	Merula piscis	157.a
Ligurinus	116.h	μαῖνις	ibidem	μέρυξ	151.g
Limax	210.d.211.h	Μαῖοτες	170.c	Metachoeus	157.a
Limola	163.h	μαλακίαια	189.b	μεταχαιοί	ibidem
λίμωστος	214.c	μαλακίαια	ibidem	Metagon	61.c
Lingulaca	151.f	μαλακίαια	203.a	μετέρας	177.d
Liparis	170.d	μαλακίαια	142.a.c	Metyss	170.d
Liua	114.c	μαλακίαια	118.f	μήδε	194.g
Locusta insectum	190.g	Malleolus	150.c	Miliaria auis	106.c
Locusta marina	204.c	Malthe	146.a	Millepeda	188.d
Lolligo	201.b	μαλθε	ibidem	Millepes	ibidem.c
Lollius	201.b.202.d	μαλθις	219.a	Miluago	152.g
Lucanus	192.b.h	Manos spongia	ibidem	Miluus	121.c
Lucerna	152.g	Mantichorus	71.g	Miluus auis	ibidem
Lucius	169.f	Margaritifera concha	216.g	Miluus piscis	152.g
Lumbrici terrestres	195.g	Marinus piscis	170.d	Mitulus	215.f.216.c
Lumbrici intestinorū	ibide	Mario	169.a	μίτλος	216.b
Lumbricus teres	196.a	Mars	68.c	Mollia	198.b
Lumbricus latus	195.h	Martes	ibidem	Molliceps	118.f
Luna piscis	170.e	Mastace	191.c	Moluris	191.c
Lupus auis	125.a	Marres apum	177.h	Molurus	102.a
Lupus araneus	186.e	Matrix uesparum	183.g	Monapos	74.f
Lupus phalāgij genus	187.b	Matrix auis	ibidem	Monedula auis	124.a
Lupus piscis	155.c.d	μάρις	155.h	Monedula piscis	167.f
Lupus lanarus	155.e.156.b	Μαῖα	206.a	Monoceros	71.h
Lupus uarius	155.f.156.b	μάκας piscis	199.d.f	μονόκερ	2.a
Lupus maculosus	ibidem	μαλακίαια	119.f	μονόκερ lupi	62.b
Lupus ινδιγυλιος	ibidem	Melancoryphus	127.d.e	μονόκερ	207.f
Lupus foroiulienfis	155.f	Melanderinus	157.h	Monticola	127.d
Lupus quadrupes	62.a	Melandrys	165.a.d	Montisfringila	ibidem.c
Lupus ceruarius	ibidem.f	Melanthini	133.a	μόνικα	84.h
Lupus canarius	ibidem.h	Melanurus serpens	100.d	Mordella	193.c
Lupi piscatores	ibidem.b	Melanurus piscis	152.e	Mormur	156.b
Luscinia	127.f	157.g		Mormylos	ibidem
Lutaria pelamis	163.h	Melcagrides	112.d.e	Mormyros	ibidem
Lutea	128.a	Meles	68.c	Mormytes	ibidem
Luteola	127.g	Melenaeros	119.f	Morphnos	119.f
Luteus auis	115.c.128.a	Melicambales	211.g	Morphnus	ibidem
Lutra	70.b.f	Melichloron	185.h	Morphna	ibidem
Lutris	ibidem.f	Melissa	177.g	μόρξ	72.c.75.b
Lycaon lupus	62.f	μελίσα	ibidem	Muco piscis	160.d
Lycaon canis	60.f	Melitembales	211.g	Mugil	159.b
λύκας	62.a.125.a.186.e.	Melolonihe	192.a	Mugilis	ibidem
187.h		μελολόνιη	ibidem	Mugiliciunus	ibidem.c
λύξ	62.f	μεμβράδες	161.f.162.a	Mugil fluuiarilis	ibidem.d
Lynx	ibidem	Membrades	ibidem	Mula	88.g.89.c
λύγα	163.d	Memnonides	134.a	Mula Syriaca	89.b
Lyca	196.b	Memnonides aues	ibidem	Mulz Africanæ	ibidem.a



# ET INDEX.

Mulæ Cappadoces	ibidem	Μύρμη	151.g	O	
Mulio culcx	189.d	Myrinus	150.a	ὀκλός	130.h
Mullus	151.h.152.d	Μυρώπινος	189.a	Oculata	158.b
Mullus lutarius	152.b	Myrma	156.b	Odynolion	149.c
Multifida	53.c	Μύρμηξ insectum	185.b	Oenanthe	127.d
Multipeda	188.d.g	Μύρμηκας quadrupedes	64.3	Oenas	114.b
Mulus	88.g	Μυρμικίου	188.c	οἰνός	ibidem.h
Mulus Indicus	89.c	Myrmecion	ibidem	οἶς	75.d
Muræna	147.c	Myro piscis	98.c	οἰσός	189.c.h
Muræna fluviatilis	148.b	Μύρος	147.f	Oestrus musca	ibidem
Murex 212.c.h.213.b.214.d		Μύς quadrupes	68.f	Oestrus inter apes	181.a
Murinus	150.a	Μύς piscis	157.b		189.c
Murus	147.f	Μύς o testatus	215.f	οἰσός in Thinnis	164.c.
Mus piscis	157.b	Μύς o testata	216.c		196.h
Mus marinus	92.c	Μύς σκιόλης	ibidem.b	οἰσός marinus	ibidem
Mus aquaticus	ibidem	Μυρινίπτερος	149.d	ὀλκος	186.c
Mus quadrupes	68.c	Mythus	170.d	ὀλόχρον	2.b
Mus sylvestris	ibidem.g	Mythus	ibidem	ὀλοπύλη	124.3
Mus agrestis	ibidem	Μύθος	159.c	ὀλόπτερος	175.h
Mus Niloticus	68.h	Μύθος	ibidem.d	Olor	133.3
Mus Alpinus	69.c	N		Onager	88.c
Mus Ægyptius	ibidem	Nabis	82.c	ὄναγρος	ibidem
Mus Ponticus	ibidem	Ναβάδης	46.c	ὄναγρος ἄγριος	ibidem
Mus Africanus	ibidem.d	Ναβία	145.3	ὄνις	151.f
Mus Indicus	70.h	Narica	162.b	ὄνισκος piscis	155.g.h
Mus Araneus	69.c	Natex	213.b	ὄνισκος multipes	188.g.h
Musca	189.a	Natrix	97.g	Onocentaurus	72.a
Musculus marinus	149.d	Nauplium	200.g	ὄνος multipes	188.h
Musculus piscis	149.d.172.f	Nauticus	ibidem.c.f	ὄνοι πηλύντες	ibidem
Musculus testatus	215.f	Nautilus	ibidem	ὄνος quadrupes	87.d
Musculus quadrupes	68.h	Neades	209.h	ὄνος ἰνδίας	88.d
Musimone	77.f	Νέβρις	81.a	ὄνος piscis	155.g.h
Musimon	ibidem	Νέβρο φόνος	119.d	ὄνος locusta	191.c
Mustela piscis	147.b	Nechdalus	185.a	Onocrotalus	133.b.c
Mustela marina	ibidem.c	Nercides	173.d	ὄνις	217.b.c
Mustela quadrupes	68.a	Neritis	201.b.213.a.d	ὄνις	98.e
Mustela domestica	ibidem	Νηρίτις	213.b	ὄνις	ibidem.f
Mustela vulgaris	ibidem	Νηρίτις	133.f	ὄνις	188.d
Mustela sylvestris	ibidem	Νηρίτις ἄγριος	133.h	Ophiogenes	50.g
Mustela rustica	68.c	Νηρίτις	159.c	Ophiomachus	191.c
Mustelus	147.c	Νηρίτις	133.f	Ophion	81.d
Mustelus levis	146.h	Νηρίτις φόνος	119.e	ὄφιος	95.h.97.f.103.a
Μύα	189.a	Νέβρις	146.f	ὄφιος θαλάσσιος	98.c
Μύαχρος	103.a	Nifus	120.e	Opfophagi piscis	170.d
Μύαξ	215.f	Nitedulæ	193.f	Orata	156.h
Μυαλί	69.f	Noctua avis	122.b	Orca	172.g
Myrica	216.c	Noctua piscis	155.b	Orchys	176.h
Μύλακρως	197.g	Νοκτιάς περὶ πρὸς	114.c	Orcynus	165.e
Mylocos	197.c	Nouacula	150.a	Orcynus	163.h.165.a
Myllus	166.g	Νοκτιάς uolucris	71.c	ὀρβίς	88.g.89.a
Mylus	ibidem	Νοκτιάς piscis	154.f	ὀρβίς	127.d
Μύσος	189.c	Nycticorax	115.g.122.g	ὀρβίς ἄγριος	119.g
Μύσος	69.d			ὀρβίς θαλάσσιος	92.d
Μύσος	147.c			Oripe	195.d

ὄειπαι	195.d	οὐεία	133.h	Pedicularum genera	196.f
ὄρης	103.c.104.d	οὐς ἀφροδίστης	214.c	Pediculus piscis	152.f
Oropisizes	127.c	οὐς θαλάσσιος	ibidem.d	Pediculus marinus	196.g
ὄροσανίτης	ibidem	οὐτίς	115.g	Pediculus terræ	192.b
ὄρφακίτη	153.h	Ozæna	200.c	Pelagii pisces	168.a
Orphas	154.b	Ozolis	ibidem	Pelamis	164.c.165.b
Orphus	153.h	P		πέλαμις	163.h
ὄρφος	ibidem	Pagrus	153.a	Pelamis lutofa	ibidem
ὄρφός	ibidem	Pagrus fluuiatilis	ibidem	Pelamis limatia	ibidem
ὄρφός	ibidem	Pagus	ibidem	Pelargus	131.g
Orfodacne	193.c	Pagurus	209.a	πελαργός	ibidem
Orthagoriscus	163.c	Palmipeds	132.c	πελικός	ibidem.f
ὄρθυγιον	117.f	Palumbarius accipiter	121.a	πελιδάς	114.c.115.a
ὄρθυγμακίβη	130.e.f	Palumbes	114.b.d	Pelias auis	ibidem
Ortygometra	ibidem	Palumbus	ibidem	Pelias serpens	102.f
ὄρτυξ	116.a	Palumbus torquatus	ibidem.h	Pella	130.h
Oryx quadrupes	79.b	παιδαρία	1.h.107.a	Pellos	ibidem
Oryx marinū animal	172.b	Panthera	65.c	πέλιος	ibidem
Ossifraga	120.a	Panthera marina	173.c	Peloridae	215.b.c
Ossifragus	ibidem	πανθήρ	63.h	πελορίδας	ibidem
Osmilia	200.c	Papauer piscis	170.d	πέλιος	157.h
Ostrophagi	170.d	Papilio	176.h.193.b	πελοριδών	184.g
ὄστρακωρόν	207.c	Para	127.d	Penelops	133.c
ὄστρακίδημον	ibidem	Parcus	117.h	πενελώπ	ibidem
Ostrea	214.c	Parenus	119.c	πελώνα	193.c
ὄστρεον	207.c.214.c	πέριδελις quadrupes	65.d	Penicillus	219.b
ὄστρεον	ibidem	πέριδελις marina	173.c	πενιδικύτιλοι	211.g
Ostreum	ibidem	Pardalus auis	118.g	Pentadactyles	ibidem
ὀστρεα	214.d	Pardus	65.f	Perca	157.c
ὀστρεα	ibidem	Parcas	102.f	πέρκα	ibidem
ὀστρεα	115.c.f	Parcus	ibidem	περικός	ibidem
ὀστρεα	ibidem.e.g	Parias	ibidem	Percis	ibidem
ὀστρεα	ibidem	Parnops	191.f	Perca fluuiatilis	ibidem.d
ὀστρεα	ibidem.f	Parous	108.f	Perenoptrerus	119.f
Otus	ibidem	παρόνκος	102.f	πέρκος	121.a
Ouipera animalia	89.c	Pariias	ibidem	Perdix	116.a.b.c.g
Ouis	75.d	Parus auis	117.d	Perdix altera	ibidem.g
Oues ἐρυθρός	81.f	Parus piscis	170.d	Perdix rustica	117.a
Oues erythri	ibidem	Passer auis	116.h	περδικός	113.c
Ouis testā	76.d	Passer piscis	150.d	περδικός	ibidem
Ouis Colonica	ibidem	Pastinaca	144.g	περδικός καταικτιδίας	ibidem
Ouis villatica	ibidem	Patange	213.h	περδικός τομάς	ibidem
Ouis Tarentina	ibidem	Patella	114.d	Perna	217.d
Ouis mollis	ibidem	Patella fera	ibidem	Pernes	211.a
Ouis hirta uel hirsuta	ibidem	παφάλλια	79.c	Perseus piscis	155.g
Ouis aprica	ibidem.f	Pauo auis	112.f	Petrei pisces	141.h
Ouis apica	ibidem	Pauus auis	ibidem	πέτρικος	153.g
Ouis fera	77.c.82.f	Pauo piscis	170.g	πέτρικος	121.a
Ouifera	81.f	Pecten	216.g	πέτρικος	153.a
Ouis bortenensis	77.c	Pectunculus	ibidem	Phagrus	ibidem
Ouis Arabica	ibidem.f	Pecus Græcum	76.d	Phagrus fluuiatilis	ibidem
Ouis marina	173.f	Pecus marinum	173.c	18170.c	
Ouum Polypi	200.c	Pediculus	196.d	Phagorius	ibidem
Oxyrinchus	168.b.170.b	Pediculus ferus	ibidem.c	Phalacrocorax	144.a

# ET INDEX.

φάλακx belua marina	172.f	Phycus	ibidem	Platirus	186.f
φάλακx papilio	193.c	Phyca	170.d	Plarycceros	80.g
Phalangium	186.d	Phyla piscis	ibidem.e.f	Plesti	162.b
φάλαγγιον	ibidem	Phyferer	172.h	Plotx	148.a
Phalangius	ibidem	φυστήρ	ibidem	πλῶτες	160.c
Phalanx	ibidem	Phyllulus piscis	171.a	πρόμοι	118.b
Phalangiorū genera	187.d.g	φύλακος cete	173.a	πρόμοι θαλάσσιος	ibidem
Phalangia leguminū	ibide.f	Phytharus	170.d	Pcephagus	86.h
Phalaris	133.h	Pica	125.g	πικύλα ζῶα	1.2
φάλακx	121.c	Pici, id est Gryphes	136.b	πικυλάx piscēs	163.c
Phaleris	133.h	Picus martius	125.b.126.b	πικυλάx auis	126.f
Phalerica	161.f	Picus arborarites	125.c	πικυλάx piscis	146.h
φάλαγγις ἀφόν	ibidem	Pinna	216.c	πικυτάx	27.h
Phanger	153.a	πίνα	ibidem	πικυτάx ζῶα	2.b
φάφ	114.d	πίνα φύλαξ	ibidem.d.f	Polypus	199.d
Phascades	133.g	Pinnoter	206.g	πλύπυς	ibidem
Phasiana	115.d	πινότηρ	ibidem	Polypi ouum	20.c
Phasianus	ibidem	Pīnoter Plinij	206.c.g.216.d	πλυνζαῖα ζῶα	51.c
Phasianicus	ibidem	πινότηρ Aristotelis	ibidem.g	πωμαῖα cochlez	210.d
φασαφίος	121.a	πινότηρ	ibidem	Pomilio	46.c
φάφικα	114.d	Piphex	128.d	Pompilias	164.c.200.g
Phatrage	91.d	Pipo	126.d	Porca	83.b
φάλα	110.a	πίπex	ibidem	Porcus quadrupes	84.f
Philomela	127.f	Piscis	136.c	Porcus piscis	163.c
φίλις	110.a	Piscis facer	155.a	Porcus marinus	ibidem
Phocæna	172.d	Piscēs pelagij	168.a	Porcus fluuiatilis	ibidem.g
Phœnicopterus	129.b	Piscēs faxatiles	141.h	πέρσθλις	65.d
Phœnix	134.f	Piscēs πικυαῖοι	ibidem	πέρσθλις ζῶα	1.b
φόνις	ibidem	Piscēs fuscanei	139.f	Pornops	191.f
Phœnix piscis	166.b	Piscēs cursores	140.f	περφύξ	112.a
φονικώρες	117.g	Piscēs cursiones	ibidem	Porphyrio	131.a
Phoix	129.c	Piscēs molles	142.a	περφύξ	ibidem
φολίς	214.d	Piscēs μολυκίς (αἰχμῆ)	ibidem	περφύξ	ibidem.c
φολισθῶν	16.h	Piscēs duri	ibidem	Porphyrus	101.f
Pholis	160.d	Piscēs σκληρότεροι	ibidem	πέρφης	75.b
φολίς	ibidem	Piscēs ceracci	ibidem.d	πέρφης ζῶα	163.g
φόρ	178.f	Piscēs longi	147.d.e	πέρφης ζῶα	197.g
Phoxinus	169.h	Piscēs piani	150.d	πέρφης ζῶα	165.c
Phrygianion	219.g	Piscēs fossiles	170.c	πέρφης ζῶα	ibidem
φρυγιάσιος	121.a	Piscēs uocales	163.c	πέρφης ζῶα	ibidem.c
φρυγιάσιος	93.g	Piscēs lethales	171.a	πέρφης ζῶα	128.c
φρύγος	ibidem.c.d	Piscēs candidus	155.a	Prestet	100.a
φρύγος κωφός	ibidem.e	Piscēs θιλιός	ibidem	πέρφης	ibidem.b
φρύγος θιλιόμυς	ibidem.h	Pistrix	172.h	πέρφης	172.h
φρύγος θιλιόμυς	ibidem	πίστρις	57.h	πέρφης	164.b
φθέρ	196.d	Pityocampe	192.f	πέρφης	172.h
φθέρ αἰχμῆς	ibidem	Plancus	119.c	Pristes	ibidem
φθέρ θαλάσσιος	ibidem.g	Plangus	ibidem	πρίστis quadrupes	75.d
Phuca	157.g	Platalea	131.f	πρίστis marinum	173.f
Phycen	ibidem	Platanista	169.d	Prohibitoria auis	135.c
φύκιν	ibidem	πλάτανισ	157.h	Protogustx	219.g
Phycis	ibidem	Plarea	131.f	πρόγυς	81.a
φύκιν	ibidem	Platistacos	155.h.166.g	πρόγυς	163.f

# ANIMALIUM NOMENCLATURA

<u>λαμμία</u>	163.f	Raia stellata	ibidem.e	Rubeta muta	ibidem
λαόρα	118.e	Rana	92.f	Rubetarius accipiter	121.e
λαόρος	ibidem	ράμφορ	103.e	Rubetra	<u>127.h</u>
λάτ	189.h	Rana fluuiatilil	ibidem.g	Rubicilla	<u>128.a</u>
λάττα	150.d.f	Rana aquatica	ibidem	Ruminalis	151.h
λάττα	150.d	Rana lutaria	ibidem.h	Rupex	<u>129.f</u>
Plittace	<u>125.f</u>	Rana palustris	93.c	Rupicupra	<u>79.h</u>
λάττακ	ibidem	Rana rubeta	ibidem.d	Rustica perdix	<u>117.a</u>
Plittacus	ibidem	Rana muta	ibidem.f	Rusticula	ibidem
λάττακός	ibidem	Rana uiridis	ibidem	Ruticilla	<u>128.a</u>
λάττακός ἰχθύς	150.e.d	Rana leuis	ibidem.g	S	
λάρα	193.e	Rana Dryphytes	93.f	Sacer serpens	<u>102.g</u>
λάρος	158.c	Rana Dioperes	ibidem	σακμάτι κροίς	<u>77.g</u>
λάρα	195.b	Rana Calamite	ibidem	Sacer piscis	<u>155.a</u>
λάραρος	158.b	Rana ex arbore uociferans		Sacres	<u>84.g</u>
λάλα pulex	196.h	ibidem		Sagittarius piscis	<u>159.a</u>
λάλα araneus	186.d	Rana piscatrix	145.e	Salamandra	<u>97.a</u>
λάλα θαλάσσιος	196.h	Rana marina	ibidem	Salar	<u>169.e</u>
λάλα	<u>170.a</u>	Rana uermis	194.e	Salmo	ibidem.d
πύλα ὀψιμα	<u>175.a</u>	Redinus	<u>127.c</u>	Salpa	160.e
λάλα	<u>67.b</u>	Reges apum	<u>177.h</u>	Salpe	ibidem
πύραρον	ibidem.a	Regulus	<u>127.h</u>	σαλπη	ibidem
Ptyas	99.a	Remora	149.b.c	σαλπις	ibidem
Ptynx	<u>121.b</u>	Rex auium	<u>128.c</u>	Salpyga	186.g
Pulex	197.d	Rex	ibidem.d	Salpuga	185.d
Pulex araneus	186.d	Rhacinus	170.d	Salus auis	126.g
Pulex uermiculus	197.d	Rhagion	187.e.g	Sanguifuga	149.d
Pulex marinus	196.g	Rhamphos	193.d	Sangualis	120.c
Pulla aquila	119.f	Rhaphis	148.h	Saperdes	<u>158.a</u>
Pulmo	<u>128.b</u>	Rhaphius	<u>62.h</u>	σαρκαφάγα	<u>77.h.26.c</u>
Pulmo marinus	ibidem	Rhedo	169.e	Sarda	162.b.163.h.164.e
Purpura	<u>122.a</u>	Rhiades	150.b	Sardena	162.g
Purpura filius	ibidem.e	Rhina	144.e.f	σαρδίνη	ibidem
Pygargus quadrupes	<u>79.b</u>	ρίνη	ibidem.f	Sardinæ	ibidem.b.g
Pygargus auis	119.d	Rhyntaces	134.f	Sardinia	162.e
πυγαλαμπής	193.f	Rhinobatos	144.g	Sardinus	ibidem.g
Pyralis	195.c	Rhinoceros	<u>75.a</u>	Sargiacus	<u>153.c</u>
Pytausta	ibidem	Rhizes	ibidem.b	Sarginus	152.f
Pytaura	181.b	ρίζη	ibidem	Σαργός	159.b
πυραύτης	ibidem	Rhombus	150.d.e	Sargo	160.d
πυράτης passer	<u>127.h</u>	Ricinus	196.f	Sargus	152.d.c
πυράτης columbus	114.c	Riparia	<u>123.g</u>	Sario	169.g
πυράτης	<u>127.e</u>	Riparia altera	ibidem	Satherium	<u>70.a</u>
πυγαλαμπής	193.f	Rostrum	103.e	Satheron	ibidem
Pyrrhocorax	<u>125.b</u>	Rota capra	<u>79.a</u>	Satyrium	ibidem
πυρρόλος	<u>128.a</u>	Rota marinum monstrum		Satyri ex hominum genere	
		173.a		<u>50.c</u>	
Quadrupedes uiuiperæ	<u>23.h</u>	ράβ	188.c	Satyrus simia	<u>58.e</u>
Quadrupedes ouiperæ	<u>90.</u>	Rubecula	<u>127.g</u>	Saxatiles pisces	141.h
c.d		Rubellio	<u>152.h</u>	σαύρα	93.h
Querquædulæ	133.h	Rubco	ibidem	σαύρα χαλκιδινή	<u>94.c</u>
		Ruber	ibidem	σαυρίς	167.g
Raia	144.d	Rubeta	93.d	σαύρος quadrupes	<u>91.h</u>

# ET INDEX.

σκῆρος piscis	157.2.166.f.167.f	Scorpio	185.f	Silurus	168.c.g
σκῆρος	163.g	σκορπίος	ibidem	Simia	57.h.118.c
Scarabeus piscis	154.b	Scorpius	ibidem	Simiarum vulgus	57.h
Scarabeus infectum	191.h	Scorpius terrestris	ibidem	Simia porcaria	58.g
Scarabeorum infectorum genera	ibidem	σκορπίος χερταῖος	ibidem	Simia Cynocephalo similis	ibidem.c
Scarabeus uiridis	192.a	Scorpio piscis	158.h	Simia marina	58.f
Scarabeus pilularius	ibide.h	Scorpius piscis	ibidem	Simus	170.c
Scarabeus rutilus	ibidem.b	Scorpius marinus	ibidem	σίμω	126.c
Scarabeus longipes	ibidem.f	σκορπίος θαλάσσιος	ibidem	Siren	184.g
Scarabeus in Eriphia herba	ibidem.b	Scrofa	84.g	Sirenis	ibidem
Scarar	151.d	σύνλιον	146.d.f	Sirenes	135.h
Scaurus	ibidem.g	Scylla auis	134.f	Sirulugus	219.g
Scepanus	170.d	Sylla piscis	146.c	Sis	195.b
Scepinus	ibidem	Scylla crustata	207.c	Sittace	125.f
σχιζοπύδα	109.g	σύνμορος	146.f	σίττα	126.c
Schoeniclos	129.b	σκομόριον	ibidem.d.f	Smarydes	63.a
σκιεθῖς	156.d	Scytale serpens	102.c.c	Smyrus	150.a
σκιελῖς	ibidem	Scytale Chalcidica	ibidem.d	Solea	151.b
σκιελῖς	ibidem	Scytale piscis	147.c	Solen	217.c
Sciæna	ibidem	Scythica auis	134.e	σολῆς	ibidem
σκιῖς	91.b	Scyrius	66.h	Solidipedes	84.h
σκιλάειον	206.h	σιουπνῆς	126.a	Solfuga	185.d
σκιλάρον	ibidem	σιρῖν	184.g	Solfuga in leguminibus	ibidem
Scincus	91.a.b	σινάχικ	143.c	Solipede	84.h
Scirtis	170.d	σινάχικ	ibidem	Solipede	186.g
Sclerocephalon	187.h	Seleucides aues	134.c	Solipuga	ibidem
σκληροκέφαλον	ibidem	Sempationes	123.a	Solpuga	79.c
σκιρπιόδης	185.c	σεντινῶν	128.c	Solus	68.g
σκιρπιόδης	107.a	Sepia	201.b	Sorex	77.c
σκιρπ	185.c	σεντινῶν	ibidem	Spargus	150.b
Scolecium	187.h	Seps quadrupes	94.c.g	Sparus	156.f
σκολέκιον	ibidem	σεντινῶν	ibidem	Sparulus	ibidem
σκολοκέφαλος	106.h	Seps serpens	100.h	σπαρῦλα	113.f
σκόλις	24.a	Seps multipes	188.d.c	Spatangi	ibidem
σκόλικος uermiculorum genus quoddam	194.d	Serpens	95.g.97.f	Spatiatrus	102.e
Scolorax	117.c.g	Serpens biceps	98.f	Spermatologos	125.a
Scolopendra	188.d.c	Serpens marinus	ibidem.c	Spermologos	ibidem
Scolopendra marina	ibide.f	Serpens facer	102.g	σφῆνις	183.c
σκολοπένδης	169.d	Serpens alatus	ibidem.h	σφῆνις	187.f
Scombrus	166.h	Serpens in silphio	ibidem	Spheneus	159.c
Scomber	166.h.167.a	Serpentes Indici	101.c	σφῆνις	ibidem
Scops	122.f	Serpentes cæci	103.b	σφῆνις	184.f
σκόπ	ibidem	Serphus	185.c	Sphingium	8.c
Scopes perennes	ibidem.g	Serra marina	173.a	Sphinx	ibidem
Scarodyla	163.g	σῆς	194.c.195.b	Sphondylus	214.b
Scordyla	ibidem.h	Seseli	210.d	σφόνδυλος	ibidem
σκορδύλη	ibidem	Seselinæ	ibidem	Sphondyle	102.h
Scordula	ibidem	Seferinus	160.g	Sphyræna	149.a
Scorpæna	159.a	Siena	156.d	Spinax	146.d.h
Scorpides	ibidem	Silenus	150.c	σπίναξ	126.h
		σίλφιν	197.d	σπίναξ	ibidem
		Silua	117.g		

# ANIMALIVM NOMENCLATURA E

Spinturnix	<a href="#">135.d</a>	Sudis	<a href="#">149.a</a>	Terraneola	<a href="#">117.h</a>
Spinus	<a href="#">126.h</a>	Superæ	<a href="#">191.c</a>	Terrestria animalia	<a href="#">25.g</a>
Spiza	<a href="#">127.c</a>	Sus	<a href="#">81.g.84.f</a>	Testacea	<a href="#">107.c</a>
<a href="#">αἰκίης</a>	ibidem.d	Sus fera	<a href="#">81.h</a>	Testata	ibidem
Spizites	ibidem	Sus piscis	<a href="#">167.f.g</a>	Testudo	<a href="#">91.d</a>
Spondylus	<a href="#">214.b</a>	Sus marinus	<a href="#">163.f</a>	Testudo marina	ibidem.c
Spondyle	<a href="#">102.h</a>	<a href="#">σύνταρος</a>	<a href="#">83.h.84.g</a>	Testudo lutaria	<a href="#">92.b</a>
Spongia	<a href="#">218.g</a>	<a href="#">συνάλης</a>	<a href="#">127.c</a>	Testudo fluviatilis	ibidem.c
Spongia Achillea	<a href="#">219.a</a>	Syluia	ibidem.g	Testudo terrestis	<a href="#">91.g</a>
<a href="#">σπίγας</a>	<a href="#">219.g</a>	Synagris	<a href="#">153.g</a>	Testudines albæ	<a href="#">92.f</a>
Spuma piscis	<a href="#">161.d</a>	Synodon	ibidem.f	Testudines aureæ	ibidem
Spuria	<a href="#">162.g</a>	Synodontis	<a href="#">165.c</a>	Testudines môtanæ	ibidem
Squalus	<a href="#">146.a.147.c</a>	<a href="#">συνονδύς</a>	<a href="#">153.f</a>	Testudines ephraï	ibidem
Squatina	<a href="#">144.c</a>	Synodous	ibidem	Testudines Indicæ	<a href="#">91.f</a>
Squatinoraia	ibidem.g	Syrnia	<a href="#">136.b</a>	Testudines cornigeræ	ibidē
Squaraia	ibidem	Syroploxix	<a href="#">116.h</a>	Tetartos	<a href="#">115.d</a>
Squilla	<a href="#">203.b.206.g</a>			Tethea	<a href="#">217.c</a>
Squilla parua	<a href="#">206.a.f</a>	T		Tethos	ibidem
<a href="#">στρίων</a>	<a href="#">133.c</a>	Tabanus	<a href="#">189.c</a>	<a href="#">τῆθος</a>	ibidem
Stella	<a href="#">118.a</a>	Tænia piscis	<a href="#">150.g</a>	<a href="#">τῆθον</a>	ibidem
Stellaris ardea	<a href="#">130.h</a>	Tænia uermis	<a href="#">196.a</a>	Tethyon	ibidem
Stellaris aquila	<a href="#">119.h</a>	<a href="#">ταγνέριον</a>	<a href="#">117.c</a>	Tetracon	<a href="#">115.h</a>
Stellaris accipiter	<a href="#">121.a</a>	Talpa	<a href="#">70.h</a>	Tetragon	ibidem
Stellaris piscis	<a href="#">146.h</a>	<a href="#">ταβίς</a>	<a href="#">112.f</a>	Tetragnathus	<a href="#">187.c</a>
Stellio	<a href="#">94.f</a>	<a href="#">ταβίς</a>	ibidem	Tetragnathius	ibidem
Stellio transmarina	<a href="#">95.a</a>	<a href="#">ταβίς</a>	ibidem	Tetrahon	ibidem
Stimphalides	<a href="#">135.f</a>	Tarandus	<a href="#">81.c</a>	Tetrapelyrides	<a href="#">191.f</a>
<a href="#">στάρκας</a>	<a href="#">213.a</a>	Tarda auis	<a href="#">115.c</a>	Tetrax	<a href="#">115.d</a>
<a href="#">στάρκας</a>	<a href="#">170.c</a>	<a href="#">ταρταίς</a>	<a href="#">147.f</a>	Tetrax altera	ibidem
Strepsicerotes	<a href="#">79.b</a>	<a href="#">ταρταίς</a>	ibidem	Tetrix	ibidem
<a href="#">στρίξ</a>	<a href="#">135.g</a>	<a href="#">τατρίξ</a>	<a href="#">115.d</a>	<a href="#">πῆγναις</a>	<a href="#">190.d</a>
Strix	ibidem	Taura	<a href="#">72.d</a>	Tettigopia	ibidem
<a href="#">στρουαπύς</a>	<a href="#">160.g</a>	Taurus quadrupes	<a href="#">72.d</a>	<a href="#">πῆγναις</a>	ibidem.d.c
<a href="#">στρουαπύς</a>	<a href="#">211.f</a>	Taurus Æthiopicus	<a href="#">74.c</a>	Tetrigoniz	ibidem.d
<a href="#">στρουαπύς</a>	<a href="#">27.c.210.b</a>	<a href="#">75.a</a>		<a href="#">πῆγναις</a>	ibidem.a
<a href="#">στρουαπύς</a>	<a href="#">210.b</a>	Taurus Indicus	<a href="#">75.c</a>	<a href="#">πῆγναις</a>	<a href="#">201.b.202.c</a>
<a href="#">στρουαπύς</a>	<a href="#">127.h</a>	Taurus auis	<a href="#">128.b</a>	<a href="#">πῆγναις</a>	<a href="#">201.c.202.d</a>
<a href="#">στρουαπύς</a>	<a href="#">126.h.136.c</a>	Taurus auis	<a href="#">173.c</a>	Tharis	<a href="#">170.d</a>
<a href="#">στρουαπύς</a>	<a href="#">151.b</a>	Taurus marinus	<a href="#">173.c</a>	Thessa	<a href="#">162.f</a>
<a href="#">στρουαπύς</a>	<a href="#">136.c</a>	Taurus scarabeus	<a href="#">192.a.b</a>	Thetta	ibidem
Struthio Africus	ibidem	<a href="#">πυλαιοπύς</a>	<a href="#">170.d</a>	Thieldones	<a href="#">63.d</a>
Struthio camelus	ibidem.b	<a href="#">πυλαιοπύς</a>	<a href="#">72.d</a>	Thos	<a href="#">62.d</a>
Struthio camelus	ibidem	Telline	<a href="#">216.a</a>		ibidem
Struthio	ibidem.c	Tenthredo	<a href="#">184.e</a>	Thranis	<a href="#">167.h</a>
Struthius	ibidem	<a href="#">πυλαιοπύς</a>	ibidem	<a href="#">θρανίς</a>	ibidem
Struthopodes	<a href="#">50.c</a>	Teragus auis	<a href="#">158</a>	Trassa	<a href="#">162.f</a>
Sturnus	<a href="#">118.c</a>	Teragus piscis	<a href="#">158.f.170.d</a>	Thraita	ibidem
Subaquila	<a href="#">118.c</a>	Teredo uermiculus	<a href="#">194.c.d</a>	Thraupis	<a href="#">126.g</a>
Subis	<a href="#">135.c</a>	<a href="#">πυλαιοπύς</a>	ibidem	Thressa	<a href="#">162.c</a>
Subin	ibidem	<a href="#">πυλαιοπύς</a>	<a href="#">181.b.c</a>	<a href="#">θρῆσσαι</a>	ibidem
Subulones	<a href="#">79.c</a>	Teredines	ibidem	Thrips	<a href="#">194.c.195.b</a>
Subus	<a href="#">77.c</a>	Teredo crabroni similis	<a href="#">194.f</a>	<a href="#">θρίψ</a>	<a href="#">194.f</a>
Subucio	<a href="#">121.a</a>	<a href="#">184.g</a>		Thriffa	<a href="#">162.c</a>



# ET INDEX.

<i>Spizax</i>	162.c	Triton piscis	ibidem.b	Verticillus	103.b
Thunnus	163.g.h.164.c	Triton monstium marinum		Verticillum	ibidem
<i>Θύννα</i>	23.a		173.c	Ventraba	60.h
<i>Θύννη</i>	165.c	Trochylus auis	128.c	Veruex	77.g
Thymalus	170.a	Trochus	63.g	Vespa	183.f
Thymus	ibidem	Trocta	156.c.167.d	Vespa fera	ibidem
Thynnis	163.h.170.a	Troglodytes	127.d	Vespa mitior	ibidem
Thynnus	ibidem	<i>Θρόγλυττις</i>	ibidem	Vespa annua	184.f
<i>Θύννη</i>	163.g	Trogon	122.c	Vesparum dux	113.g
Tigris	64.h	Troxallis	191.d	Vesparum fuci	ibidem
Tillo	169.h	Truones	133.c	Vespertilio	71.e.f
Tilos	188.c.g	<i>Θρυνών</i> auis	115.a	Vespertilioes Arabice	
<i>τίλος</i>	ibidem	<i>Θρυνών</i> piscis	144.g	ibidem	
Tinea	169.f	Trixalis	191.d	Vinago	114.h
Tinea	194.c.e	Tubera	218.c	Vipera	99.d
Tinea lanaria	ibidem.f	Turbinata	110.b	Vipiones	131.f
Tinea lignaria	ibidem.c	Turbo auis	125.c.126.a	Virco	118.f
Tinea aluorum	181.c	Turbo testatus	211.g.213.c	Virio	ibidem
Tinea agrestis	193.b	Turdus piscis	142.a.157.a	Viniflora	127.d
Tinea uermis	196.a	Turdus auis	117.h	Viria	151.c
Tinea <i>παιρία</i>	196.a	Turdus pilaris	118.a	Virula	71.c.75.b
Tinnunculus	121.b	Turdus Iliacus	ibidem	Vitulus	ibidem
Tiphle	170.c	Turpæna	170.d	Vitulus marinus	70.h.71.a
Tisio	172.c	Turfio	172.c	Viueria	67.h.68.c
<i>τίσιος</i>	114.d	Turtur	114.c.115.a	Viuipera	23.h
<i>τιμολίχθις</i>	168.a	<i>τურτ</i>	118.a	Vlula	122.f
Tomus Thurianus	167.h	Tympanus	124.g	Vmbilicus	211.g.h
Torpedo	145.a	Typhle	170.c	Vmbra	156.c
Torquilla	125.c.126.a	Typhline	102.g	Vmbra fluuialilis	ibidem.d
Torfio	172.c	Typhlopes	ibidem	Vmbra marina	ibidem.e
<i>τορτί</i>	62.b	Tyrannus	127.c	Vmbri	77.f
Trachurus	166.f		V	Vmcungues	104.b
Tragelaphus	81.c	Vacca	72.d.71.d	Vnguis	217.c
<i>τράγελφος</i>	78.c	Vacca Altina	ibidem.h	Vuiualuia	107.f.108.c
<i>τράγος</i>	219.a.c.g	Vaginipennia	175.c.191.g	Voca	163.b
Tragus spongia	ibidem	Valeria	119.f	Volucra	194.b
Tragus piscis	158.d.c.162.h	Varia auicula	126.f	Vopiscus	48.d
Tragopa	135.c	Variz pieæ	125.b	Vpupa	134.b
Tragopanades	ibidem	Variz quadrupedes	65.f	Vrax	115.d
<i>τράγος</i>	117.h	Velia	128.d	Vranoscopos	154.c
Trichzus	161.f	Venarica auis	118.d	Vrena	170.d
Trichias	ibidem	Venatrix	ibidem	Vri	74.h
Trichiades	165.c	Veneriz conchæ	201.a.213.c	Vria	133.h
Trichides	161.f.162.a	Vermis	243	Vrinatrix	ibidem.g
<i>τρίχιδες</i>	77.h	Vermes rubri	194.a	Vria quadrupes	65.h
Tridacna	214.h	Vermiculi farri	ibidem.h	Vria crustata	207.c
<i>τρίδακνα</i>	151.h	Vermiculi pomorū	ibidem	Vrsus	65.h
<i>τρίδακ</i>	151.h.153.c	Vermiculus cocci	195.a	Vrtica	218.c
Triglites	161.g	Vermiculi graminis	ibidem	Vua piscis	170.d
<i>τρίγλας</i>	152.f	Vermes in niue	ibidem.c	Vulpanser	132.h
Tringa	129.c	Vermes terreni	ibidem.d	Vulpecula uolucris	71.g
Triorchis	120.g	Verres	83.f.84.g	Vulpecula piscis	146.g
Tritocomum	165.d	Verribulum	217.h	Vulpecula marina	ibidem

# ANIMALIVM NOMENCLATVRÆ

Vulpes quadrupes	<u>66.h</u>	ῥαινα piscis	<u>163.g</u>	Z	
Vultur	110.a.b	ῥαιτῆς	ibidem	Zegeries	<u>69.d</u>
		ῥεῖς	121.c.f	Zcus	160.g
X		ῥαχῆ	153.d	Zigmis	94.c
Xanthias	165.b	ῥπακτῆς	110.c	ζωοφυτῶν	<u>16.c</u>
Xilophthoros	<u>191.f</u>	ῥπακ	193.c	Zoophyta	<u>117.c</u>
Xiphias	167.g	ῥπαλαῖς	<u>117.h</u>	ζορ	13.h
ῥιφίης	ibidem	ῥπαρῖος	111.a	Zorx	<u>80.g</u>
ῥιφῖος	<u>116.b</u>	ῥε quadrupes	<u>81.g.84.g</u>	Zygna	149.b
		ῥε ἄρτα	83.h		
Y		ῥε piscis	<u>163.f</u>	FINIS.	
		ῥε piscis	177.f		
ῥαινα quadrupes	<u>63.a</u>	ῥε ῥπαλαῖς	ibidem		

# PARTIVM ANIMALIVM, NECNON

aliorum quorundam, ex quibus constituuntur co-  
rum animalium differentia, Index.

	<b>Abdomen</b> 5.f.6.	<b>Alcyonium</b> 128.b	<b>αἰχμή</b> 23.a
	b.c.84.c	<b>Alex</b> 163.c.166.d	<b>Arteria</b> 5.c.d
<b>Abomasum</b> 19.b		<b>ἀλματωδής membrana</b> 18.b	<b>Arteria aspera</b> ibidem
<b>ἀκαιοδα οἶστος</b> 14.c		<b>ἀλμα</b> 166.c	<b>ἀρτηρία τραχὺά</b> ibidem
<b>ἀκαιοδα ριγίον</b>		<b>ἀλδύνας</b> 6.e	<b>ἀρ. σπός &amp; ἡγέρ. ἔρμος</b> 14.c
138.d		<b>ἀλγος</b> 4.f	<b>Articulus digiti</b> 7.a
<b>ἀκαιοδαίον</b> ibidem		<b>Aluus</b> 11.g.46.f	<b>Aruncus</b> 78.a
<b>Acetabulum</b> 5.b.6.d.19.d		<b>ἀμαρυγία</b> 4.f	<b>Aspera arteria</b> 5.c.d.9.h
<b>Acetabula in matrice</b> 38.f		<b>ἀμυντήρις</b> 79.f	<b>ἀσπικίς</b> 4.g
<b>Acetabulorum geminus in animan-</b>		<b>ἀμυγίς membrana</b> 18.b	<b>ἀσπράγαλοι</b> 7.d.15.f.16.c.33.f
<b>tibus mollibus usus</b> 198.d		<b>ἀμαρυγία</b> 4.f	<b>ἀτλας</b> 164.a
<b>ἀκαιοδός</b> 6.e		<b>ἀμφιδιὰ τροφῆς μεμβράνα</b> 8.d.b	<b>Atlantion</b> 16.a
<b>ἀκείη</b> 4.g		<b>ἀμφιφασμαδίασας</b> 47.a	<b>Atlas vertebra</b> 14.b
<b>ἀκύν</b> ibidem		<b>ἀνακτοῦ</b> 27.c	<b>Atra bilis</b> 20.f
<b>ἀκύντομοι</b> ibidem		<b>Acscia</b> 74.f	<b>Atramentum in mollibus</b> 198.g
<b>ἀκύντομὸς πόρος</b> 4.g.8.e		<b>ἀσθῆρος</b> 7.b	<b>Auricula</b> 3.b.4.g
<b>ἀκύντομὸν ἔδρον</b> 8.e		<b>Arognium</b> 97.b	<b>Auricule cordis</b> 10.d
<b>ἀκύντομὸν ἔδρον</b> 7.a		<b>Arognium</b> ibidem	<b>Auricule</b> 11.e
<b>ἀκύντομὸν</b> 14.e		<b>Astennia</b> 175.d	<b>Axungia</b> 84.d
<b>ἀκύντομὸν</b> 5.b		<b>ἀσθῆσις</b> 4.b	<b>ἀφούγιος</b> ibidem
<b>ἀκύντομὸν</b> 6.b		<b>ἀσθῆσις</b> 4.b.5.a	<b>αὐχίς</b> 5.d
<b>ἀκύντομὸν</b> 6.c		<b>ἀσθῆσις</b> 5.a	<b>αὐχίς ὑπὲρ</b> 11.f
<b>ἀκύντομὸν</b> ibidem		<b>ἀσθῆσις</b> 6.b	<b>αὐχίς μὲν</b> ibidem.h
<b>Aculeus</b> 175.e.177.h.185.b.		<b>ἀσθῆσις</b> 7.a	<b>αὐχίς ἐν τῇ σπῆνι</b> 109.f
191.g.200.b		<b>ἀσθῆσις</b> ibidem.d	<b>αὐχίς in cetis</b> 171.b
<b>ἀκύντομὸν ἀσθῆσις</b> 20.f		<b>ἀσθῆσις</b> 4.g	
<b>Aden</b> 18.f		<b>ἀσθῆσις</b> ibidem	
<b>ἀδέν</b> ibidem		<b>ἀσθῆσις</b> 11.g	
<b>ἀδέν</b> 18.b		<b>ἀσθῆσις</b> 10.c.12.b	
<b>ἀδέν</b> 18.b.19.a.38.a.40.		<b>ἀσθῆσις</b> 142.c	
<b>Adeps</b> 18.b.19.a.38.a.40.		<b>ἀσθῆσις</b> 31.e	
<b>e.74.b</b>		<b>Adrex</b> 32.d	
<b>ἀδέν</b> 7.b.15.h		<b>ἀσθῆσις</b> 11.g	
<b>ἀδέν</b> 7.d		<b>Adrex</b> 164.a	
<b>ἀδέν</b> 14.e		<b>ἀσθῆσις</b> ibidem	
<b>ἀδέν</b> 36.b		<b>Adrex</b> 42.f.44.b	
<b>ἀδέν</b> 6.f		<b>ἀσθῆσις</b> 30.b	
<b>ἀδέν</b> 117.d		<b>ἀσθῆσις</b> 13.a.b	
<b>ἀδέν</b> ibidem.c		<b>ἀσθῆσις</b> 36.g	
<b>ἀδέν</b> 12.f		<b>ἀσθῆσις</b> 16.a	
<b>ἀδέν</b> 152.a		<b>Aqualiculus</b> 5.f.6.c	
<b>ἀδέν</b> 187.h		<b>Aqueus oculi humor</b> 9.f	
<b>Ala</b> 5.f.6.b		<b>ἀσθῆσις</b> 8.h	
<b>Ala animum</b> 103.h		<b>Aranea</b> 186.d	
<b>Ala serpentum</b> 102.h		<b>ἀσθῆσις</b> 6.d.11.g	
<b>Albugo</b> 4.f		<b>ἀσθῆσις</b> 5.b	
<b>Albugineus humor</b> 9.f			

# PARTIV M ANIMALIVM

βροχίαι	ibidem	καρχαίαι	17.γ.δ	κέφα	4.β.7.δ
βροχίαι	γ.δ	καρχαίαι matricis	12.γ.36.φ	κεφαίαι	3.β
βροχίαι καφαλά	ibidem	καρχαίαι matricis	36.φ	κέφα	4.φ
Butyrum	43.α.φ.19.φ.20.α	καρχαίαι tunica	9.δ	κέφα	4.ε.7.δ
	C	καρχαίαι	15.α.16.ε	κέφα	4.ε
καρχαίαι	30.ε	Cerebellum	8.ε	κέφα	7.β
καρχαίαι	ibidem.γ	Cerebrum	ibidem.β	κέφα	ibidem.δ
Cacum foramen	8.α	κέφα	170.γ	κέφα	6.β.11.γ
Cacum intestinum	11.ε	Cervinus	ibidem	κέφα	11.γ
καλαίαι	11.ε	κέφα	179.ε	κέφα	ibidem
Calina	3.φ.4.ε.13.ε.16.α	κέφα	183.β	κέφα	8.φ
Caluaria	4.ε.13.ε.16.α	Cervix	5.ε.δ.34.ε	κέφα	23.β.ε
Calvarium	47.α	Cervix extrema	5.δ	κέφα	37.δ
Calx	7.ε.δ	Cervix interni	11.φ	κέφα	5.β.6.δ
καμάρι	4.β	κέφα	165.δ	κέφα	ibidem
καμάρι	7.δ	κέφα	54.ε.77.φ	κέφα	20.ε
Canini dentes	4.ε.33.α.8.φ	κέφα in ovo	105.ε	κέφα	5.β.δ.η.33.δ
Canities	47.α	Charilago	16.ε	κέφα	6.β.7.β
καρτί	4.φ	Charilago nasi	4.β	κέφα	11.δ
Caput	3.φ.4.ε.32.ε.45.α	κέφα	52.η	κέφα	73.δ
Caput facioris	16.β	κέφα	4.β	κέφα	19.γ.87.γ
καρτί	11.α	κέφα	16.α.53.ε.203.ε	κέφα	36.α
καρτί	10.ε	κέφα	16.ε.203.ε	κέφα	4.ε.γ.δ
Caro	18.ε	κέφα	5.α	κέφα	85.α
καρτί	6.φ.ε.7.α.15.ε	Chelidonium lapis	123.δ	κέφα	113.δ
Casus	19.φ.20.α.42.β	κέφα	9.η	κέφα	6.β
Casus Byzantinus	43.ε	κέφα	4.β	κέφα	132.β
Casus βυζαντί	ibidem	κέφα	17.ε	κέφα	179.δ.180.δ
Casus βιζαντί	43.δ.44.ε	κέφα	6.ε	κέφα	7.ε
Casus Bithynius	43.ε	Cholega	5.φ.6.ε	κέφα	196.δ
Casus mollis	44.ε	κέφα	11.α.20.φ	κέφα	151.ε
Casus musteus	43.ε	κέφα	20.φ	κέφα	179.ε
Casus muris	43.ε.44.ε	κέφα	138.δ	κέφα	ibidem
Castoreum	70.β	κέφα	4.β	κέφα	10.φ
Castorium	ibidem	κέφα	ibidem	κέφα	14.β
καρτί	ibidem	κέφα	8.β.9.α	κέφα	20.φ
κατακλί	6.α	κέφα	18.α.ε	κέφα	10.β.11.α.36.ε
κατακλί	14.ε	κέφα	17.δ	κέφα	14.φ
κατακλί	11.γ	κέφα	3.ε.4.φ	κέφα	4.φ
κατακλί	6.ε	κέφα	4.η.5.β	κέφα	9.δ
κατακλί	11.η	κέφα	5.β	κέφα	145.δ
κατακλί	32.α	κέφα	36.φ.198.β	κέφα	16.ε.32.δ.52.δ
κατακλί	54.β	κέφα	179.δ	κέφα	3.φ
κατακλί	179.δ	κέφα	6.δ	κέφα	9.ε
κατακλί	5.α	κέφα	5.η.6.α	κέφα	6.β.14.β.35.β
κατακλί	10.β	κέφα	165.δ	κέφα	4.β
κατακλί	6.ε	κέφα	6.ε	κέφα	20.δ
κατακλί	175.ε	κέφα	6.α.δ.ε	κέφα	4.β
κατακλί	4.ε	κέφα	19.η.20.α.43.β	κέφα	16.β
κατακλί	16.β	κέφα	14.ε	κέφα	3.ε.4.ε.14.ε
κατακλί	4.ε	κέφα	211.ε	κέφα	15.β
κατακλί	16.α	κέφα	ibidem	κέφα	6.β.16.β
κατακλί	183.β	κέφα	4.ε	κέφα	165.δ
κατακλί	16.ε.36.φ	κέφα	5.α	κέφα	6.β

# INDEX.

κατάλη manūs pars	7.b	Dentes canini	33.a.8.p.a	ἰφικτικὰ γαστρίος	31.a
κατάλη crurīs pars	15.d	Dentes exerti	33.a	ἰφίσφοκτα	6.d.7
κατάλη αὐτῶν	6.d.16.b.c	Dentium acies	4.a	ἰπικαιδίκες	4.f
Coxa	7.b.6.d.16.b	ἔρμουα	16.b.17.c	ἰπικαίος	6.d
Coxarum os	15.d	ἔρμουα πώδους μιλῶν	8.c.17.d	ἰπικαίρις	17.c
Coxendices	16.b	Defillatio	20.d	ἰπικαίριος	6.b
ῥογῆνοι	4.a.16.b	Nectrum	70.g	ἰπικαίρις	7.a.g.h.33.c
ῥογῆταιρις	7.b.4.b	Ἀφῆκαπερ	27.c	ἰπικαίρις	7.d
ῥογῆται	7.b	Ἀφῆκαπερ	31.b	ἰπικαίρις	ibidem
Crea	7.c.16	Ἀφῆκαπερ	11.a	ἰπικαίρις	7.d.16.c
Crines polyborum	201.a	Ἀφῆκαπερ	4.b	ἰπικαίρις	7.d
κρίσις	14.d	Ἀφῆκαπερ	17.f	ἰπικαίρις	16.d
Crocodilea	90.h	Ἀφῆκαπερ	20.f	ἰπικαίρις	6.f
κρίταφοι	4.f.h	Ἀφῆκαπερ	24.b	ἰπικαίρις	11.d
κρίταφῆτα sutura	13.g	Ἀφῆκαπερ	31.b	ἰπικαίρις	17.h
Crus	7.b.c	Ἀφῆκαπερ	31.b	ἰπικαίρις	18.b
κρίσις	78.a	Ἀφῆκαπερ	31.b	ἰπικαίρις	6.c
κρίσις	6.d	Ἀφῆκαπερ	31.b	ἰπικαίρις	ibidem
Crysalinum humor	8.h	Ἀφῆκαπερ	31.b	ἰπικαίρις	7.d.6.a
κρίσταλλοειδής	ibidem	Ἀφῆκαπερ	31.b	ἰπικαίρις	6.b
κρίσις	6.d	Ἀφῆκαπερ	31.b	ἰπικαίρις	16.h.77.a
κρίσις dentes	7.b	Ἀφῆκαπερ	31.b	ἰπικαίρις	179.f.g
κρίσις manus pars	7.b	Ἀφῆκαπερ	31.b	ἰπικαίρις	ibidem
Cubitus	6.f.7.a.15.a.16.b	Ἀφῆκαπερ	31.b	ἰπικαίρις	4.h
Cunnius	6.d	Ἀφῆκαπερ	31.b	ἰπικαίρις	6.c
Cuticula	17.c	Ἀφῆκαπερ	31.b	ἰπικαίρις	14.c
Cutis	16.g.17.a	Ἀφῆκαπερ	31.b	ἰπικαίρις	10.b.f
κρίσις	4.g	Ἀφῆκαπερ	31.b	ἰπικαίρις	30.d
Cybius	164.g.165.h	Ἀφῆκαπερ	31.b	ἰπικαίρις	ibidem.g
κύβιος	ibidem	Ἀφῆκαπερ	31.b	ἰπικαίρις	31.a
Cybius genera	164.g	Ἀφῆκαπερ	31.b	ἰπικαίρις	30.f
κύβιος in aure	5.h	Ἀφῆκαπερ	31.b	ἰπικαίρις	
κύβιος os	15.g	Ἀφῆκαπερ	31.b	ἰπικαίρις	
κύβιος	14.a.16.a	Ἀφῆκαπερ	31.b	ἰπικαίρις	
κύβιος	5.g	Ἀφῆκαπερ	31.b	ἰπικαίρις	
κύβιος	4.c.33.a	Ἀφῆκαπερ	31.b	ἰπικαίρις	
κύβιος	106.g	Ἀφῆκαπερ	31.b	ἰπικαίρις	
Cynophthalmus	146.c	Ἀφῆκαπερ	31.b	ἰπικαίρις	
κύβιος	4.g	Ἀφῆκαπερ	31.b	ἰπικαίρις	
κύβιος excrementum	20.f	Ἀφῆκαπερ	31.b	ἰπικαίρις	
κύβιος	ibidem	Ἀφῆκαπερ	31.b	ἰπικαίρις	
κύβιος brachiorum	8.a	Ἀφῆκαπερ	31.b	ἰπικαίρις	
κύβιος in aure	5.h	Ἀφῆκαπερ	31.b	ἰπικαίρις	
κύβιος iecanoris	11.a	Ἀφῆκαπερ	31.b	ἰπικαίρις	
κύβιος	11.g.18.c	Ἀφῆκαπερ	31.b	ἰπικαίρις	
D		Ἀφῆκαπερ	31.b	ἰπικαίρις	
δακτύλιος	6.d.11.g	Ἀφῆκαπερ	31.b	ἰπικαίρις	
δακτύλιος	7.a	Ἀφῆκαπερ	31.b	ἰπικαίρις	
δακτύλιος	ibidem.c	Ἀφῆκαπερ	31.b	ἰπικαίρις	
δακτύλιος	5.d	Ἀφῆκαπερ	31.b	ἰπικαίρις	
δακτύλιος	6.c.11.b	Ἀφῆκαπερ	31.b	ἰπικαίρις	
Dentes	4.c.5.b.7.a	Ἀφῆκαπερ	31.b	ἰπικαίρις	

F

ci

## PARTIV M ANIMALIVM

[illegible]



# INDEX.

Maxilla superior ossa	13.h	Mola	7.e	libus	21.e.g
Maxilla inferioris ossa	ibidem	Molares dentes	4.d.5.b	ιστιαίος μυελός	19.d
Meatus auditorius	4.g	μολάρων calvaria	13.f	τύπος	6.d
μάκων in polytis	199.d.f	μάλα	3.c	Nymphæ	180.g
μάκων in testis	208.e	Mucro cordis	10.c	νύμφη	6.d
Medius digitus	6.g.7.a	Mucus	20.d		
Medium intestinum	11.g.	Mucus cochlearum	211.e		
	13.c	Muris	166.e.g		
Medulla	19.d.40.b	Muris	ibidem	οὐλαῖος sutura	13.g
μύζας διέκτυλος	7.a	Muscerda	69.b	Occhipitium	4.e
Mel	181.d	Musculi	18.d	Ocorus	3.f.4.e
Mel candidum	179.a	Mustax	4.b	ὀχρὸν μακρὸν	4.h
Mel anthinum	181.b	Mutis in exanguiibus	174.b	ὀχρὸν	6.e
Mel horaeum	ibidem	Mutis in crustatis	203.f	Oculus	3.d.8.a
Mel sylvestre	182.d	μυτιῶντες	4.a.b	ὀδόντες	5.b
Mel ericeum	ibidem	μυελός	19.d	ὀδόντες ἁπλῆς ossium processus	
Mel manomcnon	181.g	μύς	18.d		
Mellus optimi notæ	182.c	μυλακίς	7.d	ὀδόντες vertebra	ibidem
μύλακ	4.h.5.b	μύλας	5.b	ὀσφύς	5.d
Melandyra	165.d	μύλη	7.d.16.c	Ocyrus	77.c
μυλάς οφθαλμοί	ibidem	μύλωντες	45.b	Ocyrum	ibidem
μυλάς οφθαλμοί	ibidem	μύλωντες	6.d	ὀσφυς	ibidem
Melca	44.b.c	μυλὸς χαλκός	ibidem	ὀλίσκος	6.h.15.b
μύλη	181.d	μύλων	4.b.5.a	ὀλίςκος	7.a.16.b
μύλη καὶ ὄφθαλμοί	209.d	μύλων in exanguiibus	174.b	ὀλίςκος	6.a
Melligo	180.d	μύλων in mollibus	198.f	ὀλίσκος	92.f
μύλος	3.c	μύλων in crustatis	203.f	ὀλίσκος	ibidem
Membrana	17.c	μύλων	4.h	Omasum	19.h.14.b
Membrana costalis succingens	ibidem.f	μύλων cochlearum	211.e	Omentum	11.d.17.g.18.b
Membrana cerebri continen-	ibidem.d			ὀμολογία	4.f
tes				ὀμολογία	3.b
Membrum	3.c	Nares	4.a.b.45.c.52.a	ὀμολογία	5.h.6.e.16.b
μύνη σκληρὰ	8.b.17.d	Nasus	4.a.b	ὀμολογία	6.d.e.h
μύνη σκληρὰ	8.b.17.d	Nasi spina	ibidem.h	ὀμολογία	164.h
Mentum	4.b.b	Nates	5.h.6.a.d.e	ὀμολογία	16.e
μύνη	3.c	ναῖς	11.g	ὀμολογία	24.a
μύνη	16.h	ναῖς καὶ vertebra	14.b	ὀμολογία	23.h.89.e
μύνη	7.d	ναῖς	11.a	ὀμολογία	4.f
μύνη καὶ ὄφθαλμοί	11.e.18.c	Nervus	13.a	ὀμολογία καὶ φάλαξ	3.g
μύνη καὶ ὄφθαλμοί	ibidem	Nervorum paria septem	8.c	ὀμολογία ὄφθαλμοί	ibidem
μύνη καὶ ὄφθαλμοί	4.e	Nervorum συγγύα	ibidem	ὀμολογία	4.f
μύνη καὶ ὄφθαλμοί	7.d	Nervi optici	8.d	ὀμολογία	16.e
μύνη καὶ ὄφθαλμοί	3.g	Nervi molles	8.d.12.h	ὀμολογία dentes	5.d.5.b.46.c
μύνη καὶ ὄφθαλμοί	6.g.7.a	Nervi duri	ibidem	ὀμολογία salsamenta	165.b
μύνη καὶ ὄφθαλμοί	5.b	Nervus auditorius	8.e	ὀμολογία	4.f
μύνη καὶ ὄφθαλμοί	4.e	νύς	199.c	ὀμολογία	14.c.104.b
μύνη καὶ ὄφθαλμοί	ibidem	νύς	13.a	ὀμολογία	6.6.20.a
μύνη καὶ ὄφθαλμοί	6.c.d.11.f	νύς καὶ ἀκρυγία	8.e	ὀμολογία	7.e
Milesum balsionium	128.h	νύς καὶ ἀκρυγία	16.c	ὀμολογία	4.b.5.a
Minimus digitus	6.g	Nigrum oculi	3.h	ὀμολογία	13.c.52.a
μίνυς	179.e	Nodus	6.g.7.a	ὀμολογία	10.d
		Nota per quam fit motus in anima		ὀμολογία	6.a.14.a.b
				ὀμολογία	14.a

# PARTIV M ANIMALIVM

ὀφθαλμοί	6.c	περιτονίαι	16.b	Peritonai principium	ibidem
ὀφθαλμοί	ibidem	περιτοναί	6.b	περίτομα	20.f
ὀφθαλμοί	ibidem	περιτοναί	16.c	περιτοματικά	31.d
ὀφθαλμοί	6.e.14.d	περιτοναί	36.d	περίτομα	16.c
Ostium uteri	11.f	περιτοναί	16.b	Perispiratio sensum latens	20.e.f
Ostium	13.c	περιτοναί	5.a	Pes	7.c.d
Ostium	14.b	περιτοναί	4.f	περιτοναί	4.f
Osium	24.d	Pars pedis suprema	7.e	περιτοναί	7.a
Osium hypomemias	105.g	Pars pedis infima	ibidem	περιτοναί	47.a
Osium submentanea	ibidem	Pars prior	ibidem	περιτοναί	20.f
Osium	106.g	Partes	3.b.c	περιτοναί	12.f
Osium	105.g	Particula	ibidem	περιτοναί	16.b
Osium	106.g	Pars tota	ibidem	περιτοναί	27.c
Osium	ibidem	Pars integra	ibidem	περιτοναί	5.e
Osium	105.h	Partes simplices	ibidem.b	περιτοναί	4.d
Osium	109.f	Partes prima	ibidem	περιτοναί	11.a
Osium	ibidem	Partes in composita	ibidem	περιτοναί	201.a
Osium	108.g	Partes similes	ibidem	περιτοναί	30.h
Osium	ibidem	Partes similes molles	11.h	περιτοναί	179.d
Osium	ibidem	Partes similes solide	12.a	περιτοναί	49.c
Osium	ibidem	Partes dissimiles	3.c	περιτοναί	20.f
Osium	ibidem	Partes organice	ibidem.b	περιτοναί	37.g
Osium	ibidem	Partes instrumentales	ibidem	περιτοναί	16.h.51.h
Osium	ibidem	Partes officiales	ibidem	περιτοναί	179.d
Osium	ibidem	Partes	7.c.d.15.e.16.c	περιτοναί	ibidem.e
Osium	ibidem	Partes	7.a.16.b	περιτοναί	20.d
Osium	105.e	Pectus	15.d.16.b	περιτοναί	111.b
Osium	105.e	Pectus	5.e.6.b	περιτοναί	35.f
Osium	208.e	Pectus	5.e	περιτοναί	7.c.e
Osium	10.h	Pectus	7.d.f.15.h	περιτοναί	16.b
Osium	5.a	Pectus	15.h	περιτοναί	11.f.36.f.198.b
Osium	ibidem	Pectus	7.c.15.h	περιτοναί	11.a
Osium	10.h.11.e	Pectus	7.d	περιτοναί	6.b.16.b
Osium	5.g	Pectus	ibidem	περιτοναί	14.b
Osium	20.f	Pectus	4.f	περιτοναί	5.h.6.d
Osium	4.g	Pectus	5.f.6.c	περιτοναί	112.e
Osium	42.e	Pectus	16.h.104.c	περιτοναί	47.a
Osium	4.h	Pectus	20.e.f	περιτοναί	6.g.7.a
Osium	17.d	Pectus	17.g	περιτοναί	15.c
Osium	31.b	Pectus	ibidem	περιτοναί	13.g
Osium	11.e	Pectus	4.e	περιτοναί	7.f
Osium	4.b.5.a	Pectus	5.g.6.c	περιτοναί	8.d.20.e
Osium	112.e	Pectus	6.d	περιτοναί	36.h
Osium	6.f.7.a	Pectus	113.d	περιτοναί	7.e
Osium	3.g.4.f	Pectus	ibidem	περιτοναί	7.d.e
Osium	208.c	Pectus	17.e	περιτοναί	5.f.10.e.11.4.61.f
Osium	49.a	Pectus	ibidem	περιτοναί	5.g.6.c
Osium	5.e.6.b	Pectus	ibidem	περιτοναί	56.f
Osium	6.g	Pectus	18.b	περιτοναί	5.e.6.b
Osium	7.d	Pectus	17.g.18.b	περιτοναί	7.a.b
Osium		Pectus		περιτοναί	14.c

# INDEX.

πυλός	6.d.11.g	Scapula	5.h.6.f.h.38.b	Spina/scapularum	14.e.f
πυλός	74.f	Scapularum ossa lata	14.d	Spinalis medulla	19.d
πυλός	6.b	σκαλός	7.d	Spinula piscium	138.d
πυλός	104.f	σκαλός	4.f	Spiratio	27.c
Promuscia	56.f	Schodon	180.f	σπασίον	11.4
πυλός	16.b	Schiston	42.f	σπασίον	ibidem
Propolis	179.e.183.d	σπασίον	ibidem	σπασίον	14.4
πυλός	7.e	σπασίον	15.e	Squama	16.h
πυλός	6.e	σπασίον	17.d	σπασίον	5.b
Pubes	5.f.6.e	σπασίον	142.b	σπασίον	19.a
Pudenda	ibidem	Scaptula	5.h.14.d.16.a	σπασίον	6.e
Pulmo	10.e.11.a	Scaptula aperta	6.e	σπασίον	4.b.11.g
πυλός	6.d	Scaptula cervix	ibidem	σπασίον	13.g
πυλός	11.b	Scorium	5.g.6.c	Stercus	20.e.f.51.h
πυλός	31.h	Scorium	ibidem	σπασίον	16.b
πυλός	14.b	σπασίον	15.c	σπασίον	ibidem
πυλός	42.f	Sebium	18.h.19.a	σπασίον	6.b.14.f.g
πυλός	ibidem	Secunde membrane	18.a	σπασίον	7.e
πυλός	30.e	σπασίον	22.g	σπασίον	6.b
πυλός	20.a	Senectus	ibidem.c	σπασίον	7.b
R		Septum	201.b.c	σπασίον	3.g
πυλός	6.e.14.a.e	Septum	ibidem	σπασίον	5.4
πυλός	4.h	Septum	10.e	σπασίον	11.h
πυλός	14.e.f	Septum transversum	10.b.e.35.b	σπασίον	5.4
πυλός	9.e	Septum marinum	4.h	Stomachus	ibidem
πυλός	4.f	Serotini dentes	ibidem.d	σπασίον	49.c
πυλός	4.e.16.e.32.f.103.e	Serum	19.f.20.a.42.h	σπασίον	16.a
πυλός	16.a	σπασίον	16.a	σπασίον	ibidem
πυλός	ibidem	Sesum	18.h	σπασίον	4.h
Retiformis membrana	8.d	Sextana salsamenta	165.g.h.	σπασίον	15.b
Renes	10.g.11.a	σπασίον	167.f	Sudor	12.f.20.e.f.41.a
πυλός	4.h	σπασίον	4.h	Sumen	6.a.84.e.g
πυλός	4.h.32.f	σπασίον	20.f	Supercilia	3.g.4.f
πυλός	179.g	Sibilus	27.c	Superciliorum cauda	3.g
Rostrium	16.f.103.e	σπασίον	20.f	Sura	7.c.d
Rugae	3.g	σπασίον	11.a	Sura os	15.e.16.e
πυλός	4.e.16.f.32.f.34.e.	Sinciput	3.f.4.e.13.f	Sutura	16.a
πυλός	52.a.103.e	Sinus cordis	10.d	σπασίον	56.b
πυλός	32.a	Sinus matricis	36.f	σπασίον	31.h
S		σπασίον	14.d	σπασίον	13.a
Salina	20.e.f.51.a	Sonus	27.c	σπασίον	20.f
Salsamentum	165.f	σπασίον	4.d	σπασίον	27.d
Salsamenta horaa	ibidem.h	σπασίον	20.b	σπασίον	10.d
Salsura	ibidem.f	σπασίον	4.h	Talus	7.d.15.f.16.c.33.f
σπασίον	179.f	σπασίον	184.a	πυλός	165.f
Sanguis	12.d.f.36.b.37.a.b	σπασίον	13.h	πυλός	ibidem
Sanies	12.e.f	σπασίον	11.d	πυλός	3.h.4.f
Sarda	165.h	σπασίον	16.c	πυλός	7.b
Sardica salsamenta	ibidem	Spina	6.e.14.a.16.a	πυλός	ibidem.d.ē
σπασίον	18.c	Spina dorsi	ibidem	Tarso ossa	4.f
σπασίον	4.g	Spina os	13.c	πυλός	74.d
σπασίον	4.e	Spina piscium	138.d		
σπασίον	15.g.h				

# PARTIV M ANIMALIVM

Taurocola	ibidem	Tubercula ossium	16.a	Vina	6.h
ταῦρος	6.c	Tunica	17.e	Vmbilicus	5.f.6.b.38.e
πάλμα	7.e	τύλις	3.g	Vmbilicus in pectus	139.h
Tempora	4.a.e.h	τύλομαι	7.e	Vnguis	6.g
Tendines	12.h.13.a.b	τυφλὸς πῖρος	8.e	Vngula	16.e
Tendones	13.b	τυφλὸν ὀπίσθον	11.g	Vox	27.c
τίσις	5.d.13.b	τυρεὶς	42.h	Vrina oua	106.f
Testes	5.g.6.c.11.f.25.d.			Vrogygium	104.b
36.a.53.c		Vas seminarium	36.h	Vterus	5.f.g.6.c.d.11.f.h.36.d.
πῖστρον	15.g	Vellera	77.g	Vna	4.e.5.b
ἄλλα	6.b	Volumina	ibidem	Vulva	5.f.6.c.h.11.f
ἄλν	23.a	Vena	12.b.f	Vulva ciectitia	84.b
ἄλαρ	7.a.b	Venacava	12.b	Vulva porcaria	ibidem
ἄλος in mollibus	198.f.g	Vena capitalis	ibidem		
Thorax	5.e.6.a	Vena iccoparia	ibidem	Xylocolla	74.d
ἄρερ	20.b.138.b	Venarum ortus & divisio	12.b	ξύφος in lolligine	167.h.199.
Spil	16.h	Venarum nomine etiam arterias	4.201.c		
Thurnium falsamentum	165.h	appellari	ibidem	ξύφος in xypria	6.b.14.g
θύμος	6.a	Venenum anguinum	67.a	ξύς	3.h
θύμς	18.h	Venter	5.f.6.b.35.e.53.e		
Thynnium falsamentum	165.h	Venter imus	6.c	Υαλοὶδης oculi humor	9.a
Thynnium falsamentum	ibidem	Ventriculus	11.b.g	ύμης	18.b
θυείας in sanis apum	179.d	Ventriculi os	ibidem	ύμω πρὸς ὀπίσθον	17.d
Tibia	7.c.d.15.e.16.c	Ventriculi cerebri	8.g	ύσθρ os	16.e
τιτθίς	6.b	Ventriculi cordis	11.a	ύπαιπια γαστρίς	31.a
τιτθίς	ibidem	Ventrebra	14.a	ύπαιπια	4.b
τομῆς dentes	4.c.5.b	Vertebra colli	16.a	ύπαζωκὸς ύμης	17.e
Tomus Thuriarum	167.h	Vesica	11.b.g.18.c	ύπαχίος	6.b
Tonsille	4.c.5.a.b	Vesica cervix	11.h	ύπακίς	5.c.d
Tongular	8.f	Vesica maior	18.a	ύπαλαστίς	4.e
τράχη ἀρπεία	5.d	Vesica minor	ibidem	ύπαλαστίς	6.d
τράχελος	ibidem	Vesica bitem continens	ibidem	ύπασιμα	5.g.6.e
τράχελος ὀπίσθιος	11.h	Vespetum	184.a	ύπασιμα	7.a
τράχελος ὀπίσθιος	16.a	Vestigium	7.e	ύπείρε	6.c.11.h
τράχελος	6.c	Vetula	6.b		
Transpiratio sensum latens	20.f	Viscera	10.b.11.a	Ζυγορδῆς	16.a
τρίχια	49.c	Vitellus oui	105.e	Ζύγωμα	ibidem
τράχελος	15.e	Vitreus humor oculi	9.a		



Vol. 2. pag. 1. in maxime nervosis & lege libi te quo. f. 2. nerv. 6. male in q. nerv. 2. hirsutia. ibi. in max. vir. 4. 11. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851. 852. 853. 854. 855. 856. 857. 858. 859. 860. 861. 862. 863. 864. 865. 866. 867. 868. 869. 870. 871. 872. 873. 874. 875. 876. 877. 878. 879. 880. 881. 882. 883. 884. 885. 886. 887. 888. 889. 890. 891. 892. 893. 894. 895. 896. 897. 898. 899. 900. 901. 902. 903. 904. 905. 906. 907. 908. 909. 910. 911. 912. 913. 914. 915. 916. 917. 918. 919. 920. 921. 922. 923. 924. 925. 926. 927. 928. 929. 930. 931. 932. 933. 934. 935. 936. 937. 938. 939. 940. 941. 942. 943. 944. 945. 946. 947. 948. 949. 950. 951. 952. 953. 954. 955. 956. 957. 958. 959. 960. 961. 962. 963. 964. 965. 966. 967. 968. 969. 970. 971. 972. 973. 974. 975. 976. 977. 978. 979. 980. 981. 982. 983. 984. 985. 986. 987. 988. 989. 990. 991. 992. 993. 994. 995. 996. 997. 998. 999. 1000.









